






+QK313
.C3
1828
pt.1











BOTANICON GALLICUM.

PARS I.

On vend dans la même Librairie :

LA FLORE FRANÇAISE, ou Description de toutes les Plantes qui croissent naturellement en France, disposée selon une nouvelle méthode d'analyse, et précédée d'un exposé des principes de la Botanique; par MM. *de Lamarck*, membre de l'Institut, professeur au Muséum d'Histoire naturelle, et *De Candolle*, professeur de botanique à Genève; troisième édition, 6 gros vol. grand in-8., fig. et cartes, br.

48 fr.

Cet ouvrage contient la description de six mille espèces; il est accompagné d'une belle Carte botanique sur papier grand-aigle, laquelle indique, par des couleurs diverses, les cantons où croissent les plantes particulières aux différentes contrées de la France, et il est orné de 11 grandes planches, sur lesquelles sont représentées plus de 200 figures servant à l'intelligence de l'étude des végétaux.

DE L'IMPRIMERIE DE CRAPELET,

RUE DE VAUGIRARD, N° 9.

AUG. PYRAMI DE CANDOLLE

BOTANICON GALLICUM

SEU

SYNOPSIS

PLANTARUM IN FLORA GALLICA
DESCRIPTARUM.

EDITIO SECUNDA.

EX HERBARIIS ET SCHEDIS CANDOLLIANIS PROPRIISQUE DIGESTUM

A

J. E. DUBY v. d. M.

PARS PRIMA

Plantas Vasculares continens.

PARIS.

V^E DESRAY, RUE HAUTEFEUILLE, N^o 4.

1828.

LIBRARY

CS
1828
plat

LECTORI.

Quum mihi summus Candollius , pro suâ erga me amicitiâ et indulgentiâ , curam concesserit secundam suæ Synopsis plantarum in Florâ Gallicâ descriptarum editionem elaborandi , et mihi cum maximâ benevolentî herbarium et ineditas notas communicaverit , suisque optimis monitis adjuverit , omni ope atque operâ enixus sum ut tantis adminiculis me ostenderem dignum et ut quantum in me esset vacua quæ ex temporis lapsû et Scientiæ progressibus in primâ editione extabant , completem , Gallicæque Botanices studium facilius redderem. Idecò , paucis mutatis , ex tribus primis Prodromi systematis naturalis Regni Vegetabilis voluminibus (quorum tertium mihi tantùm in manuscripto et labore meo jam pro parte perfecto innotuit) , omnia quæ de plantis Gallicis dicta sunt excerpti. Quoad reliquas familias quas Magistri manus nondum pertractaverat , enixe conatus sum ne nimia cum prioribus inesset differentia , et quas , opus meum persequendo , in schedis viri summi notas aut observationes reperi , has sedulò adhibui et designavi signo *DC. mss.* aut *DC. herb.*

Non tantum ex herbariis et schedis Candolianis , undè hocce *Botanicon Gallicum* ederem , desumpsi , sed etiam ex propriis schedis et herbariis nec non ex observationibus quas suppeditarunt mea per Galliam itinera et meum cum multis doctis Botanicis commercium. Hâc occasione datâ liceat animo grato profiteri quantum debeam viris clarissimis *Vaucher* , *Roeper* , *Choisy* , *Seringe* , *Des Moulins* , *Prost* , *Le Prévost* , *Delise* , *de Brébisson* , *Soleirol* , *Chauvin* , *Grateloup* , *Desmazières* , *Lenormand* , *Solier* , *Graves* , *Monnier* , *Stire* , *Despréaux* , *d'Orbigny* , *E. Mercier* , etc. , etc. , qui me aut laboribus ineditis , aut observationibus , aut plantis rarissimis , pro singulari benevolentî adjuvare non dedignati sunt.

Ut pateat quænam fiducia tribuenda sit designatæ specierum stationi, sedulò signum *v. v.* plantis addidi quas ego et celeberrimus Floræ Gallicæ auctor vivas in loco indicato vidimus. Quas solus in loco natali vidit Candollius signo *v. v. DC.*, quas solus ipse signo *v. v. D.*, quas vero nec ille nec ego vivas in provinciis in quibus collectæ fuerunt sed tamen ex his provinciis siccas vidimus, signo *v. s.*, quas denique in provinciâ quâdam viventes testantur auctores, sed quarum specimina in Galliâ collecta non vidi, signo *v. s. ex Hispaniâ*, *v. s. ex Germaniâ* etc., *v. c.* (vidi cultam), *v. s. c.* (vidi siccam cultam), indicavi. Quum Botanici cujusdam nomen curvæ lineolæ complectuntur, tum specimina ex hoc Botanico proficiscentia vidi ; quum vero hoc nomen particula *ex* prægreditur, tum specimina ex loco indicato orta non vidi, ita ut si quis error irrepererit, non mihi sed Botanico laudato tribuendus sit.

Hocce primum volumen tres plantarum Vascularium classes continens, quam citissimè, Deo volente, insequetur volumen secundum, jam prelo subjectum et quod quartam classem seu Cellulares, supplementa varia, clavim analyticam et indicem amborum voluminum continebit.

Die primâ februario 1828.

J. DUBY v. d. M.

INDEX.

I. Plantæ VASCULARES seu COTYLEDONEÆ.....	Pag. 1
Classis prima. DICOTYLEDONEAE seu EXOGENAE.....	<i>ibid.</i>
Subclassis I. THALAMIFLORÆ.....	<i>ibid.</i>
Ordo I. Ranunculaceæ.....	2
Trib. I. Clematideæ.....	<i>ibid.</i>
II. Anemoneæ.....	3
III. Ranunculeæ.....	7
IV. Helleboreæ.....	13
V. Pæoniaceæ.....	18
Ordo II. Berberideæ.....	19
III. Nymphæaceæ.....	20
IV. Papaveraceæ.....	21
V. Fumariaceæ.....	24
VI. Cruciferæ.....	26
Subordo I. Pleurorhizeæ.....	<i>ibid.</i>
Trib. I. Arabideæ.....	<i>ibid.</i>
II. Alyssineæ.....	33
III. Thlaspideæ.....	38
IV. Cakilinææ.....	42
Subordo II. Notorhizeæ.....	<i>ibid.</i>
Trib. V. Sisymbreæ.....	<i>ibid.</i>
VI. Camelineæ.....	46
VII. Lepidineæ.....	47
VIII. Isatideæ.....	49
Subordo III. Orthoploceæ.....	50
Trib. IX. Brassiceæ.....	<i>ibid.</i>
X. Zilleæ.....	53
XI. Raphaneæ.....	54
Subordo IV. Spirolobeæ.....	55
Trib. XII. Buniadeæ.....	<i>ibid.</i>
Subordo V. Diplecolobeæ.....	<i>ibid.</i>
Trib. XIII. Subularieæ.....	<i>ibid.</i>
Ordo VII. Capparideæ.....	56
VIII. Cistineæ.....	57
IX. Violarieæ.....	63
X. Resedaceæ.....	66
XI. Droseraceæ.....	68
XII. Polygaleæ.....	69
XIII. Frankeniaceæ.....	70
XIV. Cariophylleæ.....	71
Trib. I. Sileneæ.....	<i>ibid.</i>
II. Alsineæ.....	80
Ordo XV. Lineæ.....	88
XVI. Malvaceæ.....	90
XVII. Tiliaceæ.....	94
XVIII. Aurantiaceæ.....	<i>ibid.</i>
XIX. Hypericææ.....	96
XX. Acerineæ.....	98
XXI. Hippocastaneæ.....	99
XXII. Meliaceæ.....	100
XXIII. Ampelideæ.....	<i>ibid.</i>
XXIV. Geraniaceæ.....	101
XXV. Tropæoleæ.....	105
XXVI. Balsamineæ.....	<i>ibid.</i>
XXVII. Oxalideæ.....	106

	Pag.
Ordo XXXVIII. Zygophylleæ.....	107
XXIX. Rutaceæ.....	108
XXIX bis. Coriarieæ.....	xij
Subclassis II. CALYCIFLORÆ.....	109
Ordo XXX. Celastrineæ.....	ibid.
Trib. I. Staphylaceæ.....	ibid.
II. Evonymeæ.....	ibid.
III. Aquifoliaceæ.....	110
Ordo XXXI. Rhamneæ.....	ibid.
XXXII. Terebinthaceæ.....	112
Trib. I. Anacardieæ.....	ibid.
II. Sumachineæ.....	113
III. Pteleaceæ.....	ibid.
Ordo XXXIII. Leguminosæ.....	114
Subordo I. Papilionaceæ.....	ibid.
Trib. I. Sophoreæ.....	115
II. Loteæ.....	ibid.
III. Hedyssareæ.....	144
IV. Vicieæ.....	149
V. Phaseolæ.....	159
Subordo II. Cesalpinieæ.....	161
Trib. VI. Cassieæ.....	ibid.
Ordo XXXIV. Rosaceæ.....	162
Trib. I. Amygdaleæ.....	ibid.
II. Spireaceæ.....	164
III. Dryadeæ.....	165
IV. Sanguisorbeæ.....	173
V. Roseæ.....	175
VI. Pomaceæ.....	179
Ordo XXXV. Granateæ.....	183
XXXVI. Myrtaceæ.....	ibid.
Trib. I. Myrtleæ.....	184
II. Philadelphææ.....	ibid.
Ordo XXXVII. Cucurbitaceæ.....	185
XXXVIII. Onagrarieæ.....	187
Trib. I. Onagreæ.....	ibid.
II. Jussieæ.....	188
III. Hydrocaryes.....	189
Ordo XXXIX. Halorageæ.....	190
Trib. I. Cercidianæ.....	ibid.
II. Callitrichineæ.....	191
III. Hippurideæ.....	ibid.
Ordo XL. Ceratophylleæ.....	192
XLI. Lythrarieæ.....	ibid.
XLII. Tamariscineæ.....	194
XLIII. Portulaceæ.....	195
XLIV. Paronychieæ.....	196
Trib. I. Telephieæ.....	ibid.
II. Illecebreae.....	197
III. Polycarpeæ.....	199
IV. Sclerantheæ.....	ibid.
V. Minuartieæ.....	ibid.
Ordo XLV. Crassulaceæ.....	200
XLVI. Nopaleæ.....	205
XLVII. Ficoideæ.....	ibid.
XLVIII. Grossularieæ.....	206
XLIX. Saxifrageæ.....	207
L. Umbelliferae.....	213
Trib. I. Thapsieæ.....	ibid.

	Pag.
Trib. II. <i>Daucineæ</i>	215
III. <i>Caucalineæ</i>	216
IV. <i>Coriandreeæ</i>	217
V. <i>Silerineæ</i>	218
VI. <i>Tordylineæ</i>	<i>ibid.</i>
VII. <i>Peucedaneæ</i>	219
VIII. <i>Angeliceæ</i>	223
IX. <i>Seselineæ</i>	225
X. <i>Scandincineæ</i>	238
XI. <i>Smyrneæ</i>	240
XII. <i>Saniculeæ</i>	242
XIII. <i>Hydrocotylinaeæ</i>	243
Ordo LI. <i>Caprifoliaeæ</i>	244
Trib. I. <i>Hederaceæ</i>	<i>ibid.</i>
II. <i>Sambucineæ</i>	<i>ibid.</i>
III. <i>Caprifolieæ</i>	245
Ordo LII. <i>Lorantheæ</i>	246
— LIII. <i>Rubiaceæ</i>	247
— LIV. <i>Valerianæ</i>	252
— LV. <i>Dipsaceæ</i>	255
— LVI. <i>Compositæ</i>	258
Trib. I. <i>Corymbiferæ</i>	259
II. <i>Cynarocephalæ</i>	280
III. <i>Cichoraceæ</i>	294
Ordo LVII. <i>Lobeliaceæ</i>	310
LVIII. <i>Campanulaceæ</i>	311
LIX. <i>Vaccinieæ</i>	315
LX. <i>Ericineæ</i>	316
Trib. I. <i>Ericaceæ</i>	<i>ibid.</i>
II. <i>Rhodoraceæ</i>	318
Ordo LXI. <i>Monotropæ</i>	319
Subclassis III. COROLLIFLORÆ.....	320
Ordo LXII. <i>Ebenaceæ</i>	<i>ibid.</i>
Trib. I. <i>Diospyreæ</i>	<i>ibid.</i>
II. <i>Styraceæ</i>	<i>ibid.</i>
Ordo LXIII. <i>Jasmineæ</i>	321
Trib. I. <i>Jasmineæ</i>	<i>ibid.</i>
II. <i>Lilaceæ</i>	322
Ordo LXIV. <i>Apocyneæ</i>	323
Trib. I. <i>Asclepiadæ</i>	<i>ibid.</i>
II. <i>Vinceæ</i>	324
Ordo LXV. <i>Gentianeæ</i>	325
LXVI. <i>Polemonideæ</i>	329
LXVII. <i>Convolvulaceæ</i>	<i>ibid.</i>
LXVIII. <i>Borragineæ</i>	331
LXIX. <i>Solanæ</i>	337
LXX. <i>Antirrhineæ</i>	342
LXXI. <i>Orobanchæ</i>	348
LXXII. <i>Rhinanthaceæ</i>	351
Trib. I. <i>Pedicularineæ</i>	<i>ibid.</i>
II. <i>Veronicaeæ</i>	355
Ordo LXXIII. <i>Labiataeæ</i>	359
LXXIV. <i>Verbenaceæ</i>	377
LXXV. <i>Acanthaceæ</i>	378
LXXVI. <i>Lentibularieæ</i>	<i>ibid.</i>
LXXVII. <i>Primulaceæ</i>	379
LXXVIII. <i>Globularieæ</i>	386
Subclassis IV. MONOCHLAMYDEÆ.....	387
Ordo LXXIX. <i>Plumbagineæ</i>	<i>ibid.</i>

Ordo LXXX. Plantagineæ.....	Pag. 390
LXXXI. Nyctagineæ.....	393
LXXXII. Amaranthaceæ.....	<i>ibid.</i>
LXXXIII. Chenopodeæ.....	394
Trib. I. Atripliceæ.....	<i>ibid.</i>
II. Phytolaceæ.....	399
Ordo LXXXIV. Polygoneæ.....	400
LXXXIV <i>bis.</i> Thymeleæ.....	405
LXXXV. Laurineæ.....	407
LXXXVI. Santalaceæ.....	408
LXXXVII. Elæagnæ.....	409
LXXXVIII. Cytineæ.....	410
LXXXIX. Aristolochieæ.....	<i>ibid.</i>
XC. Euphorbiaceæ.....	411
XCI. Urticeæ.....	417
Trib. I. Urticeæ.....	<i>ibid.</i>
II. Artocarpeæ.....	419
Ordo XCII. Juglandeæ.....	420
XCIII. Amentaceæ.....	<i>ibid.</i>
Trib. I. Celtideæ.....	421
II. Betulineæ.....	<i>ibid.</i>
III. Salicineæ.....	423
IV. Quercineæ.....	428
V. Plataneæ.....	430
VI. Myrificeæ.....	<i>ibid.</i>
Ordo XCIV. Coniferae.....	431
Trib. I. Taxineæ.....	<i>ibid.</i>
II. Cupressineæ.....	432
III. Abietineæ.....	433
Classis secunda. MONOCOTYLEDONEAE seu ENDOGENAE PHANE- ROGAMAE.....	435
Ordo XCV. Hydrocharideæ.....	<i>ibid.</i>
XCVI. Alismaceæ.....	437
Trib. I. Butomeæ.....	<i>ibid.</i>
II. Alismoideæ.....	<i>ibid.</i>
III. Juncagineæ.....	438
Ordo XCVII. Potameæ.....	439
XCVIII. Orchideæ.....	442
XCIX. Irideæ.....	451
C. Amaryllideæ.....	454
CI. Asparageæ.....	458
CII. Liliaceæ.....	461
Trib. I. Tulipaceæ.....	<i>ibid.</i>
II. Asphodeleæ.....	463
III. Hemerocallideæ.....	471
Ordo CIII. Bromeliaceæ.....	472
CIV. Colchicaceæ.....	473
CV. Junceæ.....	474
CVI. Palmæ.....	480
CVII. Aroideæ.....	<i>ibid.</i>
Trib. I. Aroideæ.....	<i>ibid.</i>
II. Orontiaceæ.....	481
Ordo CVIII. Typhaceæ.....	482
CIX. Cyperaceæ.....	483
Ordo CX. Gramineæ.....	499
CXI ? Lemnaceæ.....	532
Classis tertia. MONOCOTYLEDONEAE seu ENDOGENAE CRYPTOGAMÆ.....	533
Ordo CXII. Characeæ.....	<i>ibid.</i>
CXIII. Equisetaceæ.....	534

INDEX.

xj

Ordo CXIV. Filices.....	Pag. 536
Trib. I. <i>Ophioglossaceæ</i>	<i>ibid.</i>
II. <i>Osmundaceæ</i>	<i>ibid.</i>
III. <i>Polypodiaceæ</i>	537
Ordo CXV. Marsileaceæ.....	542
Trib. I. <i>Salvinieæ</i>	<i>ibid.</i>
II. <i>Marsileæ</i>	<i>ibid.</i>
Ordo CXVI. Lycopodiaceæ.....	543
Trib. I. <i>Isoetideæ</i>	<i>ibid.</i>
II. <i>Lycopodieæ</i>	<i>ibid.</i>

FINIS INDICIS.

Ordo in loco suo post Rutaceas omissus.

Ordo XXIX bis. CORIARIEÆ DC. prod. 1. p. 739.


Flores hermaphroditæ aut sexūs unius abortu monoöci dioïcive. Calyx (aut Perigonium) 1-sepalus campanulatus 10-fidus, lobis 5 exterioribus majoribus ovatis, interioribus 5 alternis minoribus callosis. Petala 0. Stamina 10 è toro exserta, 5 inter calycis lobos externos et ovarii angulos, 5 inter calycis lobos internos et ovarii sulcos. Antheræ oblongæ 2-loculares. Ovarium toro crassiusculo insidens 5-loculare 5-angulare. Stylus 0. Stigmata 5 ex apice longa subulata. Carpella 5 ad matritatem discreta approximata indehiscentia 1-sperma glandulosis lobis ampliatis cincta. Semen in carpello pendulum. Albumen 0. Embryo rectus, radiculâ superâ, cotyledonibus 2 carnosis. — Frutices ramis subtetragonis oppositis. Folia opposita simplicia integra. Florum racemi terminales. — Ordini locus in serie naturali dubius.

I. CORIARIA *Niss. act. par. 1711. t. 12.*

Character isdem ac ordinis.

1. C. MYRTIFOLIA (L. sp. 1467.) foliis ovato-lanceolatis acutis triplinerviis subpetiolatis glabris, racemis erectiusculis. ♂ ad sepes in provinciis Mediterraneis. — Fl. fr. 4. p. 920. Lam. ill. t. 822. Dubam. arb. 1. t. 73. (v. v.)





BOTANICON —

GALLICUM.

I. PLANTÆ VASCULARRES SEU COTYLEDONEÆ.

CAR. Plantæ contextu cellulozo vasisque lymphaticis constantes; stomatibus donatæ, foliis veris instructæ. Flores saepius distincti. Embryo intrà spermodermium inclusus, cotyledonibus instructus.

Classis Prima. DICOTYLEDONEÆ seu EXOGENÆ.

CAR. Truncus constans corporibus duobus, ligneo nempè et corticali, juxta leges inversas crescentibus. Corpus ligneum exhibens in centro medullam è quâ productiones medullares radiantes trans strata lignea annua, alia (lignum) interiora seniora duriora, alia (alburnum) exteriora juniora molliora albida. Cortex constans complexu cellulozo, sub epidermide sito, et stratis corticalibus aliis exterioribus senioribus, aliis interioribus junioribus nomine Libri insignitis. Folia nervis ramosis anastomosantibus. Flores distincti, symmetrici, saepius numero quinario dispositi. Embryo cotyledonibus, saepius 2 oppositis, rarius plurimis verticillatis, constans.

Subclassis I. THALAMIFLORÆ.

Calyx poly-sepalus. Petala plurima distincta, staminaque thalamo inserta nec calyci accreta.

Ord. I. RANUNCULACEÆ. Juss. 231. DC. syst. I. p. 127.

Perigonum duplex, utrumque liberum hypogynum. Sepala 3-6. Petala sepalorum numero æqualia dupla triplave, libera, æstivatione imbricatâ, rariùs abortū nulla, nunc ex filamentis dilatatis facta et tunc plana, nunc ex antheris transformatis orta et tunc cucullata. Stamina hypogyna, libera, numero indefinita. Antheræ adnatæ. Pistilla ∞ toro inserta, abortu aut coalitione rariùs solitaria. Carpella alia pseudosperma, alia baccata, alia capsularia aut follicularia, 1- ∞ -sperma. Semina nunc solitaria erecta aut pendula, nunc plurima secùs carpelli margines seriatim disposita. Albumen corneum. Embryo minimus, intrà albuminis foveolam locatus. — Herbæ aut suffrutices. Folia basi in vaginam semi-amplexicaulem sæpiùs dilatata simplicia, sæpè variè secta. Pili o aut simplices.

Trib. I. CLEMATIDEÆ. DC. syst. I. p. 131.

Calycis æstivatio valvata aut induplicata. Antheræ lineares extrorsæ. Carpella 1-sperma indehiscentia stylo accreto caudata. — Folia opposita; radices fibrosæ.

I. CLEMATIS. DC. syst. I. p. 131.

Involucrum o aut calyciforme sub flore; sepala 4-8 colorata; petala o aut sepalis breviora; cariopsis ∞ in caudam sæpiùs barbato-plumosa productæ. — Radices perennes.

Sect. I. FLAMMULA. DC. l. c.

Invol. o; pet. o; carpellorum caudæ longæ barbato-plumosæ.

1. C. ERECTA (All. ped. n. 1078.) caule erecto, foliis pinnatisectis, segmentis petiolulatis ovato-lanceolatis integerrimis. \mathcal{U} in collibus Galliae Mediterraneæ. — Fl. fr. 4. p. 873. C. recta. L. sp. 767. — Lob. ic. 627. f. 2. (v. v.)

2. C. FLAMMULA (L. sp. 766.) caule scandente, foliis pinnatisectis, segmentis glabris integris trilobisve orbiculatis ovalibus oblongis sublinearibusve acutiusculis. in \mathfrak{f} sterilibus et sepibus Galliae Mediterraneæ. — Fl. fr. 4. p. 873. — Lob. ic. 627. f. 1.

α . vulgaris (DC.) fol. segmentis ovali-ant oblongo-lanceolatis. (v. v.)

β . maritima (DC.) fol. segmentis linearibus. In maritimis prope Monspelium. C. maritima, L. sp. 767? fl. fr. 5. p. 562. (v. v.)

+ 3. C. VITALBA (L. sp. 766.) caule scandente, foliis pinnatisectis, segmentis ovato-lanceolatis dentato-incisis acuminatis basi truncato-cordatis, pedunculis foliis subbrevioribus. \mathfrak{f} in sepibus. — Fl. fr. 4. p. 872. — Lob. ic. 626. f. 1. (v. v.)


β . integrata (DC.) segmentis paucissimis dentatis integerrimisve. (v. v.)

4. C. INTEGRIFOLIA (L. sp. 767.) pedunculis unifloris, floribus nutantibus, foliis integris ovato-lanceolatis glabris. \mathcal{U} in Pyrenæis ex Lapeyr. — Fl. fr. 5. p. 532. — Lob. ic. 628. f. 1. (v. v. c.)

Sect. II. CHEIROPSIS. DC. syst. I. p. 162.

Involucrum calyciforme è duabus bracteis coalitis sub flore ad apicem pedunculi situm; petala o; caudæ barbate.





5. *C. CIRRHOSEA* (L. sp. 766.) foliis ovato-subcordatis dentatis fasciculatis, pedunculis 1-floris involucratis, flore minore pallido intra involucrum pedicellato. ♂ ex Corsicâ acceptam misit Solier. — Bot. mag. t. 1070. *C. cirrhosa* ♂ pedicellata DC. prod. 1. p. 9. (v. s.)

6. *C. BALEARICA* (Rich. in Journ. phys. 1779, fevr. 127 cum ic. non Pers.) pedunculis unifloris sub flore involueratis, foliis ternatim sectis, segmentis petiolatis 3-lobis dentato-incisis. ♂ in Corsicâ reperit cl. Soleiro. — *C. calycina* Schrank. mon. t. 15. Involucrum campanulatum subbilobum obtusum florem arcte cingens. (v. s.)

Sect. III. ATRAGENE. DC. prod. 1. p. 9.

Involucrum o; sepala 4; petala 8; caudæ barbatæ.

7. *C. ALPINA* (Mill. dict. n. 9.) pedunculis unifloris folio longioribus, foliis biinternatim sectis, segmentis ovato-lanceolatis acuminatis serratis, petalis subspathulatis obtusis. ♂ in dumetis asperis subsylvaticis Alpium rariüs, et forsitan Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 874. *Atragene Alpina* L. sp. 764. — J. Bauh. 2. p. 129. f. 2. Fl. cœrulei raro albi. (v. v.)

Trib. II. ANEMONEÆ. DC. syst. 1. p. 168.

Calycis corollæque æstivatio imbricativa. Carpella 1-sperma indehiscentia in caudas mucronesve sèpiùs desinentia. — Folia radicalia aut alterna.

II. THALICTRUM. L. gen. 697. DC. syst. 1. p. 168.

Involucrum sub flore o; petala o; carpella sicca in caudas non desinentia, nunc stipitata, nunc longitudinaliter striato-sulcata. — Herbae ♀.

Sect. I. TRIPTERIUM. DC. l. c.

Fructus triqueter, angulis alatis, substipitatus.

1. *T. AQUILEGIFOLIUM* (L. sp. 770.) stipellis ovatis binis ad basin petioli ramificationum, paniculæ corymbosa, fructibus triquetris. ♀ in subsylvaticis montosis. — Fl. fr. 4. p. 878. — Moris. s. 9. t. 20. f. 4. n. 16. (v. v.)

Sect. II. EUTHALICTRUM. DC. l. c. p. 172.

Fructus ovato-oblongus striatus sessilis.

2. *T. ALPINUM* (L. sp. 767.) caule simplicissimo subnudo digitali, racemo simplici terminali, floribus nutantibus, foliorum segmentis glabris. ♀ in pascuis editioribus Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 874. — Moris. s. 9. t. 20. fig. ult. n. 14. (v. v.)

3. *T. FOETIDUM* (L. sp. 768?) caule simplici basi nudo medio folioso apice paniculato, foliis pubescenti-viscidis, segmentis dentibus obtusis. ♀ in Alpium Galloprovinciæ vallibus. — Fl. fr. 4. p. 875. Lam. ill. t. 497. f. 3. — Moris. s. 9. t. 20. f. 10. n. 13. (v. s.)

4. *T. PUBESCENS* (Schl. in fl. fr. 5. p. 633.) caule simplici foliis sparsis obsito apice paniculato, foliis subpubescenti-viscidulis. ♀ in lapidosis calcareis Occitanie, Galloprov. et Delphin. inferioris. — Gon. hort. 263. Vill. 4. p. 714. (v. v. DC.)

5. *T. MINUS* (L. sp. 767.) caule tereti polline glauco, floribus laxè paniculatis cernuis 4-sepalis, foliorum segmentis glabris subrotundis apice dentatis subtùs glaucis, carpellis utrinquè acutis. ♀ in pratis montosis subsylvaticis. — Fl. fr. 4. p. 875. Jacq. aust. t. 419. — Tabern. n. t. 55. f. 2. (v. v.)

6. *T. SAXATILE* (DC. Fl. fr. 5. p. 633.) caule tereti polline glauco destituto, floribus paniculatis erectis, fol. segmentis glabris subrotundis apice dentatis

DICOTYL. SEU EXOGENÆ.

- subtus glaucis, carpellis utrinque acutis. $\frac{1}{2}$ in collibus sylvaticis Alsatiæ, Alpium, Pyrenæorum. — T. minus Poll. n. 522. (v. v.)
7. T. MAJUS (Murr. syst. 513.) caule tereti polline glauco destituto, floribus laxe paniculatis cernuis, foliorum segmentis glabris subtus glaucis trifidis, lobulis ovatis submuconatis, carpellis basi obliquè rotundatis. $\frac{1}{2}$ in collibus siccis Delphin. Gebennarum, Pyren. central. ex cl. Bentham. — Fl. fr. 4. p. 876. Jacq. aust. t. 420. (v. v.)
8. T. GALIOIDES (Nestl. in fl. fr. 4. p. 876, 5. p. 633.) caule tereti subsulcato stricto, radice repente, paniculâ strictâ, floribus nutantibus, foliorum segmentis linearibus angustissimis integerrimis margine revolutis, ultimo subsessili. $\frac{1}{2}$ in pratis sylvaticis arenosis Alsatiæ. — C. Bauh. prod. 146. ic. — Moris. s. 9. t. 20 f. 7. n. 8. (v. v. DC.)
9. T. ANGUSTIFOLIUM (Jacq. vind. 4. t. 43.) caule stricto tereti subsulcato, radice fibrosâ, paniculâ multiplici erectâ, floribus erectiusculis, foliorum segmentis linear-lanceolatis integris, ultimo lobato. $\frac{1}{2}$ circa Parisios. — Pluck. t. 65. f. 5. (v. s.)
11. T. NIGRICANS (Jacq. aust. 5. t. 421.) caule stricto sulcato ramoso, radice fibrosâ, paniculâ multiplici erectâ subcorymbosâ, foliorum radicalium segmentis cuneiformibus trifidis caulinorum oblongo-linearibus. $\frac{1}{2}$ in arenosis ad ostia Rhodani, in Galloprov. australi, ad Pyrenæorum radices. — Fl. fr. 5. p. 634. Jacq. aust. 5. t. 421. Sequentis forsitan varietas. (v. v. DC.)
12. T. FLAVUM (L. sp. 770.) caule erecto ramoso sulcato, radice fibrosâ, paniculâ multiplici erectâ subcorymbosâ, foliorum omnium segmentis cuneiformibus trifidis acutis. $\frac{1}{2}$ in pratis humidis. — Fl. fr. 4. n. 877. — Tab. ic. t. 55. f. 1. (v. s.)
13. T. SIMPLEX (L. mant. 78.) caule erecto simplici angulato, radice repente, paniculâ erectâ racemosâ pauciflorâ, foliorum segmentis linearibus aut inferioribus oblongis acutis trifidis. $\frac{1}{2}$ in pratis subpaludosis Occitaniæ, Galloprov. Delphiu. — Fl. fr. 4. p. 877. Fl. dan. t. 244. T. angustifolium. Vill. 3. p. 712. (v. v. D.)
14. T. GLAUCUM (Desf. cat. ed. 2. p. 126.) caule erecto tereti striato polline glauco, paniculâ multiplici erectâ confertâ, foliorum segmentis subcordato-ovatis obtusè trifidis subtus glaucis. $\frac{1}{2}$ in Pyrenæis orientalibus ex Lapeyr. — Fl. fr. 4. p. 878. — Moris. s. 9. t. 12. f. 5. n. 1. T. speciosum. Poiret. (v. v.)
15. T. TUBEROSUM (L. sp. 768.) radice grumosâ, floribus laxè corymbosis solitariis, involucro nullo, bracteis sessilibus, sepalis petaloïdeis stamina superantibus. $\frac{1}{2}$ in pascuis sterilibus et pratis collum, & caule unifloro suprà Carcassone, β caule multifloro, in Pyrenæis orientalibus. — Fl. fr. 4. p. 875. Mill. ic. 265. f. 2. — Moris. s. 4. t. 28. f. 4. n. 13. (v. v. DC.)

III. ANEMONE. DC. syst. 1. p. 188.


Involucrum trifolium à flore distans foliolis incisis; calyx petaloïdeus, 5-15-sepalus; petala 0; carpella ∞ . Herbæ $\frac{1}{2}$, folia radicalia petiolata multi-partita aut lobata.

Sect. 1. PULSATILLA. Bauh. pin. 177. DC. l. c.

Cariopsides in caudas longas barbatas productæ; involuci folia sessilia in lobos lineares palmati-partita.

1. A. VERNALIS (Lin. sp. 759.) foliis pinnatisectis, segmentis cuneato-lanceolatis trifidis glabriusculis, flore erecto, involucro villosissimo, sepalis 6 rectis elliptico oblongis. $\frac{1}{2}$ in scopolis et pratis ad nivem aeternam deliquescentem in Alpibus, Pyrenæis, Arverniam. — Fl. fr. 4 p. 879. — Hall. helv. t. 21. (v. v.)

the Legion



2. A. HALLERI (All. ped. n. 1922. t. 80 f. 2.) foliis pinnatisectis villosissimis, segmentis tripartitis, lobis lobatis, lobulis lanceolato-linearibus acuminatis, flore erecto, sepalis 6 ovali-lanceolatis. ♀ ad nivem aternam deliquescentem in summis Alpibus Delph. — Fl. fr. 4. p. 879. (v. v.)
- + 3. A. PULSATILLA (Lin. sp. 759.) foliis pinnatisectis, segmentis multipartitis, lobis linearibus, flore subnutante, sepalis 6 patentibus. ♀ in campis sylvestribus collibusque apricis Galliae ferè totius. — Fl. fr. 4. p. 880. Bull. herb. 149.
β. rubra Lam. dict. 1. p. 163. In Arverniâ. (v. v.)
4. A. PRATENSIS (Lin. sp. 760.) foliis pinnatisectis, segmentis multipartitis, lobis linearibus, flore pendulo, sepalis 6 erectis apice reflexis. ♀ in campis apricis pratensibus. — Fl. fr. 4. p. 880. — Dod. pempt. 433. f. 2. (v. v.)

Sect. II. PREONANTHUS. DC. l. c.

Cariopsides in candas longas barbatas productæ. — Involucri foliola petiolata trisepta.

5. A. ALPINA (Lin. sp. 760.) foliis petiolo ramoso bitemnatum sectis, segmentis pinnatum inciso-serratis, involucralibus conformibus, sepalis 6 patentibus. ♀ in pascuis lapidosis montanis. — Fl. fr. 4. p. 881. Crantz Austr. 2. t. 3. f. 2 (v. v.)
α. major (DC.) floribus magnis albis extùs subpurpurascens, sepalis ellipticis, foliis glabratris aut parcè villosis ante florem expansis. — Dalech. Lugd. 850. f. 3. (v. v.)
β. micrantha (DC.) floribus parvulis albis extùs subpurpurascens, sepalis ellipticis, foliis glabriusculis ante florem expansis. — Dalech. 849. f. 2. (v. v.)
γ. flavescens (DC.) floribus magnis flavis extùs pallidioribus, sepalis ellipticis, foliis parcè villosis ante florem expansis. — Jacq. misc. 2. p. 47. f. 4. (v. v.)
δ. nivalis (DC.) floribus mediocribus albis subtùs subpurpurasc., sepalis ellipticis, foliis villosissimis cum flore aut post fl. expansis, scapo nano. (v. v.)
ε. intermedia (DC.) floribus magnis flavis extùs subpallidioribus, sepalis ellipticis, foliis villosissimis ante fl. aut cum fl. nascentibus. (v. v.)
ζ. sulphurea (DC.) floribus mediocribus flavis extùs subpal., sepalis ovatis, foliis villosissimis ante fl. aut cum fl. expansis. — Cam. ep. 393. ic. — A. sulphurea. Lin. mant. 78. (v. v.)

Sect. III. ANEMONANTHEA. DC. l. c. p. 196.

Cariopsides ecaudatae ovoideæ, pedicelli solitarii aut bini, omnes aphylli uniflori. — Involueri foliola sessilia aut petiolata.

6. A. CORONARIA (Lin. sp. 760.) foliis ternatim sectis, segmentis multifidis, lobulis linearibus mucronatis, involucralibus sessilibus multifidis, sepalis 6 ovalibus approximatis. ♀ in pascuis subhumidis Galliae Mediterraneæ. fl. primo vere. — Fl. fr. 4. p. 882. — Lob. ic. 177. (v. v. DC.)
7. A. PAVONINA (Lam. dict. 1. p. 166.) foliis tripartitis, lobis cuneatis inciso-dentatis, involucralibus sessilibus integris subincisisve, sepalis 10-12 lanceolatis acutissimis. ♀ in Galloprovinciâ, circa Olbias et Niceam. fl. vere. — Fl. fr. 5. p. 634. — Lob. ic. 278. (v. s.)
β. fulgens (DC. prod. 1. p. 18.) foliis tripartitis, lobis cuneatis inciso-dentatis, involucralibus sessilibus oblongis integris subincisisve, sepalis obianeolatis apice latioribus basi attenuatis. ♀ in vineis Vasconiaæ circa Dax. A. hortensis Thor.-chl. Land. 238. A. pavonina Lois. not. p. 87. Flores ampliores quam var. α. intenſe rubri. (v. s.)
8. A. STELLATA (Lam. dict. 1. p. 166.) foliis tripartitis, lobis cuneatis inciso-dentatis, involucralibus sessilibus oblongis integris subincisisve, sepalis 10-12 oblongis obtusiusculis. ♀ in sepibus et dumetis Galloprov. austr. — A.

DICOTYL. SEU EXOGENÆ.

- hortensis. Lin. sp. 761. Fl. fr. 4. p. 882. 5. p. 635. — Lob. ic. 279. fig. 1. (v. v.)
9. A. PALMATA (Lin. sp. 758.) foliis cordatis suborbiculatis obtusè 3-5 lobis dentatis, involucralibus sessilibus trifidis, sepalis 10-12 oblongis obtusis. ♀ in Galloprov. prope Olbia. fl. primo vere. — Fl. fr. 5. p. 635. — Lob. ic. 279. f. 2. (v. s.)
10. A. APENNINA (Lin. sp. 762.) foliis petiolo ramoso triternatim sectis, segmentis lanceolatis inciso-dentatis acutis, involucralibus petiolatis triseptis inciso-dentatis, sepalis 12-14 oblongis obtusis. ♀ in umbrosis submontanis Galloprov? Corsicæ. Fl. cœrul. ant albi. — Mentz. pug. t. 8. f. 2. Engl. Bot. 1. 106a. J. Bauh. hist. 3. p. 405. f. 2. (v. s.)
11. A. BALDENSIS (Lin. mant. 78.) foliis petiolo ramoso biternatim sectis, segmentis multipartitis, lobis linearibus, involucralibus breviter petiolatis multifidis, sepalis 8-10 oblongo-subovalibus. ♀ in asperis editis Alpium. — Fl. fr. 4. p. 882. Vill. 4. t. 49. A. fragifera Jacq. ic. rar. 1. 103. — Sepala alba extus rubentia. (v. s.)
12. A. NEMOROSA (Lin. sp. 762.) foliis ternatim sectis, segmentis trifidis inciso-dentatis lanceolatis acutis, involucralibus petiolatis conformatibus, sepalis 6 ellipticis. ♀ in nemoribus dumetis et collibus umbrosis. fl. albi, rarius rosei cœrulei. — Fl. fr. 4 p. 884. — Clus. hist. 247. fig. 1 et 2. (v. v.)
13. A. TRIFOLIA (Lin. sp. 762.) foliis omnibus petiolatis ternatim sectis, segmentis ovato-lanceolatis acutis dentatis, sepalis 5 ellipticis obtusis. ♀ in nemorosis submontanis Andegaviae, Parisiorum circa Chantilly ex Thuil. — Fl. fr. 4. p. 884. — Lob. ic. 281. f. 1. fl. albi. (v. s.)
14. A. RANUNCULOIDES (Lin. sp. 762.) foliis radicalibus 3-5-sectis, segmentis subtrifidis inciso-dentatis, involucralibus subpetiolatis tripartitis inciso-dentatis, sepalis 5-6 ellipticis. ♀ in nemoribus et pratis montanis. — Fl. fr. 4. p. 885. — Fuchs. hist. 162. ic. fl. latei. (v. v.)
15. A. SYLVESTRIS (Lin. sp. 761.) foliis ternatim quinatim sectis, segmentis apice inciso-dentatis, involucralibus petiolatis conformatibus, pedicello solitario, sepalis 6 ellipticis, fructibus hirsutissimis. ♀ in nemoribus et sepiibus Alsatiæ, Lotharingiæ, Arverniæ, agri Laudunensis. — Fl. fr. 4. p. 883. — Lob. ic. 280. f. 2. fl. albi. (v. v.)

Sect. IV. OMALOCARPUS. DC. l. c. p. 212.

Carioipsides compresso-planæ ovali-orbiculatæ glabræ cundatæ; pedicelli ∞ umbellati aphylli 1-flori.

16. A. NARCISSIFLORA (Lin. sp. 763.) foliis radicalibus subvillosis palmatim 3-5-partitis, lobis inciso-dentatis, lobulis linearibus acutis, involucralibus apice 3-5-fidis, floribus umbellatis. ♀ in pascuis montanis præsertim calcareis. — Fl. fr. 4. p. 885 et 5. p. 635. — J. Bauh. hist. 861. f. 1 et 2. (v. v.)
fl. monantha (DC.) floribus solitariis aut binis. — A. dubia Bell. app. t. 7. (v. s.)

IV. HEPATICA. Dill. giess. p. 108. t. 5. DC. fl. fr. 4. p. 885.


Involucrum calyciforme trifoliatum 1-florum flori approximatum; sepala petaloïdea 6-9 dupli triplicive serie disposita; carpella ∞ ecaudata. — Herbæ ♀, scapis plurimis radicalibus 1-floris.

1. H. TRILOBA (DC. fl. l. c.) foliis cordatis trilobis, lobis integerrimis. ♀ in sepiibus, dumetis, sylvis submontanis. — Anemone hepatica. L. sp. 758. — Cam. epit. 585. ic. fl. cœrulei rarius albi et rosei. (v. v.)

V. ADONIS. Dill. giess. 109. t. 4. DC. syst. 1. p. 220.

Calyx 5-sepalus adpressus; petala 6-15 ungue nudo; stamina ∞ ad





Basin gonophori inserta; cariopsides 1-spermæ secus gonophorum spicatae ovatae stylo brevi acuminatae. — Herbæ caule folioso, foliis in lobos lineares multipartitis.

(1) Sect. I. ADONIA. DC. syst. I. p. 221.

Cariopsides stylo recto uncinato acuminatae, petala 5-10. Radices annuae.

- + 1. A. AUTUMNALS (L. sp. 771.) calyce glabro, petalis 6-8 concavo-conniventibus calyce vix majoribus, carpellis subreticulatis in capitulum ovatum aggregatis stylo brevissimo coronatis, caule ramoso. (I) inter segetes spontanea, in hortis culta. — Eng. bot. t. 308. Weinm. phyt. t. 27. f. b. c. Fl. sanguinei. (v. v.)
- 2. A. FLAVA (Vill. cat. str. 247.) calyce glabro basi soluto, petalis planis oblongis calyce duplò longioribus, carpellis sublævibus in capitulum oblongum aggregatis, caule subsimplici. (I) inter segetes et in vineis. — Weinm. phyt. t. 28. f. a. b. Fl. flavi. (v. v. DC.)
- 3. A. MICRANTHA (DC. syst. I. p. 222.) calyce glabro basi non soluto, petalis planis oblongis calyce paulò longioribus, carpellis subreticulatis in capitulum ovatum aggregatis, caule subramoso. (I) inter segetes Galliae australis. — Fl. parvi flavi seu flammæi. (v. v. DC.)
- 4. A. CITRINA (Hoffm. germ. p. I. p. 251.) calyce basi hispido, petalis planis oblongis calyce longioribus, carpellis in capitulum ovato-oblongum dispositis, caule subsimplici, flore parvo inter folia subsessili. (I) inter segetes. — Fl. citrini. An sequentis varietas? (v. v. DC.)
- 5. A. ESTIVALIS (L. sp. 772.) calyce basi hispido, petalis planis oblongis obfusis calyce duplò longioribus, carpellis reticulatis in spicam elongatam laxam dispositis conoideo-prismaticis stylo recto concolori rostratis, caule subsimplici. (I) inter segetes Galliae australis. — A. miniata Jacq. aust. t. 354. (v. v.)
- 6. A. DENTATA (Delile aeg. 17. descr. t. 53. f. 1.) calyce basi hispido, petalis planis ovali-oblongis calyce paulò longioribus, carpellis basi tuberculato-dentatis reticulatis in spicam elongatam continuam digestis. (I) in Galloprov. supetiori inter Digne et Colmar. — Fl. flammei. (v. v. DC.)

Sect. II. CONSILIGO. DC. syst. I. p. 224.

Cariopsides stylo uncinato recurvo acuminatae; petala 8-15. Radices 2.

- 7. A. VERNALIS (L. sp. 772.) foliis radicalibus infimisve abortivis ad squamas subvaginantes reductis, mediis et summis sessilibus, carpellis velutinis, petalis 10-12 oblongis subdenticulatis. 2 in collibus et vallibus Alpium, Cebennarum, montium Ligeris (el. Prost.) — Fl. fr. 4. p. 887. — Moris. s. 6. t. 9. f. 1 et 2. Fl. flavi. (v. v.)
- 8. A. PYRENAICA (DC. fl. fr. 5. p. 635.) foliis radicalibus longè petiolatis, petiolo trifido, segmentis multipartitis, summis sessilibus, carpellis glabris, petalis 8-10 oblongo-cuneatis integris. 2 in valle Eynes Pyrenæorum orientalium. — A. Apennina L. sp. 772. excl. syn. — Del. ic. sel. I. t. 21. Fl. flavi. (v. s.)

Trib. III. RANUNCULEÆ. DC. syst. p. 228.

Æstivatio calycis et corollæ imbricata. Petala bilabiata aut intus squamulâ ad basin aucta. Carpella 1-sperma sicca indehiscentia. Semen erectum. — Folia radicalia aut erecta.

VI. MYOSURUS. Dill. giess. p. 106. t. 4.

Calyx 5-sepalus, sepalis basi solutis seu ultrâ insertionem deorsum

(1) Stirpes sub hoc titulo collectæ nempe sunt forsitan varietates notabiles unius speciei, A. Annuae Mill. dict. n. I. Fl. fr. 4. p. 887.

longè productis; petala 5 ungue filiformi tubuloso; stamna 5-20; cariopsides plurimæ triquetræ confertissimæ, receptaculo longissimo spicatum dispositæ, stylo recto subacuminatæ.

1. *M. MINIMUS* (L. sp. 407.) scapis folio sublongioribus, calycis appendicibus subfoliaceis. (I) in apricis pinguibus hyeme inundatis. — Fl. fr. 4. p. 906. — Dod. pempt. 112. f. 1. (v. v.)

VII. CERATOCEPHALUS. Mœnch. meth. p. 218. DC. syst. 1. p. 230.

Calyx 5-sepalus subpersistens, sepalis basi non productis; petala unguiculata; stamna 5-15; carpella ∞ secùs rachin persistentem longè spicata, basi utrinquè gibba, apice producta in cornu compressum semine 4-gono sextuplò longius; embryo rectus.

2. *C. FALCATUS* (Pers. ench. 1. p. 341.) pericariorum cornubus falcatis subascendentibus. (I) inter segetes provinc. Mediterr. — Fl. fr. 4 p. 900. — Bocc. Sic. t. 14. f. 2. 3. (v. v.)

VIII. RANUNCULUS. C. Bauh. pin. 180. DC. prod. 1. p. 46. Ser. mel. helv. 2. p. 45.

Calyx 5-sepalus, sepalis basi non solutis deciduis; petala intùs basi squamulâ foveolari nectariferâ instructa; stam. ∞ ; cariopsides ovatæ subcompressæ, in mucronem aut cornu semine vix longius desinentes, in capitulum globosum cylindraceumve dispositæ.

Sect. 1. BATRACHIUM. DC. syst. p. 1. 233.

Pericarpia transversè rugoso-striata; petala alba ungue flavo foveâ nectariferâ notato.

1. *R. HEDERACEUS* (L. sp. 781.) caule repente, foliis subreniformibus sub-3-5 lobis, lobis latis integris obtusissimis, petalis oblongis calyce vix longioribus, staminibus 5-12, carpellis glabris transversè rugoso-striatis, stylo brevi crassiusculo substruncato vix deflexo. \mathcal{U} ad scaturigines et fontes in aquis vadosis et locis inundatis provinc. septentr. et occident. — Fl. fr. 4. p. 894, Drev. et Hayn. Eur. t. 106. (v. v. DC.)

2. *R. TRIPARTITUS* (DC. ic. rar. 1. t. 49 et Fl. fr. 5. p. 637.) caule natante, foliis submersis capillaceo-multifidis, emersis tripartitis, lobis cuneatis apice dentatis, carpellis glabris transversè rugoso-striatis, stylo brevi crassiusculo substruncato vix deflexo. \mathcal{U} in fossis, scaturiginibus inundatisque Galliae occident. — Herba sequentia cum flore prioris. (v. v. DC.)

3. *R. AQUATILIS* (L. sp. 781.) caule natante, foliis submersis capillaceo-mul-tifidis, emersis tripartitis, lobis cuneiformibus apice dentatis, petalis obovatis calyce majoribus, carpellis setis rigidis hispidis glabris transversè rugoso-striatis, stylo brevi crassiusculo substruncato vix deflexo. \mathcal{U} in aquis aquosive. — Fl. fr. 4. p. 894. Non diversam a 2 præcedentibus contendit cl. Seringe mel. helv. t. 2. p. 49.

a. *heterophyllus* (DC.) foliis emersis tripartitis. — Tabern. ic. 54. f. 2. Variat foliis emersis peltatis aut non peltatis. (v. v.)


β . *capillaceus* (DC.) foliis petiolatis, omnibus immersis in lacinias filiformes tenues dissectis. — Barr. ic. 57. t. 566. (v. v.)


γ . *cæspitosus* (DC.) foliis petiolatis, omnibus emersis circumscriptione suborbiculatis in lacinias divergentes rigidulas dissectis, petiolis basi latè vaginato-auriculatis. — Schk. handb. 2. t. 152. (v. v.)

δ . *stagnatilis* (DC.) foliis sessilibus, omnibus immersis capillaceo-multifidis circinnatis, laciñis abbreviatis, vaginis obsoletè auriculatis. (v. v.)

η . *peucedanifolius* (DC.) foliis petiolatis, omnibus immersis in lacinias longas parallelas dissectis. — Oed. dan. t. 376. (v. v.)









Sect. II. RANUNCULASTRUM. DC. prod. I. p. 27.

Carpella lœvia compressa in spicam digesta; radices grumosæ.

4. R. BULLATUS (L. sp. 744.) foliis omnibus radicalibus petiolatis ovatis dentatis plus minusve bullatis, scapis nudis unifloris, carpellis tenuiter reticulatis, stylo brevi apice tumidiusculo subuncinato. ♀ in arvæ incultis Corsicæ. — Fl. fr. 4. p. 903. — Clus. hist. I. p. 238. f. 1. et 2. Flores lutei, odorati. (v. s.)
5. R. CHÆROPHYLLOS (L. sp. 780.) foliis radicalibus petiolatis subvillosis triseptis, segmentis semel aut bis tripartitis acutis, primordialibus ovatis dentatis trilobis, caule erecto 1-2-floro, calyce patente subreflexo, carpellis punctatis, stylo rostrato compresso. ♀ in collibus Galliæ occidentalis medie australisque. — Fl. fr. 4. p. 900. — Barr. ic. t. 581. (v. v.)
6. R. MONSPELIACUS (L. sp. 778.) foliis lanuginosis, radicalibus trilobis, lobis cuneatis trifido-dentatis, superioribus tripartitis, lobis integris linearibus, caule erecto paucifloro, calyce reflexo, capitulo ovato, carpellis punctatis, stylo rostrato compresso acuto recto. ♀ in pascuis apricis saxatilibus regionis mediterraneæ. — Fl. fr. 4. p. 899 et 5. p. 688. ic. rar. t. 50. — R. Illyricus Besl. eyst. syst. vern. ord. I. t. 13. f. 1. Variat foliis angustis, cuneatis, rotundis. (v. v.)
7. R. ASIATICUS (L. sp. 777.) foliis ternatim bitemnatum sectis, segmentis dentatis aut inciso-trifidis, caule erecto simplici aut inferne ramoso, calyce patente demum reflexo, capitulo cylindrico, carpellis minutissime punctatis, stylo elongato teretiusculo acuto patent-deflexo. ♀ ex Oriente indigena, in hortis culta. — Fl. fr. 4. p. 892. — Weinm. phyt. 849-852. Variat caule ramoso, foliis 3-sectis multifidis, lobis acutis obtusis, florum colore. (v. v. c.)

Sect. III. THORA. DC. I. c. p. 28.

Carpella lœvia subglobosa; radices grumosæ.

8. R. THORA (L. sp. 775.) foliis glaberrimis, radicalibus petiolatis caulinoque sessili reniformibus crenatis, floralibus incisis, caule 2-3-floro glabro, carpellis longitudinaliter nervosis, stylo filiformi apice subcincinnato. ♀ in pascuis editoribus Jurassi, Alpium, Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 903. — Clus. hist. I. p. 239. f. 3. (v. v.)


Sect. IV. HECATONIA. DC. I. c.

Carpella lœvia, ovato-subrotunda in capitulum subrotundum digesta; radices fibrosæ.

* *Floribus albis, foliis dissectis.*

9. R. RUTÆFOLIUS (L. sp. 777.) foliis pinnatim sectis, lobis 3-lobato-incisis multifidis, caule sub 1-floro, calyce glabro, petalis 8-10, ungue discolore. ♀ in scopolis ad nivem in summis Alpibus et Pyrenæis. — Fl. fr. 4. p. 893. All. ped. t. 67. f. 1. (v. s.)
10. R. GLACIALIS (L. sp. 777.) foliis radicalibus petiolatis palmatim tripartitis 3-sectis, lobulis subobtusis crassiusculis, caule subuinifloro, calyce hirsutissimo, carpellis compressis marginatis, stylo compresso. ♀ inter scopulos prope nives in Alpibus et Pyrenæis. — Fl. fr. 4. p. 892. — J. Bauh. 3. p. 862. f. 3. (v. v.)
11. R. SEGUIERI (Vill. danph. 4. t. 49.) foliis tripartitis, partitionibus acutis trifidis aut integris, caule subuinifloro, calyce glabro, petalis 5 integris. ♀ inter scopulos prope nives in Alpibus. — Fl. fr. 4. p. 893. R. Columnæ. All. ped. t. 67. f. 3. 4. (v. v.)
12. R. ALPESTRIS (L. sp. 778.) foliis orbiculatis trilobis, lobis apice lobulato-crenatis obtusiusculis, caule subuinifloro, calyce glabro, petalis 5 obcordatis trilobatis, carpellis obovatis tenuiter venosis, stylo rostrato compresso apice uncinato. ♀ inter scopulos et in pascuis editoribus Alpium, Pyren.,

- Jurassi, Vogesorum. — Fl. fr. 4. p. 892. Jacq. aust. t. 110. Seg. ver. t. 12. f. 1. (v. v.)
13. *R. ACONITIFOLIUS* (L. mant. 79.) foliis palmatū 3-7-partitis, partitionibus inciso-dentatis, supremis sessilibus in lobos linear-lanceolatos fissis, caule ramoso multifloro, calycibus adpressis glabris, carpellis venosis, stylo conico apice circinnato. ♀ in montanis. — Fl. fr. 4. p. 890.
- a. humilis* (DC.) foliis radicalibus 3-5 partitis, bracteis lanceolatis serratis, caule gracili glabro. — In pratis udis excelsis. — Lob. ic. 668. f. 2. (v. v.)
 - β. crassicaulis* (DC.) foliis radicalibus 3-partitis, bracteis lanceolatis serratis, caule crassiusculo apice adpresso villoso. — Secùs rivulos et in udis Pyrenæorum. — *R. heterophyllus*, Lapeyr. abr. 316 non Sm. (v. v.)
 - γ. intermedius* (DC.) elatior, foliis radicalibus tripartitis, bracteis linearibus integris. — In sylvaticis Cebenarum. (v. s.)
 - δ. platanifolius* (DC.) elatior, foliis radicalibus 5-7-lobis acuminatis, bracteis linearibus integris. — In dumetis et sylvaticis montium demissiorum. — *R. platanifolius* L. mant. 79. — Lob. ic. 668. f. 1. et 667. f. 2. (v. v.)
 - ε. dealbatus* (DC.) foliis radic. 7-lobis dentatis subtus candidantibus, supremis trilobis. — In rupibus calcareis Pyren. — *R. dealbatus* Lapeyr. †.
14. *R. LACERUS* (Bell. act. taur. 5. t. 8.) foliis cuneiformibus apice irregulariter acutè incisis, caule glabro ramoso multifloro, calycibus adpressis. ♀ rarissimus in pascuis fertilibus Alpium Delphinatū ex Vill. — Valdè affinem *R. aconitifolio* affirmat cl. Seringe mel. bot. 2. p. 54, hybridum inter *R. aconitifolium* et *Pyrenæum* cl. DC. syst. 1. 242. Fl. fr. 4. p. 891. (v. v. DC. in Ped.)
- ** *Floribus albis, foliis integris.*
15. *R. PYRENÆUS* (L. mant. 248.) foliis linearibus lanceolatis integerrimis, scapo pedunculive apice tomentosis, capitulis ovatis, stylis subpatentibus apice uncinatis. ♀ in pascuis Alpium et Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 892. Deless. ic. vol. 1. t. 27. f. B. (v. v.)
- β. buplevrifolius* (DC.) caule unifloro, foliis lanceolatis. *R. Pyrenæus* Jacq. misc. I. t. 18. f. 1. *R. buplevrifolius* Lapeyr. abr. 314. (v. v.)
 - γ. plantagineus*. (DC.) caule multifloro, foliis lato-lanceolatis. — *R. plantagineus* All. ped. t. 76. f. 1. (v. v.)
16. *R. ANGUSTIFOLIUS* (DC. fl. fr. 5. p. 636.) foliis linearibus sublanceolatis glaucescentibus non amplexicanibus, scapo pedunculisque glabris, capitulis globosis, stylis conico-subteretibus acutis rectis ascendentibus. ♀ in turfosis montanis Pyr. orient. circa Mont-Louis. — Deless. ic. sel. 1. t. 27. f. A. Variat caule 1-∞-floro. (v. s.)
17. *R. AMPLEXICAULIS* (L. sp. 774.) foliis ovali-lanceolatis acuminatis amplexicaulibus, scapo pedunculive glabris. ♀ in locis excelsis udis scopulosis Alpium et Pyren. — Fl. fr. 5. p. 636. Deless. ic. sel. 1. t. 27. f. C. Moris. s. 4. t. 30. f. 2. n. 37. Variat caule 1 aut ∞-floro. (v. v.)
18. *R. PARNASSIFOLIUS* (L. sp. 774.) foliis radicalibus petiolatis subcordatis ovato-subrotundis, caulinis sessilibus ovato-lanceolatis, pedunculis hirsutis, capitulis ovato-globosis, carpellis obovato-globosis, stylis teretibus circinnatis. ♀ in Alpium et Pyrenæorum scopulis nivi æternæ contiguis. — Fl. fr. 4. p. 890. Jacq. coll. 1. t. 9. f. 3. (v. v.)
- *** *Floribus luteis, foliis indivisis.*
19. *R. GRAMINEUS* (L. sp. 773.) foliis lanceolatis linearibusve integerrimis, caule erecto glaberrimo ad collum fibrilloso, radice fasciculatâ, squamulâ petalorum tubulosâ, capitulis ovatis, carpellis lœvibus, stylo conico crassiusculo apice vix deflexo. ♀ in pratis inundatis campisque subargilliosis Galliae mediae et australis. — J. Bauh. 3. p. 866. f. 2 et 3. (v. v.)
20. *R. LINGUA* (L. sp. 773.) foliis lanceolatis subserratis sessilibus semi-amplexicaulibus, caule erecto glabro, capitulo globoso, carpellis lœvibus,






- stylo lato rostrato ascende. ♀ in palustribus inter arundines, ad fontes et fossas. — Fl. fr. 4. p. 904. — J. Banh. 3. p. 865. ic. (v. v.)
21. R. FLAMMULA (L. sp. 772.) foliis glabris linearibus lanceolatis subovatisve subintegris, inferioribus petiolatis, caule declinato pleno basi subradicante, pedunculis oppositifoliis, capitulo ovato-globoso, carpellis lævibus, stylo conico deflexo brevissimo. ♀ in humidis frequens. — Fl. fr. 4. p. 905. fl. dan. t. 575. R. ovatus Pers. — Dod. pempt. t. 432. f. 2. (v. v.)
- β. reptans (Sm.) caule repente ad quemque nodum radiculas agente, foliis linearibus integerimis. — In glareosis udis rarius. — R. reptans. L. Fl. fr. p. 905. fl. dan. t. 108. (v. v.)
- **** Floribus flavis, foliis dissectis.
22. R. AURICOMUS (L. sp. 775.) foliis glabris, radicalibus petiolatis cordatis plerisque tripartitis lobatis, caulinis in lobos lineares integros subdentatosve partitis, calyce pubescente petalis breviore, capitulis subglobosis, stylo teretiusculo recurvo brevi. ♀ in pascuis humidis et umbrosis. — Fl. fr. 4. p. 899. Variat lobis foliorum superiorum integris (Fuchs. hist. 156. ic.) aut serratis (Weinm. 857 A.) et inferioribus indivisis. (All. ped. 82. f. 2.) (v. v.)
23. R. SCLERATUS (L. sp. 776) foliis glabris, radicalibus petiolatis tripartitis, lobis trilobatis obtusè subincisis, summis tripartitis, lobis oblongo-linearibus integris, floralibus oblongis, calyce glabro, carpellis minutissimis in capitulum ovato-oblongum dispositis, stylo vix conspicuo. ① in fossis et paludibus. — Fl. fr. 4. p. 897. Fuchs. 159. ic. (v. v.)
24. R. MONTANUS (Wild. sp. 2. p. 1321.) foliis radicalibus glabris tripartitis orbiculatis, laciinis trifidis obtusis, caulinis sessilibus in lobos lineares integerrimos 3-5-partitis, caule 1-floro apice adpressè pubescente, calyce glabriusculo. ♀ in pratis editoribus Alpium et Pyren. — Fl. fr. 4. p. 895. R. nivalis Jacq. aust. t. 325 et 326 non L. (v. v.)
- β. tenuifolius (DC.) foliorum laciinis acutis. — In Jurasso et Galloprov. (v. s.)
25. R. VILLARSH (DC. fl. fr. 4. p. 896.) foliis pubescentibus, radicalibus suborbiculatis tripartitis laciiniis trifidis dentatis acutis, caulinis sessilibus in lobos lineares integros 3-5-partitis, caule 1-floro apice pubescente, calyce patentè villosa. ♀ in pratis asperisque Alpium Delph. et Galloprov. — R. Lapponicus Vill. 4. p. 743. (v. v. DC.)
26. R. GOUANI (Wild. sp. 2. p. 1322.) foliis radicalibus orbiculatis 5-lobatis, lobis inciso-dentatis, caulinis sessilibus palmato-partitis lobis dentatis, caule pubescente, calyce subviloso. ♀ in pratis Pyren. et rariis Alpium. — Fl. fr. 4. p. 896. et 5. p. 627. R. Pyrenæus Gon. ill. t. 17. f. 1 et 2 non L. (v. v. DC.)
27. R. ACERIS (L. sp. 779.) foliis pubescentibus subglabrisve palmato-partitis, lobis inciso-dentatis acutis, summis linearibus, caule erecto multifloro subpubescente; pedunculis teretibus, calyce subviloso, capitulis globosis, carpellis pùncis numerosissimis notatis, stylo brevi rostrato recto vel apice vix curvato. ♀ in pratis pascuis et sylvestribus. — Fl. fr. 4. p. 899. Fuchs. 879. ic. (v. v.)
- β. sylvaticus (DC.) petiolis foliisque subtùs velutino-villosis. — R. lanuginosus. Fl. fr. 4. p. 899. non L. (v. s.)
- γ. multifidus (DC.) foliorum lobis inciso-multifidis. (v. s.)
28. R. POLYANTHEMOS (L. sp. 779.) foliis 3-5-palmato-partitis inciso-multifidis, lobis sublinearibus, caule erecto multifloro petiolisque patentè pilosis, pedunculis subacutis, calyce hirsuto, stylo brevissimo rectiusculo. ♀ in pratis, dumetis et sylvis cæduis Galliae borealis. — Fl. fr. 5. p. 638. R. napellifolius var. Crantz. aust. 2. t. 4. f. 1. sup. (v. s.)
29. R. TUBEROSUS (Lapeyr. abr. 320.) foliis radicalibus amplis trilobis lobis distantibus, lateralibus bilobis, intermedio cuneiformi trilobo, lobalis inci-

- sis, caule subascendente pubescente, pedunculis divaricatis teretibus, calyce adpresso. $\frac{1}{2}$ in Pyrenæorum pratis. — Affinis. R. lanuginoso, an satis à R. nemoroso distincta. DC. syst. 1. p. 281. R. polyanthemo referendam speciem censem cl. Walker-Arnolt qui hanc in herb. Lapeyr. vidit. (v. s. DC.)
30. R. MEMOROSUS (DC. syst. 1. p. 284.) foliis radicalibus ultrâ medium 3-5-fidis lobis cuneiformibus trifidis, lobulis apice dentatis, caule erecto petiolisque patentim pilosis, pedunculis sulcatis, carpellis stylo incurvato uncinatis. $\frac{1}{2}$ in sylvis.
- $\alpha.$ *multiflorus* (DC.) caule multifloro, foliis superioribus in lobos lineares integros partitis. — In montanis ad radices Jurassi et Cebennarum. (v. v.)
- $\beta.$ *pauciflorus* (DC.) caule 1-3-floro, foliis superioribus sublobatis inciso-dentatis, summis minimis. — In subalpinis Cebenn. Pyren., circa Aginnum (St. Am.), Burdigalam (Desmoul.). — R. villosus St. Am. bouq. t. 5. (v. s.)
31. R. LANUGINOSUS (L. sp. 779.) foliis trifidis holosericeis, lobis latis dentatis subincisis, caule erecto multifloro petiolisque reflexo-pilosus, pedunculis teretibus, carpellis stylo uncinatis. $\frac{1}{2}$ in sylvis montanis. — Fl. dan. t. 397. — J. Bauh. hist. 3. p. 417. f. 3. (v. v.)
32. R. REPENS (L. sp. 779.) foliis pinnatum trisectis, segmentis cuneatis trilobatis inciso-dentatis, caule flagella prostrato-repentia e collo agente, florifer suberecto, calyce adpresso, capitulo subrotundo, carpellis punctis minimis notatis, stylo tenui deflexo. $\frac{1}{2}$ in pratis fossis plateis oleraceisque. — Fl. fr. 4. p. 898. — Dod. pempt. 425. ic. (v. v.)
- $\beta.$ *erectus* (DC.) caulibus floridis erectis, flagellis repentibus nullis. (v. v.)
33. R. PALUSTRIS (Sm. in Rees. cyclop. n. 52.) foliis subhirsutis petiolatis ultrâ medium trifidis, sinubus obtusis, lobis ovatis incisis dentatis, caule erecto ramoso subnudo, capitulo globoso-depressis, carpellis punctis numerosis notatis stylo brevi recto acuminatis. $\frac{1}{2}$ in Corsicâ. — Caules dichotomi. DC. syst. 1. p. 294. R. Corsicus. Fl. fr. 5. p. 637. (v. s.)
34. R. BULBOSUS (L. sp. 778.) foliis radicalibus petiolatis trisectis subpinnatisectis, segmentis trifidis inciso-dentatis, medio petiolato, caule erecto ad collum bulboso, calyce reflexo, capitulo globoso-depressis, carpellis punctatis stylo brevi apice unciuato acuminatis. $\frac{1}{2}$ in pratis pascuisque frequens. — Fl. fr. 4. p. 901. — Fuchs. hist. 160. ic. (v. v.)
- Sect. v. ECHINELLA. DC. prod. 1. p. 41.
- Carpella tuberculis aculeisve scabra.
- * Foliis dissectis lobatis.*
35. R. PHILONOTIS (Retz. obs. 6. p. 51.) foliis trilobatis trisectisve, lobis obtusis inciso-dentatis, medio petiolato, calyce reflexo, caule basi non bulboso, capitulo globosis, carpellis ad margines tuberculorum minimorum seriem unicam gerentibus, stylo brevi lato apice inflexo. (I) in pratis, aquilegiis, dumetis. — Fl. fr. 4. p. 901 et 5. p. 639. — J. Bauh. 3. p. 417. f. 2. (v. v.)
- $\beta.$ *intermedius* (DC.) foliis subglabris. — In humidioribus. R. intermedius Poir. (v. v.)
- $\gamma.$ *parvulus* (DC.) caule nano subunifloro. — In siccis, lapidosis, aprylicis, aridis. — R. parvulus L. mant. 79. — Barr. ic. t. 791. (v. v.)
36. R. CORDIGERUS (Viv. cors. 8. et app. 2.) sericeo-hirsutus, foliis radicalibus omnibus cordatis subrotundo-ovatis dentato-crenatis integris trilobatis, caulinis incisis simplicibusque, caule subunifloro pedunculisque radicalibus nudis unifloris, calycibus reflexis, carpellis obsoletè tuberculatis, stylo brevissimo patenti-deflexo. — In monte Coscione Corsicæ. — R. alpinus, etc. Bocc. mus. t. 124. (v. s.)
37. R. ARVENSIS (L. sp. 780.) foliis glabris, primordialibus apice dentatis, radi-





- calibus tripartitis, caulinis multifidis, lobis linearibus, caule erecto multifloro, carpellis utrinque echinatis stylo longo recto ascendentे acuminatis. (I) in avis. — Fl. fr. 4. p. 902. — Fuchs. 157. ic. (v. v.)
38. *R. MURICATUS* (L. sp. 780.) foliis glabris petiolatis suborbiculatis trilobis grossè dentatis, caule erectissimo aut diffuso, pedunculis oppositifoliis, calyce patente, carpellis utrinquè punctatis et tuberculoso-aculeatis stylo lato compresso recto acuminatis. (I) in depressis humidis prov. Mediterr. — Fl. fr. 4. p. 902. — Clus. 233. f. 2. (v. v.)
39. *R. PARVIFLORUS* (L. sp. 780.) foliis villosis orbiculatis trilobis grossè dentatis incisive, caulinis molliter pilosis decumbentibus, pedunculis oppositifoliis, calyce demum reflexo petala æquante, carpellis punctatis tuberculosisque stylo compresso brevi apice uncinato rostratis. (I) in humidis lapidosis provinc. occident. et australium. — Fl. fr. 4. p. 902. *R. parvulus* Lapeyr. abr. non L. *R. Xatardi* Lapeyr. supp. 77. — Moris. s. 4. 28. f. 12. n. 21. (v. v.)
40. *R. SUBAPETALUS* (Vict. Aug. in ann. soc. lin. 1. p. 193.) caule erecto substriato, florum pedunculis oppositifoliis, petalis 2-3-calyce minoribus interdùm nullis, foliis superioribus 3-5-fidis, inferioribus subrotundis lobatis omnibus hirsutis, seminibus elevato-punctatis stylo subhamato coronatis. (I) in sepibus ad ostium flum. Ain. — An satis à precedenti distinctus?
41. *R. TRILOBUS* (Desf. atl. 1. t. 113.) foliis subvillosis glabratissime, primordia libus subrotundis crenatis, cæteris tripartitis, lobis divergentibus basi cuneatis apice dentatis, caule erecto, pedunculis oppositifoliis, calyce demum subreflexo petalis breviore, carpellis tuberculatis et minime punctatis, stylo brevi patente vix uncinato. (I) in agris et humidis Corsicæ, Telonis, Perpinian. — Fl. fr. 5. p. 639. *R. parviflorus* Lapeyr. abr. 321. non L. ex cl. Walker-Arnolt. (v. v. DC.)

* * *Foliis integris.*

42. *R. OPHIOGLOSSIFOLIUS* (Vill. dauph. 4. t. 49.) foliis inferioribus petiolatis cordatis obtusis, superioribus oblongis sessilibus, caule erecto fistuloso, pedunculis oppositifoliis, carpellis tuberculato-spinosis, stylo latissimo crasso obtuso brevi uncinatis. (I) in udis pratis et fossis provinciarum australium, agri Burdigalensis et Andegavensis. — Fl. fr. 5. p. 639. (v. v.)
43. *R. NODIFLORUS* (L. sp. 773.) foliis radicalibus petiolatis ovali-oblongis, floribus sessilibus oppositifoliis, carpellis granulato-tuberculosis stylo vix rostellatis. (I) in humidis pluvia subinundatis sylvæ Fontainebleau et Andegaviæ ex Bast. — Fl. fr. 4. p. 903. — Vaill. act. par. 1719. t. 4. f. 4. (v. v. DC.)

IX. FICARIA. Dill. nov. gen. p. 108. t. 5. DC. syst. 1. p. 304.

Calyx 3-phylus caducus; petala 9 intus basi foveolata; stamina ovariaque ∞ ; carpella lævia compressa obtusa.

1. *F. RANUNCULOIDES* (Mœnch. meth. 315.) radice grumosa, caule folioso, foliis cordatis. ♀ in pratis sepibus dumetisque humidiusculis. — Fl. fr. 4. p. 886. *Ranunculus* *Ficaria* L. Bull. t. 43. — Fuchs. 867. ic. (v. v.)

Trib. IV. HELLEBOREÆ. DC. prod. 1. p. 42.

Æstivatio calycis et corollæ imbricata. Petala nunc o, nunc irregularia bilabiata nectarifera. Calyx petaloïdeus. Carpella capsularia intus dehiscentia ∞ sperma.

X. CALTHA. Pers. enc. 2. 107. DC. prod. 1. p. 44.

Calyx coloratus 5-sepalus, sepalis suborbiculatis petaloïdeis; petala o; stamina ∞ ; capsulae 5-10 compressæ patentes 1-loculares ∞ spermæ.

- + 1. *C. PALUSTRIS* (L. sp. 784.) caule erecto, foliis cordatis suborbiculatis rotundè crenatis, auriculis rotundatis. ♀ in humidinsculis, secùs sepes fossas et rivulos, primo vere. — Fl. fr. 4. p. 918. — Dod. pempt. 598. f. 1. 2. (v. v.)

XI. TROLLIUS. *L. gen. n.* 700.

Calyx coloratus 5-15-sepalus, sepalis deciduis petaloïdeis; petala 5-20 parva basi tubulosa unilabiata; stamina ovariaque ∞ ; capsulae ∞ sessiles subcylindraceæ polyspermæ.

- + 1. *T. EUROPAEUS* (L. sp. 782.) sepalis 15 in globum ferè conniventibus, petalis 5-10 longitudine staminum. ♀ in pratis montanis subfrigidis. — Fl. fr. 4. p. 906. Lam. ill. t. 499. — Lob. ic. 675. (v. v.)

XII. ERANTHIS. *Salisb. trans. lin. 8. p. 303. DC. prod. 1. p. 46.*

Involucrum multipartitum subflore. Flos sessilis 5-8 sepalus, sepalis coloratis petaloïdeis oblongis deciduis; petala 5-8 tubulata brevissima; capsulae pedicellatae; semina globosa simplici serie disposita.

- + 1. *E. HYEMALIS* (Salisb. l. c.) sepalis 6-8 oblongis. ♀ in umbrosis humidiusculis ad radices montium, primo vere. — *Helleborus hyemalis* L. sp. 783. Fl. fr. 4. p. 929. — Lob. ic. 676. (v. v.)

XIII. HELLEBORUS. *Adans. fam. 458. DC. prod. 1. p. 46.*

Calyx persistens 5-sepalus, sepalis subrotundis obtusis magnis sæpè viridibus; petala 8-10 brevissima tubulata inferne angustiora nectariæ; stam. 30-60; ovaria 3-10; stigmata orbiculata; capsulae coriaceæ, semina elliptica dupli serie disposita.

* *Scapo aphylo 1-2 floro.*

- + 1. *H. NIGER* (L. sp. 783.) foliis radicalibus pedatisectis glaberrimis, scapo aphylo 1-2-floro bracteato. ♀ in montosis sylvaticis subalpinis Galloprovinciæ, hyeme florens. — Fl. fr. 4. p. 908. — Lob. ic. 681. (v. v.)

** *Caule paucifloro subdichotomo folia floralia subsessilia fissa aut incisa gerente.*

- + 2. *H. VIRIDIS* (L. sp. 784.) foliis radicalibus glaberrimis pedatisectis, caulinis subsessilibus palmati-partitis, pedunculis sæpè bifidis, sepalis subrotundo-ovatis viridibus. ♀ in sylvis et dumetis, aprili et maio in planitiebus florens, jun. jul. in montibus excelsis. — Fl. fr. 4. p. 908. Jacq. aust. t. 106. — Fuchs. hist. 274. ic. Garid. aix. t. 47. (v. v.)

*** *Caule folioso multifloro, pedunculis bracteatis.*

- + 3. *H. FRÆTIDUS* (L. sp. 784.) caule multifloro folioso, foliis pedatisectis glaberrimis, segmentis oblongo-linearibus. ♀ in pascuis glareosis præsertim calcareis, dumetis et secùs vias planitierum, autumno et hyeme florens. — Fl. fr. 4. p. 907. — Dod. pempt. 386. ic. (v. v.)

4. *H. LIVIDUS* (Ait. kew. 2. p. 272.) caule multifloro folioso, foliis triseptis glaberrimis subtus glaucis, segmentis ovato-lanceolatis. ♀ in Corsicâ hyeme et primo vere florens. — Fl. fr. 4. p. 907. *H. argutifolius* Viv. cors. 8. — Moris. s. 12. t. 4. f. 5. n. 7. (v. v.)

XIV. ISOPYRUM. *L. gen. 701.*

Involucrum o. *Calyx* 5-sepalus deciduus regularis petaloïdeus; petala 5 sæqualia tubulata bilabiata labio exteriore bifido; stam. 15-20; ovaria 2-20; capsulae sessiles 1-loculares oblongæ compressæ membranaceæ.

- + 1. *I. THALICTROIDES* (L. sp. 783.) capsulis 1-3, sepalis obtusis, radice repente





fasciculatâ aut grumosâ, petiolis basi in auriculas membranaceas dilatatis. ♀ in montanis umbrosis Pyren., Arverniæ, Delph. — Fl. fr. p. 929. — Moris. s. 12. t. 1. f. ult. n. 5. (v. v.)

XV. GARIDELLA. *Tourn. inst. 655. t. 43. L. gen. n. 571.*

Calyx 5-sepalus deciduus vix petaloïdeus; petala 5 bilabiata 2-fida; stam. 10-40; ovaria 3 connexa; styli brevissimi; capsulae 2-3 polyspermæ connatae in unicam 2-3-locularem vix 2-3-cornutam.

1. G. NIGELLASTRUM (L. sp. 753.) petalis sessilibus patentibus, staminibus 10-12. (I) in apricis inter vineas et oliveta Galloprov. — Fl. fr. 4. p. 911. — Garid. aix. t. 39. (v. v. DC.)

XVI. NIGELLA. *Tourn. inst. 248. t. 134. L. gen. n. 685.*

Calyx coloratus deciduus petaloïdeus patens 5-sepalus; petala 5-10 bilabiata; stam. 80; ovaria 5-10 plus minusve basibus concreta, in stylis simplices longos desinentia; capsulae totidem plus minusve concretæ polyspermæ, stylis elongatis rostratæ.

1. N. ARVENTIS (L. sp. 753.) antheris apiculatis, stylis 5-7 extus circinnatim revolutis, capsulis lœvibus in fructum obconicum basi angustatum ultrâ medium connexis, caule glabro, ramis subdivergentibus. (I) in arvis inter segetes. — Fl. fr. 4. p. 910 et 5. p. 640. Bull. t. 126. (v. v.)
2. N. SATIVA (Lin. sp. 753.) antheris muticis, capsulis muricatis in fructum ovatum ad apicem usque connexis, caule erecto pilosiusculo, floribus nudis. (I) in arvis Monspelii. — Fl. fr. 5. p. 640. — Fuchs. 503. ic. fl. albidi. (v. v. c.) *β. citrina*, seminibus luteis, floribus plenis. — Clus. 2. p. 207. ic.
3. N. DAMASCENA (Lin. sp. 753.) antheris muticis, capsulis 5 lœvibus bilocularibus in unicam ovato-globosam ad apicem usque connexis, floribus involucro folioso cinctis, sepalis patentibus. (I) in arvis inter segetes Galliæ australis. — Fl. fr. 4. p. 910. — Fuchs. hist. 504. ic. Var. sepalis albis cœruleisve. (v. v.)

XVII. AQUILEGIA. *Tourn. inst. t. 242. Lin. gen. n. 275.*

Calyx deciduus colorato-petaloïdeus 5-sepalus, petala 5 deorsum producta in calcaria cava apice callosa inter sepala exserta; ovaria 5; capsulae totidem erectæ stylis acuminatæ.

1. A. VULGARIS (Lin. sp. 752.) calcaribus incurvis, capsulis villosis, caule folioso multifloro, foliis glabrinsculis, stylis stamina non superantibus. ♀ in pratis sepibus umbrosis. — Fl. fr. 4. p. 911. — Cam. ep. 405. ic. (v. v.)
2. A. VIScosa (Gou. ill. t. 19.) calcaribus incurvis, capsulis villosis caule punci ant unifloro subnudo foliisque pubescens-viscosis, stylis stamina non superantibus. ♀ in asperis montanis apricis Galliæ australis. — Fl. fr. 4. p. 912. 5. p. 640. Lach. act. Helv. 8. t. 5. (v. v.)
3. A. ALPINA (Lin. sp. 752.) calcaribus rectis apice subincurvis limbo petalorum dimidiò brevioribus, caule 2-3-floro folioso, foliorum segmentis in lobos lineares profundè multifidis. ♀ in locis umbrosis et humidis Alpium. Deless. ic. sel. 1. t. 48. A. Alpina var. α. Fl. fr. 4. p. 912. All. ped. t. 66. (v. v. in Helv.)
4. A. PYRENAÏCA (DC. fl. fr. 5. p. 640.) calcaribus rectis limbo vix brevioribus, caule subnudo subunifloro, foliorum segmentis in lobos lineares profundè multifidis. ♀ in pratis elatis Pyren. — A. Alpina var. β. fl. fr. 4. p. 912. Priori dimidiò minor. (v. v.)

XVIII. DELPHINIUM. *Tourn. inst. 426. t. 241. L. gen. n. 681.*

Calyx deciduus petaloïdeus irregularis, sepalo nempè superiore in

calcar deorsum producto; petala 4, 2 superiora basi in appendices intrà calcar contentas producta.

Sect. I. CONSOLIDÆ. DC. syst. I. p. 341.

Ovaria 1; petala 4 in unum coalita; calcar internum 1-petalum. — Species annuae.

1. D. AJACIS (Lin. sp. 748.) caule erecto subglabro subsimplici, ramis vix divergentibus longè floriferis, floribus densè racemosis, pedicellis bracteæ longitudine, capsulis pubescentibus. (I) in hortis cultum, in Corsicâ reperit Requien, in Santoniâ Desmoulins. — Fl. fr. 4. p. 913. Weinm. phys. t. 409. 411. Lob. ic. 740. t. I. (v. v.)
2. D. CONSOLIDÆ (Lin. sp. 748.) caule erecto subglabro divaricatum ramoso, floribus paucis laxè racemosis, pedicellis bracteæ longioribus, capsulis glabris. (I) in arvis et segetibus. — Fl. fr. 4. p. 913. — Lob. ic. 739. f. 2. (v. v.)
3. D. PUBESCENS (DC. fl. fr. 5. p. 641.) caule recto pubescente apice divaricatum subramoso, floribus laxè racemosis, pedicellis bracteæ longioribus, foliis capsulisque pubescentibus. (I) in agris et segetibus circa Narbonam, Monspelium, Nemausim, Avenionem, Massiliam (Solier). (v. s.)

Sect. II. DELPHINELLUM. DC. l. c. p. 346.

Ovaria 3; petala libera glabra; calcar internum dipetalum. Species annuae.

4. D. CARDIOPETALUM (DC. syst. I. p. 347.) caule erecto subramoso, foliis glabris membranaceis trisectis, segmentis multifidis, lobis linearibus, rameis bracteisque inferioribus multifidis, racemis confertis, petalis stipitatis, limbo orbiculato basi cordato. (I) in Pyren. vallibus. — D. peregrinum Lam. dict. 2. p. 264. Fl. fr. 4. p. 914. excl. var. β et All. syn. 5. p. 641. non L. D. Garumnae Lapeyr. supp. (v. v.)
5. D. JUNCEUM (DC. fl. fr. 5. p. 641.) caule erecto ramosissimo, foliis glabris rigidis, inferioribus multifidis, rameis bracteisque linearibus integris, racemis laxis, petalis stipitatis limbo elliptico. (I) in Galloprov? Niceæ. — D. peregrinum All. ped. 425. f. 3. (v. s. ex Barbariâ.)

Sect. III. DELPHINASTRUM. DC. syst. I. p. 351.


Ovaria 3-5; petala libera, inferiora in disco barbata bifida; calcar elongatum internum dipetalum. — Species perennes.

6. D. INTERMEDIUM (Ait. kew. 2. p. 243.) petiolis basi non dilatatis, foliis cordatis 5-7 fidis, superioribus 3-lobis, omnium lobis inciso-serratis, pedicellis bracteolis calycibus ovariisque glabris. \mathscr{U} in vallibus Pyren. (v. v. DC.)
 - a. pilosissimum (DC.) caule pilosissimo, foliis villosis, nervis supernè pilosis racemo ramoso. — Gm. sib. 4. t. 80.
 - β . leptostachyum (DC.) caule petiolisque glabris, foliis pubescentibus, racemo simplici brevi. D. intermedium Lapeyr.?
 - γ . ranunculifolium (DC.) caule glabro, petiolis pilosiusculis, foliis tenuibus pubescentibus, racemo simplici laxo.
 - δ . laxum (DC.) caule foliisque glabris, lobis elongatis acutius incisis, racemo laxo racemoso.
7. D. MONTANUM (DC. fl. fr. 5. p. 641.) petiolis basi non dilatatis, foliis pubescentibus 5-lobatis, lobis basi cuneatis trifidis incisis, racemo simplici, bracteis calycibus capsulisque pubescentibus, calcare inflexo. \mathscr{U} in vallibus excelsis Pyren. et Alp. Galloprov. — Clus. hist. 2. p. 94. f. 2. (v. v.)

Sect. IV. STAPHYSAGRIA. C. et J. Bauh. DC. prod. I. p. 56.

Ovaria 3-5, petala libera; calcar breve internum dipetalum; capsulae ventricosæ, semina pauca magna. — Species biennes.

8. D. REQUIENII (DC. fl. fr. 5. p. 642.) calcare calycis ferè longitudine, bracteolis medio pedicelli insertis, petiolis pilosis. (2) in insulis Stæchadum, et Corsicâ (cl. Soleiroli.), Deless. ic. sel. I. t. 63. (v. s.)





9. **D. PICTUM** (Willd. enum. 574.) calcare calyce vix breviore, bracteolis ad basin pedicelli insertis, petiolis pubescentibus, pedicellis flore vix longioribus. (2) in Gallopr. maritimâ. — **D. STAPHYSAGRIA** J. Bauh. 3. p. 641. f. 2. (v. s.)
10. **D. STAPHYSAGRIA** (Lin. sp. 750.) calcare brevissimo, bracteolis ad basin pedicelli insertis, petiolis pilosis, pedicellis flore duplò longioribus. (2) in ruderatis Occitaniae et Gallopr. — Fl. fr. 4. p. 913.—J. Bauh. 3. p. 642. f. 1. (v. v.)

XIX. ACONITUM. *Tourn. inst. t. 239 et 240. L. gen. 682. DC. syst. 1. p. 364.*

Calyx petaloïdeus irregularis deciduus vel marcescens, sepalo nempè superiore concavo cassidæformi; petala 2 superiora (cuculli, nectaria) longè unguiculata apice in saccum expansa sub galeâ recondita.

Sect. I. ANTHORA. *DC. l. c.*

Sepala persistentia, galea conica vel semicircularis, ovaria 5; — folia in lobos lineares palmatisecta.

1. **A. ANTHORA** (L. sp. 751.) floribus paniculatis, cucullorum sacco ferè nullo, calcare crasso spirali, staminum alis evanescentibus, foliis multifidis, lacinias linearibus acutis. 2f in Jurasso et Pyrenæis. — Fl. fr. 4. p. 917. — Moris. s. 12. t. 2. n. 7. (v. v.)

f. atrovirens (DC. syst.) foliis caulinisque glabratris. In Pyrenæis.

f. eupolphum (Ser. in DC. prod. 1. p. 57.) paniculâ floribusque puberulis, galeâ conicâ suprà rostrum incumbente. — In Jurasso. *A. anthoroïdeum* DC. syst. 1. p. 366.

Sect. II. LYCOCTONUM. *DC. syst. 1. p. 367.*

Sepala decidua; galea conico-cylindracea, ovaria 3; — lobi foliorum cuneiformes pinnati rarò bipinnatisecti.

2. **A. LYCOCTONUM** (L. sp. 750.) caule piloso, foliis petiolatis ciliatis ultrà medium 3-5-lobatis, lobis cuneatis 3-fidis, floribus spicatis paniculatisve. galeâ conico-cylindracea ovariiisque glabrinculis. 2f in sylvis dumetis pratique montosis. — Fl. fr. 4. p. 916. — Moris. s. 12. t. 2. n. 1. (v. v.)

3. **A. PYRENAÏCUM** (Lam. dict. 1. p. 33.) densè velutino-pubescentia, caule ramosissimo, foliis petiolatis ultrà medium 5-9-lobatis, lobis cuneatis trifidis, floribus paniculatis, galeâ conico-cylindracea angustatâ ovariiisque velutinis. 2f in Pyrenæis. — DC. fl. fr. 4. p. 916. syst. 1. p. 368. *A. Lycoctonum* / Ser. in DC. prod. 1. p. 57. — Camer. epit. 831. ic. (v. v. DC.)

Sect. III. CAMMARUM. *DC. l. c. p. 374.*

Sepala decidua, galea conica compressa ovaria 3-5; — lobi foliorum pinnatisecti.

4. **A. PANICULATUM** (Lam. dict. 1. p. 33.) paniculâ divaricatâ, ramis puberulis, galeâ conico-semicirculari, rostro inclinato, sacco cucullorum subconoïdeo, calcare crasso brevi spirali, alis staminum angustis evanescentibus, folliculis elongatis. (2) in asperis dumetis abruptis Alpium. — Fl. fr. 4. p. 918. 5. p. 643. — Ser. mus. helv. 1. t. 15. f. 20 et 21. (v. v.)

Sect. IV. NAPELLUS. *DC. syst. 1. p. 371.*

Sepala decidua, galea semicircularis rarò navicularis; ovaria 3-7. — Foliornm lobi bipinnatisecti.

5. **A. NAPELLUS** (L. sp. 751.) floribus densè spicatis vel laxè paniculatis, sacco cucullorum subconoïdo, calcare brevi crasso inclinato, alis staminum cuspidatis vel evanescentibus, foliorum lobis cuneatis pinnatisectis, ovaris 3, rarò 5, glabris vel pilosis. (2) in montosis. — Fl. fr. 4. p. 917. Lob. ic. 679.

f. 1. Inflorescentiâ, galeæ formâ, floris colore, foliis, staturâ admodum variabilis. (v. v.)

Trib. V. *PÆONIACEÆ*. DC. prod. 1. p. 64. — Ranunculaceæ spuriæ. *DC. syst.* 1. p. 281.

Antheræ introrsæ. — An ordo proprius? ex *DC. prod. l. c.*

XX. *ACTEA*. L. sp. ed. 2. p. 722. *DC. syst.* 1. p. 381.

Calyx deciduus 4-sepalus; petala 4; carpella ∞ -sperma.

1. A. *SPICATA* (L. sp. 722.) monogyna, baccis subglobosis, petalis staminum longitudine, racemo ovato, foliis bi-trernatimve sectis segmentis ovato-lanceolatis serratis incisive. ♀ in umbrosis asperis montanis. — Fl. fr. 4. p. 920. Bull. t. 83. — Lob. ic. 682. f. 1. (v. v.)

XXI. *PÆONIA*. L. gen. n. 678.

Calyx 5-sepalus foliaceus inæqualis; petala 5-10; stam. ∞ ; discus carnosus ovaria cingens; carpella 2-5 grossa stigmatibus bilamellatis crassis instructa, in folliculos capsulares conversa; semina subglobosa nitida. — Folia caulina biternatim secta; flores ampli.

1. P. *CORALLINA* (Retz. obs. 3. p. 34.) herbacea, carpellis tomentosis, foliorum segmentis ovatis integris glabris. ♀ circa Aureliam, Blois et propè Alais. — Fl. fr. 5. p. 643. — P. mas. Dod. pempt. 194. f. 1. (v. s.)
2. P. *OFFICINALIS* (Retz. obs. 3. p. 35.) herbacea, carpellis tomentosis rectiusculis, foliorum segmentis inæqualiter laciniatis glabris, laciniis ovato-lanceolatis. ♀ in pratis nemorosis Delphinatûs, Galloprov? Pyrenæorum ex Lapeyr. — Fl. fr. 4. p. 919. — P. femina Dod. 195. f. 1. Lob. ic. 682. (v. v.)
3. P. *RUSSI* (Biv. man. sic: 4. p. 12.) herbacea, carpellis pilosis recurvatis, foliorum segmentis ellipticis integris subtus vix pubentibus. ♀ in Corsicâ sylvâ Perticato dictâ reperiit cl. Soleiroli. — DC. prod. 1. p. 66. Petala chermesina. (v. s. fructigeram.)
4. P. *PARADOXA* (And. trans. Linn. 12. p. 288.) herbacea, carpellis tomentosis rectis, foliorum segmentis multipartitis subundulatis subtus glaucis pilosis. ♀ in Galliae australis montibus apricis raro. — DC. prod. 1. p. 66. P. promisea Lob. ic. 683. f. 2. P. peregrina DC. fl. fr. 5. p. 643. (v. v. DC.)



J. Legendre

Ordo II. BERBERIDEÆ. *Vent. tabl. 3. p. 83. DC. fl. fr. ed. 3.
v. 4. p. 627. syst. 2. p. 1. prod. 1. p. 105.*

Sepala 3-4 aut sæpius 6 decidua, oblonga aut ovalia, sæpè subcolorata, dupli serie alternatim disposita, extùs squamis sæpius stipata. Petala tot quot sepala et iis opposita, aut rariùs numero dupla, hypogyna, sæpius basi intùs glandulâ squamulâve aucta. Stam. tot quot petala iis opposita, filam. brevibus, antheris oblongis adnatis bilocularibus, loculis à basi ad apicem valvulâ subelastica dehiscentibus. Ovarium (abortu) solitarium ovatum subobliquum 1-locul., stylo sublaterali brevissimo et stigmate suborbiculato coronatum. Fructus baccatus capsularis. Semina imæ placentæ lateralí adfixa 1-3, ovata aut globosa. Albumen carnosum sæpè subcorneum. Embryo rectus axilis, radiculâ ad apicem plus minùsve incrassatâ, cotyledonibus planis. — Frutices aut Herbæ perennes; folia aut foliola aristato-serrata.

I. BERBERIS. *L. gen. 442.*

Sepala 6 squamis 3 stipata; pet. 6 intùs biglandulosa; bacca 2-3-sperma.—Frutices foliis primariis abortivis in spinam sæpius mutatis, secundariis in axillis fasciculatis. Flores flavi.

I. *B. VULGARIS* (Lin. sp. 472.) spinis tripartitis, foliis fasciculatis subobovatis ciliato-serratis, racemis multifloris pendulis, petalis integris. ♂ in dumetis sepiibus incultis et apricis præsertim calcareis Galliæ totius. — Fl. dan. t. 904. Fl. fr. 4. p. 627. Fructus ruber et in var. cultis luteus violaceus purpureus niger aut albus. (v. v.)

II. EPIMEDIUM. *L. gen. n. 148.*

Sepala 4 extùs basi bibracteolata; pet. 4 intùs appendice discolore aucta; capsula siliculaeformis 20-sperma. — Herbæ perennes, foliis multisectis, floribus atropurpureis.

I. *E. ALPINUM* (Lin. sp. 171.) foliis radicalibus nullis, caulino biternatim septo, segmentis cordato-lanceolatis acuminatis aristato-serratis. ♀ in umbrosis et dumetis montanis Alpium, Vogesorum ubi forsitan Lindernio introductum. — Fl. fr. 4. p. 628. Lam. ill. t. 83. (v. v. in Helv.)

Ordo III. NYMPHÆACEÆ. DC. prop. med. ed. 2. p. 119.
syst. 2. p. 39. prod. p. 113.

Torus floris expansus in urceolum ovaria includentem et stigmatibus coronatum. Sepala 4-6 toro inserta persistentia colorata. Petala pluriserialia, toro inserta, oblonga, plana, serie quâque totidem petalis constante quot sunt sepala, externâ cum iis alternâ. Stam. ∞ multiserialia toro cum petalis inserta, filamentis planiusculis, antheris adnatis introrsis linearibus bilocularibus rimâ dupli longitudinaliter dehiscentibus. Carpella 8-24 intrâ torum inclusa 1-styla membranacea evalvia polysperma, stigmatibus extrâ torum urceolatum peltatim radiatis basi connatis apice liberis. Semina ∞ parietibus carpellorum adfixa inversa ovato-globosa, arillo folliculæ-formi cincta. Embryo ad basin albuminis farinacei situs, parvus, turbinato-globosus, inclusus in sacculo proprio membranaceo undè monocotyledoneus videtur, sed sacculo fisso cotyledones 2 foliaceas exhibens. — Herbae aquatice, truncu tereti horizontali repente, foliis longè petiolatis limbo natantibus, floribus longè pedunculatis radicalibus solitariis.

I. NYMPHÆA. DC. syst. 2. p. 49.

Sepala ad basin tori; petala staminaque cum toro carpella tegente longè adnata et bacca ideò quasi semi-infera cicatrizada. — Flores albi.

1. N. ALBA (Lin. sp. 729.) foliis cordatis integerrimis, stigmate 16-radiato, radiis adscendentibus. $\frac{2}{f}$ in fossis lacubus fluminibusque lente fluentibus Galliæ totius. — Fl. dan. t. 602. Fl. fr. 4. p. 630. (v. v.)

2. minor (Besl. eyst. vern. ord. vii. t. 3. f. 2.) flore minore. — In Alsatiâ circa Argentinam. (v. s.)


II. NUPHAR. DC. syst. 2. p. 59.

Sepala petala staminaque ad basin tori inserta et ideò bacca quasi supera lævis. — Flores lutei.

1. N. LUTEA (Sm. prod. fl. gr. 1. p. 361.) calyce 5-sepalô, stigmate integro 16-20-radiato profundiè umbilicato, foliis ovali-cordatis, lobis approximatis, petiolis acutangulis triquetris. $\frac{2}{f}$ in fossis et fluminibus lente fluentibus Galliæ ferè totius. — Nymphæa lutea Lin. sp. 729. engl. bot. t. 159. Fl. fr. 4. p. 630. (v. v.)

2. N. PUMILA (Sm. engl. bot. 2292.) calyce 5-sepalô, stigmate lobato 10-radiato, foliis oblongo-cordatis punctatis subpubescentibus, lobis approximatis, petiolis basi semiteretibus apice subtriquetris. $\frac{2}{f}$ in lacubus montanis Vogesorum. — DC. syst. 2. p. 60. Dimidiò minor quam N. lutea. (v. s. ex Germaniâ.)





Ordo IV. PAPAVERACEÆ. DC. syst. 2. p. 67. prod. 1. p. 117.
— Papaveracearum. gen. Juss.

Calyx 2-sepalus foliaceus, sepalis concavis florem juniores saepius includentibus. Pet. regularia eglandulosa, ante evolutionem irregulariter plicata, saepius 4 unicâ serie disposita et inter se cruciata. Stam. inter se libera, rarius 4 serie unicâ petalis opposita, saepius seriebus multiplicatis 8, 16 20... etc. Filam. filiformia; antheræ biloculares basi insertæ sulco duplice dehiscentes. Ovarium liberum constans carpellis nunc paucis (2-3) nunc plurimis (10-12) intrâ thalami productionem membranaceam saepè amplexis. Stylus 0 aut brevis. Stigmata radiatim patentia. Capsula ovata aut elongata siliquiformis, carpellis margine seminifero inter se connexis, et placentas ideò utrinque seminiferas nunc bifiliformes nunc septiformes conficientibus. Semina 8 horizontalia subglobosa exarillata. Albumen carnososo-oleosum. Embryo minimus ad basin albuminis rectus. — Herbæ succo lacteo albo aut croceo fœtæ. Radices fibrosæ. Folia alterna penninervia dentata aut pinnatiflobata. Pedunculi elongati 1-flori.

I. **PAPAVER.** Tourn. inst. t. 119. L. gen. n. 448. DC. fl. fr. 4. p. 631.

Sepala 2 decidua; pet. 4; stam. 8; stylus 0; stigmata 4-20 radiantia sessilia super discum ovarium coronantem; capsula obovata 1-loc. septis incompletis, carpellis 4-20 in thalami productione membranacea inclusis constans, sub stigmatum coronâ valvulis brevibus dehiscens. — Pedunculi ante fluorescentiam apice inflexi.

§. I. *Capsulis hispidis.*

1. P. PYRENAÏCUM (Willd. enum. 563) capsulâ hispidâ obovatâ, sepalis setosis, pedunculis radicalibus, foliis pilosis pinnatilobatis, lobis incisis dentatisve subobtusis. $\frac{1}{2}$ in apricis calcareis montium regionem olearum circumdantium nempe in Pyrenæis orient. Cebennis, Alpibus aust.—DC. syst. 2. p. 71.
 a. *luteum* (DC.) floribus flavis defloratis subaurantiacis. — Argemone Pyrenaica Lin. P. aurantiacum Lois. not. 84. DC. fl. fr. 5. p. 585 P. alpinum et P. suaveolens Lapeyr. (v. v.)
 £. *puniceum* (DC.) floribus puniceis. In Pyrenæis loco dicto Port de Plan ex Lapeyr.
2. P. ALPINUM (Lin. sp. 724.) capsulâ hispidâ obovato-oblongâ, sepalis pilosusculis, pedunculis radicalibus, foliis glabriusculis bipinnatisectis, lobulis tenuibus subacutis. $\frac{1}{2}$ in apricis inter lapides et saxa Alpium editioram. — Jacq. austr. t. 83. Fl. fr. p. 93a. Flores albi. (v. v.)
3. P. HYBRIDUM (Lin. sp. 725.) capsulâ hispidâ obovato-globosâ torosâ, sepalis pilosis, caule folioso multifloro, foliis pinnatisectis, lobis multifidis linearibus. (I) in agris versuris et oleraceis Gall. ferè totius. — Lob. ic. t. 276. f. 1. Fl. fr. 4. p. 631. Fl. rubri. (v. v.)
4. P. ARGEMONE (Lin. sp. 725.) capsulâ hispidâ elongato-clavatâ, sepalis glabriusculis, caule folioso multifloro, foliis bipinnatisectis, lobis linearibus.

(1) in campis arenosis, agris, oleraceis Gall. totius. — Lob. ic. t. 276. f. 2. Fl. fr. 4. p. 631. Fl. parvi pallide coccinei ungue nigro. (v. v.)

§. 2. *Capsulis glabris.*

5. P. DUBIUM (Lin. sp. 726.) capsula glabra oblongo-clavata, sepalis pilosis, caule multifloro setis patentibus hispido, setis peduncularum adpressis, foliis pinnatipartitis, lobis inciso-dentatis. (1) in arvis sabulosis oleraceisque. Gall. tot. — Schkuhr. handb. 2. t. 140. Fl. fr. 4. p. 633. Flores coccinei aut rarius albi. (v. v.)
6. P. RHEAS (Lin. sp. 726.) capsula glabra obovatâ, sepalis pilosis, caule multifloro setis patentibus scabro, foliis pinnatipartitis, lobis elongatis inciso-dentatis acutis. (1) in arvis frequens inter segetes. — Blackw. herb. t. 2. et 560. Fl. fr. 4. p. 632. Flores coccinei variantes albi aut carnei aut marginati. (v. v.)
7. P. ROUBIEI (Vig. diss. 39. t. 1. f. 1.) capsula glabra subrotundâ, sepalis pilosis, caule multifloro piloso, foliis bipinnatipartitis villosis, lobis linearibus pilo terminatis. (1) in arenosis ad Frontignan propè Monspelium legit Roubieu, in Corsicâ Ph. Thomas. — Fl. fr. 5. p. 585. (v. s.)
8. P. SETIGERUM (DC. fl. fr. 5. p. 586) capsula glabra obovatâ, sepalis subsestosis, caule glabro paucifloro, foliis amplexicaulibus glaneis inciso-repandis, dentibus setâ terminatis. (1) in insulis Stoechadum obs. Requien. et in Corsicâ Ph. Thomas. — Deless. ic. sel. 2. t. 7. An stirps sylvestris P. somniferi nigri? (v. s.)
9. P. SOMNIFERUM (Lin. sp. 726.) capsula obovatâ aut globosâ calycibusque glabris, caule glabro glauco, foliis amplexicaulibus inciso-repandis, dentibus subobtusis. (1) ex Oriente ortum nunc freq. cultum.
 - a. *nigrum* (DC.) capsulis globosis sub stigmate foraminibus apertis, semin. nigris. — Cultum præsertim in Alsatiâ ad confic. oleum huile d'œillet dictum. Lam. ill. t. 431. (v. v. c.)
 - β. *album* (DC.) capsulis ovato-globosis sub stigmate foraminibus nullis seu oblitteratis, seminibus albis. — Cultum ad opium extrahendum. An species propria? Wood. med. bot. t. 185. (v. v. c.)

II. MECONOPSIS. Vig. diss. f. 3. DC. fl. fr. 5. p. 586.

Sep. 2 decidua; pet. 4; stam. ∞ ; stylus brevis; stigm. 4-6 radientia convexa libera; capsula obovata 1-loc. valvis 4-6 apice dehiscens, placentis tenuibus vix intus in membranulas angustas productis. —

1. M. CAMBRICA (Vig. diss. 48. f. 3.) capsulis lævibus, foliis plurimis petiolatis. $\frac{2}{3}$ in pratis umbrosis dumetis et sepibus Pyrenæorum et montium Arverniæ. — Papaver cambricum Lin. sp. 727. Fl. fr. 4. p. 633. Succus flavescens. Flores flavi. (v. v.)

III. ROEMERIA. DC. Syst. 2. p. 92. prod. 1. p. 122.


Pet. 4; stam. ∞ ; capsula elongata 3-4-valvis, valvis ab apice ad basin dehiscentibus; sem. reniformia scrobiculata cristâ glandulosâ destitutâ. — Herbæ (1).


1. R. HYBRIDA (DC. 1. c.) siliquis 3-4-valvibus erectis apice rigidè setosis. (1) in agris cultis et vineis regionis Mediterraneæ. — Chelidonium hybridum Lin. sp. 724. Fl. fr. 4. p. 636. — Clus. hist. 2. p. 92. f. 2. Succus flavus. Flores violacei. (v. v. DC.)

IV. GLAUCIUM. Tourn. inst. t. 130. DC. syst. 2. p. 94. prod. 122.

Pet. 4; stam. ∞ ; capsula elongata bivalvis dissepimento cellulari bilocularis; semina ovato-reniformia. — Herbæ (2).

1. G. FLAVUM (Crantz. austr. 2. p. 141.) caule glabro, foliis canlinis repandis,





- siliqua tuberculato-scabriuscule. (2) in glareosis et arenosis secus littora marium et fluminum.—*Chelidonium Glaucium* Lin. sp. 724. Fl. fr. 4. p. 635.—Cam. epit. 805. ic. Flores flavi. Succus croceus. (v. v.)
2. *G. CORNICULATUM* (Curt. lond. 6. t. 32.) canale piloso, foliis caulinis pinnatifidis incisis, siliqua setosâ. (1) in agris et segetibus regionis Mediterraneæ rariüs. — *Chelidonium corniculatum* Lin. sp. 724. Fl. fr. 4. p. 635. Flores phœnicei. (v. v. DC.)

V. CHELIDONIUM. Gærtn. fruct. 2. t. 115. f. 5. DC. syst. 2. p. 98.

Sep. 2 glabra; pet. 4; stam. 8; capsula elongata bivalvis 1-locul. valvis à basi ad apicem dehiscentibus; semina cristâ glandulosâ instrucța. — *Herbæ* 2.

1. *G. MAJUS* (Lin. sp. 723. var. α .) pedunculis umbellatis, foliis pinnatisectis, segmentis subrotundis dentato-lobatis, petalis ellipticis integris. 2 frequens in umbrosis etruderatis.—Fl. fr. 4. p. 634. Lam. ill. t. 450. f. 1. Flores flavi. Succus croceus acris. (v. v.)

VI. HYPECOUM. Tourn. inst. t. 115. L. gen. 171.

Pet. 4, interiora sæpius 3-loba; stam. 4; capsula siliquæformis bivalvis transversè nodosa seu articulata; semina inter articulationes solitaria.

1. *H. PROCUMBENS* (Lin. sp. 181.) siliquis articulatis compressis arcuatis, petalis 3-lobis, externis dorso glabris. (1) in arvis et arenosis secus mare Mediterraneum. — Lam. ill. t. 88. Fl. fr. 4. p. 640. Flores flavi. (v. v.)
2. *H. PENDULUM* (Lin. sp. 181.) siliquis nodosis teretibus pendulis, petalis glabris, 2 exterioribus ovato-oblongis, 2 interioribus 3-partitis. (1) in arvis Galloprovinciæ, Monspelii, Andegaviæ. — Lob. ic. 743. f. 2. — Fl. fr. 4. p. 641. fl. flavi. (v. s.)

Ordo V. FUMARIACEÆ. DC. syst. 2. p. 105. prod. 1. p. 125.

Calyx 2-sepalus membranaceus deciduus parvus. Pet. 4 inter se cruciata, nunc libera, nunc basi coalita, nunc 1 liberum et 3 coalita, 2 exteriora sepalis alterna nunc ambo nunc unicum in calcar gibbositatemve producta, 2 interiora oblongo-linearia apice callosa. Stan. Filam. 6, in phalanges 2 oppositas ante petala exteriora sitas disposita. Antheræ 6 parvæ, laterales cu-jusque phalangis 1-loculares, mediæ biloculares; et ideò antherafum loculi 8, et in quâque phalange antheræ 2 strictori sensu habendæ. Ovarium 1 liberum. Stylus filiformis. Stigma bila-mellatum petalis interioribus parallelum. Fructus siccus nunc siliquosus bivalvis polyspermus dehiscens, valvulis oppositis, placentis 2 ad suturas nerviformibus persistentibus, nunc bi-valvis 2-spermus valvulis coalitis indehiscens, nunc evalvis? indehiscens, abortu? 1-spermus. Semina placentis lateralibus adfixa horizontalia ovato-globosa nitida arillata aut carunculata. Albumen carnosum. Embryo basilaris. Cotyled. oblongæ. — Herbæ succo aqueo. Flores racemosi.

I. CORYDALIS. DC. fl. fr. 4. p. 636. syst. 2. p. 113.

Pet. 4, unicum basi calcaratum; siliqua bivalvis compressa poly-sperma. — Herbæ perennes aut annuæ.

Sect. I. CAPNITES. DC. prod. 1. p. 126.


Radice tuberosa; caule simplici, folia alterna pauca gerente.


1. C. TUBEROSA (DC. fl. fr. 4. p. 637.) caule simplici exsquamato, foliis 2 bibernatim sectis, segmentis cuneatis inciso-multifidis, bracteis ovatis integris, radice tuberosa cavâ. ♂ in sepiibus et dumetis umbrosis submontanis. — Fumaria bulbosa & Lin. sp. 933. — Lob. ic. 759. f. 1. Fl. purpurei aut albi. (v. v.)
2. C. FABACEA (Pers. enc. 2. p. 269.) caule subsimplici erecto sub infimo folio squamigero, foliis 3-4 petiolatis bibernatim sectis, segmentis oblongis obtusiusculis, bracteis ovatis acutis pedicello longioribus, radice tuberoso-bulbosâ solidâ. ♂ in sylvâ Compiegne ex Lois. — Fl. dan. t. 1394. DC. syst. 2. p. 118. fl. fr. 5. p. 586. Fumaria bulbosa & Lin. fl. succ. n. 831. (v. s. ex Vallesiâ.)
3. C. BULBOSA (DC. fl. fr. 4. p. 637.) caule simplici erecto sub infimo folio squamigero, foliis 3-4 petiolatis bibernatim sectis, segmentis cuneatis oblongisve bracteisque apice incisis, radice tuberoso-bulbosâ solidâ. ♂ in sepiibus, umbrosis, humidiusculis submontanis. — Lob. ic. 759. f. 2. Fumaria bulbosa & Lin. sp. 983. Fl. purpurascentes. (v. v.)


Sect. II. CAPNOÏDES. DC. prod. 1. p. 128.

Radice fibrosa; caule ramoso folia alterna plurima gerente.

4. C. CAPNOÏDES (Pers. enc. 2. p. 270.) caule ramoso diffuso, foliis bipinnatim sectis, segmentis obovato-cuneatis trifidis, bracteis linearis-subulatis pedicello tripli brevioribus, siliquis linearibus vix pedicello longioribus. ♂ in fissuris rupium circa Narbonam et in muris Argentinae et Basileæ. — DC. syst. 2. p. 125. — Lob. ic. 758. f. 2. — Fumaria lutea Liu. mant. 258. Corydalis lutea Fl. fr. 4. p. 638. — Flores flavi in var. Europæa, albidi in Mauritanicâ nondum apud nos repertâ. (v. s.)







5. *C. CLAVICULATA* (DC. fl. fr. 4. p. 638.) caule ramoso diffuso scandente, foliis bipinnuatim sectis, petiolis cirrhosis, segmentis ovalibus integris, bracteis oblongis pedicello-longioribus. (I) in sepibus saxosisque prov. australium et occidentalium.—Lob. ic. 758. f. 1. *Fumaria clavicularia* Lin. sp. 985. Flores pallidè flavi. (v. v.)

II. SARCOCAPNOS. DC. syst. 2. p. 129. prod. 1 p. 129.

Pet. 4, unicum basi calcaratum; capsula bivalvis indehiscens 2-sperma, valvulis 3-nerviis planiusculis.

1. *S. ENNEAPHYLLA* (DC. l. c.) foliis petiolo ramoso triternatim sectis, segmentis ovato-orbiculatis. 2/4 in fissuris rupium agri Ruscinonensis.—*Fumaria enneaphylla* Lin. sp. 984. Lam. ill. t. 597. f. 4. DC. Fl. fr. 5. p. 587. Flores albido ochroleuci apice purpurei. (v. s.)

III. FUMARIA. Tourn. inst. p. 237. DC. syst. 2. p. 131.

Pet. 4, unicum basi gibbum aut breviter calcaratum; cariopsis indehiscens 1-sperma stylo post anthesin deciduo mutica. — Herbæ annuae.

Sect. I. PLATYCAPNOS. DC. l. c.

Siliculæ seu cariopsides compresso-planæ.

1. *F. SPICATA* (Lin. sp. 985.) siliculis compressis ovalibus lœvibus, racemis spicatis, pedicellis bracteâ multò brevioribus, caulinis erectis. (I) in agris oleraceisque regionis Mediterraneæ. — Clus. hist. 2. p. 208. f. 1. Fl. fr. 4. p. 640. Flor. purpurei. (v. v.)

Sect. II. SPHÆROCAPNOS. DC. l. c.

Siliculæ seu cariopsides globosæ.

2. *F. CAPREOLATA* (Lin. sp. 985.) siliculis globosis, pedicellis fructiferis recurvatis bracteâ longioribus, racemis oblongis, caulinis subscandentibus, foliis bipinnatisectis, petiolis subcirrhosis. (I) in sepibus, dumetis et arvis asperis prov. australium.—DC. fl. fr. 4. p. 639. ic. rar. 1. t. 34. Fl. carnei apice atro-purpurei. (v. v.)

3. *F. MEDIA* (Lois. not. p. 101.) siliculis globosis depresso-ovalibus, pedicellis fructiferis erectis bracteâ duplò longioribus, racemis laxiusculis, caulinis erectis, foliis suprà decompositis, petiolis subcirrhosis. (I) in agris oleraceisque Galliae australis et circa Parisios, Andegavum, Lauzertam, etc.—Vaill. bot. t. 10. f. 4. —Fl. fr. 5. p. 587. Flores albidi apice atro-purp. (v. v.)

4. *F. OFFICINALIS* (Lin. sp. 984.) siliculis globoso-retusis, pedicellis fructiferis erectis bracteâ duplò longioribus, racemis laxiusculis, caule erecto, foliis supra decompositis, lobis linearibus. (I) ubique in cultis, arvis, hortis. — Fuchs. hist. 338. ic. Fl. fr. 4. p. 539. Flor. purpascentes. (v. v.)

5. *F. PARVIFLORA* (Lam. dict. 2. p. 567.) siliculis globosis submucronulatis, pedicellis fructiferis erectis bracteâ longioribus, racemis laxis, caule diffuso, foliis suprà decompositis, lobis linearibus canaliculatis. (I) in cultis oleraceisque sèpè cum priore mixta. — Flores pallidi. Sm. engl. bot. t. 590. Fl. fr. 4. p. 639. (v. v.)

6. *F. VAILLANTII* (Lois. not. 102.) siliculis globosis vix mucronulatis, pedicellis fructiferis erectis bracteâ longioribus, racemis brevibus, caule erectiusculo, foliis suprà decompositis, lobis linearibus planis. (I) in agris arenosis circa Parisios, Andegavum, Monspelium, etc.—Vaill. bot. t. 10. f. 6. Fl. fr. 5. p. 587. Herba glaucescens. Flores purpascentes. (v. v.)

7. *F. DENSIFLORA* (DC. cat. h. Monsp. 113.) siliculis globosis, pedicellis fructiferis erectis bracteâ longioribus, racemis densis, calycibus dentatis, caule erectiusculo, foliis suprà decompositis, lobis linearibus crassiusculis. (I) in agris lapidosis et muris circa Telonem et Monspelium. — Fl. fr. 3. p. 588. syst. 2. p. 137. Var. floribus purpureis et albidis. (v. v.)

Ordo VI. CRUCIFERÆ. *Juss. gen. 257. DC. fl. fr. 4. p. 641.
syst. 2. p. 139. prod. 1. p. 131.*

Calyx 4-sepalus, sepalis cruciatis, 2 placentariis (superiore nempè et infer.) oppositis planis angustioribus, 2 lateralibus seu valvaribus latioribus basi concavis gibbis aut rariùs calcaratis, glandulis è toro ortis sepalorum basi. imminentibus. Petala 4 hypogyna, sepalis alterna, sæpiùs inter se æqualia, decidua. Stam. 6 è toro orta tetradynta, 2 ante sepala lateralia sita breviora, 4 longiora antè sepaia placentaria geminata interdùm inter se coalita. Antheræ biloculares introrsæ. Torus glandulas callosas inter petala et genitalia gerens. Ovarium 1 biloculare, elongatum et tunc stylus subnullus, aut abbreviatus et tunc stylus elongatus. Stigmata 2. Fructus elongatus (tunc *siliqua* dictus) aut abbreviatus (et tunc *silicula*), rariùs 1-loocularis evalvis, sæpiùs bilocularis bivalvis, loculis septo longitudinaliter divisis, valvulis planis concavis aut carinatis. Semina in quoque loculo ad utramque suturam adfixa, rarissimè abortu solitaria, exaluminosa, oleosa. Embryo (1) formâ varius semper plus minus curvato-plicatus. — Herbæ aut suffrutescens. Folia ferè omnium alterna. Racemi oppositifolii aut terminales, sæpiùs ebracteati,

Subordo I. PLEURORHIZEÆ (o =). *DC. syst. 2. p. 146.*

Cotyledones planæ accumbentes. Radicula lateralis nempè rimæ cotyledonum incumbens. Semina compressa interdùm marginata.

Trib. I. *ARABIDEÆ* seu Pleurorhizeæ siliquosæ. *DC. l. c.*

Siliqua elongata bivalvis dehiscens, septo linearis, stylo abbreviato, valvulis planis concavis aut subcarinatis. Semina in loculo quoque plurima. Cotyledones planæ septo paralellæ accumbentes. (o =)

I. MATHIOLA. *Brown. Kew. ed. 2. vol. 4. p. 119. DC. syst. 2. p. 162. non L.*

Calyx erectus basi bisaccatus; petala unguiculata; stam. libera edentula; siliqua teres vel compressa elongata, stigmate connivente bilobo, lobis dorso incrassatis vel cornigeris; semina 1-serialia.

Sect. I. *PACHYNOTUM. DC. l. c.*

Petalorum laminæ obovatæ planæ purè purpureæ aut albæ; stigmatum dorsa incrassata aut gibba.

I. *M. INCANA* (*Brown. h. Kew. ed. 2. v. 4. p. 119.*) caule basi suffruticoso-erecto ramoso, foliis lanceolatis integerrimis incanis, siliquis subcylindricis-e glandulosis. ♂ ♀ in rupibus maritimis Nicaeæ et insularum Stæchadum reperi,

(1) Embryonis structura facilius videtur in seminibus nondùm absolutè maturis.

- in hortis frequenter culta. — *Cheiranthus incanus* Lin. sp. 924. DC. fl. fr. 4. p. 656. — Wein. phyt. t. 643. f. a-e. et 644. f. a-b. Variat flore purp. coccineo albo et varieg., simplici et pleno. (v. v. sp. D.)
2. M. ANNUA (DC. syst. 2. p. 165.) caule herbaceo erecto ramoso, foliis lanceolatis obtusis incanis, siliquis subcylindricis eglandulosis. (1) in maritimis Europæ australis ex Lin., in hortis freq. culta. — *Cheiranthus annuus* Lin. sp. 925. Fl. fr. 4. p. 656. — J. Bauh. hist. 2. p. 875. f. 1. Var. fl. purp. et albo. (v. v. c.)
3. M. SINUATA (Brown. h. Kew. 4. p. 120) caule erectiusculo herbaceo ramoso, foliis oblongis tomentosis, inferioribus sinuatis, siliquis compressis velutinis et glanduloso-muricatis. (2) in arenosis maritimis secùs Mediterraneum et secùs Oceanum in prov. occid. — *Cheiranthus sinuatus* Lin! sp. 926. Fl. fr. 4. p. 657. — Lob. ic. t. 33o. f. 2. Flores roseo-purpurei vespero odorati. (v. v.)

Sect. II. LUPERIA. DC. syst. 2. p. 169.

Stigmatis dora crassa non cornigera; petala oblonga sordidè è flavo purpurea.

4. M. TRISTIS (Brown. h. Kew. 4. p. 120.) caule basi suffruticoso ramoso erecto, foliis tomentosis linearibus integris dentatisve, floribus subsessilibus, siliquis teretiusculis. ♂ ♀ in apricis lapidosis Galloprovincie et rariùs in Occitania. — *Cheiranthus tristis* Lin. sp. 925. Fl. fr. 4. p. 625. excl. var. Sabauda. — Barr. ic. t. 803. Flores vespero odoratissimi. (v. v. DC.)

Sect. III. ACINOTUM. DC. syst. 2. p. 175.

Petala obovata; siliqua apice tricuspidata stigmatum dorsis nempè in cornua exsertis.

5. M. TRICUSPIDATA (Brown. l. c.) caule suberecto ramoso, foliis sinuato-pinnatifidis, siliquæ cuspidibus 3 acutis subæqualibus. (1) in arenis maritimis secùs mare Mediterraneum, nec unquam Candollius vidit secùs Oceanum ubi tamen à cl. Laterrade indicatur. — *Cheiranthus tricuspidatus* Lin. sp. 926. Fl. f. 4. p. 655. Habitus et flores M. sinuatæ. (v. v.)

II. CHEIRANTHUS. Brown. kew. ed. 2. v. 4. p. 118. DC. syst. 2. p. 176.

Calyx basi bisaccatus clausus; siliqua teres aut compressa elongata; stigma bilobum aut capitatum, lobis dorso non gibbis; semina 1-serialia ovata compressa, in nostris immarginata.

1. C. CHEIRI (Lin. sp. 924.) foliis lanceolatis integerrimis, pnbē bipartitâ adpressâ aut nullâ, siliquis linearibus, stigmatis lobis recurvis. ♂ ♀ interdùm (2) in muris tectis et lapidosis præsertim prov. austral., in hortis frequenter cultas. — Fl. fr. 4. p. 637. — Lob. ic. 33o. f. 1 et 331. f. 2. Flores flavo-ferruginei, in hort. facile pleni, odorati. (v. v.)

III. NASTURTIUM. DC. syst. 2. p. 187.

Calyx patens æqualis; petala integra interdùm o; stigma subbilobum; siliqua teretiuscula aut abbreviata, valvis concavis enervibus; semina parva irregul. biserialia immarginata.

Sect. I. CARDAMINUM. DC. l. c.

Petala alba calyce majora; siliquæ teretiusculæ; glandulæ 4 ad basim statim. —

1. N. OFFICINALE (Brown. h. Kew. 4. p. 110.) foliis pinnatisectis, segmentis ovatis subrotundo-cordatis repandis. ♂ in rivulis fontibus scaturiginibus Gallicæ totius. Culta ad usus pharmaceuticos et culinares in Normanniâ. — *Sisymbrium nasturtium*. Lin. sp. 916 Fl. fr. 4. p. 661. — Lob. ic. t. 209. f. 1. (v. v.)

Sect. II. BRACHYLOBOS. DC. l. c.

- Petala flava; siliquæ teretiusculæ aut ellipsoideæ; glandulæ tori parvæ.
2. N. SYLVESTRE (Brown. l. c.) foliis pinnatisectis, segmentis lanceolatis serratis incisive. ♂ in pascuis humidis, ruderatis, glareosis secùs fluviorum ripas.—*Sisymbrium sylvestre*. Lin. sp. 916. Fl. fr. 4. p. 662. Engl. bot. t. 2324. Radix repens. Petala aurea calyce majora. (v. v.)
 3. N. PALUSTRE (DC. syst. 2. p. 191.) foliis pinnati-lobatis, auriculis amplexicaulis ciliatis, lobis confluentibus dentatis glabris, radice fusiformi, petalis calyceem æquantibus. (1) in inundatis ubique.—*Sisymbrium palustre*. DC. fl. fr. 4. p. 662. Schk. handb. t. 187.—J. Bauh. hist. 2 p. 866. f. 1. (v. v.)
 4. N. PYRENAICUM (Brown. l. c.) foliis radicalibus petiolatis obovatis lyratis, caulinis amplexicaulibus pinnatipartitis, lobis linearibus integris, siliculis ovalibus stylo apiculatis. ♂ in pascuis siccis collibus montosisque a Pyrenæis ad Alsatiam, ab Armoraciâ australi ad Galloprov.—*Sisymbrium Pyrenaicum*. Lin. sp. 916. Fl. fr. 4. p. 663. Myagrum Pyren. Berger. phyt. t. 143. (v. v. DC.)
 5. N. AMPHIBIUM (Brown. l. c.) foliis oblongo-lanceolatis pinnatifidis serratisve, radice fibrosâ, petalis calyce majoribus, siliculis ellipsoideis. ♂ in aquosis et inundatis Galliæ totius.—*Sisymbrium amphibium*. Lin. sp. 917. Fl. fr. 4. p. 663. Myagrum aquaticum Berger. phyt. t. 145. (v. v.)
 a. *indivisum* (DC.) foliis omnibus integrusculis serratisve.—C. Bauh! prod. 38. f. 1.
 b. *varifolium* (DC.) foliis aliis serratis, aliis pectinato-pinnatifidis, aliis capillaceo-multifidis.—Lob. ic. 319.

IV. BARBAREA. Brown. in h. Kew. ed. 2. v. 4. p. 109; DC. syst. 2. p. 205.

Calyx erectus basi subæqualis; petala unguiculata limbo integro; siliqua tetragono-anceps, valvis concavo-carinatis; semina 1-serialia.—Herbæ ♀ glaberrimæ. Flores flavi.

1. B. VULGARIS (Brown. h. Kew. 4. p. 109.) foliis inferioribus lyratis lobo terminali subrotundo, superioribus obovatis dentatis. ♂ in ruderatis humidiusculis, sepibus et palustribus Gall. tot.—*Erysimum barbarea*. Lin. sp. 922. var. a et γ. Fl. fr. 4. p. 560.—Lob. ic. t. 207. f. 2. (v. v.)
2. B. PRÆCOX (Brown. l. c.) foliis inferioribus lyratis, lobo terminali ovato, superioribus pinnatipartitis, lobis lineari-oblongis integerrimis. ♂ in herbidis uliginosis Pyrenæorum, Cebennarum, Alpium austral. et in pratis subsalsis maritimis Armoraciæ.—*Erysimum præcox* Smith! engl. bot. t. 1129. Fl. fr. 4. p. 661. Edulis. (v. v. DC.)

V. TURRITIS. Dill. nov. gen. giess. p. 120. t. 6. DC. syst. 2. p. 211.

Calyx laxus; pet. unguiculata, limbo oblongo integro; siliqua elongata anceps stricta, valvis planis nervosis; semina in quoque loculo biserialia numerosissima.—Flores albidi.

1. T. GLABRA (Lin. sp. 930.) foliis radicalibus dentatis pilosis, caulinis amplexicaulibus integerrimis glabris, siliquis strictissimis pedicello sextuplo longioribus. (2) in pascuis, siccis, apricis et sylvulis arenosis Gall. tot.—Clus. hist. 2. p. 126. f. 5. *Arabis perfoliata* Fl. fr. 4. p. 675. (v. v.)

VI. ARABIS. L. gen. n. 818.

Calyx erectus; pet. unguiculata limbo patente integro; siliqua linearis stigmate subsessili coronata, valvulis planiusculis nervosis vel venosis, septo linearis; semina 1-serialia.—Flores albi rariū rosei.

Sect. I. ALOMATIUM. DC. syst. 2. p. 214.

Semina immarginata, seu parvâ alâ membranacea cineta.



Sign De

§. 1. *Foliis caulinis cordato-amplexicaulibus, petalorum limbis obovatis ab ungue distinctis patentibus.*

1. A. VERRA (Brown. h. Kew. 4. p. 105. non Desf.) foliis caulinis cordatis amplexicaulibus dentatis pube tripartitâ scabris, pedicellis calyce brevioribus, stigmate subemarginato. (I) in arvis agris et asperis prov. Mediterranearum. — Hesperis verna Lin. sp. 928. Fl. fr. p. 653.—Barr. ic. t. 875 et 876. Flores parvi purpurei (v. v.)
2. A. ALPINA (Lin. sp. 928) foliis pluridentatis pube ramosâ villosis lanceolatis acutis, radicalibus subpetiolatis, caulinis cordato-amplexicaulibus, pedicellis calyce glabrinculo longioribus. ♀ in rupibus saxisque apricis montium calcareorum.—Clus. hist. 1. p. 125. f. 1 et 2. Fl. fr. 4. p. 674. Flores albi uti sequentes. (v. v.)

§. 2. *Foliis caulinis cordato-amplexicaulibus, petalis oblongo aut cuneato-linearibus erectis.*

3. A. AURICULATA (Lam. dict. 1. p. 219.) foliis subdentatis pube ramosâ scabris, inferioribus ovalibus in petiolum subattenuatis, caulinis obtusè cordato-auriculatis, pedicellis calyce vix longioribus, siliquis maturis à caule divergentibus strictis. (I) in collibus, muris, glareosis Delphinatûs, Occitanie, Galloprovinciae.—DC. fl. fr. 4. p. 673. syst. 2. p. 220. (v. v.)

α. A. aspera All! ped. auct. 18. t. 2. f. 2.

β. A. recta Villd. dauph. 3. p. 319. t. 37.

4. A. SAXATILIS (All. ped. n. 973.) foliis subdentatis pube ramosâ scabris, inferioribus in petiolum subattenuatis caulinis acutiusculè cordato-auriculatis, pedicellis demùm calyce quadruplò longioribus, siliquis maturis patulis subflexnosis. (I) in saxosis rupestribus asperis montium Delphinatûs, Galloprovinciae et Pyren. valle Eynes ex cl. Bentham.—Fl. fr. 4. p. 677. Ar. nova Vill. dauph. 3. t. 37. (v. v.)

5. A. SAGITTATA (DC. syst. 2. p. 221.) foliis subdentatis pube sæpius ramosâ scabris, radicalibus ovatis aut oblongatis in petiolum attenuatis, caulinis lanceolatis sagittato-cordatis, pedicellis calycis longitudine, siliquis erectis strictis. (2) in asperis muris, et campis præsertim prov. austral.

α. Gerardiana (DC.) foliis scabris, caulinis basi in auriculas productis.—

A. sagittata Fl. fr. 5. p. 592.—Ger. gallopr. 367. n. 2. (v. v.)

β. subglabrata (DC.) foliis fere glabris, caulinis auriculato-sagittatis, racemo composito.—In muris urbis Mont de Marsan legit. L. Dufour. (v. s.)

6. A. HIRSUTA (DC. Fl. fr. 4. p. 675. 5. p. 592.) foliis dentatis pube sæpius ramosâ scabris, radicalibus obovato-oblongis in petiolum attenuatis, caulinis ovato-lanceolatis, pedicellis calycis longitudine, siliquis erectis. (2) in campis et asperis Galliae ferè totins, præsertim australis. — Turritis hirsuta Lin. sp. 930. Jacq. ic. var. 1. t. 126. Boiss. fl. eur. t. 456. f. 1. (v. v.)


§. 3. *Foliis caulinis sessilibus, petalis oblongo aut cuneato-linearibus erectis.*

7. A. MURALIS (Bertol! dec. ital. 2. p. 137.) foliis pube ramosâ hirsntis, radicalibus spatulatis obtusè dentatis, caulinis ovatis acutè dentatis, racemo stricto, pedicellis calyce demùm duplò longioribus. ♀ in rupibus montanis Cebennarum et Alpium demissiorum, ad Vallemclausam.—Fl. fr. 5. p. 592. (v. v.)

8. A. STRICTA (Huds. angl. 592.) foliis pube sparsâ bifidâ ciliato-scabris, radicalibus obovatis dentatis, caulinis oblongis subintegris, racemo stricto, pedicellis calyce vix longioribus, siliquis laxiusculis. ♀ in rupibus calcareis apricis Alpium demissiorum et Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 677. var. α. Turritis Rayi Vill. dauph. 4. p. 326. t. 38. (v. v.)

9. A. CILIATA (Brown. h. Kew. 4. p. 107.) foliis subdentatis glabris ciliatis, radicalibus subsessilibus ovali-oblongis, caulinis oblongis, racemo stricto,

- pedicellis calycis longitudine. (2) in rupibus apricis Alpium et Pyrenæorum ex Benth. — A. stricta & Fl. fr. 4. p. 667. priori valde affinis. Dubia civis. (v. s. sp. ex Helv.)
10. A. INCANA (Roth. cat. bot. 1. p. 79.) foliis omnibus sessilibus subdentatis pilis ramosis incanis, radicalibus obovato-oblongis, caulinis oblongis, racemo erecto, pedicellis demum calyce quadruplo longioribus, siliquis strictis. (2) in campestribus siccis circa Nevers legit cl. Reynier. — DC. syst. 2. p. 225. (v. s.)
11. A? THALIANA (Lin. sp. 929.) foliis pilosis subdentatis, radicalibus petiolatis ovato-oblongis, caule ramoso, siliquis laxis adscendentibus, pedicellis calyce multo longioribus. (1) frequens in muris, tectis, arenosis, aridis. — Fl. fr. 4. p. 618. Sisymbrium Thalianum Gay in ann. sc. natur. avril. 1826. — Thal. herec. 84. t. 7. D. (v. v.)
12. A. SERPYLLIFOLIA (Vill. dauph. 3. p. 18. t. 37.) foliis subintegris pilis ramosis ciliato-subscabris, radicalibus caulinisque ovalibus basi attenuatis, racemo laxiusculo, pedicellis calycis longitudine. (2) in rupestribus montosis Alpium Delphinatū et Galloprovinciæ. — Fl. fr. 4. p. 678. (v. v. DC.)
- §. 4. *Foliis caulinis sessilibus aut petiolatis, petalorum limbo obovato seu cuneato ab ungue distincto.*
13. A. PETRÆA (DC. syst. 2. p. 229.) foliis glabris aut pilis simplicibus bifurcatis ciliatis vel scabris, radicalibus incisis, caulinis oblongo-linearibus integris, caule saepius ramoso, siliquis erecto-patulis, stigmate capitato. ♀ in rupibus et saxosis montium Arvernæ et Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 679. A. runcinata Lapeyr. ex cl. Benth. (v. s.)
14. A. ARENOSA (Scop. carn. ed. 2. n. 837. t. 40.) foliis pube bifurcâ villosis, radicalibus lyrato-pinnatifidis, caulinis inciso-dentatis, caule ramoso pilis simplicibus hispido, pedicellis siliquisque patulis. (1) in arenosis vineisque Alsatiæ et prope Dolam (Cordienne). — Sisymbrium arenosum Lin. sp. 919. Fl. fr. 4. p. 666. — C. Bauh! prod. 40. f. 1. Flores rosei. (v. s.)
15. A. CEBENNENSIS (DC. syst. 2. p. 234.) foliis omnibus petiolatis angulato-ovatis acuminatis grossè dentatis pube minimâ subvelutinis, pedicellis siliquisque patulis. (2) in locis asperis subumbrosis montium Cévennorum et Aubrac. — Deless! ic. sel. 2. t. 26. Hesperis inodora var. Lin! sp. 927. (excl. syn.) Gou. fl. monsp. 167. Fl. fr. 5. p. 589. Flores pallidè violacei. (v. v. DC.)
- Sect. II. LOMASPORA. DC. syst. 2. p. 234.
- Semina marginata seu alà membranacea late cincta.
16. A. TURITA (Lin. sp. 930.) foliis amplexicaulibus acuminatis subdentatis pubescentibus, pedicellis calycis longitudine, siliquis secundis decurvis. (2) in sepibus et dumetis montosis Gall. ferè tot. — Clus. hist. 2. p. 126. f. 2. — Fl. fr. 4. p. 675. Flores albido-subochroleuci. (v. v.)
17. A. PUMILA (Jacq. fl. austr. t. 281.) foliis scabris subintegris, radicalibus obovatis, caulinis sessilibus ovatis oblongis, racemo nutante, pedicellis calyce duplo longioribus, siliquis erectis pedicello triplo longioribus. ♀ in asperis lapidosis rupestribusve Alpium editiorum Delphin. et Gallopr. — A. scabra Fl. fr. 4. p. 677. Flores albi. Folia nunc ferè glabra, nunc pilis tripartitis subsimplicibusve scabra. (v. v. DC.)
18. A. BELLIDIFOLIA (Jacq. fl. austr. t. 280.) foliis glabris subintegris, radicalibus obovatis, caulinis sessilibus ovatis, racemo erecto, pedicellis calyce triplo longioribus, siliquis pedicello quadruplo longioribus. ♀ in graminosis lapidosis Alpium et Pyrenæorum oriental. — Lin. mant. 94. Fl. fr. 4. p. 676. — Clus. hist. 2. p. 129. f. 2. — Fl. albi. (v. v.)
19. A. CÆRULEA (Jacq. coll. 2. p. 56.) foliis glabris subintegris, radicalibus oblongo-bovatis, caulinis paucis oblongis, racemo nutante, pedicellis calycis





longitudine, siliqnis erectis. ♀ in asperis et pascuis editoribus Alpium Galloprov. superioris et Delphinatūs. — Fl. fr. 4. p. 678. — Turritis cærulea All. ped. n. 981. t. 40. f. 2. Tota glabra. Flores ex albo subcærulei. (v. v. DC.)

VII. CARDAMINE. DC. syst. 2. p. 245. — Cardamines sp. L.

Calyx basi æqualis; pet. unguiculata, limbo integro; siliquæ sessiles lineares compressæ, valvis planis enerviis dissepimento incrassato subangustioribus sæpiùs elasticè dehiscentibus, stylo brevi aut subnullo; semina ovata immarginata 1-serialia, funiculis tenuibus. — Flores albi, rariùs sublilacini.

§. 1. *Foliis ferè omnibus indivisis.*

1. C. ASARIFOLIA (Lin. sp. 913.) foliis glabris petiolatis cordato-orbiculatis subsinuato-dentatis, caule erecto, siliquis erectis pedicello duplò longioribus. ♀ in rivulis humidis montanis Alpium Galloprov. suprà vallem Barcino-nensem ex Barr. ic. t. 163. — Fl. fr. 4. p. 681. Radix repens. Flores albi. (v. v. sp. ex Pedemontii montibus Galloprov. conterminis.)
2. C. BELLIDIFOLIA (Lin. sp. 913.) foliis glabris crassiunculis, radicalibus petiolatis ovatis integris, caulinis paucis integris aut subbilobis, siliquis erectis, stigmate subsessili. ♀ in fissuris rupium humidis Alpium edit. et Pyrenæorum. — All. ped. n. 949. t. 18. f. 3. C. alpina Willd. sp. 3. p. 481. Fl. fr. 4. p. 680. Variat in montibus Lapponia petiolis longioribus, in nostris limbo ferè brevioribus, et limbo integro aut trilobo. (v. v.)

§. 2. *Foliis plerisque trilobis.*

3. C. RESEDIFOLIA (Lin. sp. 913.) foliis glabris membranaceis petiolatis, radicalibus indivisis, caulinis in auriculam acutam basi utrinque productis, inferioribus trisectis, superioribus pinnatim 5-lobis, siliquis erectis stylo brevissimo apiculatis. ♀? (1) in umbrosis humidis Alpium, Cebennarum, Pyrenæorum et montium Arverniæ. — Jacq. fl. aust. supl. t. 31. Fl. fr. 4. p. 680. An fortè prioris var? (v. v.)
4. C. TRIFOLIA (Lin. sp. 913.) foliis glabriusculis trisectis, segmentis sessilibus rhombeo-subrotundis dentatis, scapo nudo, ramis infimis radiciformibus repentibus. ♀ in umbrosis sylvaticis montanis Arverniæ ex Delarb. et alibi in Galliâ ex Lam. sed vereor ne var. foliis trilobis C. amaræ pro eâ descriptam fuerit. — Fl. fr. 4. p. 682. — Lob. ic. t. 211. f. 1. (v. v. sp. ex Germaniâ et Ital.)

§. 3. *Foliis plerisque pinnatipartitis.*

5. C. AMARA (Lin. sp. 915.) foliis pinnatisectis, radicalium segmentis subrotundis, caulinorum dentato - angulatis, stylo filiformi acutiusculo, caule basi radicante. ♀ in aquosis umbrosis et ad rivulos Gall. ferè totius præs. in submontanis. — Fl. fr. 4. p. 683. Engl. bot. t. 1000. Variat foliis trisectis (an C. trifolia Delarb?) et subvillosis (C. umbrosa Lejeun. sp. 2. p. 63.) (v. v.)
6. C. PRATENSIS (Lin. sp. 913.) foliis piunatisectis, segmentis radicalium subrotundis, caulinorum linearibus lanceolatis integris, stylo brevissimo vix siliquâ tenuiore, stigmate capitato. ♀ in pratis humidiusculis Galliæ totius frequens. — Fl. fr. 4. p. 684. — Lob. ic. t. 210. f. 1. et fors. f. 2? Flores lilacini rariùs albi. (v. v.)
7. C. HIRSUTA (Lin! sp. 915.) foliis pinnatisectis, radicalium segmentis subrotundis petiolatis, superiorum oblongis subsessilibus, petalis oblongis, siliquis erectis. (1) in sylvaticis umbrosis asperis sepibus Galliæ totius. — Fl. fr. 4. p. 684. — Barr. ic. t. 455. Variat foliis subhirsutis et glabriusculis. Hujus cl. Saint-Hilaire observ. monstrum calycibus 3 flores tetrandros gerentibus. (v. v.)
8. C. SYLVATICA (Link. in Hoffm. blatt. 1. p. 59.) foliis pinnatisectis, seg-

mentis irregulariter sinuato-dentatis mucronatis, petalis oblongis, siliquis patentibus latitudine stylum æquantibus glabris, rachi hirsuta. (1) in sylvaticis Galliae ferè totius sed cum priore, forsitan non immerito, sèpè confusa. — *C. impatiens* fl. dan. t. 735. (v. s.)

9. *C. UMBROSA* (Andrz. in DC. syst. 2. p. 260.) foliis pinnatisectis, segmentis integris mucronatis, petalis oblongis, siliquis subpatulis stylum crassum latitudine duplò superantibus rachique glaberrimis. (1) in Cebennorum montium sylvaticis et forsitan ubique cum à prioribus confusa. (v. v.)

10. *C. PARVIFLORA* (Lin. sp. 919.) foliis pinnatipartitis, lobis sessilibus oblongis linearibusve integris, infimis a caule remotis, petalis oblongo-linearibus, pedicellis subpatulis, siliquis erectis. (1) in herbosis humidis Galloprov., Occitaniæ, et prov. occident. — Fl. fr. 4. p. 685. — Gmel. fl. sib. 3. t. 64. *C. hirsutæ* affinis sed gracilior glabra, etc. (v. v.)

11. *C. IMPATIENS* (Lin. sp. 914.) foliis pinnatisectis, segmentis ovali-oblongis subdentatis, infimis cauli approximatis acutis stipulæformibus. (1) in umbrosis sylvaticis montosis Gall. ferè totius. — J. Bauh. hist. 2. p. 886. f. 1. Fl. fr. 4. p. 685. Variat petalis nullis aut parvis oblongis, foliis glabris aut subciliatis. (v. v.)

12. *C. LATIFOLIA* (Vahl. symb. 2. p. 77.) foliis pinnatisectis glabris, segmentis 3-7 suborbiculatis dentato-angulatis, siliquis erectis pedicello paulò longioribus stylo acuminatis. $\frac{1}{2}$ secùs rivulos et in humidis umbrosis Pyrenæorum oriental. et central. — Herm. parad. p. 203. t. 69. — Fl. fr. 4. p. 683. Flores purpurascentes magn. *C. pratensis*. (v. v. DC.)

13. *C. THALICTROIDES* (All! ped. n. 951. t. 57. f. 1.) foliis petiolatis glabris, superioribus pinnatisectis, segmentis 3-5 petiolulatis ovatis trilobatis, caule debili, siliquis patulis. (2) in sylvaticis asperis subhumidis Alpium Delphiniatūs. — Fl. fr. 4. p. 681. *C. Plumieri* Vill. dauph. 3. t. 38. Flores albi cum nngue subflavescente, nec flavi ut incaute dixit All. (v. v. DC.)

VIII. PTERONEURUM. DC. syst. 2. p. 269.

Calyx basi æqualis; pet. unguiculata integra; siliqua sessilis lanceolaris, valvis planis septo angustioribus enerviis à basi elasticè dissiliens, placentis extùs alatis nervo acuto secùs stylum ideò ancipitem producto; funiculi umbilicales alato-dilatati.

1. *P. GRÆCUM* (DC. l. c.) foliorum segmentis petiolulatis suborbiculatis dentato-lobatis subequalibus. (1) in umbrosis humidis Corsicæ teste Boccone Sic. p. 84. t. 44. f. N. et t. 45. f. 2. mus. p. 171. t. 116. — *Cardamine græca* Lin! sp. 915. Fl. fr. 4. p. 683. Fl. albi magn. Cardamines amaræ. (v. s. sp. ex Italia.)

IX. DENTARIA. Tourn. inst. t. III. L. gen. n. 811.

Calyx basi æqualis erectus; pet. unguiculata limbo obovato aut obcordato; siliqua sessilis lanceolata apice attenuata compressa, valvis planis enerviis septo angustioribus elasticè sèpè revolutis, stylo filiformi, stigmate subsimplici; funiculi umbilicales alato-dilatati; semina ovata immarginata 1-serialia. — Trunci radicales carnosí horizontales dentati. Folia petiolata secta.

1. *D. DIGITATA* (Lam. dict. 2. p. 268.) foliis caulinis plurimis alternis petiolatis palmatim 5-sectis, segmentis oblongo-lanceolatis acuminatis grossè serratis. $\frac{1}{2}$ in sylvaticis umbrosis montanis Gall. ferè totius. — Clus. hist. 2. p. 122. f. 1. 2. Fl. fr. 4. p. 686. — *D. pentaphyllos* β et γ Lin! sp. 912. Flor. albi aut subpurpurascentes. (v. v.)

2. *D. PINNATA* (Lam. ill. t. 562 f. 1.) foliis caulinis alternis pinnatisectis, segmentis oblongis acuminatis serrato-dentatis. $\frac{1}{2}$ in umbrosis sylvaticis



+ 1000

montanis Gall. ferè tot. — Clus. hist. 2. p. 123. ic. Fl. fr. 4. p. 687. D. pentaphyllos & Lin. sp. 912. flores prioris. (v. v.)

3. D. **BULBIFERA** (Lin. sp. 912.) foliis caulinis alternis pinnatisectis, summis indivisis, plerisque in axillis bulbilliferis 2/ ad radices montium, in locis humentibus umbrosis in Arverniâ, Alsatiâ, Delphinatû, circa Parisios, Abbativillam, etc. — Fl. fr. 4. p. 687. Clus. hist. 2. p. 121. f. 1. (v. s.)

Trib. II. ALYSSINEÆ seu Pleurorhizeæ latiseptæ. *DC. syst. 2. p. 280.*

Silicula bi- (rariùs uni-) locularis, bivalvis, ovata aut oblonga, compressa aut turgida, valvis planis aut concavis non carinatis, septo ovato aut oblongo in majore fructus diametro. Semina ovata aut compressa. Cotyledones planæ accumbentes. (o =)

X. LUNARIA. L. gen. n. 809. DC. syst. 2. p. 280.

Calyx clausus basi bisaccatus; petala unguiculata, limbo obovato; stam. libera edentula; silicula pedicellata elliptica aut oblonga, placantis nerviformibus marginata, plana, bilocul., septo membranaceo persistente, valvis planis enerviis, funiculis longis septo adnatis, stylo filiformi; semina distantia marginata.

1. L. **REDIVIVA** (Lin. sp. 911) siliquis lanceolatis utrinquè attenuatis. 2/ in sylvis montanis Alpium, Jurassi, Vogesorum, Pyrenæorum, etc. — Fl. fr. 4. p. 688. — Lob. ic. t. 278. f. 1. Flores purpurascentes odori. (v. v.)

2. L. **alpina** (DC.) foliis superioribus minus cordatis, siliculis angustioribus. — L. alpina Berg. phyt. 3. t. 115. In Pyrenæis et Vogesis. An spec. prop? (v. v.)

2. L. **BIENNIS** (Mœnch. meth. 126.) siliculis ellipticis utrinquè obtusis. ② in sylvis montanis Alsatiæ, et Galloprovinciæ ex Gerard. In hortis sæpè culta. — Lob. ic. t. 322. f. 2. L. annua Lin. sp. 911. Fl. fr. 4. p. 688. Flores inodori violaceo-lilacini aut albi. (v. v. c.)

XI. FARSETIA. Desv. journ. bot. 3. p. 173. DC. syst. 2. p. 286.

Calyx erectus basi bisaccatus; pet. unguiculata, limbo integriusculo; stam. minora dente aucta; silicula stylo brevi apiculata, elliptica, sessilis, compresso-plana, septo membranaceo elliptico, valvulis planis; semina horizontalia compressa suborbiculata marginata.

1. F. **CLYPEATA** (Brown. h. Kew. 4. p. 96.) caulis herbaceis erectis, foliis oblongis repandis, siliculis pube brevi velutinis, stigmate capitato. ② in collibus saxosis montanisque propè S.-Amand in ditione dictâ Cher ex cl. Gay, circa Monspelium ex Gonan, et Nîcam ex All., sed mihi dubia civis. — Lob. ic. t. 323. f. 1. Alyssum clypeatum Lin. sp. 909. Fl. fr. 4. p. 696. Flores flavi. (v. s. sp. ex Oriente.)

XII. BERTEROA. DC. syst. 2. p. 286.

Calyx erectus basi æqualis; pet. unguiculata, limbo bilobo; stam. libera, 2 minora basi intùs dentata; silicula bilocularis elliptica, valvis convexo, planis membranaceis, septo elliptico, stylo persistente; semina ovalia, plana submarginata.

1. B. **INCANA** (DC. l. c.) siliculis pubescentibus subventricosis. ② in ruderatis arenosis apries incultis in Alsatiâ et Galloprovinciâ. — Lob. ic. 216. f. 2.

Alyssum incanum Lin. sp. 978. Fl. fr. 4. p. 694. Herba erecta incana, fol. oblongo-lin., flor. albis. (v. v. DC.)

XIII. VESICARIA. *Lam. ill. t. 559. DC. syst. 2. p. 295.*

Calyx clausus; pet. unguiculata limbo integriuscule; stam. libera; silicula globosa inflata immarginata dehiscens stylo apiculata, valvis membranaceis convexissimis, septo membranaceo; semina 4-6 in quoque loculo.

1. *V. UTRICULATA* (Lam. ill. t. 559. f. 1.) calyce bisaccato, foliis oblongis integerimis glabris, inferioribus ciliatis subspathulatis. ♂ in rupibus calcareis Delphinatū et in Burgundiā propè Semur ex Dur. — Fl. fr. 4. p. 696. — Barr. ic. t. 883. *Alyssum utriculatum* Lin. mant. 265. Flor. flavi. Stam. edentula. (v. v. sp. in Vallesiā. D.)

XIV. ALYSSUM. *DC. syst. 2. p. 301.* — *Alyssi sp. L.*

Calyx æqualis; pet. unguiculata limbo integriuscule; stam. filamenta omnia aut nonnulla dentata; silicula orbiculata ovalisve stylo tenui apiculata, compressa, valvis planis aut centro convexis, loculis 1-2-spermis, septo tenuissimo; semina ovalia compressa.

Sect. I. ADYSETON. *DC. l. c.*

Flores flavi; stamina dentata; semina marginata.

1. *A. CORSICUM* (Duby MSS.) caulis basi suffruticosis glabris ramosissimis, ramis sterilibus foliisque inferioribus spathulato-ovatis utrinquè argenteis, siliculis orbiculatis compressis glaberrimis lucidis, seminibus subimmarginatis. ♂ in Corsicā circa Bastia. (v. s.)
2. *A. ALPESTRE* (Lin. mant. 92.) caulis basi suffruticosis diffusis canescensibus, foliis obovatis incanis, racemis simplicibus, siliculis obovato-oblongis canescensibus, valvis planis. ♂ ♀ in scopulis apricis montanis Alpium Gallo provinciæ, Delphinatus, in Lotharingiā ex Will. et circa Senlis ex Thuil. — Ger. Galloprov. 352. t. 13. f. 2. Fl. fr. 4. p. 693. (v. v.)
3. *A. MONTANUM* (Lin. sp. 907.) canibus subherbaceis diffusis pubescentibus, foliis subincanis, infer. obovatis, super. oblongis, racemis simplicibus, siliculis orbiculatis subemarginatis canescensibus. ♀ in collibus apricis montibusque demissioribus calcareis Gall. ferè tot. — Fl. fr. 4. p. 694. — Lob. ic. t. 220. f. 1. (v. v.)
f. arenarium, foliis rotundioribus. — *A. arenarium* Lois. Fl. gall. 401. not. 96. (v. v.)
4. *A. DIFFUSUM* (Tenor. app. h. neap. 1815. p. 58.) caulis subherbaceis diffusis canescensibus, foliis incanis, infimis subobovatis, cæteris linearis-lanceolatis utrinquè attenuatis, racemis simplicibus, siliculis ovatis subemarginatis stylo subæqualibus. ♀ in summis Pyrenæis oriental. monte dicto Cambres d'Aze. — *A. montanum* var. Benth. cat. 59. (v. v. DC.)
5. *A. CAMPESTRE* (Lin. sp. 909.) caulis herbaceis diffusis, foliis lanceolatis sublinearibusve hirsutis, siliculis orbiculatis tuberculato-hirsutis longè racemosis stylo sextuplo longioribus. (1) in campis arenosis apricis Galliæ ferè totius, præsertim australis. — Fl. fr. 4. p. 694. — Barr. ic. t. 912. f. 2. (v. v.)
6. *A. CALYGINUM* (Lin. sp. 908.) caulis herbaceis diffusis, foliis linearis-lanceolatis canescensibus, calycis persistentibus, siliculis orbiculatis subemarginatis pubescentibus stylo quadruplo longioribus. (1) in campis seccis apricis arenosis lapidosis Gall. ferè tot.; præsertim australis. — Fl. fr. 4. p. 694. — Cam. epit. 558. f. 1. (v. v.)

Sect. II. LOBULARIA. *DC. syst. 2. p. 318.*

Flores albi; semina in loculis sèpiù solitaria; stam. edentula.





7. *A. MARITIMUM* (Lam. dict. 1. p. 98.) caulis basi suffricticosis procumbentibus, foliis linear-lanceolatis acutis subincanis, siliculis ovalibus glabris stylo brevi apiculatis. ♂ ♀ in arenosis maritimis et apricis ruderatis secus mare Mediterraneum et secus Rhodanum usque ad Arausionem. — Fl. fr. 4. p. 592. — Barr. ic. t. 844. t. 907. f. 1. et 908. f. 1. — *A. minimum*, *A. halimifolium* et *Clypeola maritima* Lin. (v. v.)
8. *A. SPINOSUM* (L. sp. 907.) caule fruticoso, ramis pedunculisque senescentibus spinosis, foliis oblongo-linearibus argenteis, siliculis orbiculatis glabris stylo brevi apiculatis. ♂ in rupestribus calcareis apricis regionis olearum (et circa Epernon et Senlis. ex Mér.?). — Fl. fr. 4. p. 692. — Barr. ic. t. 808. (v. v.)
9. *A. MACROCARPUM* (DC. syst. 2. p. 321.) caule fruticoso ramoso subspinescente, foliis oblongis obtusis argenteis, siliculis obovato-orbiculatis subemarginatis glabris stylo apiculatis 8-ovulatis. ♂ in rupibus calcareis montium regionem olearum circumdantium, nempe in Cévennes propè Roquelaure et Mende, in Pyrenæis orient. propè Villefranche. — Deless. ic. sel. 2. t. 41. (v. v. DC.)
10. *A. PYRENAICUM* (Lapeyr. abr. 371. supl. 91.) caulis fruticosis ramosis inermibus, foliis obovatis basi attenuatis cano-tomentosis, siliculis ellipticis villosulis stylo longè acuminatis. ♂ in rupibus Pyrenæorum orientalium ad montem Conat legit Xatard. — DC. syst. 2. p. 322. *A. Halimifolium* fl. Fl. fr. 5. p. 594. (v. s.)

XV. CLYPEOLA. Gærtn. fruct. 2. f. 141. f. 6. DC. syst. 2. p. 326.

Calyx basi æqualis; pet. integra; stam. filamenta dentata; silicula orbicularis plana subemarginata indehiscens 1-loc.-1-sperma; stigma sessile; semen lateraliter ope funiculi horizontalis adfixum, centrale, compressum.

1. *C. JONTHLASPI* (Lin. sp. 910.) siliculis margine ciliatis, caulis diffusis aut adscendentibus. ♀ in sabulosis apricis, muris, sterilibus calcareis aut gypsaceis prov. oleiferarum, et in Arvernâ et Delph. infer. — Fl. fr. 4. p. 630. — Lob. ic. t. 215. f. 1. Flores flavi minimi. (v. v.)

XVI. PETROCALLIS. Brown. DC. syst. 2. p. 330.

Cal. æqualis; pet. integra; stam. edentula; stylus brevissimus; silicula ovalis, septo elliptico membranaceo, valvis planiusculis medio nervigeris, loculis 2-spermis; funiculi umbilicales septo adnati? sem. immarginata.

1. *P. PYRENAICA* (Brown. h. Kew. 4. p. 93.) ♀ in rupibus apricis inter saxa et lapides Pyrenæorum, Alpium Galloprov. et Delphin. — *Draba Pyrenaica* Lin. sp. 896. Fl. fr. 4. p. 698. All. ped. t. 8. f. 1. Flores rosei. Folia cuneata apice 3-5-fida. (v. v.)

XVII. DRABA. DC. syst. 2. p. 331. — Drabæ sp. L.

Cal. basi æqualis suberectus; pet. integra; stam. edentula; silicula ovalis aut oblonga, integra valvis planiusculis, septo tenui valvarum latitudine; sem. 20 biseriata immarginata.

Sect. I. AIZOPSIS. DC. l. c.

Stylus filiformis; pet. apice retusa; silicula apice attenuata. — Folia rigida nervo medio carinata, pilis simplicibus ciliata; flores flavi. Herba ♀.

1. *D. AIZOIDES* (Lin. mant. 91.) scapis nudis glabris, foliis rigidis lanceolato-linearibus carinatis ciliatis, staminibus petala subæquantibus, stylo latitudinem siliculæ æquante. ♀ in apricis rupestribus glareosis Alpium, Jurassi, montium Arvernæ, Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 697. — Lob. ic. 381. f. 1. (v. v.)

- β. minor* (DC.) foliis brevissimis, siliculâ constanter glabrâ. — D. ciliaris.
Fl. fr. 4. p. 697. (v. v.)
γ. diffusa (DC.) caulibus elongatis diffusis. — Ger. Gallopr. 344. t. 13.
f. 1. — D. ciliaris Lin. mant. 91. (v. s.)

Sect. II. LEUCODRABA. DC. l. c.

Stylus brevissimus; pet. obtusa aut subemarginata; silienla ovali-oblonga. — Folia mollinacula subradicalia; pili ramosi. Flores albi; scapi subnudi. Herbæ 2.

2. D. NIVALIS (Willd. sp. 3. p. 427.) scapis nudis monophyllisve glabris, foliis oblongo-linearibus ciliatis subpilosis, siliculis elliptico-oblongis pedicellisque glaberrimis. 2 in rupestribus editioribus Alpium Delphinatūs, ad montem Galibier, etc. — DC. syst. 2. p. 344. Fl. fr. p. 699. excl. var. Pyren. — Fl. dan. t. 142. (v. v. DC.)
3. D. TOMENTOSA (Wahlenb. helv. 123. n. 672. t. 3.) scapo 1-2-phyllo velutino, foliis ovali-oblongis pube stellatâ brevi tomentosis, pedicellis pubescensibus, siliculis ovalibus ciliatis. 2 in rupibus Pyrenæorum centralium ad vallis d'Aure montem Penne Blanque legit cl. Marchand. — DC. syst. 2. p. 346. (v. s.)
4. D. STELLATA (Jacq. obs. n. 54. t. 4. f. 3.) scapis 1-phyllis pubescensibus, foliis ovali-oblongis pube stellatâ brevi tomentosis, pedicellis puberulis, siliculis oblongis. 3 in fissuris rupium et scopolis Pyrenæorum et Alpium. — Fl. fr. 4. p. 699. Deless. ic. sel. 2. t. 46. f. B. D. hirta Vill. dauph. 3. p. 282. (v. v.)
β. hebecarpa (DC.) siliculis undique velutino-pubescentibus. DC. syst. 2. p. 346. Hab. cum var. α. (v. v.)

5. D. LÆVIPES (DC. syst. 2. p. 346.) scapis nudis 1-phyllis pubescentibus, foliis ovatis pube stellatâ brevi tomentosis, siliculis elongato-linearibus pedicellisque glaberrimis. 2 in rupibus Pyrenæorum centralium editiorum ad Port d'Oo et montem Maladetta. — Deless. ic. sel. 2. t. 46. f. A. (v. v.)

Sect. III. HOLARGES. DC. syst. 2. p. 348.

Silienla elongatae stylo distincto brevi apiculatae. — Herbæ 1 aut 2; caules foliosi sæpius ramosi; flores albi.

6. D. CONTORTA (Ehr. beitr. 7. p. 155.) caule folioso ramoso pube stellatâ velutino, foliis ovatis dentatis, siliculis oblongis glabris subcontortis. 1 in rupibus calcareis montanis Pyrenæorum. — DC. syst. 2. p. 348. D. incana var. β. Lin. sp. 897. Fl. fr. 4. p. 700. Engl. bot. t. 388. (v. v.)

Sect. IV. DRABELLA. DC. syst. 2. p. 351.

Siliculae elliptico-oblongæ, stigmate sessili. — Herbæ 1; caules foliosi ramosi; flores minimi.

7. D. NEMORALIS (Ehr. beitr. 7. p. 154. non Delarb.) caule ramoso folioso pubescente, foliis ovatis dentatis pubescentibus, siliculis elliptico-oblongis 32-36-spermis pube minimâ velutinis. 1 in Pyrenæis ad montem Canigon legit Thomas. — D. nemorosa Houtt. pfl. 4. t. 60. f. 1. non All. Petala flava. (v. s.)
8. D. MURALIS (Lin. sp. ed. 1. p. 643.) caule ramoso folioso pubescente, foliis ovatis dentatis subcordato-amplexicaulibus subhirsutis, siliculis elliptico-oblongis glabris 12-16-spermis. 1 in umbrosis, muris, rupestribus prov., præsertim australium, circa Monspelium, etc. — Fl. fr. 4. p. 699. — J. Bauh. hist. 2. p. 939. f. 1. (v. v.)

XVIII. EROPHILA. DC. syst. 2. p. 356. — Drabæ sp. L.

Cal. æqualis laxiusculus; petala bipartita; stam. edentula; silicula ovalis aut oblonga, septo membranaceo, valvis planiusculis, stigmate sessili; semina parva immarginata in quoque loculo ∞ biseriata.

1. E. VULGARIS (DC. l. c.) siliculis ellipticis pedicellis brevioribus, scapis 5-15-floris.





(1) in maris, aggeribus, pascuis, aridis, apricis primo vere vulgaris.—Draba verna Lin. sp. 896. Fl. fr. 4. p. 698. — Lob. ic. t. 469. f. 1. flor. albi. (v. s.)

XIX. COCHLEARIA. Tourn. inst. t. 101. L. gen. 803.

Cal. patens basi æqualis, sepalis concavis; pet. limbo obovato obtuso; stam. edentula; silicula globosa ovata aut oblonga, septo tenui, valvulis ventricosis crassiusculis, loculis rariüs di-sæpius polyspermis; stylus brevissimis; semina immarginata. — Flores albi.

Sect. I. KERNERA. DC. syst. 2. p. 359.

Silicula globosa, valvis rigidioribus, stylo brevi, stigmate bilobo.

1. C. SAXATILIS (Lam. dict. 2. p. 165.) siliculis globosis lœvibus, foliis radicalibus oblongis dentatis pilosis, caulinis linearis-oblongis. ♀ in rupestribus et asperis præsertim calcareis montanis prov. præsertim australium.—Myagrum saxatile Lin. sp. 894. Fl. fr. 4. p. 718. — Cam. epit. 338. ic. (v. v.)

♂. incisa (DC.) foliis lyratis pinnatifidisque. — In Jurasso, etc. (v. s.)

2. C. AURICULATA (Lam. dict. 2. p. 165.) siliculis globosis lœvibus, foliis radicalibus oblongis dentatis pilosis, caulinis cordato-sagittatis. ♀ in rupestribus calcareis Pyrenæorum, Cévennorum, Arverniae.—Myagrum montanum Berg. phyt. 3. t. 140. Myagrum auriculatum Fl. fr. 5. p. 597. (v. v. DC.)

Sect. II. ARMORACIA. Rupp. jen. p. 87. DC. l. c.

Silicula ellipsoidea, stylo brevi filiformi, stigmate capitato ferè disciformi.

3. C. ARMORACIA (Lin. sp. 904.) siliculis ellipsoideis, foliis radicalibus oblongis crenatis, caulinis elongato-lanceolatis dentatis incisive, radice carnosâ maximâ. ♀ in humidis Delphinatûs ex Vill., Lotharingiæ ex Willem., Tolosæ ex Tournon, agri Syrtici propè la Teste ex Laterrade, forsitan Armoraciæ ex nomine, mihi nunquam obvia nisi in hortis nbi frequenter culta ob radicem culinariam. — Fl. fr. 4. p. 701. — Fuchs. hist. 660. ic. (v. v. c.)

Sect. III. COCHLEAR. DC. l. c. p. 362.

Silicula globosa ovata aut oblonga, apice non emarginata, stigmate sub sessili coronata.

4. C. GLASTIFOLIA (Lin. sp. 904.) siliculis subglobosis, foliis caulinis cordato-sagittatis amplexicaulibus acuminatis integrerrimis. (1) (2) in agris et cultis Delphinatûs propè Sisteron ex Vill., Corsicæ. — Fl. fr. 4. p. 702. — Lob. ic. t. 321. f. 2. (v. s.)

5. C. ANGLICA (Lin. sp. 903.) siliculis ovato-subglobosis venoso-reticulatis, pedicello dimidiò brevioribus, foliis radicalibus petiolatis integris, caulinis oblongis. ♀ in littoribus maritimis Armoraciæ obs. cl. Bonnemaison, Burdigalæ Laterr., ad ostium sequanæ cl. Le Prévost. — DC. syst. 2. p. 364. — Lob. ic. t. 294. f. 1. (v. s.)

6. C. OFFICINALIS (Lin. sp. 903.) siliculis ovato-globosis pedicello dimidiò brevioribus, foliis radicalibus petiolatis cordatis, caulinis ovatis dentato-angulatis. ♀ in littoribus maritimis cœniosis petrosisve Belgii gallici circa Dunkerque, Neustriæ, etc. — Fl. fr. 4. p. 700. — Lob. ic. t. 293. f. 2. (v. v.)

7. C. PYRENAICA (DC. syst. 2. p. 365.) siliculis obovatis subglobosis pedicelli longitudine, foliis radicalibus cordato-reniformibus integris, caulinis paucis ovatis dentatis. ♀ secùs rivulos in Pyrenæis centralibus editioribus ad mon tem Néouville. — Deless. ic. sel. 2. t. 48. C. officinalis Lapeyr. abr. 368. (v. v. DC.)

8. C. DANICA (Lin. sp. 903.) siliculis ellipsoideis pedicelli longitudine, foliis omnibus petiolatis subdeltoïdeis. ♀ in maritimis cœniosis petrosisve secùs Oceanum hinc indè a Pictaviâ ad Belgium.—Fl. fr. 4. p. 701.—Lob. ic. t. 615. f. 2. (v. v. DC.)

Trib. III. THLAPSIDÆ seu Pleurorhizæ angustiseptæ.
DC. prod. 1. p. 175.

Silicula bilocularis bivalvis, septo angustissimo linearis, valvis carinatis aut navicularibus. Semina ovalia compressa sèpè marginata.

XX. THLASPI. Dill. giess. p. 123. t. 6. DC. syst. 2. p. 373.

Calyx basi æqualis; pet. æqualia integra; stam. edentula; silicula de-pressa apice emarginata, septo ovali-oblongo, stylo filiformi aut brevissimo, valvis navicularibus dorso membranâ foliacea alatis; semina in quoque loculo ∞ rarius 2, ovata, immarginata. — Flores albi.

Sect. I. NOMISMA. DC. l. c.

Silicula plana suborbiculata, sinu angusto apice emarginata, stylo subnullo, valvis compressissimis dorso per totam longitudinem alatis; semina in quoque loculo 6-8, striis curvis periphæricis insculpta.

1. T. ARVENSE (Lin. sp. 901.) foliis oblongis dentatis, caulinis erectis, siliculis obovato-orbiculatis pedicello brevioribus. ♀ in arvis, agris, cultis et arenosis Galliae totius. — Fl. fr. 4. p. 709. Lam. ill. t. 557. f. 1. (v. v.)

Sect. II. PTEROTROPIS. DC. l. c. p. 377.

Silicula subobovata emarginata aut truncata; valvis dorso in alam expansis; semina non striata.

2. T. ALLIACEUM (Lin. sp. 901.) foliis oblongis obtusis subdentatis, infer. petiolatis, super. antriculis acutis sagittato amplexicaulibus, siliculis subobovatis ventricosis, stigmate subsessili. (1) in agris et arvis agri Lugdunensis ex Latour, Burgundiae ex Dur., Lotharingiae ex Buch., Armoraciæ ex Aubri. — Fl. fr. 4. p. 710. — J. Bauh. hist. 2. p. 923. f. 3. (v. s.)

3. T. PERFOLIATUM (Lin. sp. 902.) foliis subdentatis, radicalibus petiolatis, caulinis cordato-amplexicaulibus, caule ramoso, petalis calyci æqualibus, siliculis obcordatis 8-spermis, stigmate subsessili. (2) in agris et arvis apricis prov. præsertim calcareorum. — Fl. fr. 4. p. 710. — Barr. ic. t. 915. (v. v.)

4. T. MONTANUM (Lin. sp. 902.) foliis subcarnosulis integris, radicalibus obovatis petiolatis, caulinis oblongis sagittato-amplexicaulibus, petalis calyce majoribus, siliculis obcordatis 4-spermis, stylo filiformi. ♀ in montanis apricis Pyrenæorum, Cebennarum, Jurassi, Alpium. — Fl. fr. 4. p. 711. — J. Bauh. hist. 2. p. 928. ic. (v. v.)

5. T. ALPESTRE (Lin. sp. 903.) foliis subintegris, radicalibus ovatis petiolatis, caulinis oblongis amplexicaulibus, petalis calyci subæqualibus, siliculis obcordatis 8-12-spermis, stylo filiformi. ♀ in agris et pratis montanis Pyrenæorum, Cebennarum, Alpium. — Fl. fr. 4. p. 711. T. pumilum. 111. Clus. hist. 2. p. 131. ic. (v. v.)


β. arenarium, scapo subnudo, pedicellis inferioribus elongatis. In sylvis sabulosis agri Syrtici reperiit Des Moulins. (v. s.)

6. T. HETEROPHYLLUM (DC. fl. fr. 4. p. 712.) foliis radicalibus petiolatis patulis integris dentatis et lyratis, caulinis erectis cordato-sagittatis, petalis calyci subæqualibus. ♀ in Pyrenæis forsitan Hispanicis legit. cl. Clemente. Lepidium heterophyllum Benth? cat. 95? qui plantæ suæ tribuit siliculas ellipticas alatas vix emarginatas glabras et stylum exsertum filiformem. (v. s. olim in herb. Clarion DC.)

XXI. HUTCHINSIA. Brown. Kew. v. 4. p. 82. DC. syst. 2. p. 384.

Calyx erectus æqualis; pet. æqualia integra; stam. edentula; silicula oblonga aut elliptica, apice acuta aut truncata, depresso, utrinquè in-

~~or~~ Bartosis x



tegra; valvis navicularibus apteris, septo oblongo, loculis 2-4-rarissimè 6-spermis; semina è quaque placentâ alterna pendula.

Sect. I. IBERIDELLA. DC. l. c.

Stylus filiformis. — Folia integra aut subdentata.

1. *H. ROTUNDIFOLIA* (Brown. h. Kew. 4. p. 82.) foliis subcarnosis integerrimis, infimis petiolatis obovatis, caulinis ovato-oblongis subamplexicaulibus, staminibus petalis et stylo siliculâ dimidiò brevioribus. ♀ inter lapides et in rupium fissuris prope nives in Alpibus Galloprov. et Delph. — *Iberis rotundifolia* Lin. sp. 905. *Lepidum rotundifolium* All. ped. t. 55. f. 2. Fl. fr. 4-p. 706. *Flores rosei.* (v. v.)
2. *H. BREVISTYLA* (DC. syst. 2. p. 387.) foliis subcarnosis petiolatis obovatis subdentatis, siliculâ obovato-cuneatâ truncato-emarginatâ, stylo brevissimo. ♀ in Corsica montibus Bastilica reperierunt cl. Soleiro et Ph. Thomas. — *H. pygmæa* Viv. Cors. App. 3. Fl. parvi albi. (v. s.)

Sect. II. NASTURTIOÏDES. DC. l. c.

Stylus brevissimus aut nullus. — Folia pinnato-lobata. Flores albi.

3. *HP ALPINA* (Brown. l. c.) foliis pinnatipartitis glabris, petalis calyce deciduo duplò longioribus, siliculis utrinquè acutis, stylo brevissimo exerto. ♀ in rupibus humidiusculis et scopulis Alpium et Pyrenæorum editiorum. — *Lepidium Alpinum* Lin. amen. 4. p. 321. Fl. fr. 4. p. 705. — *Clus. hist.* 2. p. 128. f. 1. Verum *Lepidium* esse affirmat cl. Gay in ann. sc. nat. avr. 1826. (v. v.)
4. *H. PETRÆA* (Brown. l. c.) foliis pinnatipartitis glabris, petalis calyce vix longioribus, siliculis utrinquè obtusis 4-spermis, stigmate sessili. (I) in petrosis, lapidosis, arenosis submontanis apricis Gall. ferè totius. — *Lepidium petræum* Lin. sp. 899. Fl. fr. 4. p. 706. Boiss. fl. eur. t. 440. f. 1. (v. v.)
5. *HP PROCUMBENS* (Desv. journ. 3. p. 163.) foliis sinuato-pinnatifidis aut sub-integris, petalis vix calyce majoribus, siliculis utrinquè obtusis 10-12-spermis, stigmate sessili. (I) in ruderatis maritimis secùs vias et semitas ad oras salinarum in prov. præsertim australibus. — *Lepidium procumbens* Lin. sp. 898. Fl. fr. 4. p. 706. — Magn. bot. Monsp. 184. ic. Verum *Lepidium* contendit cl. Gay l. c. (v. v.)

β. foliis subintegris. (I) Massiliæ. (v. s.)

XXII. TEESDALIA. Brown. Kew. ed. 2. v. 4. p. 83. DC. syst. 2. p. 391. — *Guepinia*. *Bast.*

Calyx deciduus sepalis basi tamen subcoalitis; pet. integra æqualia aut inæqualia; stam. intùs basi squamulâ aucta; silicula depressa ovalis apice emarginata, valvis navicularibus in carinâ subalatis, septo oblongo angusto, stylo nullo; semina in quoque loculo 2 orbicularia. — Flores albi minimi. Herbæ (I), foliis radicalibus rosulatis pinnati-lobatis.

1. *T. IBERIS* (DC. syst. 2. p. 392.) petalis inæqualibus, exterioribus majoribus. (I) in arenosis, sylvaticis, nudis et sterilibus Galliae ferè totius. — *Iberis nudicaulis* Lin. sp. 907. *Guepinia iberis* Fl. fr. 5. p. 596. — Lob. ic. t. 221. f. 2. (v. v.)
2. *T. LEPIDIUM* (DC. l. c.) petalis æqualibus. (I) in arenosis sterilibus apricis subsylvaticis Corsicæ, Occitanie, Delphinatus australis et verosim. Gallo-provinciæ. — *Lepidium nudicaule* Lin. sp. 898. *Guepinia lepidium* Fl. fr. 5. p. 596. — Magn. bot. Monsp. 186. ic. (v. v.)

XXIII. IBERIS. L. gen. n. 804.

Calyx basi æqualis; pet. 4 inæqualia, 2 exteriora majora; stam. eden-

tula; silicula valvis carinatis navicularibus depressissima, basi ovata, apice valvis in lobulos productis emarginata, stylo persistente filiformi, septo angustissimo interdum bipartibili, loculis 1-spermis; semina ovata pendula. — Flores albi aut subpurpurascentes.

Sect. I. IBERIDIUM. DC. prod. I. p. 179.

Radicula descendens; semen immarginatum; septum simplex.

* *Pedicellis fructiferis corymbosis.*

1. I. SPATHULATA (Berg. phyt. ic.) herbacea glabra, foliis spathulatis integris subcarnosis, siliculis corymbosis sinu angusto acuto emarginatis. (1) in Pyrenæorum lapidosis calcareis schistosive aquâ nivali irrigatis. — Fl. fr. 4. p. 716. Ib. carnosa Willd. sp. 3. p. 455. Flores purpurascentes. (v. v. DC.)
2. I. NANA (All. auct. 15. t. 2. f. 1.) herbacea glabra, foliis subrotundo-spathulatis integris subcarnosis, siliculis corymbosis emarginatis sinu latiusculo obtuso. (1)(2) in rupibus apricis Alpium austral. edit., in montibus Auroux, Ventoux, et Alpib. Sedenensibus Galloprovinciæ. — Fl. fr. 4. p. 717. Ib. aurosica Vill. Flores purpurascentes. (v. v. DC.)
3. I. CILIATA (All. ped. auct. 15. non Willd.) herbacea glabriuscula, foliis linearibus integris basi ciliatis, siliculis corymbosis emarginatis lobulis obtusis stylo subæqualibus. (2) in rupestribus apricis Galloprovinciæ circè Brignoles, et propè Niceam. — Fl. fr. 5. p. 597. Flores albi aut subpurpurasc. (v. v.)
4. I. LINIFOLIA (Lin. sp. 905.) herbacea glabra, foliis linearibus integerrimis, radicalibus subdentatis, siliculis corymbosis bidentatis. (1)(2) in apricis cultis Galloprovinciæ, Niceæ, Occitanie infer. et Pyren. orient. ex cl. Benth.—Fl. fr. 4. p. 716. — Garid. aix. 459. t. 105. Flores purpurei conferti. (v. v. D.)
5. I. UMBELLATA (Lin. sp. 906.) herbacea glabra, foliis lanceolatis acuminatis, inferioribus serratis, superioribus integerrimis, siliculis umbellatis acutissimè bilobis. (1) Niceæ spontanea dicitur; in hortis culta.—Fl. fr. 4. p. 716.—Lob. ic. t. 216. f. 1. Flores sæpius purpurascentes (v. v. sp. in Etruria DC.)


* * *Pedicellis fructiferis racemosis, caulinis herbaceis.*

6. I. PINNATA (Gouan. hort. Monsp. 319.) herbacea glabra, foliis pinnatifidis, racemis corymbosis post anthesin parùm elongatis. (1) inter segetes prov. australium. — Fl. fr. 4. p. 715. — Lob. ic. t. 217. f. 2. Flores albi. (v. v.)
7. I. crenata (Lam. dict. 3. p. 213.) foliis inciso-crenatis. (1) cum var. α
Ib. panduræformis Pourr. (v. v.)
8. I. INTERMEDIA (Guers. bull. philom. n. 82. t. 21.) herbacea, foliis lanceolatis glabris obtusis integris ant radicalibus subdentatis, floribus mox racemosis, siliculis ovatis truncatis seu latissimè emarginatis. (2) in rupibus calcareis secùs Sequanam inter Rothomagum et Duclair. — Fl. fr. 4. p. 715. Flor. albi. (v. s.)
9. I. AMARA (Lin. sp. 906.) herbacea, foliis lanceolatis acutis subdentatis, floribus corymbosis mox racemosis, siliculis orbiculatis angustè emarginatis. (1) in arvis agris et segetibus Gall. ferè totius. — Fl. fr. 4. p. 714. — Riv. tetr. irr. t. 112. Fl. alb. (v. v.)

* * * *Pedicellis fructiferis racemosis, caulinis frutescentibus.*

10. I. GARREXIANA (All. Ped. n. 920. t. 40. f. 3. et 54. f. 2.) frutescens, foliis oblongis basi attenuatis obtusis integerrimis glabris, floribus corymbosis. 3 in saxosis apricis Pyrenæorum orientalium et centralium. — Fl. fr. 4. p. 714. Flor. albi. (v. v.)
11. I. SAXATILIS (Lin. amœn. 4. p. 321.) frutescens, foliis linearibus integerrimis subcarnosis subacutis ciliatis, floribus corymbosis. 3 in saxosis apricis collinis Pyrenæorum orient., Occitanie, Galloprovinciae. — Fl. fr. 4. p. 714. — Lob. ic. t. 217. f. 1. (v. v. DC.)

Serpinen - 25 - 50% Konzentration - 10 min - 25°C



B. corifolia (DC.) foliis glabris obtusis. ♂ in monte Ventoso. Sims. bot. mag. t. 1642. (v. s. DC.)

Sect. II. IBERIDASTRUM. DC. l. c.

Radicula horizontalis; semen submarginatum; septum ferè duplex.

II. I. SEMPERFLORENS (Lin. sp. 904.) frutescens, foliis cuneatis spathulatis ve obtusis integerrimis glabris, floribus corymbosis, siliculis apice truncato-subemarginatis lobulis obsoletis. ♂ ex Siciliâ orta, in hortis sàpè culta. — Fl. fr. 4. p. 713. — Riv. tetr. irr. 1. 224. f. 2. (v. v. c.)

XXIV. BISCUTELLA. L. gen. n. 808.

Cal. sepala nunc basi æqualia nunc lateralia ad basim gibboso-calcarata; pet. æqualia integra; stam. edentula; silicula bilocularis, stylo longo persistente superata, loculis compressissimis planis orbiculatis scutæformibus lateraliter axi adnatis, à basi ad apicem ab axi separabilibus, vix aut non marginatis, 1-spermis; semina compressa; embryo inversus nempe radicula descendens. — Flores flavi.

Sect. I. JONDRABA. DC. syst. 2. p. 407.

Calyces basi bicalcarati; glandulæ tori valdè prominentes.

1. B. AURICULATA (Lin. sp. 911.) calycibus obtusè bicalcaratis, siliculis glabris in disco punctis elevatis scabris, lobulis apice in stylum coeuntibus. (I) in agris cultis Galloprovinciæ ex Ger., Delphinatus ex Vill. sed forsan cum seq. confusa. — DC. diss. t. 1. f. 2. Fl. fr. 4. p. 689. Schkuhr. handb. 2. t. 82. (v. v. c.)

2. B. HISPIDA (DC. diss. n. 3. t. 1. f. 1.) calycibus acutè bicalcaratis, siliculis glabris in disco punctis elevatis scabris, lobulis apice in stylum non coeuntibus, caule hispido. (I) in apricis montosis Galloprovinciæ. — Barr. ic. t. 230 et 1219. (v. s.)

3. B. CICORIIFOLIA (Lois. add. p. 167.) calycibus acutinsculè bicalcaratis, siliculis glabris in disco punctis elevatis scabris, lobulis in stylum non coeuntibus, caule villosa. ♀ in saxosis apricis ad radices Pyrenæorum centralium propè Bagnères de Luchon detexit Berger et in Pyren. orient. Thomas. — DC. diss. n. 4. t. 2. Folia infer. runcinata. (v. s.)

Sect. II. THLASPIDIUM. DC. l. c.

Calyces basi æquales; glandulæ tori vix prominentes.

4. B. CILIATA (DC. diss. n. 9. syst. 2. p. 410.) siliculis laevibus margine ciliatis, caule erecto elongato folioso, foliis sessilibus oblongis remotè dentatis. (I) in Corsicâ reperiit Ph. Thomas. — B. coronopifolia. DC. ic. rar. 439 non L. Fl. fr. 4. p. 690. (v. s.)

5. B. LÆVIGATA (Lin. mant. 225.) siliculis glabris laevibus, foliis subradicalibus piloso-scabris oblongis in petiolum attenuatis subdentatis integrisve, caulinis linearibus paucis integerrimis. ♀ in asperis apricis Alpium, Jurassi, Pyrenæorum, etc. — Fl. fr. 4. p. 689. ic. rar. t. 38. (v. v.)

6. B. CORONOPIFOLIA. (All. ped. n. 907.) siliculis glabris laevibus, foliis piloso-scabris plerumquè radicalibus pinnatifidis, lobis utrinquè 2-3 remotis. ♀ in apricis sterilibus collium et montium demissiorum Occitanie, Galloprov., Delphinatus australis. — DC. diss. n. 2. 2. t. 18. non Fl. fr. (v. v. DC.)

7. B. AMBIGUA (DC. diss. n. 23. t. 11. f. 1.) siliculis glabris laevibus, foliis piloso-scabris, radicalibus sinuato-dentatis basi attenuatis, caulinis paucissimis basi subcordatis semi-amplexicaulibus. ♀ in sterilibus apricis collibusque Galloprovinciæ et Occitanie. — DC. syst. 2. p. 415. Var. foliorum sinubus dentibus revolutis aut planis. (v. v.)

8. *B. SAXATILIS* (DC. fl. fr. 4. p. 690. diss. t. 10.) siliculis glabris in disco punctis elevatis scabris, foliis piloso-scabris plerumque radicalibus oblongis. $\frac{1}{2}$ in sterilibus apricis montosis provinc. ab Alpibus ad Pyrenæos.—*B. pectinifolia* Lapeyr. ex Arnolt. *B. apula* Lapeyr. non L. ex cl. Benth.
 α. Folii integris. — *B. longifolia* Vill. Dauph. 3. 305. (v. v.)
 β. Folii inciso-dentatis aut dentato-pinnatifidis. — *B. mollis* Lois. not. 168. (v. s.)
 γ. Folii subdentatis, caule humillimo. — *B. coronopifolia* Lapeyr. non L. *B. intermedia* Gou. ill. 42. (v. v.)

Trib. IV. *CAKILINEÆ* seu Pleurorhizeæ Lomentaceæ. DC. syst. 2. p. 427.

Siliqua aut silicula transversè in articulos 1-2-loculares 1-2-spermis secedens. Semina immarginata. Cotyledones planæ accumbentes, septo (dùm adsit) parallelæ.

XXV. *CAKILE*. Tourn. inst. t. 483. DC. syst. p. 185.

Calyx basi bigibbosus; pet. limbo obovato; stam. edentula; silicula biarticulata compressa, articulo superiore ensiformi aut ovato; semen in loculis solitarium, superioris erectum, inferioris pendulum. — Herbæ carnosæ floribus albis aut subpurpurascens.

1. *C. MARITIMA* (Scop. carn. n. 844.) siliculae articulo superiore ensiformi. (1) frequens in arenis maritimis secus Oceanum et mare Mediterraneum. — Fl. fr. 4. p. 718. *Bunias cakile*. Lin. sp. 936.
 α. *vulgaris* (DC.) foliis pinnatipartitis, lobis angustis distantibus. — Lob. ic. t. 223. f. 1. (v. v.)
 β. *sinuatifolia* (DC.) foliis dentato-repandis seu sinuatis. — *C. Ægyptiaca* Wild. sp. 3. p. 417. (v. s. ex Ital.)

Subordo II. *NOTORHIZEÆ* (o || .)

Cotyledones planæ incumbentes. Radicula dorsalis nempè medio dorso cotyledonum incumbens. Semina ovata non marginata.

Trib. V. *SISYMBREÆ* seu Notorrhizeæ siliquosæ. DC. syst. 2. p. 438.


Siliqua bilocularis bivalvis dehiscens valvis concavis carinatisve. Cotyledones planæ incumbentes septo contrariæ.

XXVI. *MALCOMIA*. Brown. Kew. II. v. 4. p. 121. DC. syst. 2. p. 438.

Calyx clausus; pet. limbo obovato aut leviter emarginato; stam. edentula; siliqua teres stigmate acutissimo simplici terminata. — Flores albi aut purpurascens.

1. *M. AFRICANA* (Brown. h. Kew. 4. p. 121.) caule ramoso diffuso, foliis lanceolatis subdentatis, pubescentia 2-4-partita, pedicellis calyce persistente brevioribus, siliquis scabris. (1) in agris vineis et arenosis prov. oleiferarum. — Bocc. Sic. t. 42. f. 1. *Hesperis Africana* Lin. sp. 928. Fl. fr. 4. p. 552. (v. v. DC.)
 2. *M. MARITIMA* (Brown. l. c.) caule erecto ramoso, foliis ellipticis obtusis integris basi attenuatis, pubescentia 2-4-partita, pedicellis calyce subbrevioribus, siliquis pubescentibus apice longè acuminatis. (1) in littoribus arenosis prope





- Narbonam, Massiliam (Solier) et ex Thore in ericetis Burdigalensibus. — Barr. ic. t. 1127. *Cheiranthus maritimus* Lin. sp. 924. *Hesperis maritima* Fl. fr. 4. p. 654. (v. v.)
3. *M. PARVIFLORA* (DC. syst. 2. p. 442.) caule erecto humili ramoso, foliis oblongis obtusis subintegris, pube tomentosâ stellatâ, pedicellis demum calycis longitudine, siliquis pubescentibus. (1) in arenosis maritimis Corsicæ, agri Ruscinonensis, Occitanie, Galloprov. — *Hesperis parviflora* Fl. fr. 4. p. 654. 5. p. 390. ic. rar. 1. t. 35. (v. v.)
4. *M. LITTOREA* (Brown. l. c.) caule erecto multiplici, foliis lanceolato-lineariibus subintegris tomento brevi canis, pedicellis calycis longitudine, siliquis incanis. (2) in arenosis maritimis à Galloprovinciâ ad Nannetes frequens. — Lob. ic. t. 331. f. *Cheiranthus littoreus* Lin. sp. 925. Fl. fr. 4. p. 656. (v. v.)

XXVII. HESPERIS. *L. gen. n. 817. DC. syst. 2. p. 447.*

Calyx clausus bisaccatus; pet. subintegra; stam. edentula; siliqua teretiuscula aut tetragona, stigmatibus 2 erectis conniventibus; semina oblonga subtriangularia.

1. *H. LACINIATA* (All. ped. n. 985. t. 82. f. 1.) pedicellis calyce brevioribus, petalis obovato-oblongis, foliis obovatis inciso-dentatis, caule hispido. (2) in rupibus apricis Galloprovinciæ, Delphinatûs australis, et Pyren. orient. propè Font de Comps ex cl. Benth. — Fl. fr. 4. p. 652. Flores nunc flavescentes nunc purpurascentes interdùm in iisdem plantis. (v. v. DC.)
2. *H. MATRONALIS* (Lam. dict. 3. p. 321. ill. t. 564. f. 1.) pedicellis calycis longitudine, petalis obovatis, siliquis erectis torosis glabris margine non incrassatis, foliis ovato-lanceolatis dentatis, caule erecto subsimplici. 2/4 in dumetis et sepiibus submontanis. — Fl. fr. 4. p. 652.
 - a. *hortensis* (DC.) caule firmo recto, floribus sæpius odoratis, petalis frequentius emarginato-mucronatis, foliis basi non cordatis. — Var. fl. albis purpureis aut variis, simplicibus plenisque. (v. v. c.)
 - b. *sylvestris* (DC.) habitu laxo, foliis saltem inferioribus basi plus minus cordatis et grossius dentatis, floribus semper purpurascensibus rarius odoratis, petalis obtusis. — *H. inodora* Lin. sp. 917. Jacq. fl. austr. t. 347. Ad radices Pyrenæorum, etc. (v. v. sp.)

XXVIII. SISYMBRIUM. *All. ped. 1. p. 274. DC. syst. 2. p. 458.*

Calyx basi æqualis; petala integra; stam. edentula; siliqua sessilis teretiuscula, valvis concavis, stylo vix ullo, septo membranaceo; stigmata 2 distincta aut in capitulum connata; semina ovata aut oblonga 1-serialia.

Sect. I. VELARUM. *DC. l. c.*

Siliquæ subuliformes basi latiores apice in stylum brevissimum desinentes, pedicello brevissimo post anthesin incrassato secus axiu adpressæ. — Flor. flavi.

1. *S. OFFICINALE* (Scop. carn. n. 824) foliis runcinatis pilosis, caule piloso, siliquis subulatis rachi adpressis. (1) ubique in incultis ruderatis secus vias et muros. — Fl. fr. 4. p. 672. — Lob. ic. t. 206. f. 1. — *Erysimum officinale*. Lin. sp. 922. (v. v.)

Sect. II. NORNA. *DC. l. c.*

Siliquæ teretes; calix patens; semina oblonga. — Flores flavi; racemi ebracteati.

2. *S. STRICTISSIMUM* (Lin. sp. 922.) foliis lanceolatis petiolatis dentatis pubescentibus. 2/4 in apricis montosis asperis circâ Parisios ex Merat, in vallibus

Alpium Delphinatū ex Vill. — Fl. fr. 4. p. 972. — Cam. epit. 342. ic. (v. v. c.)

Sect. III. IRI_O. DC. L. C.

- Siliquæ teretes; semina ovata subtriquetra.—Flores flavi; pedicelli ebracteati.
3. S. OBTUSANGULUM (Scheich. in Fl. fr. 4. p. 671.) foliis pinnatipartitis, lobis ovali-oblongis obtusis sinnato-dentatis, sinubus rotundatis, caule basi retrorsum subhispido. (2) in arenosis, cultis, glareosis et ruratis ferè ubique.—S. jacobaeæfolium. Berg. phyt. ic. Non diversum esse a Brasicâ Erucastro vult cl. Gay. (v. v.)
 4. S. ACUTANGULUM (DC. fl. fr. 4. p. 670.) caule foliisque glabris, radicalibus runcinatis, caulinis pinnatifidis lobis sinubusque acutis, calyce patentissimo, siliquis scabris. (2) in asperis apricis et ruderatis vallium Pyrenæorum et Alpium, in collibus prov. austr. — Sinapis Pyrenaica. Lin! sp. 934. All. ped. t. 55. f. 1. (v. v.)
 5. S. TARAXACIFOLIUM (DC. fl. fr. 4. p. 670. ic. rar. t. 37.) foliis runcinato-pinnatilobatis, lobis sinubusque acutis, siliquis declinatis glabris, calyce erectiusculo. (2) in asperis montium Sedenensium Galloprovinciæ, et edit. Pyren. orientalium ex cl. Benth.—Caulis glaber infernè pilo spatulos gerens. (v. s.)
 6. S. AUSTRIACUM (Jacq. austr. 3. t. 262.) caule siliquis foliisque glabris, fol. radicalibus runcinatis, caulinis incisis pinnatifidis, lobis sinubusque acutis, calyce patente. (2) in asperis apricis et ruderatis collium et vallium Delphinatū, Galloprovinciæ, Occitanie et Pyrenæorum orient. — S. erysimifolium. Pourr. Fl. fr. 4. p. 671. (v. v. DC.)
 7. S. IRI_O (Lin. sp. 921.) caule foliisque glabris runcinato-pinnatipartitis, lobis dentatis, terminali elongato, calyce siliquisque patenti-erectis. (1) in ruderatis, cultis, secùs vias et muros ferè ubique. — Jacq. fl. austr. t. 322. Fl. fr. 4. p. 669. Flor. parvi. (v. v.)
 8. S. COLUMNÆ (Jacq. fl. austr. t. 323.) caule villoso subincano, foliis runcinatis pubescentibus, lobis dentatis integrisve acutis, siliquis magnis erectiusculis, calyce laxo. (1) in ruderatis, cultis, viis et hortis Argentorati, Mons-pelii, Narbonæ, agri Buscinonensis. — Fl. fr. 5. p. 590. (v. v.)
 9. S. villosissimum (DC. syst. t. 2. p. 469.) siliquis pubescentibus, caule foliisque villosissimis, foliorum lobis dentatis. — Parisiis forsitan ex hort. Bot. migratum. S. Lœselii. Thuil. fl. par. 335. Fl. fr. 4. p. 670. (v. v.)
 10. S. PANNONICUM (Jacq. ic. rar. 1. t. 123.) foliis inferioribus runcinatis hispidis, lobis dentatis, superioribus pinnatisectis glabris, lobis linearibus integrermis, siliquis patentibus. (1) in Alsatiâ ad pagum Mutzig propè Argentoratum legit Nestler. — Fl. fr. 5. p. 591. (v. s.)
 11. S. ASPERUM (Lin. sp. 920.) foliis glabris pinnatipartitis, lobis oblongis obtusis subdentatis, pedicellis brevissimis, siliquis muricato-scabris stylo brevi acuminatis. (1) in arenosis glareosisque humidis subpaludosis Galloprov., Occitanie, Delphinatū austr., Pictavia, Arvernia, Burgundiæ. — J. Bauh. hist. 2. p. 858. f. 3. — Fl. fr. 4. p. 668. Flores parvi. (v. v. DC.)
 12. S. SOPHIA. (Lin. sp. 922.) foliis bipinnatisectis, lobis oblongo-linearibus incisis, pedicellis calyce quadruplò longioribus, petalis calyce minoribus. (1) in maceriis, muris, tectis, ruderatis Gall. ferè totius. — Fl. fr. 4. p. 669. — Fuchs. hist. t. 2. (v. v.)
 13. S. TANACETIFOLIUM (Lin. sp. 916.) foliis pinnatisectis, segmentis lanceolatis inciso-serratis, extimis confluentibus, petalis calyce majoribus, siliquis pedicello brevioribus. (2) in asperis apricis, saxosis frigidis Alpium et centralium Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 664. — Zan. hist. 86. t. 33. (v. v. sp. in Alp.)

Sect. IV. KIBERA. DC. syst. 2. p. 477.

Calyx clausus; glandulæ tori nullæ aut minimæ; stylus brevis crassus



retusus. — Pedicelli ex bracteæ axillæ solitarii aut plurimi. Flores parvi, flavi aut albi.

13. *S. SUPINUM* (Lin. sp. 907.) pedicellis axillaribus brevissimis solitariis, siliquis erectis puberulis, foliis sinuato-pinnatifidis, caule retrorsum pubescente. (1) in arenosis humidis et ad agrorum margines secus ripas Sequanæ propè Parisios, Rhodani ad Lugdunum, in Jurasso circâ lacum Jovis. — Isnard. act. acad. sc. 1724. t. 18. Fl. fr. 4. p. 668. Cor. alba. (v. v. DC.)

14. *S. POLYCEARTIUM* (Lin. sp. 918.) pedicellis subternis axillaribus brevissimis, siliquis erectis glabris, foliis sinuato-runcinatis, lobis acutis dentatis, inferioribus majoribus. (1) in muris humidis et rupium fissuris prov. oleiferarum et Arvernæ. — Fl. fr. 4. p. 667. — Lob. ic. t. 206. f. 2. Fl. flavi. (v. v.)

Sect. v. ARABIDOPSIS. DC. l. c.

Siliquæ lineares compressæ stigmate sessili truncato. — Flores albi brevissimè pedicellati; pedicelli ebracteati.

15. *S. BURSIFOLIUM* (Lin. amœn. 7. p. 322.) foliis lyratis pinnatifidis glabris, caule erecto folioso, pedicellis crassis calyce brevioribus. (1) in Pyrenæorum vallibus orientalibus ex Pourret. — Fl. fr. 4. p. 668. — Dill. h. elth. f. 177. (v. s. sp.?)

16. *S. PINNATIFIDUM* (DC. fl. fr. 4. p. 667.) foliis radicalibus lyratis, caulinis pinnatipartitis, lobis linearibus integris, terminali majore, pedicellis gracilibus calyce ferè brevioribus. (2) in pascais lapidosis rupestribusque montium Arvernæ, Alpium, Pyrenæorum. — *S. dentatum* All. ped. t. 57. f. 3. *Arabis pinnatifida* Lam. ill. t. 563. f. 3. (v. v.)

XXIX. ALLIARIA. Adans. fam. 2. p. 418. DC. syst. 2. p. 488.

Calyx laxus basi æqualis caducus; pet. limbo obovato; stam. edentula; glandulæ 4 inter stam. et pistillum; siliqua subtetragona nempè teres valvis striâ carinali et lineis prominulis angulata, stylo brevissimo; semina subcylindrica. — Flores albi.

1. *A. OFFICINALIS* (Andrz. in DC. syst. 2. p. 489.) foliis cordatis, siliquis prismaticis pedicello multoties longioribus. (2) ad sepes, dumeta et fossas Gall. ferè totius. — Fuchs. hist. 105. ic. *Erysimum Alliaria* Lin. sp. 922. *Hesperis Alliaria* Fl. fr. 4. p. 651. (v. v.)

XXX. ERYSIMUM. DC. syst. 2. p. 490.

Calyx clausus; pet. integra; stam. edentula; siliqua valvis carinatis tetragona, sessilis; stylus vix ullus; stigmata 2 patula; semina ovata aut oblonga 1-serialia. — Flores flavi aut rarissimè albidi.

Sect. I. ERYSIMASTRUM. DC. l. c.

Calyx cum petalis deciduus. — Folia nec cordata nec amplexicanlia.

1. *E. STRICTUM* (Gærtn. fl. wett. 2. p. 451.) foliis lanceolatis dentatis pubè tripartitâ pubescentibus, caule stricto, siliquis erectis, stylo brevissimo, stigmate bilobo. (2) in ruderatis submontanis et arvis glareosis Delphinatûs. — *E. hieracifolium* Jacq. austr. t. 73. (v. v.)

2. *E. VIRGATUM* (Roth. cat. bot. 75.) foliis oblongo-lanceolatis subdentatis pubè tripartitâ pubescentibus, caule stricto tereti, siliquis erectis, stylis longitudine latitudinem siliquæ vix excedente. (2) in Jurasso, ad vias Belgii. — DC. syst. 2. p. 496. (v. s.)

3. *E. CHEIRANTHOIDES* (Lin. sp. 923.) foliis lanceolatis subdenticulatis scabrinculis viridibus, siliquis erecto-patulis pedicello duplò longioribus, stigmate parvo subsessili. (1) in ruderatis, arvis, ad margines agrorum et viarum, juxtâ sepes

- et interdùm in humidis Gall. ferè totius. — Fl. fr. 4. p. 659. — Lob. ic. t. 225.
f. 1. (v. v.)
4. E. HELVETICUM (DC. fl. fr. 4. p. 658.) foliis linearibus integris, cauleque
erecto vix ramoso, pube adpressâ bipartitâ cinereis, siliquis erectiusculis,
stigmate pedicellato emarginato. (2) in Pyren. central. ex cl. Bentham. —
Cheiranthus Helveticus Jacq. vind. t. 9. (v. v. in Helv. D.)
5. E. CANESCENS (Roth. cat. bot. 1. p. 76.) foliis linearibus ant subdentatis
pube bipartitâ subcanescens, unguibus petalorum calyce longioribus,
laminis obovato-oblongis, siliquis erectis pedicello quintuplo longioribus,
stigmate subsessili. (2) in collibus et aggeribus siccis et apriis Niceæ et Gal-
loprovinciæ speciatim ad rupem Sanctæ Victoriae ex DC. syst. 2. p. 501. —
Cheiranthus alpinus Jacq. austr. t. 75. (v. v.)
6. E. LANCEOLATUM (DC. syst. 2. p. 502.) foliis inferioribus lanceolatis den-
tatis superioribus sublinearibus integris, unguibus calyce longioribus, la-
minis orbiculato-obovatis, siliquis erectis, stigmate subsessili. (2) in apriis
rupestribus campestribus et muris in Gall. ferè totâ.
- α. majus (DC.) caule simplici aut ramoso pedali rigido. — *Erysimum mu-*
rale. Fl. fr. 4. p. 657. *Cheiranthus erysimoides* Lin. sp. 923. Jacq. fl.
austr. t. 74. (v. v.)
- β. minus (DC.) caule simplici interdùm multicauli subascendente. — *Cheiran-*
thus Alpinus Lam. diet. 2. p. 716. *E. ochroleucum* β. Fl. fr. 4. p. 658. (v. v.)
7. E. OCHROLEUCUM (DC. fl. fr. 4. p. 658.) foliis oblongo-lanceolatis subden-
tatis pube bipartitâ aut nullâ, caule decumbente ramoso, petalis obovatis,
siliquis erectis stylo pedicelli longitudine apiculatis. ♀ in Jurassi montibus
Helvetiæ conterminis. — *Cheiranthus ochroleucus* Hall. fil. ex Schl. DC.
syst. 2. p. 181. — Hall. Helv. n. 449. t. 14. (v. v.)

Sect. II. CORINGIA. DC. syst. 2. p. 507.

Petala erectinacula albida; glandula inter pistillum et stam. lateralia. — Folia
caulina cordata amplexicaulia lœvia.

8. E? ALPINUM (Baumg. trans. 2. p. 263.) foliis membranaceis glabratiss., cau-
linis cordato-sagittatis amplexicaulibus oblongis, radicalibus petiolatis
ovatis. ♀ in sylvaticis lapidosis montanis *Alpium Delphinatus*, *Ceben-*
narum et *Alsatiae*. — *Brassica alpina* Lin. mant. 95. Vill. dauph. 3. p. 330.
t. 36. Fl. fr. 4. p. 647. *Arabis brassicaformis* Wallr. Sched. crit. 359. Gay.
in ann. sc. nat. 1826. (v. v.)
9. E. PERFOLIATUM (Crantz. aust. 27. DC. syst. 2. p. 508.) foliis radicalibus
obovatis, caulinis cordato-amplexicaulibus, omnibus obtusis glabris glaucis,
siliqua tetragonæ lateribus enerviis. ♀ in agris saxis et clivis Gall. ferè tot.
— Lob. ic. 396. f. 2. *Brassica orientalis* Lin. sp. 931. *Brassica persoliata* Fl.
fr. 4. p. 696. (v. v.)

Trib. VI. CAMELINEÆ seu Notorhizeæ latiseptæ. DC.
syst. 2. p. 513.


Silicula 2-locul. aut abortu 1-locul. bivalvis, valvis plus minus
concavis sœpius dehiscentibus, septo elliptico in majore fructus
diametro. Semina plura ovata immarginata. Cotyled. planæ, in-
cumbentes.

XXXI. CAMELINA. Crantz. fl. aust. 1. p. 17. DC. syst. 2. p. 514.

Calyx basi æqualis; pet. integra; stam. edentula; silicula obovata
aut globosa, stylo filiformi persistente superata, valvis ventricosis,
loculis polyspermis; semina oblonga immarginata. — Flores flavi.

- x. C. SATIVA (Crantz. aust. 10.) siliculis cuneato-pyriformibus 4-rostratis
stylo longiusculo terminatis, foliis subintegerrimis lanceolatis. (1) inter





segetes et Lina hinc indè spontanea. — *Myagrum sativum* Lin. sp. 894. Cav. ic. t. 66. Fl. fr. 4. p. 117. *Alyssum utriculatum* Lapeyr. (v. v.)

α? pilosa (DC.) foliis integris pilosis. — *C. sylvestris* Wallr. sched. 347. *Semper sylvestris.* (v. v.)

β. glabrata (DC.) foliis integris subglabris. — Lind. als. t. 1. Culta ad oleum è seminibus extrahendum. (v. v. c.)

2. *C. DENTATA* (Pers. enc. 2. p. 191.) siliculis subgloboso - pyriformibus 4-costatis stylo longiusculo superatis, foliis repando-dentatis. (1) in arvis Alsatiæ arenosis. — J. Bauh. hist. 2. p. 893. ic. — DC. syst. 2. p. 516. (v. s. DC.)

XXXII. NESLIA. Desv. journ. 3. p. 162. DC. syst. 2. p. 516.

Cal. æqualis patens; pet. integra; stam. edentula; silicula coriacea indehiscens subgloboso-compressa, septo tenui in majore diametro interdùm evanido, valvis concavis indistinctis; semina in quoque loculo solitaria, pendula, subglobosa. — Flores flavi.

1. *N. PANICULATA* (Desv. journ. bot. 3. p. 162.) (1) in arvis et arenosis Gall. ferè totius. — *Bunias paniculata* Fl. fr. 4. p. 721. *Myagrum paniculatum* Lin. sp. 894. — C. Bauh. prod. 52. ic. Folia amplexicaulia sagittata oblongo-lanceolata integra. (v. v. DC.)

Trib. VII. LEPIDINEÆ seu Notorhizeæ angustiseptæ. DC. syst. 2. p. 521.

Silicula septo angustissimo, valvis carinatis aut valdè concavis. Semina in loculis solitaria aut pauca ovata immarginata. Cotyledones planæ incumbentes.

XXXIII. SENEBIERA. DC. syst. 2. p. 521.

Calyx æqualis patens; pet. integra; stam. edentula, interdùm abortu 4 aut 2; silicula didyma, subcompressa, evalvis, aptera, bilocularis, indehiscens, stigmate sessili, valvis subglobosis rugosis aut subcristatis, loculis 1-spermis; semina pendula, subgloboso - triquetra. — Flores albi minimi.

Sect. I. NASTURTIOLUM. DC. l. c.

Silicula didyma apice emarginata, septo nempe valvulis globosis breviore.

1. *S. PNNATIFIDA* (DC. mem. soc. h. n. Par. 144. t. 9. Fl. fr. 4. p. 703.) foliis pinnatilobatis, lobis oblongis dentatis aut subincisis, siliculis compressis didymis reticulatis. (1) in ruderatis præsertim maritimis in Armoraciâ circa Quimper et Nannetos, in Vasconia, Monspelii. — *Lepidium didynamum* Lin. mant. 92. Caules plurimi diffuso-procumbentes. (v. v.)

Sect. II. CARARA. DC. l. c.

Silicula apice non emarginata, septo nempe valvis paulò longiore, valvulis compressis dorso cristato-rugosis.

2. *S. CORONOPUS* (Poir. dict. 7. p. 76.) foliis pinnatilobatis, lobis integris dentatis pinnatifidis, siliculis acutisealatis compressis, valvis dorso cristato-rugosis. (1) (2) in ruderatis apries secùs vias in calcareis et arenosis ferè ubique. — *Cochlearia Coronopus* Lin. sp. 904. *Coronopus vulgaris* Fl. fr. 4. p. 704. 5. p. 595. — Lob. ic. 238. f. 1. (v. v.)

XXXIV. CAPSELLA. DC. syst. 2. p. 383.

Calyx æqualis; pet. integra; stam. edentula; stigma sessile; silicula depresso-complanata, triangularis, apice truncata, septo ferè linearis, loculis 8-10-spermis, valvis carinatis compressis dorso non alatis. — Flores albi.

1. *C. BURSA-PASTORIS* (DC. l. c.) (1) in agris, oleraceis, ruderatisque ubique frequens. — *Thlaspi bursa-pastoris* L. sp. 903. Fl. dan. t. 729. Fl. fr. 4. p. 709. Plea herb. fasc. 5. ic. — Planta valde varians quoad foliorum formam. Petala in stamina mutata videntur cl. Jacquin. (v. v.)

XXXV. *LEPIDIUM*. Brown. Kew. ed. 2. v. 4. p. 85.

Cal. æqualis; pet. integra; stam. edentula; silicula ovalis depressa dehiscens, valvis carinatis, septo membranaceo angustissimo; semina in quoque loculo solitaria, pendula, subtriangulata aut compressa. — Flores albi.

Sect. I. *CARDARIA*. DC. syst. 2. p. 528.

Silicula ovato-cordata acuta subdepressa, valvis concavis subturgidis dorso apteris, stylo filiformi exerto superata.

1. *L. DRABA* (Lin. sp. ed. 1. p. 645.) siliculis cordatis subturgidis apice integris stylo superatis, foliis amplexicaulibus lanceolatis dentatis. (1) in arvis agris oleraceis Gall. ferè totius, præsertim in Occitanâ frequens. — *Cochlearia draba* Lin. sp. ed. 2. p. 904. Fl. fr. 4. p. 702. — Lob. ic. 224. f. 1. (v. v.)

Sect. II. *CARDAMON*. DC. l. c.

Silicula suborbiculata apice emarginata, valvis carinato-navigularibus dorso subnudatis, stylo brevissimo intrà emarginaturam inclusa; cotyledones tripartitæ.

2. *L. SATIVUM* (Lin. sp. 899.) siliculis orbiculatis alatis emarginatis, foliis variè divisis incisisque, ramis non spinescentibus. (1) ex Oriente ortum nunc in hortis frequens cultum. — *Thlaspi sativum* Fl. fr. 4. p. 708. — Lob. ic. 212. f. 1. (v. v. c.)

f. crispum. C. Bauh. prod. 43. et 44. ic. (v. v. c.)

Sect. III. *LEPIA*. DC. l. c.

Silicula suborbiculata apice emarginata, valvis navigularibus apice alatis, alis stylo sæpius adnatis, stylo brevissimo intrà emarginaturam inclusa; cotyled. integræ.

3. *L. CAMPESTRE* (Brown. h. Kew. 4. p. 465.) siliculis ovatis alatis emarginatis lepidoto-punctatis, foliis caulinis sagittatis dentatis. (1) (2) in viis, agris argilliosis apricis arvis Gall. ferè tot. — *Thlaspi campestre* Lin. sp. 902. Fl. fr. 4. p. 712. *Lepidium cristatum* Lapeyr. ex Arnolt. — Fuchs. hist. 306. ic. (v. v.)

4. *L. HIRTUM* (Smith. comp. ed. 3. p. 98.) siliculis ovatis alatis emarginatis hirtis, foliis caulinis sagittatis villosis subintegris. (2) in arvis, agris apricis, lapidosis prov. oleiferarum. — *Thlaspi hirtum* Lin. sp. 901. Fl. fr. 4. p. 713. — C. Bauh. prod. 47. ic. (v. v. DC.)

5. *L. HUMIFUSUM* (Req. in ann. sc. nat. t. 5. p. 385.) siliculis ovatis alatis emarginatis glabris, foliis radicalibus lyratis ovatisque, caulinis sagittatis integris, caulibus prostratis pedicellisque pubescentibus. 2^l in Corsicæ montibus. (v. s.)

Sect. IV. *DILEPTIUM*. DC. l. c. p. 538.

Silicula subelliptica brevissimè emarginata, valvis carinatis nec dorso nec apice alatis, stylo vix ullo. — Flores minimi interdùm apetalii 2-4-andri.

6. *L. RUDERALE* (Lin. sp. 900.) siliculis ovatis emarginatis patulis pedicello brevioribus, foliis glabris, radicalibus pinnatilobatis, rameis linearibus integris. (1) in ruderatis et secùs vias ferè ubique. — *Thlaspi ruderale* Fl. fr. 4. p. 707. *L. subulatum* et *graminifolium* Lapeyr. ex cl. Benth. — Lob. ic. 214. f. 1. Variat floribus apetalis et 4-petalis, 2-4-andri. (v. v.)

on television

Lg.

Sect. v. LEPIDIASTRUM. DC. l. c.

Silicula ovata aut elliptica integerim nec ullo modo emarginata stigmate subsessili apiculata, valvis carinatis apteris.

7. L. *TATIFOLIUM* (Lin. sp. 899.) siliculis ovatis stigmate apiculatis, foliis ovato-lanceolatis, indivisis subserratis, infimis longè petiolatis. $\frac{2}{3}$ in umbrosis succulentis humidis ferè ubique. — Fl. fr. 4. p. 704. — Lob. ic. 318. f. 2. (v. v.)
8. L. *IBERIS* (L. sp. 900.) siliculis ovatis stigmate apiculatis, foliis radicalibus incisis pinnatisectis, caulinis linearibus integris, caule ramosissimo. $\frac{2}{3}$ in ruderatis et secùs vias ferè ubique. — L. graminifolium Lin. sp. 900. Lob. ic. 223. f. 2. Fl. fr. 4. p. 705. (v. v.)

XXXVI. ÆTHIONEMA. Brown. Kew. l. c. p. 80. DC. syst. 2. p. 557.

Calyx basi inæqualis; pet. integra; stam. majora aut inter se connata aut intùs dentata; silicula ovalis sæpius emarginata, valvis naviculáribus dorso alatis, loculis oligospermis; semina ovato-oblonga. — Flores ex albo rosei.

1. *Æ. SAXATILE* (Brown. h. Kew. 4. p. 80.) siliculis bilocularibus obcordatis, stylo brevissimo, valvis dorso alatis integris, stam. majoribus dentatis, racemis fructiferis laxis. $\frac{5}{6}$ in rupestribus agri Ruscimonensis, Occitaniae, Galloprov., Delphin. austr. — Thlaspi saxatile Lin. sp. 901. Fl. fr. 4. p. 710. Thlaspi marginatum Lapeyr. supp. ex cl. Arnott. — Barr. ic. 845. (v. v.)

Trib. VIII. ISATIDEÆ seu NOTORHIZEÆ NUCA-MENTACEÆ. DC. syst. 2. p. 563.

Silicula valvis indistinctis aut indehiscentibus carinatis, septo evanido 1-locul. 1-sperma. Semina ovato-oblonga immarginata. Cotyled. planæ oblongæ incumbentes.

XXXVII. ISATIS. Lin. gen. 834. DC. syst. 2. p. 564.

Calyx æqualis patens; pet. integra; stam. edentula; stigma sessile; silicula ovali-oblonga 1-locul. depresso-plana, valvis carinatis vix dehiscentibus dorso subalatis; semen pendulum. — Flores flavi. Fol. integra, sup. basi acutè sagittata sessilia.

1. I. *TINCTORIA* (Lin. sp. 936.) siliculis cuneatis basi acuminatis apice subspathulatis obtusissimis glabris latitudine majore triplò longioribus. (2) Fl. fr. 4. p. 722.
 - α. sylvestris*, foliis præs. inferioribus parcè villosis. — In ruderatis apricis secùs vias ferè ubique. Lob. ic. 352. f. 1. (v. v.)
 - β. sativa* (DC.) foliis glabris latioribus. Culta in agris pinguibus circà Albi, etc. ad usum tinctorium. (v. v. c.)
 - γ. hirsuta* (DC.) foliis hirsutis angustioribus. I. hirsuta Vill. Dauph 3. p. 308. non All. — In apricis saxosis. (v. s.)
2. I. *CANESCENS* (DC. fl. fr. 5. p. 598.) siliculis elongato-cuneatis pubescentibus infernè angustatis supernè subspathulatis obtusis, latitudine quadruplò longioribus, pedicelli apice obconici longitudinem duplò excedentibus. (2) in apricis maritimis Galloprovinciae circà Telonem. — Caulis et fol. infer. pilis patulis mollibus hirsuta. (v. s.)

XXXVIII. MYAGRUM. Tourn. inst. t. 99. DC. syst. 2. p. 573.

Cal. suberectus; petala oblonga; stam. majora inter se imâ basi sub-

connata ; stylus brevis ; silicula compressa ferè cuneata , apice lacunas 2 vacuas , infernè loculum 1 monospermum gerens ; semen pendulum oblongum. — Flores pallidè flavi. Fol. integra , super. sagittato-amplexicaulia.

i. M. PERFOLIATUM (Lin. sp. 893.) (1) in agris et arenosis prov. præsertim australium. — Cakile perfoliata Fl. fr. 4. p. 720. — C. Bauh. prod. 51. ic. (v. v.)

Subordo III. ORTHOPLOCEÆ. (o>>) DC. syst. 2. p. 438.

Cotyledones incumbentes, conduplicatae seu secùs nervum medium longitudinaliter plicatae et radiculam dorsalem in sinu fontes. Semina immarginata sæpius globosa.

Trib. IX. BRASSICEÆ seu ORTHOPLOCEÆ SILIQUOSÆ. DC. syst. 2. p. 581.

Siliqua valvis longitudinaliter dehiscentibus, septo linearis.

XXXIX. BRASSICA. DC. syst. 2. p. 582.

Calyx erectus ; pet. obovata ; stam. edentula ; siliqua teretiuscula stylo parvo brevi obtuso ; semina uniseriata subglobosa.

Sect. I. BRASSICARIA. DC. syst. 2. p. 582.

Siliqua sessilis, rostro nullo aut conico aspermo superata.

i. B. OLERACEA (Lin. sp. 932.) foliis polline glaucis subcarnosis repandis lobatisve, etiam junioribus glaberrimis. (2) DC. in ann. agr. fruct. vol. 19. diss. 10. t. 2. p. 582.

a. sylvestris (DC.) in rupibus maritimis Normanniae? B. oleracea Sm. engl. bot. t. 637. (v. v. in littore Anglie DC.)

b. acephala (DC.) caule tereti elongato, foliis expansis, racemis paniculatis. — Lob. ic. 243. f. 1. Culta in hortis et agris prov. præsertim occid. (v. v. c.)

y. bullata (DC.) caule tereti subelongato, foliis junioribus subcapitatis denum patulis bullatis crispatisve, racemis paniculatis. — Lob. ic. 244. f. 1. Culta in hortis. (v. v. c.)

d. capitata (L.) caule tereti abbreviato, foliis concavis non bullatis in capitulum antè florescentiam congestis, racemis paniculatis. — Lob. ic. 243. f. 2. Culta in hortis. Variat fol. viridis et purpureis, capite sphærico ovato aut depresso. (v. v. c.)

e. cauiflora (DC.) caule ad originem foliorum tumido subgloboso. — Lob. ic. 246 f. 1. Variat alba et purpurascens, in hortis culta. (v. v. c.)

f. botrytis (L.) racemorum pedunculis corymbosis confertis antè florescentiam valdè carnosis abbreviatis, floribus sæpè abortivis. — Lob. ic. 245. f. 1. Culta in hortis. (v. v. c.)

2. B. CAMPESTRIS (DC. syst. t. 2. p. 588.) foliis polline glaucis subcarnosulis, inferioribus novellis subhispidis ciliatisve lyratis dentatis, cæteris cordato-amplexicaulis acuminatis. (2)

— *a. oleifera* (DC.) radice fusiformi exili, caule elongato. — Br. campestris Lin. sp. 931. Sm. engl. bot. t. 2224. Culta in agris sub nom. Colzat seu Colsat. (v. v. c.)

b. pavularia (DC.) radice fusiformi exili, caule abbreviato. Chou à faucher. (v. v. c.)

— *y. napobrassica* (DC.) radice tumidâ napiformi. Culta in agris, variat radice alba (chou navet blanc), purpurascente (chou navet rouge) et flavescente (Rutabaga). (v. v. c.)


3. B. RAPA (Lin. sp. 931.) foliis radicalibus lyratis polline glauco destitutis

11

SOURCE OF THE RIVER

11

11



setoso-scabris, caulinis mediis incisis, summis integerrimis laevibus. (2) DC. syst. 2. p. 590.

a. *depressa* (DC.) radice sub-eollo tumidâ globoso-depressâ in radiculam tenuem subtus abruptè desinente. — Lob. ic. t. 197. f. 1. Culta in agris, variat radice albâ, flavescente, nigricante, rubente, etc. (v. v. c.)

β. *oblonga* (DC.) radice oblongâ sensim apice attenuatâ. — Lob. ic. 197. f. 2. Culta rariè. Radix alba. (v. v. c.)

γ. *oleifera* (DC.) radice exili. — Lob. ic. 298. f. 1. Culta ad oleum è seminibus in Delphin. sub nom. *navette*. (v. v. c.)

4. B. *NAPUS* (Lin. sp. 951. DC. syst. 2. p. 592.) foliis glabris polline cæsio glaucescentibus, radicalibus lyratis, caulinis pinnatifidis crenatisque, summis cordato-lanceolatis amplexicaulibus, siliquis divaricato-patentibus. (2) B. *arvensis* Lapeyr. non L. (cl. Arnott. ex autopsiâ in herb. Lap.)

a. *oleifera* (DC.) radice exili. — Lob. ic. 200. f. 2. Culta in agris sub nomine *navette d'hiver*. (v. v. c.)

β. *esculenta* (DC.) radice fusiformi sub collo incrassatâ. — Lob. ic. 200. f. 1. Culta in agris et hortis, variat radice albâ, flavâ, nigricante. (v. v. c.)

5. B. *DRACOZ* (Waldst. et Kit. in DC. syst. 2. p. 593.) foliis glabris polline cæsio glaucescentibus, radicalibus caulinisque inferioribus lyratis, summis cordato-lanceolatis amplexicaulibus crenatis, siliquis erectis. (1) culta ad oleum in Alsatiâ sub nom. *navette d'été*. (v. v. c.)

6. B. *HUMILIS* (DC. syst. 2. p. 598.) foliis radicalibus carnosis pinnatifidis, lobis integris apice sèpiùs piliferis, scapis nudis, siliquis patulis basi attenuatis stylo crassiunculo terminatis. ♀ in planitie argillosâ non longè à Monspelio ponè montem Lupi inter Loudres et Laroque aprilis flor. (v. v. DC.)

7. B. *REPANDA* (DC. syst. 2. p. 598.) foliis radicalibus carnosis glabris repando-dentatis, scapis nudis, stylo tenui à siliquâ distincto. ♀ in apricis montium Genevre et Galibier in Delphinatu, et in Alpibus Barcintonensibus Galloprov. — Sisymbrium monense Vill. Dauph. 3. t. 39. non Lin. Sjs. repandum Fl. fr. 4. p. 665. (v. v. DC.)

Sect. II. ERUCASTRUM. DC. syst. 2. p. 598.

Siliqua sessilis, rostro conico basi 1-2-spermo superata.

8. B. *RICHERII* (Vill. Dauph. 3. p. 331. t. 36.) foliis glabris, inferioribus petiolatis oblongis subdentatis, summis linear-lanceolatis paucis. ♀ in asperis lapidosis pratis Alpium Delphinatûs et Galloprovinc. — All. ped. t. 58. f. 1. et 76. f. 2. Fl. fr. 4. p. 649. Petala flava. (v. v. DC.)

9. B. *ERUCASTRUM* (Lin. sp. 932.) foliis runcinatis subglabris, lobis inæqualibus obtusè sinuatis, caule basi hispido. (1) in arenosis hinc indè. — Bull. herb. t. 331. Fl. fr. 4. p. 650. Petala flava venis nigricantibus reticulata. (v. s.)

10. B. *CHEIRANTHOS* (Vill. Dauph. 3. p. 332. t. 36.) foliis petiolatis hispidis pin-natipartitis, lobis sinuato-dentatis ovali-oblongis, caule basi hispido, siliquis rostro quadruplò longioribus. (2) seu ♀ Fl. flavi.

a. *arvensis*, caule elongato ramoso erecto. — In arenosis asperis et ad ripas à Pictaviâ ad Delphinatum et in prov. austral. — J. Bauh. hist. 3. p. 858. f. 2. B. *Cheiranthos* Fl. fr. 4. p. 650. (v. v.)

β. *montana*, caule humili brevissimo cæspitoso. — In montibus excelsioribus Pyren. et Alpium. — Br. *montana* Fl. fr. fr. 4. p. 651. Sisymbrium vimineum Lapeyr. non L. excl. Arnott. (v. v.)

11. B. *CHEIRANTHIFLORA* (DC. syst. 2. p. 601.) foliis radicalibus petiolatis lyrato-pinnati-lobatis subhispidis, caulinis paucis lobis integris acutis, radice exili, siliquis rostro triplò longioribus. (1) in arenosis circa tête de Buch, Sables d'Olone, Tarare et in Burgundiâ. — Raphanus *cheiranthiflorus* Willd. hort. berol. t. 19. Flor. flavi. (v. v. DC.)

XL. SINAPIS. Lin. gen. 821. DC. syst. 2. p. 607.

Calyx basi æqualis patens. Cætera Brassicæ. — Flores flavi.

Sect. I. MELANOSINAPIS. DC. l. c.

Siliqua teres aut subtetragona, stylo brevi parvo apiculata.

1. S. **NIGRA** (Lin. sp. 933.) siliquis glabris lævibus subtetragonis rachi adpressis, foliis infimis lyratis, summis lanceolatis integerrimis petiolatis. (1) in agris, arvis, aggeribus, ruderatis ubique. — Fl. fr. 4. p. 644. — Lob. ic. t. 202. f. 2. (v. v.)

$\beta.$ *torulosa* (Pers. enc. 2. p. 207.) foliis latis hastato-lobatis, super. ovatis repandis, siliquis torulosis. — Parisiis, etc. (v. s.)

$\gamma.$ *turgida* (Pers. l. c.) foliis lobatis repandis basi auriculatis, siliquis turgidis venosis divergenti-adpressis, rostro conico striato. — Parisiis, etc. (v. s.)

$\delta?$ *villosa* (Mer. fl. par. 265.) foliis infer. ovatis dentatis subsinuatis glabris, superioribus lanceolatis, siliquis villosis. — Parisiis. An eadem ac S. *geniculata* Desf. (v. s.)

Sect. II. CERATOSINAPIS. DC. syst. 2. p. 611.

Siliqua rostro conico aspermo superata.

2. S. **ARVENSIS** (Lin. sp. 935.) siliquis glabris multangulis tornulosis rostro tenui subancipiti triplò longioribus, caule folisque pilosus. (1) in arvis vineis agris ubique. — Fl. fr. 4. p. 644. — Fuchs. hist. 257. ic. (v. v.)
- $\beta.$ foliis incisis. Lob. ic. 198. f. 2. (v. s.)

3. S. **ORIENTALIS** (Lin. sp. 933.) siliquis retrorsum pilosiusculis subtetragonis tornulosis rostro tenui brevioribus. (1) in arvis et agris Andegaviæ, Arduenæ, etc. — Schkuhr. handb. 1. t. 186. Fl. fr. 4. p. 645. (v. s.)

Sect. III. HIRSCHFELDIA. DC. l. c.

Siliqua teres, loculo utroque sub-4-spermo, rostro ovato 1-spermo lævi indehiscente.

4. S. **INCANA** (Lin. sp. 934) siliquis glabris rachi adpressis subtorulosis, caule ramoso infernè scabro, foliis lyratis scabris. (2) in arvis, ruderatis, collinis lapidosisque prov. australium. — Fl. fr. 4. p. 646. Jacq. hort. vind. t. 169. *Myagrum hispanicum* Lin. sp. 893. (v. v.)

Sect. IV. LEUCOSINAPIS. DC. l. c.

Siliqua rostro ensiformi superata, valvis tornulosis. — An Erucæ sect? an genus?

5. S. **ALBA** (Lin. sp. 933.) siliquis hispidis patentibus rostro ensiformi subangustioribus, foliis lyratis cauleque subglabris. (1) inter segetes et in ruderatis prov. austr., culta sub nom. *moutarde blanche* pro condimento. — Fl. fr. 4. p. 645. — Fuchs. hist. 538. ic. Fl. flavi. (v. v.)

XLI. MORICANDIA. DC. syst. 2. p. 626.

Calyx clausus basi bisaccatus; petala integra; stam. edentula; siliqua compresso-tetragona elongata, stylo compresso-conico; semina ovata parva biserialia. — Herba glabra glauca. Flores purpurascentes.

1. M. **ARVENSIS** (DC. syst. 2. p. 626.) siliquis subtetragonis, foliis caulinis cordato-amplexicaulibus integerrimis. (2) in arvis humentibus et glareosis Galloprovinciæ et forsitan Alsatiæ ex Mapp. — Bocc. sic. t. 25. f. 3-4. — *Brassica arvensis* L. mant. 95. Fl. fr. 4. p. 657. (v. v.)

$\beta.$ *suffruticosa* (Desf. atl. 2. p. 94.) caulinibus basi suffruticosis. (2) in collibus Niceæ. — Fl. fr. 5. p. 589. (v. v. sp. et c. DC.)





XLII. DIPLOTAXIS. DC. syst. 2. p. 628.

Calyx laxus basi æqualis ; pet. integra ; stam. edentula ; siliqua compressa linearis , valvis planis nervo medio donatis , stylo conico semina 1-2 gerente aut vacuo ; semina ovata parva in quoque loculo biserialia aut rariùs abortu subuniserialia . — Flores flavi aut albi. Siliquæ in sp. Gall. erectæ , in calyce sessiles aut pedicellatæ .

1. D. ERUCOIDES (DC. l. c.) pubescens , siliquis sessilibus erectinusculis , stylo ensiformi , foliis sessilibus runcinato-lyratis dentatis. (I) in agris vineis et ad vias agri Ruscinonensis et Niceæ . — Barr. ic. t. 132. Sinapis erucoïdes Lin. sp. 934. Fl. fr. 4. p. 644. Fl. albi. (v. s.)
2. D. TENUIFOLIA (DC. l. c.) glabra , siliquis subpedicellatis erectis , stylo filiformi brevi aspermo , foliis supremis integris , infimis pinnatipartitis , lobis linearibus integris pinnatifidisve. ♀ in ruderatis , glareosis , lapidosis , apri- cis ferè ubique . — Fuchs. hist. 262. ic. Sisymbrium tenuifolium Lin. sp. 917. Bull. herb. t. 335. Fl. fr. 4. p. 665. Flor. flavi. (v. v.)
3. D. MURALIS (DC. l. c.) subpilosiuscula , siliquis sessilibus erectis , stylo brevi subfiliformi , foliis radicalibus lyratisve glabris , caulinis subnudis adscendentibus. (I) (2) in ruderatis , muris , glareosis , arenosis apri- cis hinc-indè . — Barr. ic. t. 131. Sisymbrium murale Lin. sp. 918. Fl. fr. 4. p. 664. Fl. flavi. (v. v.)
♂ foliorum lobis profundioribus acutioribus dentatis. S. erucastrum Gon. ill. 12. t. 20. (v. s.)
γ. minor , foliorum lobis profundioribus obtusis. S. Barrelieri Thuil. par. 334. non Lin. (v. s. sp.)
δ pygmæa . — S. monense. Thuil. par. 333 non Lin.
4. D. VIMINEA (DC. l. c.) glabra , siliquis sessilibus erectis , stylo brevi filiformi , foliis radicalibus lyratis obtusissimis lœvibus , caulinis nudis subde- cumbentibus. (I) in vineis , cultis et arenosis Galloprov. , Occitanie , Delphi- natūs , agri Parisiensis , etc. — Bocc. sic. 19. t. 10. Sisymbrium vimineum Liu. sp. 919. Fl. fr. 4. 665. Fl. flavi. (v. v.)
5. D. SAXATILIS (DC. l. c.) subpilosiuscula , siliquis erectis sessilibus basi at- tenuatis , stylo brevi conico , foliis radicalibus pinnatilobatis crassiusculis , lobis integris , caulinis subnudis erectis. ♀ in asperis rupestribus collinis Galloprovinciæ propè Digne et ad montem Sanctæ Victoriæ . — Ger. gallopr. 360. n. 8. Sisymbrium monense Lin. sp. ed. 2. non ed. 1. Sis. saxatile. Fl. fr. 4. p. 665. Fl. flavi. (v. v. DC.)

XLIII. ERUCA. Tourn. inst. t. 111. DC. syst. 2. p. 637.

Calyx erectus ; pet. integra ; stam. edentula ; siliqua ovali-oblonga , valvis concavis lœvibus , rostro ensiformi aspermo vix valvulis breviore ; sem. globosa . — Petala alba aut flava venis fuscis reticulata.

1. E. SATIVA (Lam. fl. fr. 2. p. 496.) foliis lyrato-pinnatipartitis , lobis dentatis acutis , caule hirsuto , pedicellis calyce deciduo brevioribus. (I) ad vias , in scrobibus , oleraceis et segetibus prov. austral. — Lob. ic. 204. f. 1. Brassica Eruca Lin. sp. 932. Fl. fr. 4. p. 649. Variat fl. albo et flavo , siliquis glabris aut pilosis , fructibus turgidis glabris (B. turgida Pers. ench. 2. p. 207.) etc. (v. v.)

Trib. X. ZILLEÆ seu ORTHOPLOCEÆ NUCAMEN- TACEÆ. DC. syst. 2. p. 646.

Silicula indehiscentia , subglobosa , valvis indistinctis. Semina globosa in loculis solitaria. Cotyl. conduplicate.

XLIV. CALEPINA. Adans. fam. 2. p. 423. DC. syst. 2. p. 648.

Calyx subpatens basi æqualis ; pet. obovata , exteriora paulò majora ;

stam. edentula ; silicula coriacea 1-locul. 1-sperma ; semen pendulum. — Flores albi.

1. C. CORVINI (Desv. journ. 3. p. 158.) (I) in arvis, vineis, arenosis et ruderatis prov. præsertim australium. — Barr. ic. 894. f. 1. et t. 1152. Bunias cochlearioides Fl. fr. 4. p. 721. (v. v.)

Trib. XI. RAPHANEÆ seu ORTHOPLOCEÆ LÖMEN-TACEÆ. DC. syst. 2. p. 649.

Silicula seu siliqua transversè in articulos secedens. Semina globosa. Cotyl. conduplicatae.

XLV. CRAMBE. Lin. gen. n. 825. DC. syst. 2. p. 650.

Calyx patens basi subæqualis ; pet. æqualia integra ; stam. majora apice dente laterali aucta ; silicula coriacea biarticulata, articulis in dehiscentibus 1-spermis, inferiore abortiente pedicelliformi brevi, sup. globoso. — Flores albi.

1. C. MARITIMA (Lin. sp. 937.) filamentis longioribus bifurcatis, silicula mutica, foliis subrotundis crassiusculis sinuatis undulatis dentatis glaucis cauleque glaberrimis. 2 in arenosis maritimis Oceani et Mediterranci. — Lob. ic. 245. f. 2. — Fl. fr. 4. p. 722. (v. v.)

XLVI. RAPISTRUM. Boerh. lugd. 406. DC. syst. 2. p. 430.

Calyx laxus ; pet. integra ; stam. edentula ; silicula biarticulata, articulo superiore ovato rugoso ; semina in loculis solitaria, superioris erectum, inferioris pendulum. — Flores flavi.

1. R. PERENNE (Berg. phyt. ic.) siliculis glabris, articulo superiore ovato stylo longiore, foliis pinnatifidis, lobis dentato-incisis acutis. 2 in agris arenosis Galloprov., Lugduni, Lotharingiæ, Alsatiæ? — Myagrum perenne Linn. sp. 893. Jacq. austr. t. 414. Cakile perennis Fl. fr. 4. p. 719. (v. s.)

2. R. RUGOSUM (Berg. phyt. ic.) siliculis pubescentibus, articulo superiore globoso rugoso stylo breviore, foliis obtusis dentatis, radicalibus sublyratis. (I) in agris et arenosis prov. præsertim australium. — Myagrum rugosum Lin. sp. 893. Cakile rugosa Fl. fr. 4. p. 719. (v. v.)

β. stylosum (DC.) foliis ferè omnibus radicalibus, siliculis villosis, artic. infer. sæpè abortivo. Fl. fr. 5. p. 598. in Alsatiâ, Occitanîâ. (v. s.)

γ. venosum (DC.) siliculis adultis glabris, artic. inferiore rariùs abortivo. — Myagrum venosum Pers. enc. 2. p. 183. Tolosæ. (v. v. DC.)

3. R. ORIENTALE (DC. syst. 2. p. 433.) siliculis glabris, articulo superiore globoso rugoso stylo sublongiore, inferiore sæpè abortivo, foliis oblongis, caulinis profunde dentato-sinuatis. (I) in Corsicâ reperiit Ph. Thomas. (v. s.)

4. R³ HYPOGÆUM (Duby MSS.) siliculis hispidulis, articulis 2 ovatis, scapis 1-floris foliis pinnatis prærioribus. (I)? in littore australi Corsicæ (Viv.) — Erucaria hypogaea Viv. Cors. 11. App. 3. t. 1. f. 2. Planta valde singularis, silicula 1-2-nodosa, loculus superior 1-spermus aut aspermus aut nullus, inferior 2-spermus, contractione 2-locularis. Nec minime referri potest Erucariæ cum in Erucariâ cotyledones replicatae subspirales et in nostra incumbentes conduplicatae sint, ut ipse vidi. An genus novum? (v. s. D.)


XLVII. RAPHANUS. Lin. gen. n. 1098. DC. syst. 2. p. 662.

Calyx erectus basi subbisaccatus ; pet. limbo obovato aut obcordato ; stam. edentula ; silicula teres stylo conico acuminata, evalvis, coriaceo-suberosa ; semina 1-serialia globosa pendula.

Sect. I. RAPHANIS. DC. l. c.

Siliqua vix ac nevix substrangulata fungosa bilocularis; semina septulis transversis distincta.

Laciniata &
nbs barbitroid - the legend



1. *R. SATIVUS* (Lin. sp. 935.) siliquis teretibus torosis acuminateis vix pedicelis longioribus. (1) ex Oriente ortus, in hortis vulgatissimus. — Lam. ill. t. 566. Fl. fr. 4. p. 641. (v. v. c.)

A. *RADICULA* radice plus minus carnosâ albâ roseâ aut rubrâ.

o. *a. rotunda* (DC.) radice subglobosa. — Lob. ic. t. 201. f. 1. Esculenta.

b. oblonga (DC.) radice oblongâ carnosâ. — Lob. ic. 201. f. 2. Esculenta.

c. oleifera (DC.) radice exili elongata vix subcarnosa. Culta rarissimè ad oleum seminum. R. Chinensis Mill.

- + B. *NIGER* radice carnosò-compactâ duriusculâ sapore acerrimâ. — Lob. ic. 202. f. 1. Variat radice oblonga et rariùs rotunda, nigrâ griseâ et rariùs alba.

Sect. II. *RAPHANISTRUM*. DC. l. c.

Siliqua per maturitatem moniliformis, articulis 1-spermis.

2. R. *RAPHANISTRUM* (Lin. sp. 953.) siliquis unilocularibus articulatis striatis 3-8-spermis stylo longioribus, foliis simpliciter lyratis. (1) in arvis, agris, cultis et arenosis ubique. — Fl. fr. 4. p. 643. — Lob. ic. 199. f. 1. Variat flore albo flavo aut purpurascente, unicolori aut venis fuscis reticulato. (v. v.)

3. R. *MARITIMUS* (Sm. engl. bot. t. 1643.) siliquis 1-loclnl. articulatis striatis 2-6-spermis, stylo conico articulo ultimo ferè breviore, foliis interruptè lyratis. (2) in maritimis Armoraciæ inter Brest et Qnimper. — Fl. fr. 5. p. 588. Flor. flavi. (v. s.)

Subordo IV. *SPIROLOBEÆ*. (o || ||) DC. syst. 2. p. 670.

Cotyledones incumbentes lineares circinnatim convolutæ. Semina subglobosa.

Trib. XII. *BUNIADEÆ* seu *SPIROLOBEÆ NUCAMENTACEÆ*. DC. syst. 2. p. 670.

Silicula nucamentacea indehiscens 2-4-locul., loculis 1-spermis.

XLVIII. *BUNIAS*. Brown. DC. syst. 2. p. 670.

Calyx basi æqualis; pet. unguiculata, limbo obcordato; stam. edentula; silicula nucamentacea. — Flores flavi.

1. B. *ERUCAGO* (Lin. sp. 935.) siliculis tetragonis, angulis cristatis, foliis radicalibus runcinatis. (1) in arvis et agris prov. austr. — Fl. fr. 4. p. 720. — C. Bauh. prod. 41. ic. (v. v.)

Subordo V. *DIPLECOLOBEÆ*. (o || || ||) DC. syst. 2. p. 776.

Cotyledones incumbentes lineares bicrures seu biplicatæ nempe bis transversè plicatæ. Semina depressa.

Trib. XIII. *SUBULARIEÆ*. DC. syst. 2. p. 697.

Silicula ovalis, septo elliptico, valvis convexis, loculis polyspermis, stigmate sessili.

XLIX. *SUBULARIA*. Lin. gen. n. 799. DC. syst. 2. p. 697.

Cal. suberectus; pet. ovalia; stam. edentula; silicula in quoque loculo 4-sperma. — Flores albi. Folia radicalia subulata.

1. S. *AQUATICA* (Lin. sp. 896.) (1) in lacibus et inundatis Vogesorum ex Lois, in piscinâ propè Basileam ex Lach. — *Draba subularia* Lam. ill. t. 556. f. 3. DC. fl. fr. 5. p. 595. (v. s. sp. ex *Campinâ Leodensi*.)

Ordo VII. CAPPARIDEÆ. Juss. gen. 242. DC. prod. 1. p. 237.


Sepala 4, nunc ferè libera, æqualia aut inæqualia, nunc basi in tubum coalita, limbo vario. Petala 4 cruciata sæpè unguiculata et inæqualia. Stamina ferè perigyna nempè toro aut imò calyci inserta, rariùs tetradynta, sæpiùs ordine quaternario multiplici disposita, definita aut indefinita. Torus hemisphæricus aut elongatus sæpè glandulifer. Thecaphorum gracile sæpè basi toro vaginatum. Ovarium stipitatum ovato-oblongum carpellis 2 arctè coalitis compositum. Stylus o aut filiformis. Fructus varius, siliquosus baccatusve, intùs 1-locularis, placentis 2 polyspermis in fructibus dehiscentibus intervalvularibus. Semina sæpiùs reniformia exalbaminosa (endoplevrà tamen tumidâ). Embryo incurvus. Cotyledones foliaceæ planiusculæ subincumbentes. — Herbæ frutices aut arbores. Stipulæ veræ nullæ. Spinae stipulares. Folia alterna petiolata. — Ordo vix in Florâ gallicâ recipiendus.


I. CAPPARIS. Lin. gen. n. 643.


Calyx 4-partitus; pet. 4; torus parvus; thecaphorum gracile; stam. 8; siliqua subbaccata stipitata. — Frutices foliis simplicibus integris.

1. C. SPINOSA (Lin. sp. 720.) spinis stipularibus uncinatis foliis subrotundis retusis, pedicellis solitariis 1-floris. ♂ in fissuris rupium mnis et lapidosis culta in Galloprovinciâ, et rariùs in Occitanîâ, agro Ruscinonensi et Turicensi. Blackw. herb. t. 417. Fl. fr. 4. p. 724. (v. v.)









**Ordo VIII. CISTINEÆ. Dunal in DC. prod. I. p. 263. — Cisti
DC. fl. fr. 4. p. 811.**

Calycis sepala 5 cum pedicello continua persistentia sæpius inæqualia, 2 exteriora cæteris minora interdùm evanida, 3 interiora per aestivationem contorta. Petala 5 hypogyna caduca æqualia per aestivationem contorta sed directione petalis contraria. Stam. numero indefinita pauca aut plurima hypogyna erecta, filam. liberis, antheris ovatis bilocul. birimosis basi insertis. Ovarium liberum. Stylus 1 filiformis. Stigma simplex; capsula constans valvis 3-5 rariùs 10 nunc medio nervum longitudinalem placentarium gerentibus et tunc capsula 1-lo-
cul., nunc nervo medio in septum plus minusve completum abeunte et tunc capsula completem aut incompletè multilocularis. Semina ideò aut placentæ nunc quasi parietali nunc septo intùs adnatae inserta, plurima, parvula. Albumen farinosum. Embryo spiralis aut curvus intrà albumen. — Suffrutices aut Herbæ. Folia simplicia penninervia integra aut subdentata, primordialia semper opposita, cætera sæpius opposita interdùm alterna, basi nunc nuda, nunc stipulis 2 foliaceis instructa. Racemi floribus sæpius 1-lateralibus successivis. Flores petalis fugacissimis diurnis flavis albis aut purpureis.

I. **CISTUS. Tourn. inst. t. 136. (DC.) fl. fr. 4. p. 811.**

Capsula 5-aut 10-locularis, valvis 5-10 medio septiferis; seminum embryo filiformis spiralis. — Frutices suffruticesve.

Sect. I. ERYTHROCISTUS. Dun. in. DC. prod. I. p. 264.

Sepala exteriora angustiora sæpè minora, interna basi concava margine scariosa; petala rosea aut purpurea; capsulae 5-loculares.

1. **C. INCANUS** (Lin. sp. 737.) foliis spathulatis tomentosis rugosis subtrinerviis sessilibus subconnatis, superioribus angustioribus, pedunculis 1-floris. ♂ in collibus incultis apricis et lapidosis Occitanie. — Fl. fr. 4. p. 812. — Clus. hist. I. p. 69. f. 1. (v. v.)
2. **C. CRISPUS** (Lin. sp. 738.) foliis sessilibus linear-lanceolatis undulato-crispis trinerviis rugosis pubescentibus, floribus subsessilibus ternis quaternisve umbellatis. ♂ in collibus apricis et lapidosis prov. oleiferarum. — Fl. fr. 4. p. 811. Cav. ic. t. 174. — Clus. hist. I. p. 69. f. 2. (v. v.)
3. **C. ALBIDUS** (Lin. sp. 737.) foliis sessilibus oblongo-ellipticis incano-tomentosis subtrinerviis, floribus 3-8 terminalibus subumbellatis, sepalis externis majoribus. ♂ in apricis lapidosis collibus prov. oleiferarum. — Fl. fr. 4. p. 812. Dun. in DC. prod. 254. — Clus. hist. I. p. 68. ic. Petala dilatè purpurea basi maculâ parvâ luteâ. (v. v.)

Sect. II. LEDONIA. Dun. l. c.

Sepala 2 exteriora majora valdè acuminata vel nulla; petala alba aut albida; stam. 10 pistillo longiora; stigma subsessile capitatum magnum; capsulae 5-10 locul. — Folia sæpè glutinosa.

* *Calycibus 5-sepalis.*

4. **C. SALVIFOLIUS** (Lin. sp. 738.) foliis petiolatis ovatis obtusis rugosis subtus

tomentosis, pedunculis longis tomentoso-albicantibus 1-floris supernè articulatis solitariis. ♂ in aridis subsylvaticis dumetis Pictaviæ, Vasconiaæ, Delphiniæ, Galloprov., Corsicæ. — Fl. fr. 4. p. 813. var. α. — Clus. hist. 1. p. 70. ic. (v. v.)

5. C. CORBARIENSIS (Pourr. ex Dun. l. c.) foliis petiolatis subcordatis ovatis acuminatis margine fimbriatis utrinquè rugosis leviter glutinosis, pedunculis longis 1-5-floris. ♂ in montibus Narbonensis dictis les Corbières. — C. hybrida. Pourr. chl. 36. C. salvifolius β Fl. fr. 4. p. 813. Rami autumnales C. populifolii ex cl. Benth. (v. v. DC.)
6. C. MONSPELIENSIS (Lin. sp. 737) foliis linear-lanceolatis sessilibus trinerviis utrinquè villosis, pedunculis cymosis subsecundis. ♂ in apricis aridis prov. oleiferarum. — Lam. ill. t. 477. f. 4. DC. fl. fr. 4. p. 814. (v. v.)
7. C. LEDON (Lam. dict. 2. p. 17.) foliis connatis oblongo-lanceolatis nervosis suprà glabris nitidis subtus villoso-sericeis, floribus corymboso-cymosis, pedunculis calycibusque villoso-sericeis. ♂ in aridis dumetis Occitaniae et Galloprov. — Duham. arb. ed. nov. 1. p. 168. t. 66. Fl. fr. 4. p. 814. (v. v.)
8. C. HIRSUTUS (Lam. dict. 2. p. 17.) foliis sessilibus oblongis obtusis hirsutis, pedunculis brevibus 1-floris aut cymoso-multifloris, capsulis parvis calyce maximo hirsuto et pyramidali tectis. ♂ in Armoraciâ propè Landerneau. — Fl. fr. 5. p. 621. excl. syn. Ait. ex Dun. DC. prod. 1. p. 265. (v. s.)
9. C. LONGIFOLIUS (Lam. dict. 2. p. 16.) foliis breviter petiolatis oblongo-lanceolatis margine pubescens et undulatis subtus venosis, pedunculis cymosis bracteolis infimis caducis. ♂ in sterilibus ad Donos et Fontfroide circa Narbonam. — Fl. fr. 4. p. 813. (v. s.)
10. C. POPULIFOLIUS (Lin. sp. 736) foliis petiolatis cordatis acuminatis lœvibus, floribus cymosis, pedunculis bracteatis, bracteolis oblongis infimis caducis. ♂ var. α pedunculis longè hirsutis in Mauritania. Var. β calycibus glabriuscens ad Fontlaurier in montibus Corbariensis agri Narbonensis. — Fl. fr. 5. p. 620. — Clus. hist. 1. p. 78. f. 1. 2. (v. s.)

** *Calyibus 3-sepalis.*

11. C. LAURIFOLIUS (Lin. sp. 736.) foliis petiolatis ovato-lanceolatis trinerviis suprà glabris subtus tomentosis, petiolis basi dilatatis connatis, capsulis 5-locularibus, stigmate sessili. ♂ in collibus aridis subsylvaticis Occitaniae, Vasconiaæ, agri Ruscinonensis. — Fl. fr. 4. p. 814. — Clus. hist. 1. p. 78. f. 1. (v. v.)

12. C. LADANIFERUS (Lin. sp. 737.) foliis subsessilibus basi connatis linear-lanceolatis suprà glabris subtus tomentosis, capsulis 10-locularibus. ♂ circa Forum-Julii (cl. Solier.) (v. s.)

II. HELIANTHEMUM. *Tourn. inst. 128. DC. fl. fr. 4. p. 815.*


Calyx 3-sepalus aut 5-sepalus, sepalis 2 exterioribus minoribus; capsula trivalvis valvis medio septi aut seminiferis; embryo uncinato-inflexus. — Herbæ aut suffrutices.

Sect. I. HALIMIUM. *Dun. in. DC. prod. 1. p. 267.*

Calyx 3 raro 5 sepalus, sepalis 2 externis minutis; stigma capitatum sub 3-lobum. — Suffrutices. Folia exstipulata.

1. H. UMBELLATUM (Mill. dict. p. 5.) caule ramoso, ramis junioribus tomentoso-pilosus viscosis, foliis sessilibus lineari-oblongis margine revolutis viscosis subtus tomentosis, pedunculis unifloris racemoso-vorticillatis terminalibus umbellatis, calyx trisepalo villoso. ♂ in dumetis circa Fontembleaudi Cœnomanum, Aureliam, Burdigalam (Laterr.), Aginnum et in agro Ruscinensi. — Fl. fr. 5. p. 815. (v. v. DC.)
2. H. ALYSOIDES (Vent. choix. t. 20.) caule ramosissimo diffuso patulo, foliis sessilibus basi attenuatis oblongo-ovatis obtusiusculis breviter hirsutis, pedunculis terminalibus solitariis seu umbellatis 1-2 floris folio longioribus,





calycibus 3-sepalis acuminatis hirsutis. ♂ in Galliâ occidentali. — Fl. fr. 4. p. 818. (v. v.)

β. rugosum foliis margine subdenticulatis subcrispis utrinque tomentoso-rugosis subtus incano-sericeis, pedunculis folio brevioribus. In Galliâ occidentali circâ Burdigalam. — H. alysoïdes β Fl. fr. 5. p. 622. H. rugosum Dun. in DC. prod. 1. p. 268. (v. s.)

3. *H. HALIMIFOLIUM* (Willd. enum. 569.) caule fruticoso erecto ramoso, foliis utrinquè leproso-candidis subpetiolatis ovato-oblongis, pedunculis longis subpaniculatis, calycibus 5-sepalis. ♂ in Corsicâ. — Fl. fr. 5. p. 621. — Lob. ic. 2. p. 113. f. 1 et 2. (v. s.)

Sect. II. TUBERARIA. *Dun. l. c. p. 270.*

Calyx 5-sepalus, sepalis externis minoribus vel majoribus; stamina numerosa pistillo multò longiora; stylus subnulus. — ♀ aut ○. Folia inferiora opposita exstipulata, superiora interdùm alterna sæpius stipulata, stipulis longis linearí-acutis.

4. *H. TUBERARIA* (Mill. dict. n. 10.) caulinibus subsimplicibus, foliis radicalibus in petiolum attenuatis ovato-oblongis canescensibus subtus nervosis, caulinis sessilibus subglabris lanceolatis, calycibus glabris nitidis. ♀ in rupes-tribus Niceæ, Galloprov., Corsicæ. — Fl. fr. 4. p. 818. — J. Bauh. 2. p. 12. f. 4. et p. 13. f. 1. (v. v.)

5. *H. PLANTAGINEUM* (Pers. enc. 2. p. 77.) caule hirsuto, foliis elliptico-lanceolatis oppositis sessilibus, subtus in nervis hirsutis, supra hirsutis, summis oblongo-linearibus stipulatis subalternis, racemis brevibus ebracteatis, sepalis externis subglabris angusto-linearibus internos villoso-incanos subæquantibus, petalis denticulatis. ① in Corsicâ. — Dun. l. c. An a seq. satis distincta? (v. s.)

6. *H. GUTTATUM* (Mill. dict. n. 18.) caule subhirsuto, foliis oppositis sessilibus oblongo-linearibus villoso-hirsutis, extremis alternis, racemis laxis ebracteatis, pedicellis filiformibus subnudis, sepalis externis internis dimidiò brevioribus. ① in Galliâ mediâ, australi et occidentali. — Fl. fr. 4. p. 819. 5. p. 623. Cum hac specie conjungit cl. Bentham sp. præcedentem et 3 subsequentes, forsas non immerito. (v. v.)

7. *H. ERIOCaulon* (Dun. l. c.) caule ramoso 2-3-chotomo hirsutissimo, foliis oblongo-linearibus angustis hirsutis oppositis, superioribus stipulatis, extremis alternis, racemis simplicibus ebracteatis, pedicellis filiformibus longis pilosis, sepalis externis angustis. ① in Galliâ ex Dun. (v. s. ex Hispaniâ.)

8. *H. INCONSPICUUM* (Pers. enc. 2. p. 77.) caule ramoso 2-3-chotomo parçè hirsuto gracili, foliis oblongo-linearibus angustis hirsutis oppositis, superioribus stipulatis, extremis alternis, racemis longis filiformibus, pedicellis brevibus secundis, floribus minutis, petalis oblongo-linearibus calyce minoribus altero margine pilosis. ①? in Corsicâ. — Dun. l. c. (v. s.)

9. *H. PUNCTATUM* (W. enum. 570.) caule ramoso dichotomo puberulo subcinereo, foliis oblongis 3-5-nerviis viridi-cinereis breviter piloso-scabriusculis, pilis stellatis mininis, superioribus alternis acutiusculis stipulatis, racemis longis pubescentibus cinereis paucifloris. ① in Galliâ occidentali circâ Dax. — Dun. l. c. An sp. distincta? (v. s.)

Sect. III. BRACHYPETALUM. *Dun. l. c. p. 271.*

Calyx 5-sepalus, sepalis externis minutis, internis 3-nerviis acuminatis, petala sæpè calyce breviora; stamina 10-20; capsula 3-quetra subnitida. — Herbæ ○. Folia petiolata, stipulata, stipulis oblongo-linearibus.

10. *H. LEDIFOLIUM* (W. enum. 571.) caule erecto subglabro, foliis petiolatis oblongo-ellipticis subdenticulatis glabriusculis tomentosive oppositis, superioribus alternis floribus oppositis, pedunculis glabriusculis tomentosive erectis calyce brevioribus, calycibus acuminatis subpubescentibus. ○ in siccis

Niceæ, Galloprov., Occitanie. — Fl. fr. 4. p. 819. — Lob. ic. 2. p. 118. f. 2.
H. Niloticum Pers. Dun. in DC. prod. 1. p. 272. (v. s.)

11. H. INTERMEDIUM (Thib. ex Dun. l. c.) caule erecto ramoso, foliis obovato-oblongis petiolatis obtusiusculis subdenticulatis, summis alternis oppositi-floris, pedunculis folio longioribus calycibusque villosa-cinereis, calycibus fructiferis oblongo-lanceolatis erectis. (1) ad vias circa Celleneuve propè Monspelium ex cl. Benth. cat. 84. — Cav. ic. t. 144. (v. s. ex Hisp.)

12. H. DENTICULATUM (Pers. enc. 2. p. 78.) caule ramoso erecto vel patulo, ramis tomentoso-pubescentibus apice subcinereis, foliis breviter petiolatis obovato-oblongis acutiusculis subdenticulatis tomentosis subtus incano-sericeis, stipulis linearibus, pedunculis calycibusque oppositis bracteis, bracteis alternis subincisis. (1) in Occitanie, et agro Ruscin. ex Benth. Bracteæ subovatae. (v. s.)

13. H. SALICIFOLIUM (Pers. l. c.) caule ramoso, ramis subhirsutis, foliis breviter petiolatis obovato-oblongis acutiusculis denticulatis subtomentosis, stipulis linear-oblongis, pedunculis calycibusque hirsutis suboppositibracteis, bracteis ovatis acuminatis integris. (1) in sterilibus Niceæ, Galloprov., Lugduni, Pictavia. — Fl. fr. 4. p. 820. — Seg. ver. 3. t. 6. f. 3. (v. v.)

Sect. iv. FUMANA. Dun. l. c. p. 274.

Calyx ante anthesin apice tortus 5-sepalus, sepalis externis angustis parvulis, internis 3 ovato-acuminatis 4-5-venosis margine scariosis; petala calyce subduplo longiora; stamina pauca; stigma sub-3-lobum; capsula 3-valvis. — Caules ♂. Folia linearia.

14. H. FUMANA (Mill. dict. n. 6.) caule ramoso tortuoso subdiffuso erecticulo, foliis exstipulatis alternis margine piloso-scabriusculis subinvolutis, inferioribus brevibus confertis, pedunculis folio longioribus, capsulis apertis nudis. ♂ in collibus apricis. — Fl. fr. 4. p. 816. — Desf. atl. 1. t. 105. — Barr. ic. 286 et 446. (v. v.)

15. H. PROCUMBENS (Dun. l. c.) caule procumbente ramoso, ramis elongatis junioribus canescensibus, foliis exstipulatis alternis sublaxis margine et subtus pilosis, pilis strigosis, pedunculis folio brevioribus, capsulis apertis semina gerentibus. ♂ in Gallia australi. — Barr. ic. 445. An praecedentis var. ut vult cl. Bentham? (v. s.)

16. H. LÉVIPES (W. enum. 370.) caule ascendente, foliis alternis setaceis glaucis subglabris stipulatis, stipulis filiformibus longis, pedunculis longis racemosis secundis, pedicellis glabris basi bracteatis, calycibus hirsutis. ♂ inter saxa aprica in provinciis mediterraneis. — Fl. fr. 4. p. 816. Ger. Gallopr. t. 14. (v. v.)

17. H. GLUTINOSUM (DC. fl. fr. 4. p. 821.) caule ascendentem ramis villosa-glutinosis subcinereis, foliis sublinearibus margine revolutis villosa-glutinosis oppositis, summis alternis, stipulis mucronatis erectis, pedunculis calycibusque villosa-glutinosis, seminibus tenuissimè excavato-punctatis. ♂ in Gallia australi. — Barr. ic. t. 415. (v. v.)


♂. *thymifolium* (DC. l. c.) foliis glabriusculis brevioribus. H. thymifolium Pers. Dun. in DC. prod. 1. p. 276. — Barr. ic. t. 444. (v. s.)

γ. *juniperinum* (Benth.) foliis inferioribus glabris. H. juniperinum Lag. ex Dun. l. c. — Barr. ic. t. 443. (v. s.)

Sect. v. PSEUDOCISTUS. Dun. l. c.

Calyx 5-sepalus, sepalis externis angustis minutis, internis 4-veniis; petala calyce vix duplo longiora; stylus basi contortus; stigma capitatum 8-lobum. — Herbae ♀ aut ♂. Folia petiolata opposita rarò stipulata.

18. H. ORGANIFOLIUM (Pers. enc. 2. p. 76.) caule suffruticoso 2-3-chotomo, foliis petiolatis ovatis utrinquè pilosis, racemis brevibus terminalibus, petalis calyce vix majoribus. ♂ circa Alais et Monspelium. — Cav. ic. 3. t. 262. f. 1. (v. v. DC.)





19. *H. OELANDICUM* (DC. fl. fr. 4. p. 817.) caule suffruticoso procumbente ramoso, foliis lanceolato-ellipticis obtusiusculis utrinquè viridibus sæpè glabris interdùm ciliatis petiolatis, summis sessilibus, racemis simplicibus paucifloris, calycibus subgloboso-ovatis. ♂ in Alpibus? — *C. oelandicus* L. sp. 741. Clus. hist. p. 73. ic. Petala calyce vix longiora. (v. s. ex Sueciâ.)
20. *H. ALPESTRE* (Dun. in DC. prod. 1. p. 276.) caule suffruticoso procumbente ramoso, ramis piloso-hirsutis, foliis utrinquè subviridibus oblongo-ellipticis subglabris vel fasciculatim piloso-hirsutis petiolatis, summis sub-sessilibus, pedicellis calycibusque piloso-hirsutis, pilis albido-cinereis. ♂ in petrosis montosis Jurassi, Galliae australis, occidentalisque. — *C. alpestris* Crantz. Aust. t. 6. f. 1. Petala calyce duplò longiora. (v. v.)
21. *H. PENICILLATUM* (Thib. ex Dunal. l. c.) caule suffruticoso, ramis procumbentibus longis foliisque viridibus utrinquè hispidis, inferioribus petiolatis ovatis, superioribus linearis-oblongis subsessilibus, calycibus hispidis, floribus minutis. ♂ circâ Monspelium, et in aridis apricis prov. medit. An sp. satis distincta? (v. s.)
22. *H. ITALICUM* (Pers. enh. 2. p. 76.) caule suffruticoso, ramis simplicibus erectis longis piloso-tomentosis, foliis piloso-hispidae, pilis strigosis adpressis, inferioribus ovatis, superioribus lanceolatis oblongis, calycibus piloso-hispidae canescentibus. ♂ in siccis Cebennarum et probabiliter omnis regionis mediterraneæ. — Barr. rar. t. 366. (v. s.)
23. *H. CANUM* (Dun. in DC. prod. 1. p. 277.) caule suffruticoso procumbente, ramis ascendentibus piloso-tomentosis incanis, foliis ovatis ellipticisve pilosis subtûs tomentoso-canis, pedicellis calycibusque piloso-canescensibus. ♂ in rupibus apricis submontanis. — *Cistus canus*. L. sp. 740. *H. vineale* Pers. Dun. l. c. *Cistus piloselloides* Lapeyr. Abr. 301. — Clus. hist. 1. p. 74. f. 1. An satis à sequenti distinctum? (v. v.)
24. *H. MARIFOLIUM* (DC. fl. fr. 4. p. 817.) caule suffruticoso procumbente, foliis exstipulatis petiolatis ovato-cordatis vel ovatis acutiusculis suprà viridibus pilosis subtûs incanis, racemis solitariis simplicibus paucifloris terminalibus elongatis. ♂ in montosis australioribus. — Barr. t. 441. (v. v.)

Sect. VI. EUHELIANTHEMUM. *Dun. l. c.*


Calyx antè anthesin apice subtortus, 5-sepalus, sepalis externis multò minoribus, internis 2 sèpius 4-costatis sulcatis; petala calycibus 2-4-plo longiora; stylus basi flexus; stigma simplex; capsula calyce obtecta 1-locularis. ♂ foliis oppositis breviter petiolatis, stipulis linearis-lanceolatis.

* *Petalis luteis.*

25. *H. LAVANDULÆFOLIUM* (DC. fl. fr. 4. p. 820.) caule erecto ramoso, ramis canescentibus, foliis oblongo-linearibus margine revolutis subtûs tomentoso-incanis, junioribus utrinque canescentibus, stipulis bracteisque linearis-acutis ciliatis, floribus confertis, sepalis glaucis ciliatis, internis acutis. ♂ in Corsicâ et circâ Massiliam. — Barr. ic. t. 288. (v. v.)
26. *H. STÆCHADIFOLIUM* (Pers. enh. 2. p. 79.) caule erecto, ramis tomentoso, canescentibus, foliis oblongo-linearibus obtusiusculis utrinquè subtûs tomentoso-incanis marginе revolutis, stipulis subvillosis linearis-lanceolatis, floribus confertis, sepalis villosis externis ciliatis viridibus, internis acuminatis incanis. ♂ in Corsicâ (Salzmann.) — Dun. in DC. prod. 1. p. 279. (v. s.)
27. *H. TOMENTOSUM* (Dun. in DC. Prod. 1. p. 729.) caule suffruticoso ramoso, ramis elongatis subcanescentibus, foliis lanceolato-oblongis margine sèpè revolutis, subtûs incano-tomentosus suprà glabriusculis, calycibus sulcatis, nervis elevatis pilosis. ♂ in Galliâ ex Dun. (v. s. in Hisp.)
28. *H. ACUMINATUM* (Pers. enh. 2. p. 79.) ramis erectis, foliis longè petiolatis oblongis margine revolutis utrinquè viridibus pilosis subtûs tomentosiusculis, stipulis subglabris linearibus petiolo longioribus, racemis laxis, calycibus glabris nitidis. ♂ in agro Niceensi. An cum sequenti conjungendum ut vult cl. Benth? (v. s.)

29. *H. VULGARE* (Gærtn. fruct. 1. p. 371. t. 6.) caule suffruticoso procumbente ramoso, foliis marginé vix revolutis subtus incano-cinereis supra viridibus pilosis subciliatis, inferioribus suborbiculatis, superioribus oblongis, stipulis oblongo-linearibus ciliatis petiolo longioribus pedicellis calycibusque pilosis. ♂ in sylvis siccis frequens. — Fl. fr. 4. p. 821. Fl. dan. t. 101. *Cistus hirsutus* Lapeyr. Abr. 303. ex atopiâ cl. Arnott. (v. v.)
30. *H. GRANDIFLORUM* (DC. fl. fr. 4. p. 801.) caule suffruticoso ascendente, foliis superioribus subplanis oblongis pilosiusculis subtus nunc viridibus nunc dilutè cinereis, stipulis ciliatis petiolo sublongioribus, floribus magnis, calycibus subhirsutis. ♂ in Pyrenæis et Galloprovinciæ alpestribus. — Scop. Carn. ed. 2. t. 25. (v. v.)
31. *H. OBSCURUM* (Pers. enc. 2. p. 79.) caule suffruticoso ascendente ramosissimo, foliis utrinquè hirsutis subviridibus, superioribus ellipticis, stipulis ciliato-hirsutis petiolo longioribus, racemis longis, calycibus hirsutis. ♂ in sylvis. — Fl. fr. 5. p. 624. var. α (v. v.)
β. nummularium (DC.) foliis inferioribus orbiculatis, superioribus oblongo-linearibus. — In Galliâ australi. — Fl. fr. 5. p. 624. — J. Bauh. hist. 2. p. 20. f. 3. An haec 4 species meritò distinguuntur? (v. s.)
32. *H. HIRTUM* (Pers. l. c.) caule suffruticoso ramoso ramis cinereis, foliis ovatis oblongisve margine revolutis tomentoso-hirtis subtus canescentibus supra viridi-cinereis, stipulis angustis petiolo sublongioribus, calycibus hirsutissimis albidis. ♂ in aridis Galliæ australis. — Fl. fr. 4. p. 822. Cav. ic. 2. t. 146. Calyces parvi. (v. v.)
- * * *Petalis coloratis.*
33. *H. PILOSUM* (Pers. enc. 2. p. 79.) caule ramoso ramis erectiusculis, foliis linearibus lineari-oblongisve utrinquè incauis apice setosis, stipulis subulatis, calycibus pilosiusculis nervoso-striatis. ♂ in apricis Galliæ australis. — Fl. fr. 4. p. 823. — All. ped. t. 45. f. 2. (v. v. DC.)
34. *H. APENNINUM* (DC. fl. fr. 4. p. 824.) caule ramoso ramis patulis, foliis petiolatis oblongo-linearibus margine vix revolutis subtus tomentosis supra glaucescentibus, stipulis subulatis petiolo longioribus, calycibus brevissimè villosis striatis glauco-cinereis obtusiusculis. ♂ circè Parisios, in Jurasso australi, Occitania, Andegaviâ. (Bast.) (v. s.)
β. hispidum, calycibus piloso-hirsutis. — In Galliâ australi. (Dun.) — *H. hispidum*. Dun. in DC. Prod. 1. p. 282. (v. s. ex Liguriâ.)
35. *H. PULVERULENTUM* (DC. fl. fr. 4. p. 823.) caule ramosissimo prostrato, foliis oblongo-linearibus margine revolutis obtusis subtus incanis supra glaucis, stipulis subulatis petiolo longioribus, calycibus canescentibus minutè tomentoso-pubescentibus. ♂ in collibus sterilibus Galliæ mediae et australis. — Petala alba. (v. v.)
36. *H. POLIFOLIUM* (DC. fl. fr. 4. p. 823.) ramis procumbentibus glabriusculis, foliis oblongis ovatis obtusiusculis subplanis subtus tomentoso-incanis supra glabris, stipulis bracteisque linearibus viridibus ciliatis, calycibus striatis glabriusculis subnitidis. ♂ in sylvis Galliæ ex Lam. et Dun. — Dill. elth. t. 145. f. 172. Petala alba. (v. s. ex Angliâ.)
37. *H. ROSEUM* (DC. fl. fr. 4. p. 822.) caule subprocumbente tomentosiusculo, foliis ovato-lanceolatis utrinquè tomentosiusculis subtus pallidè cinereis, stipulis linearibus, pedicellis calycibusque piloso-subhirsutis. ♂ circè Niçæam et in Pyrenæis. — All. ped. t. 45. f. 4. *H. vulgare* γ versicolor Benth. An *H. vulgaris* varietas? (Dun.) (v. s.)
38. *H. MAJORANÆFOLIUM* (DC. fl. fr. 5. p. 625. α.) caule erecto ramosissimo, foliis petiolatis ovato-oblongis acutiusculis margine revolutis subtus incano-tomentosis supra viridi-glauciscentibus tomentoso-hirtis, stipulis subulatis setosis, calycibus hirsutissimis, pilis albidis. ♂ circè Monspelium, Vindomagum, Arelatem. (v. s.)





Ordo IX. VIOLARIEÆ. DC. fl. fr. 4. p. 801. Juss. ann. mus. 18. p. 476.

Calyx sepalis 5 persistentibus liberis aut basi inter se sub-coalitis sæpius deorsum productis, aestivatione imbricata. Petala 5 cum sepalis alterna, hypogyna, thalamo inserta, (in nostris) inæqualia; inferius basi calcaratum cucullatumve. Stam. 5 thalamo inserta cum petalis (in nostris) alterna; antheræ 2-loculares, sæpè liberæ, ovario adpressæ interdùm basi plus minusve in discum monadelphum solutæ; filamenta sæpissimè dilatata. Ovarium 1-loculare, placentis 3 parietalibus, stylus 1; capsula 3-valvis polysperma. Albumen carnosum. Embryo rectus.—Herbæ aut suffrutices foliis sæpius alternis, stipulatis.

I. *VIOLA*. Tourn. inst. 419. t. 286. Ging. in DC. Prod. 1. p. 291.

Calyx sepalis in appendices basi productis; petala inæqualia, inferiorius deorsum in calcar cavum plus minus productum; stamina approximata aut coarctata (nec coalita), filamentis basi dilatatis.

Sect. I. NOMIMUM. Ging. l. c.

Stigma rostratum, foraminulo ad extremitatem rostri sito; stylus ab apice ad basin attenuatus; capsula sæpius 3-gona.

§. 1. *Stigmatibus apice depressis; caulis subnullis.*

1. *V. Pinnata* (L. sp. 1323.) stigmate 3-angulari marginato, radice divisâ sublignosâ, foliis pinnatis multipartitis partitionibus multilobatis, sepalis ovatis. ♀ in Alpibus Delphinatûs ex Vill. — Fl. fr. 4. p. 802. — J. Bauh. 3. p. 544. f. 2. (v. s. ex Helv.)
2. *V. PALUSTRIS* (L. sp. 1324.) stigmate marginato, radicibus articulatis squamosis, foliis reniformi-cordatis, stipulis lato-ovatis acuminatis, sepalis ovatis obtusis, capsula oblongo-trigonâ. ♀ in muscosis humidis montanis — Fl. fr. 4. p. 804. — Moris. s. 5. t. 35. n. 5. (v. v.)

§. 2. *Stigmatibus convexis, deorsum immarginatis.*

3. *V. HIRTA* (L. sp. 1324.) villosa, stigmate uncinato aento nudo, foliis cordatis, stipulis glandulosis dentatis, sepalis ovatis obtusis margine ciliatis, petalis 2 mediis subbarbatis, calcare subconico nectariis glabris, capsulis turgidis hirtis. ♀ in nemorosis et pratis. — Fl. fr. 4. p. 802. — Moris. s. 5. t. 35. n. 4. (v. v.)
4. *V. PYRENAICA* (Ram. in DC. fl. fr. 4. p. 803.) stigmate uncinato nudo, foliis latè subcordatis, petiolis apice dilatatis, sepalis ovatis obtusis. ♀ in petrosis Pyrenæorum (v. s.).
5. *V. ODORATA*. (L. sp. 1324.) stigmate uncinato nudo, foliis rotundato-cordatis, sepalis ovatis obtusis, calcare obtusissimo, capsula turgidâ hirtâ, stolonibus flagelliformibus. ♀ in nemorosis et sepibus. — Fl. fr. 4. p. 803. Bull. herb. t. 169. (v. v.)
6. *V. MIRABILIS* (L. sp. 1326.) stigmate subreflexo nudo, caulis rigidis petiolisque villosis, pilis secundis, foliis reniformi-cordatis acuminatis, sepalis 3 maximis oblongis acuminatis, calcare cylindrico obtuso longo, capsulae valvis peracuminatis. ♀ in sylvis et dumetis montium Delphinatûs ex Vill. — Fl. fr. 4. p. 805. — Dill. elth. t. 303. f. 390. (v. s. ex Pedem.)

7. *V. CANINA* (L. sp. 1324.) stigmate papilloso subreflexo, caule adultiore ascendentē ramoso glabro, foliis cordatis, stipulis acuminatis pectinatim tenuiter laceris, sepalis subulatis, pedunculis glabris, capsulae elongatae trigonae valvis acuminatis, seminibus pyriformibus fuscis. $\frac{2}{3}$ in sylvis dumetis sepibusque. — Fl. 4. p. 806. — J. Bauh. hist. 3. p. 544. f. 1. (v. v.)
f. minor (DC. fl. fr. 5. p. 617.) canle brevissimo, foliis reniformi-cordatis glabriusculis. In Jurasso, Alpibus, Pyrenæis. (v. v.)
8. *V. ARENARIA* (DC. fl. fr. 4. p. 806.) pruinoso-pubescentis, stigmate papilloso subreflexo, caulis simplicibus erectiusculis, foliis cordato-subrotundis, stipulis erectis inciso-dentatis, sepalis lanceolato-oblongis, capsulis turbinato-ellipticis obtusis pubescentibus, semin. ovatis castaneis. $\frac{2}{3}$ in montibus Galloprov. superioris. — Pio diss. t. 1. f. 2. (v. v.)
9. *V. PUMILA* (Vill. dauph. 2. p. 266. cat. strasb. t. 5.) glabriuscula, stigmate papilloso subreflexo, caulis ramosis diffusis procumbentibus, foliis ovato-lanceolatis, petiolis marginatis, stipulis ovato-lanceolatis dentatis incisive, calcare cylindrico apice subrecurvo obtuso sepa vix aequante, valvis subrectis glabris apice truncatis, sem. ovatis nigro-castaneis. $\frac{2}{3}$ in Delphinatū monte Corps, in arenosis Vasconia, turfosis Jurassi. — Fl. fr. 5. p. 618.
a. lancifolia (Ging.) foliis lanceolatis basi in petiolum gradatim attenuatis. — In arenosis Vasconia. *V. lancifolia* Thore. DC. fl. fr. p. 807. (v. v.)
f. erectorum (Ging.) foliis basi truncatis vel subcordatis in petiolum abrupte attenuatis. — In ericetis turfosis Jurassi, Delph., Vasconia. (v. v.)
γ. littoralis (Ging.) caulis elongatis, floribus apetalis. — Circè Burdigalam reperiit cl. Desmoulins. (v. s.)
10. *V. MONTANA* (L. sp. 1325.) glabriuscula, stigmate papilloso subreflexo, caulis simplicibus erectis, foliis imis cordatis, superioribus ovatis acutis, petiolis marginatis, stipulis oblongis dentatis incisis, calcare conico truncato recto sepalis breviore, valvis arcuatis subacutis. $\frac{2}{3}$ in pratis humidis Galliæ borealis et mediae. — Fl. fr. 4. p. 807. — Camer. epit. 911. ic. Flores albi demùm coerulentes. (v. v. DC.)
11. *V. ARBORESCENS* (L. sp. 1325.) stigmate uncinato nndo, caulis fruticulosus, ramosis erectis teretiusculis pubescentibus, foliis lanceolatis basi attenuatis, stipulis oblongis adhaerentibus, calcare cincinnato obtuso auriculas vix superante, valvis naviculatis obtusis oligospermis. $\frac{2}{3}$ in saxosis et sabuletis maritimis circè Telonem, Narbonam et in Corsicâ. — Fl. fr. 5. p. 618. — Barr. ic. t. 568. (v. s.)

Sect. II. DISCHIDIUM. Ging. l. c. p. 300.


Stigma erostratum, apice plus minus 2-lobum, foraminulo inter lobos sito; stylus ab apice ad basin attenuatus; capsula sèpè 3-gona oligosperma.


12. *V. BIFLORA* (L. sp. 1326.) stigmate bifido, lobis crassis divergentibus, foliis reniformibus, stipulis ovatis, sepalis linearibus, petalis glabris, calcare brevissimo. $\frac{2}{3}$ in humidis montanis. — Fl. fr. 4. p. 808. — J. Bauh. hist. 3. p. 545. f. 1. — Pluck. t. 233. f. 7. (v. v.)

Sect. III. MELANIUM. DC. prod. 1. p. 301.

Stigma urceolatum utrinquè fasciculis pilorum onustum, aperturâ magnâ infernè labello munitâ; stylus ab apice ad basin attenuatus; capsula obsoletè hexagona.

13. *V. NUMMULARIFOLIA* (All. ped. t. g. f. 4.) glaberrima, caulis ramosis decumbentibus, foliis subrotundis integris, stipulis lanceolatis setoso-dentatis, sepalis oblongis, calcare breviusculo. $\frac{2}{3}$ in saxosis Alpium Delph., Corsicæ. — Fl. fr. 4. p. 804. — Bocc. mus. 2. p. 163. t. 127. (v. s.)
14. *V. CORNUTA* (L. sp. 1325.) radice fibrosâ diffusâ, caulis ascendentibus, foliis cordato-ovatis crenatis ciliatis, stipulis obliquè cordatis inciso-dentatis ciliatis, sepalis subulatis, calcare subulato calyce longiore. $\frac{2}{3}$ In Pyrenæis. — Fl. fr. 4. p. 810. bot. mag. t. 791. (v. v.)





15. *V. CENISIA* (All. ped. n. 1651.) radicis trunko subfusiformi lignoso, caulinibus diffusis procumbentibus indivisis, foliis spathulato-ovatis oblongis integris, stipulis integris vel palmatisectis segmentis obovatis folio simillimis integris, calycibus pubescentibus, calcare tubuloso acuto calycem æquante. \mathcal{U} in Alpibus. — Ging. in DC. prod. 1. p. 301.
a. ovatifolia (Ging.) foliis omnibus ovatis vix pubescentibus. — In saxosis Alpium Galloprovinciæ. V. Cenisia All. ped. t. 22. f. 6. Fl. fr. 4. p. 805. (v. s.)
β. diversifolia (Ging.) foliis imis ovatis, superioribus oblongis tomentoso-pubescentibus. — In Pyrenæis. V. Cenisia Lapeyr. abr. (v. v.)
16. *V. CALCARATA* (L. sp. 1325.) radice fibrosâ diffusâ, caulinibus simpliciusculis cespitosis, foliis spathulate-subrotundis elongatisve crenatis, stipulis palmatisidis integrisve, sepalis oblongis glanduloso-denticulatis, calcare subulato calyce longiore, nectario staminibus vix duplò longiore. \mathcal{U} in editioribus montibus. — Fl. fr. 5. p. 810. — Barr. ic. 692. (v. v.)
β. Bertolonii (Ging.) caulinibus elongatis, foliis imis ovatis, extimis elongatis stipulisque palmatidis glabriusculis. — In montibus Corsicæ. — V. Bertoloni Pio. diss. t. 3. f. 2. (v. s.)
γ. decipiens (Ging.) caulinibus elongatis, foliis stipulisque hispidis, sepalis lanceolatis hispidulis. — In Pyrenæis orient. V. hispida Lapeyr. abr. 123. excl. syn. (v. s.)
17. *V. SUDETICA* (W. enum. supp. 12.) radice fibrosâ diffusâ, caulinibus simpli-ciusculis, foliis ovato-oblongis, stipulis palmatidis lobis integris, sepalis lanceolatis, petalis cuneatis longè unguiculatis discretis, calcare subulato acutiusculo porrecto nectario staminibus vix longiore. \mathcal{U} in pratis Vogesorum, montium Arverniæ, Galloprov. et agri Ligericini. — V. Grandiflora. Fl. fr. 5. p. 620. — Hall. helv. t. 17 f. 1. (v. v.)
18. *V. ROTHOMAGENSIS* (Desf. cat. 153.) hispida, radice subfusiformi, caulinibus ramosis diffusis, foliis ovalibus, imis subcordatis, stipulis pinnatifidis, calcare tubuloso obtuso sepalis breviore. \mathcal{U} in rupibus et aggeribus cretaceis à Rothomago ad Mimatem. — Fl. fr. 4. p. 809. Pio diss. t. 2. Vix ac ne vix differt à *V. tricolor*. (Ging.) (v. s. D.)
19. *V. TRICOLOR* (L. sp. 1826.) radice subfusiformi, caulinibus ramosis diffusis, foliis imis ovato-cordatis, stipulis runcinato-pinnatifidis, lobo medio crenato, petalis breviter unguiculatis incumbentibus, calcare crasso obtuso non porrecto, nectariis brevibus. (I) (2) in arvis. — Fl. fr. 4. p. 808. — Cam. ep. 912. ic.
a. hortensis (DC. prod. 1. p. 303.) petalis intensè velutinis calyce multò majoribus. In hortis culta. (v. v.)
β. degener (DC.) subramosa, floribus 3-coloribus subvelutinis calyce paulò majoribus, stipulis maximis. In oleraceis. (v. v.)
γ. alpestris (DC.) elongata, foliis remotis, floribus sulfureis purpureo-maculatis calyce majoribus. In pratis Alpium. (v. v.)
δ. purpurea (DC.) foliis ovatis, sepalis breviusculis latis valde appendiculatis, floribus purpureis calyce majoribus. In Armoricæ inferioris campis. (v. s.)
ε. arvensis (DC.) caulinibus ramosis assurgentibus, petalis calyce vix longioribus flavescens vel purpureo-maculatis. In agris et arenosis frequens. — V. arvensis Fl. fr. 4. p. 808. — Cam. ep. 918. ic. (v. v.)
ζ. sabulosa (DC.) caulinibus plurimis diffusis, foliis remotis ovatis elongatis angusto-lanceolatis corollâ vix brevioribus. — In arenosis maritimis. (v. s.)
η. bellidioides (DC.) hispida, caulinibus brevissimis, foliis subrotundis confertis, petalis calyce brevioribus. In arenosis Corsicæ et circè Mons-pelium. (v. s.)
ι. nana (DC.) glabriuscula, caule brevissimo, cotyledonibus per anthesim persistentibus. In arenosis maritimis Neustriæ. (v. s.)

**Ordo X. RESEDACEÆ. DC. theor. 214. ess. prop. ed. 2.
p. 110. — Capparidum. gen. Juss.**

Sepala 4-6 cum pedicellis continua persistentia. Petala 4-6 sepalis alterna, hypogyna, inæqualia, superiora ungue squamiformi limbo palmati-partito, lateralia 2-3-loba, infima minora integra. Stam. 10-24 hypogyna, filamentis sæpiùs basi plus minusve inter se coalitis mono-aut polyadelphis, antheris 2-locularibus erectis. Squama nectarifera obtusissima toro sub staminibus inserta. Torus nunc brevissimus nunc stipitiformis. Ovaria 3-6 nunc libera summo toro inserta monostyla, nunc valvatim coalita in ovarium unicum stylis brevibus 3-6 conicis cum suturis ipsis continuis coronatum. Carpella ideò nunc libera folliculiformia intùs dehiscentia oligosperma, nunc coalita in capsulam suturis indehiscentibus 3-6-valvem apice hiantem intùs unilocularem polyspermam stylis 3-6 coronatam. Placentæ 3-6 in medio carpellorum aut valvularum adnatæ sæpiùs polyspermæ, interdùm (in carpellis liberis) 1-2-spermæ. Semina secùs placentas biserialia subpendula testâ crustaceâ instructa. Albumen nullum aut tenue carnosomembranaceum. Embryo arcuatus, cotyledones carnosæ, radicula supera. — Herbæ foliis alternis, floribus breviter pedicellatis. (DC. mss.)

An potius, ut vult cl. Hooker, calyx auctorum pro involucro, squamæ et petala pro perigonio et appendicibus perigonii habendæ, et inflorescentia ut capitulum ex floribus sterilibus et perfectis compositum describenda. Ordo tunc Euphorbiaceis et Daticæ affinis.

I. RESEDA. Neek. elem. n. 991. DC. mss. — Resedæ, sp. L.


Petala 4-6 inæqualia, superiora laciniata; stam. 10-24, carpella 3-6 coalita in capsulam 3-6-gonam apice hiantem; 3-6 stylis coronatam, intùs 1-locularem; placentæ 3-6 stylis alternæ, in medio valvularum coalitarum adnatæ semina 2 biserialia gerentes. (DC. mss.)

Sect. I. RESEDASTRUM.

Sepala 6, stigmata 3, rarissimè 4. — Folia indivisa aut 3-loba.

1. R. PHYTEUMA (L. sp. 645) foliis obtusis aut mucronulatis, radicalibus integrerrimis spatulatis caulinis semi-trilobis, calycibus maximis, fructibus laxis. (I) in arvis sabulosis. — Fl. fr. 4. p. 727. — C. Bauh. prod. 42. f. 1. Antheræ pallidè flavæ; flores inodori. (v. v.)
2. R. ODORATA (L. sp. 646.) foliis oblongis obtusis aut mucronulatis undulatis integris trilobisque, calycibus corollam aequantibus, fructibus laxis. (I) ex AEgypto et Barbariâ orta, in hortis culta. — Fl. fr. 4. p. 727. Curt. bot. mag. t. 29. Mill. ic. t. 217. antheræ croceæ; flores odori. (v. v. c.)





3. *R. LUTEA* (L. sp. 645.) foliis pinnatifidis undulatis superioribus 3-fidis, fractibus laxis oblongis triangularibus apice truncatis. ♀ ad vias et muros, in sabulosis. — Fl. fr. 4. p. 727. eng. bot. t. 327. — Lob. ic. 222. f. 1. (v. v.)

Sect. II. LEUCORESEDA. DC. l. c.

Sepala 5, stigmata 4, rarissimè 3. — Folia pinnatipartita, flores albi.

4. *R. ALBA* (L. sp. 645.) foliis pinnatipartitis, lobis oblongis integris sæpè undatis, floribus 4-gynis, fructibus consertis, capsulis stylis persistentibus apice conniventibus coronatis. (1) ♀ in sabulosis maritimis Galliæ mediterraneæ passim. — Fl. fr. 4. p. 726. *R. undata* L. sp. 644. Fl. fr. 4. p. 726. — Barr. rar. t. 587. — J. Bauh. hist. 3. p. 2. p. 467. f. 1. (v. v.)

Sect. III. LUTEOLA. DC. mss.

Sepala 4, stigmata 3. — Folia indivisa.

5. *R. LUTEOLA* (L. sp. 643.) caule erecto, foliis lanceolatis undulatis integris, fructibus consertis, capsulis supernè hiantibus cornibus 3 foliaceis erectis 3 alternis carnosis intreflexis coronatis. (2) ad vias. — Fl. fr. 4. p. 725. eng. bot. t. 320. — Lob. ic. 353. f. 1. (v. v.)

Sect. IV. GLAUCORESEDA. DC. l. c.

Sepala 5, stigmata 2, capsula subglobosa. — Folia indivisa.

6. *R. GLAUCA* (L. sp. 644.) caulibus diffusis, foliis linearibus acutis angustissimis ad basim utrinquè dente acuto exerto stipulaceo auctis, capsulis subglobosis brevissimè cornutis. ♀ in saxosis apricis vallium Pyrenæorum præsertim centralium, et montis Lupi propè Monspelium ex cl. Benth. — Fl. fr. 4. p. 725. — Pluck. alm. t. 107. f. 2. (v. v. DC.)

II. ASTROCARPUS. Neck. elem. n. 992. DC. mss.

Petala 4-6 inæqualia, superiora laciniata; stam. 12-15; carpella 4-6 toro stipitiformi incidentia stellatim patentia follicularia intùs rimâ dehiscentia; semina 1-2 in medio carpellorum propè basim adnata. (DC. mss.)

1. *A. SESAMOIDES* (DC. l. c.) caulibus diffusis, foliis caulinis linearibus integrerrimis, seminibus lenticularibus in medio capsulæ insertis. ♀ Reseda sesamoïdes DC. fl. fr. 4. p. 725. ic. rar. t. 40.

a. stellata, foliis radicalibus obovato-oblongis. — In rupestribus Cebenn., Pyren., montium Arvernæ. — *R. sesamoïdes* L. sp. 644. Lam. ill. t. 400. f. 2. (v. v.)

b. purpurascens, foliis radicalibus oblongo-linearibus. — In sabulosis planitierum Galliæ austro-occident. — *R. purpurascens* L. — Lob. ic. 353. f. 2. (v. v.)

Ordo XI. DROSERACEÆ. DC. theor. 214. prod. 1. p. 317.

Calyx sepalis 5 persistentibus per aestivationem imbricatis. Petala 5 distincta hypogyna sepalis alterna. Stamina nunc petalis alterna et iis numero aequalia, nunc petalis dupla tripla quadruplave, libera; antheræ 2-loculares. Ovarium 1; styli 3-5 nunc basi coaliti nunc distincti, bifidi ramosive. Capsula 1-3, locularis, 3-5-valvis, valvulis margine plus minus introflexis, ab apice dehiscentibus, intus nunc in nervo medio, nunc ad basin seminiferis. Semina nuda aut arillo tenui folliculari involuta. Albumen cartilagineum carnosumve: Embryo rectus, radiculâ ad hylum versâ. — Herbæ foliis alternis, petiolis basi ciliis stipularibus saepius instructis.

I. DROSERA. L. gen. 391. Lam. ill. t. 220.

Sepala petalaque 5 inappendiculata; stam. 5; styli 3-5, bipartiti.

1. D. ROTUNDIFOLIA (L. sp. 402.) foliis orbiculatis, petiolis pilosis limbo longioribus, scapis rectis folia triplo superantibus, seminibus arillatis. (1) in humidis turfosis. — Fl. fr. 4. p. 729. Drev. et Hayn. eur. 3. t. 74. — Lob. ic. 802. f. 3. (v. v.)
2. D. INTERMEDIA (Drev. et Hayn. pl. eur. 3. p. 43. t. 75. B.) foliis obovatis, petiolis glabris limbo longioribus, scapis ascendentibus folia paulò superantibus, seminibus exarillatis. (1)? in turfosis et humidis. — DC. prod. p. 318. D. longifolia. L. sp. 403. Fl. fr. 4. p. 729. eng. bot. t. 868. (v. v.)
3. D. ANGELICA (Huds. ang. 135.) foliis oblongis obtusis basi attenuatis, petiolis glabris limbo vix longioribus, scapis erectis folia duplo superantibus, seminibus arillatis. 2? in paludosis Galliae borealis. — Fl. fr. 4. p. 729. D. longifolia Drev. et Hayn. 3. t. 75. A. — Moris. s. 15. t. 4. n. 1. (v. s.)

II. ALDROVANDA. Monti. act. bon. 2. p. 3. p. 404. t. 12. L. gen. 390.

Sepala petalaque 5 inappendiculata; stam. 5; styli 5 filiformes breves; stigmata obtusa; caps. globosa 5-valvis 1-locularis 10-sperma.

1. A. VESICULOSA (L. sp. 402.) 2? All. (1) Sav. — In aquosis circâ Arelatem et Burdigalam (Dunal.). Folia verticillata, petiolo in cilia 6 setacea desinente, limbo complicato ferè vesiculari. — Fl. fr. 4. p. 730. (v. v. DC.)

III? PARNASSIA. Tourn. inst. t. 127. L. gen. 384.

Sepala 5; petala 5; squamæ 5 (an stamina abortiva?) unguibus petalorum oppositæ, in setas apice glandulosas desinentes; stam. 5; anth. posticæ; stigmata 4 sessilia; capsula 4-valvis 1-locularis valvis medio septiferis; semina arillata.

1. P. PALUSTRIS (L. sp. 391.) appendicibus 9-13-setis, petalis subsessilibus, foliis radicalibus cordatis, caulino amplexicauli. 2? in paludibus submontanis. — Fl. fr. 4. p. 728. fl. dan. t. 784. (v. v.)





Ordo XII. POLYGALÆ. *Juss. ann. mus.* 14. p. 386. *DC.*
prod. 1. *p.* 321.

Calyx sepalis 5 per aestivationem imbricatis, 2 interioribus saepius petaliformibus, 3 externis minoribus, quorum 2 anteriores interdum coalita et tertium posticum. Petala 3-4 hypogyna, mediante tubo stamineo plus minusve connexa, rarius distincta. Staminum filamenta cum petalis coalita, monadelpha, apice in phalanges 2 oppositas aequales divisa. Antheræ 8, 1-loculares, basi insertæ, apice poris dehiscentes. Ovarium 1 liberum 2-loculare, rarius 1-3-loculare. Stylus 1. Stigma 1. Pericarpium capsulare aut drupaceum 2 aut 1-loculare, valvis medio septigeris. Semina in loculis solitaria pendula; saepè basi carunculato-arillata. Embryo rectus nunc in albumine carnoso axilis, nunc rarius exalbuminosus endoplevra tunc tumidiore. — Herbæ aut suffrutices; foliis in plenisque alternis super caulem articulatis integris.

I. POLYGALA. *Tourn. inst.* t. 79. *DC.* l. c.

Calycis sepala persistentia, 2 interiora alæformia; petala 3-5 tubo stamineo connexa, inferiore carinæformi; capsula compressa elliptica obovata aut obcordata; semina pubescentia, hylo carunculata, comâ destituta.

Sect. 1. POLYGALON. *DC.* l. c.

Carina cristata; capsula glabra; bracteæ 3 mox deciduae ad basin pedicellorum.

1. P. SAXATILIS (Desf. atl. t. 175.) foliis oblongo-lanceolatis mucronatis, caule basi fruticoso decumbente, racemis extra-axillaribus paucifloris, alis ellipticis. ♂ in rupestribus apricis circâ Narbonam, Massiliam. — Fl. fr. 3. p. 457. (v. s.)

2. P. VULGARIS (L. sp. 986.) foliis linear-lanceolatis obtusiusculis, caulinibus ascendentibus, alis ovatis capsulâ parùm longioribus corollâ subbrevioribus, ovario subsessili. ♀ in pratis et sylvaticis. — Fl. fr. 3. p. 456.

α. vera (DC.) caulinibus erectiusculis, foliis inferioribus obovatis obtusis, superioribus linearibus acutis. — Fl. dan. t. 516. (v. v.)

β. elata (DC.) caulinibus erectis, foliis ex ovali-oblongis. P. comosa Schkuhr. handb. t. 194. (v. s.)

γ. angustifolia (DC.) caulinibus erectis, foliis linearibus. (v. v.)

3. P. AMARA (L. sp. 987.) foliis radicalibus obovatis obtusissimis, caulinis linearibus, caulinibus erectiusculis, alis ellipticis corollam æquantibus, capsulâ suborbiculari. ♀ in pratis montanis. — Fl. fr. 3. p. 456.

α. Austrriaca (Crantz aust. t. 2. f. 4.) amarissima, floribus minoribus albicans, alis post anthesin viridescens. (v. v.)

β. alpestris (DC.) insipida, alis fractûs coloratis, radice magis cespitosâ. Jacq. aust. t. 412. (v. v.)

γ. cespitosa (DC.) floribus cœruleis, caulinibus cespitoso-procumbentibus, foliis linearibus summis ad flores approximatis. (v. v.)

δ. Alpina (Poir. dict. 5. p. 488.) floribus cœruleis paucis, caulinibus cespitoso-procumbentibus brevissimis, foliis inferioribus obovatis. (v. v.)

4. P. MONSPELIACA (Lin. sp. 987.) glabra erecta subsimplex, foliis linearibus acuminatis, alis oblongis utrinque acutis trinerviis capsula multò longioribus. (I) in sterilibus prov. mediterranearum. — Fl. fr. 3. p. 457. DC. ic. rar. t. p. 3. t. 9. (v. v.)
5. P. EXILIS (DC. cat. Monsp. 133.) erecta glabra ramosissima, foliis linearibus crassiuseulis, alis ovalibus obtusis 1-nerviis capsulae longitudine, rameo laxiusculo. (I) in arenosis circà Monspelium, Avenionem, in Gallo-provinciâ et suprà Lugdunum propè Château-Gaillard. — Fl. fr. 5. p. 386. Boiss. fl. eur. 1. t. 474. f. 1. (v. s.)

Sect. II. CHAMÆBUXUS. Dill. gen. t. 9.

Calycis sepalum inferius concavo-cucullatum intùs ad basin glandulam foveans; corollæ carina cristata.

6. P. CHAMÆBUXUS (L. sp. 989.) caulis suffruticosis ramosis procumbentibus, foliis oblongo-lanceolatis mucronatis, racemis 1-2-floris, carinâ cristatâ. ♂ ♂ in Alpibus, montibus Alsatiæ, etc., Pyrenæis orientalibus ex Lapeyr. — Fl. fr. 3. p. 458. Jacq. Austr. t. 233. (v. v.)
-

Ordo XIII. FRANKENIACEÆ. St. Hil. mem. plac. cent. p. 39.
DC. prod. 1. p. 349.

Cal. sepala 4-5 erecta basi coalita in tubum sulcatum, persistentia æqualia. Petala tot quot sepala, iis alterna, hypogyna, unguiculata, fauce squamulis subcoronata. Stamina hypogyna, nunc petalis æqualia et iis alterna; nunc 1-2 addita petalis opposita. Filamenta filiformia. Antheræ subrotundæ. Ovarium 1, liberum. Stylus filiformis 2-3-fidus. Capsula calyce persistente stipata, bi aut saepius tri-imò quadrivalvis, 1-locularis; valvulis ad marginem utrumque placentiferis, polyspermis. Embryo rectus in medio albuminis, radiculâ brevi ad umbilicum spectante. — Herbæ aut suffrutices; foliis oppositis aut verticillatis, exstipulatis, basi productis in membranulam amplexicaulem.

I. FRANKENIA. Lin. gen. n. 445.

Stylus 3-fidus, lobis oblongis intùs stigmatosis; capsula 3-4-valvis polysperma.

1. F. PULVERULENTA (Lin. sp. 474.) foliis obovatis retusis glabris subtùs pulverulentis in petiolo ciliatis, radice exili. (I) in arenosis maritimis à Nicæâ ad Hispaniam. — Fl. fr. 4. p. 766. — Clus. hist. 2. p. 186. f. 2. (v. v.)
2. F. LÆVIS (Lin. sp. 473.) foliis linearibus margine revolutis glabris basi ciliatis, caulis prostratis calycibusque glabris. ♂ ♂ in maritimis Oceani à Nannete ad Bayonam et Mediterranei secus Occitaniam. — Fl. fr. 4. p. 765. — Mich. gen. t. 22. f. 1. (v. v.)
3. F. INTERMEDIA (DC. prod. 1. p. 349.) foliis linearibus margine revolutis glabris basi ciliatis, caulis prostratis velutinis, calycibus hispidis. ♂ ♂ in maritimis Mediterraneis. — F. hirsuta. Fl. fr. 4. p. 766. — Mich. gen. t. 22. f. 2. (v. v.)



**Ordo XIV. CARIOPHYLLEÆ. Juss. gen. 299. Ser. in DC.
prod. 1. p. 351.**

Calyx saepius persistens sepalis 4 aut saepius 5 cum pedicello continuo nunc liberis, nunc inter se in tubum 4-5-dentatum coalitis, aestivatione imbricatis. Petala totidem hypogyna toro plus minusve elevato (Anthophoro dicto) inserta, sepalis alterna, unguiculata, ad faucem interdum squamis petaloideis aucta, rarissime abortu nulla. Stamina petalorum numero dupla toro inserta; petalis alia alterna, alia opposita; filamenta subulata interdum basi submonadelpha; antheræ 2-loculares. Ovarium tori apice insertum simplex 2-5-valve, stylis totidem superatum. Capsula valvis 2-5 basi coalitis apice dehiscentibus, nunc saepius 1-locularis, nunc 2-5-locularis, valvis proferentibus è medio septa, nunc incompleta, nunc ad axim continua. Placenta centralis. Semina ∞ (rarissime pauca et definita). Albumen farinosum saepius centrale. Embryo nunc periphericus plus minusve incurvus, rarissime rectus centralis, radiculæ ad hilum versa. — Herbæ aut suffrutices, foliis oppositis integris.

Trib. I. *SILENEÆ. DC. prod. 1. p. 351.* — Cariophylleæ. Lam.

Sepala coalita in tubum cylindraceum apice 4-5-dentatum.

I. *GYPSOPHILA. Linn. gen. n. 768.*

Calyx campanulatus sub 5-lobus, laciinis margine membranaceis; petala 5 non unguiculata; stamina 10; styli 2; capsula 1-locularis.

Sect. I. *STRUTHIUM. Ser. in DC. prod. l. c.*

Calyces squamis destituti.

1. *G. FASTIGIATA* (Lin. amæn. 3. p. 23.) floribus corymboso-fastigiatis, caule adscendente, foliis lanceolato-linearibus absolutè triquetris levibus obtusis secundis, staminibus exsertis. ♂ propè Monspelium ex Gonan. — Fl. fr. 4. p. 735. — Gm. sib. 4. t. 61. f. 1. (v. v. c.)
2. *G. REPENS* (Lin. amæn. 3. p. 23. spec. 581.) canibus subpaniculatis pauci floris, staminibus petalis emarginatis brevioribus, foliis linearibus glabris. ♂ in petrosis ad vias et secus torrentes Alpium, Pyren. et montium Arverniae. — Fl. fr. 4. p. 736. Ger. Galloprov. t. 15. f. 2. (v. v.)
3. *G. MURALIS* (Lin. amæn. 3. p. 24. spec. 588.) caule dichotomo paniculato ramosissimo, floribus axillaribus solitariis, petalis crenatis, foliis linearibus planis longitudine pedicellorum. ① ad vias et in agris passim. — Fl. fr. 4. p. 336. — J. Baeh. 3. p. 2. p. 338. f. 1. (v. v.)

Sect. II. *PETRORHAGIA. Ser. l. c.*

Calyces squamis scariosis 2-4 oppositis basi instructi.

4. *G. SAXIFRAGA* (Lin. spec. 584.) canibus numerosis erectis rigidis, floribus

paniculatis terminalibus, calycibus squamis quaternis involucratis, foliis linearibus rigidis. ♀ in saxosis Galliae australis, mediæ et occidentalis. — Fl. fr. 4. p. 737. — Barr. ic. 998. (v. v.)

II. DIANTHUS. Lin. gen. n. 770.

Calyx tubulosus 5-dentatus basi squamis 2-4 oppositis imbricatis; petala 5 longè unguiculata; stamina 10; styli 2; capsula 1-locularis; semina compressa hinc convexa indè concava, peltata; embryo vix curvatus.

Sect. I. ARMERIASTRUM. Ser. in DC. prod. 1. p. 355.

Flores capitati vel corymbosi, sessiles vel pedunculati.

§. 1. Bracteis ovatis muticis.

1. D. TROLIFER (Lin. spec. 587.) floribus aggregatis capitatis, squamis calycinis ovatis muticis tubum superantibus, foliis serrulatis. (I) ad marginem sylvarum et agrorum. — Fl. fr. 4. p. 741. — J. Bauh. 3. p. 335. f. 1. (v. v.)

§. 2. Bracteis lanceolatis acutis, calycibus striatis villosis.

2. D. ARMERIA (Lin. sp. 586.) floribus laxè fasciculatis, squamis calycinis lanceolato-subulatis tubum æquantibus, foliis subulatis calycibusque hirsutis. (I) in sterilibus. — Fl. fr. 4. p. 741. OEd. fl. dan. t. 230. (v. v.)

- §. 3. Bracteis ovatis vel lanceolatis, calycibus vix striatis glabris.

3. D. BARBATUS (Lin. spec. 586.) floribus aggregatis fasciculatis, squamis calycinis ovato-subulatis tubum æquantibus, foliis lanceolatis. ♀ in sterilibus Galliae australis, in hortis cultus. — Fl. fr. 4. p. 739. (v. v.)

4. D. BALBISII (Ser. in DC. prod. 1. p. 356.) glaucescens, floribus subsessilibus capitato-fasciculatis, squamis calycinis lanceolatis patulis tubo paulò minoribus, foliis lanceolato-linearibus, caule angulato. ♀ circa Niceam. — Folia lanceolato-linearia basi non dilatata. (v. v.)

5. D. FERRUGINEUS (Lin. mant. 563.) floribus aggregatis, involucris squamisque scariosis rufis oblongis aristatis calyce paulò brevioribus, foliis linearibus longè connatis. ♀ in Pyrenæis Narbonensis. — Fl. fr. 4. p. 740. — Barr. ic. t. 497. An sequentis var? (v. s.)

6. D. CARTHUSIANORUM (Lin. spec. 586.) floribus aggregatis sessilibus pedunculatisque, squamis calycinis ovatis aristatis tubo brevioribus, involucro oblongo aristato capitulo breviore, foliis linearibus trinerviis. ♀ in incultis et sterilibus. — Fl. fr. 4. p. 740. (v. v.)

- β. atrorubens (Ser.) floribus aggregato-capitatis sessilibus 3-8. — In collibus agri Ruscinonensis, Ligericini. — D. atrorubens. Jacq. ic. rar. 467. Fl. fr. 4. p. 740. (v. s.)

Sect. II. CARYOPHYLLUM. Ser. in DC. prod. l. c.

Flores paniculati vel solitarii.


§. 1. Petalis dentatis.


7. D. ASPER (Willd. enum. 466.) floribus fasciculatis, squamis calycinis ovato-lanceolatis acuminatis tubo brevioribus, petalis acutè dentatis, foliis linear-lanceolatis 3-5-nerviis cauleque scabris apice serrulatis. ♀ in provinciis australioribus.

- α. angustifolius (Ser.) paniciflorus, foliis linearibus acutis. D. serratus β DC. Fl. fr. 5. p. 601. (v. s.)


- β. collinus (Ser.) multiflorus, foliis linear-lanceolatis. — In montibus Arvernæ et propé Mimatem. — D. Collinus W. et Kit. hung. i. t. 38. (v. s.)

- γ. serratus (Ser.) caulinus 1-3-floris, floribus majoribus, foliis linearibus. — In Pyr. orient. D. serratus Lapeyr. et DC. fl. fr. 5. p. 601. α. (v. s.)









8. D. ALPESTRIS (Balb. act. acad. taur. 7. p. 11. t. 1.) floribus subbinis, squamis calyciuis 4, tubo brevioribus, 2 interioribus latis mucronatis, 2 exterioribus lanceolatis acuminatis, petalis emarginatis. ♀ circa Monspelium et in Apibus Galloprovinciae inferioris? (v. s.)
9. D. ATTENUATUS (Smith. act. soc. Lin. 2. p. 301.) floribus solitariis, squamis calycinis subsenis brevibus lanceolatis acuminatis margine membranaceis, calyce longo apice attenuato, petalis crenatis ungnibus calycem superantibus, foliis subulatis. ♀ in maritimis agri Ruscinonensis, Galloprovincie et propè Mimatem. (cl. Prost.) — Fl. fr. 4. p. 742. D. geminiflorus. Fl. fr. 5. p. 602. (v. v.)
10. D. HIRTUS (Vill. delph. 3. p. 593. t. 46.) floribus subsolitariis, squamis calycinis senis ovatis mucronatis calyce multò brevioribus, petalis crenatis, foliis subulatis margine scabris. ♀ in collibus Delph. Galloprov., agri Ligericini (cl. Prost. et Pyren. orient. ex cl. Benth. — Ser. in DC. prod. 1. p. 358. (v. s.)
11. D. CARYOPHYLLUS (Lin. spec. 587.) caule ramoso, floribus solitariis, squamis calycinis subquaternis brevissimis ovatis submucronatis, petalis latissimis imberibus, foliis linearisubulatis canaliculatis glancis. ♀ in Gallia australi et occidentali. — Fl. fr. 4. p. 741. — Lam. ill. t. 376. f. 1. (v. v.)
12. D. SYLVESTRIS (Jacq. coll. 1. p. 237. ic. rar. t. 82.) caule ramoso vel simplici, floribus solitariis, squamis calycinis brevissimis quaternis ovatis, exterioribus acutis, interioribus obtusissimis, petalis latissimis imberibus dentatis. ♀ in saxosis montanis Galliae orientalis et montis Canigou ex Benth. — Fl. fr. 4. p. 742. Jacq. ic. rar. t. 82. (v. v.)
13. D. PUNGENS (Lin. mant. 240.) caule pauciflоро, floribus solitariis, squamis calycinis brevissimis mucronatis patentibus, tubo gibbo, petalis integris, foliis cespitosis subulatis. ♀ in monte dicto la Clape propè Narbonam ex cl. Benth. (v. s. ex Hisp.)
14. D. VIRGINEUS (Lin. spec. 590.) caule subunifloro, squamis calycinis brevissimis obtusis mucronatis binis distantibus, petalis crenatis, foliis cespitosis linearibus rigidis serrulatis. ♀ in collibus agri Monspel., Narbonensis, Ruscinonensis. — Fl. fr. 4. p. 744. (v. v. DC.)
- ♂. *subacaulis* (Ser.) caulis cespitosis brevissimis 1-floris, foliis floribus squamisque calycinis abbreviatis. — In rupibus montis Ventosi. — D. subacaulis. Lois. not. t. 6. f. 1. Fl. fr. 5. p. 603. (v. s.)
15. D. DELTOIDES (Lin. sp. 588.) caulis decumbentibus ramosis, floribus solitariis, squamis calycinis ovato-lanceolatis acutis subbinis, foliis superioribus angustis acutis, inferioribus oblongis obtusis. ♀ in areuosis sylvaticis Alsatiæ, Aldegaviæ, Pyren., Cebenn. — Fl. fr. 4. p. 744. — J. Bauh. 3. p. 329. f. 4. (v. v.)
16. D. CÆSIUS (Smith act. soc. Linn. 2. p. 302. engl. bot. t. 62.) caulis cespitosis subunifloris, squamis calycinis acutis brevibus exterioribus lanceolatis interioribus subrotundis, petalis crenatis pubescentibus, foliis obtusiusculis margine scabris. ♀ in saxosis montanis Jurassi, Arverniæ. — Fl. fr. 4. p. 745. — Dill. elth. t. 298. f. 385. (v. v.)
17. D. GLACIALIS (Jacq. coll. 2. p. 84.) caulis erectis cespitosis brevibus subunifloris, squamis calycinis elongatis tubum æquantibus vel superantibus, calyce striato, petalis serratis, foliis linearibus acutis serrulatis. ♀ in montanis Galloprov. et Delph. — Fl. fr. 5. p. 603. D. Alpinus. Fl. fr. 4. p. 746. non L. (v. s.)
- §. 2. *Petalis fimbriatis.*
18. D. GALLICUS (Pers. enc. 1. p. 495.) caulis adscendentibus subunifloris, squamis calycinis brevibus ovatis submucronatis, petalis dentato-multifidis, foliis linearibus subciliatis. ♀ in arenosis maritimis à Bayonâ ad Nannetes. — Fl. fr. 5. p. 602. D. arenarius. DC. syn. p. 588. ic. rar. t. 41. non L. (v. v.)
19. D. PLUMARIUS (Linn. spec. 589. hort. upsal. 105. n. 4.) glaucescens,

- caulinibus 2-3 floris, dentibus obtusis, bracteis subovatis brevissimis mucronulatis, petalis laciniatō-multifidis barbatis, foliis linearibus margine sebris. ♀ in hortis cultus. — Fl. fr. 4. p. 745. (v. v. c.)
20. *D. SAXATILIS* (Pers. enc. 1. p. 494.) cespitosus subdecumbens, caule 2-3-floro, squamis ovatis mucrone longinsculo distinctis tubo brevioribus, petalis multifidis fauce glabris. ♀ ad rupes propè Clermont. *D. Plumarius* qnorumdam sed folia linearia non glauca, corolla fauce non pubescens, nec squamae obtusæ. (Pers. 1. c.) †.
21. *D. MONSPESSULANUS* (Lin. amæn. 4. p. 313. spec. 588.) caule paniculato paucifloro, floribus solitariis, squamis calycinis subulatis rectis tubo dimidiò brevioribus, petalis digitato-multifidis fauce subglabris, foliis linearibus serrulatis. ♀ in Jurasso, Cebennis, Pyrenæis.—Fl. fr. 4. p. 745.—Clus. hist. 1. p. 284. f. 1. (v. v.)
22. *D. SUPERBUS* (Lin. amæn. 4. p. 272. spec. p. 589.) caule paniculato multi-floro, floribus subfastigiatis, squamis calycinis brevibus ovatis mucronatis, petalis ultrà medium pinnato-multifidis fauce pilosis. ♀ in nemoribus et pratis umbrosis montanis.—Fl. fr. 4. p. 744.—Clus. hist. 1. p. 284. f. 2. (v. v.)

III. SAPONARIA. Lin. gen. n. 769.

Calyx tubulosus 5-dentatus basi nudus; petala unguiculata, ungue calycem æquante; stam. 10; styli 2; caps. 1-locularis.

Sect. I. VACCARIA. Dod. pempt. 104.

Flores paniculati, calyx angulosus glaber.

1. *S. VACCARIA*. (Lin. spec. 585.) floribus paniculatis, calycibus pyramidatis quinquangularibus glabris, bracteis membranaceis acutis, foliis ovato-lanceolatis sessilibus. (I) inter segetes passim. — Fl. fr. 4. p. 737. — J. Bauh. 3. p. 2. p. 357. f. 2. (v. v.)

Sect. II. BOOTIA. Neck. delic. gallo-belg. 1. p. 193.

Flores fasciculato-paniculati, calyx teres sæpius pilosus.

2. *S. OFFICINALIS* (Lin. spec. 584.) floribus fasciculato-paniculatis, calycibus teretibus villosis luteolis, petalorum appendicibus linearibus, foliis ovato-lanceolatis acutis obtusisve. ♀ ad margines viarum et agrorum. — Fl. fr. 4. p. 737. Eng. bot. t. 1060. (v. v.)
3. *S. OCYMOIDES* (Lin. spec. 585.) caulinibus procumbentibus dichotomis, floribus fasciculatis, calycibus teretibus villosis purpureis glanduloso-pilosis, foliis ovato-lanceolatis subuinerviis. ♀ in petrosis provinc. austral. et occidentali. — Fl. fr. 4. p. 738. — Lob. ic. t. 341. f. 2. (v. v.)

Sect. III. PROTEINIA. Ser. in DC. prod. 1. p. 366.

Flores solitarii axillares, calyx pilosus raro glaber.

4. *S. ORIENTALIS* (L. sp. 785.) caule dichotomo, ramis divaricatis, floribus axillaribus, pedunculis rigidis florem æquantibus calycibusq. hispidulis teretibus, lacinias acutis, foliis linearis spathulatis. (O) circè Collioure et Perpignau in agro Ruscinonensi. — Fl. fr. 5. p. 601. — Dill. Elth. 205. t. 167. f. 204. (v. s. c.)

Sect. IV. BOLANTHUS. Ser. in DC. prod. p. 1. p. 366.

Caulis foliaque cespitosi, flores aggregati, calyx teres villosus.

5. *S. CESPIOSA* (DC. rap. voy. 2. p. 78. 1808. fl. fr. 5. p. 601.) cespitosa, caulinibus subnudis apice floriferis, floribus subumbellatis, calycibus cylindricis villosis profundè lobatis, lobis acentis, petalis apice emarginatis appendice bifido, lobis angustissimis, foliis linearibus glabris subradicalibus vix denticulatis. ♀ in sterilibus Pyren. editiorum.—*S. elegans* Lapeyr. Abr. pyr. 238. — Habitus *S. luteæ* sed flores rosei majores. (v. v. DC.)

6. *S. LUTEA*. (Lin. spec. 585. excl. syn. Bocc.) cespitosa, caulinibus diphyllis, flo-



of C. *Nichols*

or *John Nichols*

ribus capitatis involucratis, calycibus cylindricis lanatis, lobis obtusis brevibus, petalis obovatis integris nudis, foliis linearibus basi ciliatis subradicibus. ♀ in Pyrenæis? ex Lapeyr. — Fl. fr. 4. p. 738. All. ped. t. 23. f. 1. (v. s. ex Pedemontio.)

IV. CUCUBALUS. Gærtn. fruct. 1. p. 376. t. 77. f. 7.

Calyx campanulatus 5-dentatus nudus; petala 5 unguiculata, fauce sæpiissimè coronata, limbo bifido; capsula carnosa 1-locularis.

1. C. BACCIFERUS (Lin. spec. 591.) ramis divaricatis, foliis ovatis, calycibus campanulatis, petalis distantibus. ♀ in umbrosis. — Fl. fr. 4. p. 760. — Mill. ic. t. 112. (v. v.)

V. SILENE. Lin. gen. n. 772. Gærtn. fruct. 2. p. 233. t. 130. f. 8. Otth. in DC. prod. 1. p. 367.

Calyx tubulosus 5-dentatus nudus; petala 5 unguiculata, fauce sæpiissimè coronata, limbo bifido; stamina 10; styli 3; capsulæ basi 3-loculares apice in 6 dentes dehiscentes.

§. 1. Cespitosæ, caulis subnullis.

1. S. ACAULIS (L. sp. 603.) glabra, caulis densis humilibus, foliis linearilanceolatis, pedunculis brevibus unifloris, calycibus campanulatis. ♀ in Alpibus et Pyrenæis. — Fl. fr. 4. p. 749. All. ped. t. 79. f. 1 et 2. (v. v.)

§. 2. Caulescentes, floribus solitariis paniculatis, calyce vesiculoso-inflato.

2. S. INFLATA (Smith fl. brit. 467.) caulis ramosis, floribus paniculatis, calycibus vesiculato-ovatis, petalis bifidis nudis, unguiculis cuneiformibus, stylis longissimis. ♀ in Galliæ frequens. — Fl. fr. 4. p. 746.

a. vulgaris (Otth.) glabra, erecta, foliis lanceolatis. — In agris. — Engl. bot. t. 164. (v. v.)

b. uniflora (Otth.) glabra, procumbens, foliis lanceolato-ovatis, floribus subsolitariis. — In Alpibus. S. uniflora. ♂. Fl. fr. 4. p. 747. — All. spec. t. 5. f. 3. (v. v.)

c. maritima (DC.) piloso-pubescent, procumbens, foliis ovato-lanceolatis. — In maritimis. S. uniflora. *a.* Fl. fr. 4. p. 747. (v. v.)

d. fabaria. (Otth.) repens, foliis subspathulatis margine tenuissimè ciliato-serratis. — In arenosis maritimis Vasconiaæ. — Cœubalus fabarius. Thore. S. Thorei. Dufour in Ann. sc. nat. 5. p. 184. (v. v.)

§. 3. Caulescentes, floribus verticillato-spicatis.

3. S. OTITES (Pers. enc. t. p. 497.) caulis erectis vix pubescens oligophyllis, foliis inferioribus numerosis spathulatis subcarnosis, superioribus lanceolatis, floribus dioicis parvis, calycibus femininis sphæricis, masculinis subclavatis, petalis linearibus indivisis. ♀ in sterilibus arenosis. — Fl. fr. 4. p. 752. — Clus. hist. t. p. 295. f. 1. (v. v.)

β. umbellata (Otth.) caulis humilibus, floribus subumbellatis. — In maritimis circâ Nannetos. (v. v. DC.)

§. 4. Caulescentes, calyce conoideo, fundo umbilicato dentibus longissimis. (Oth.)

4. S. CONICA (L. sp. 598.) pubescens, foliis linearibus mollibus, floribus solitariis aut paniculatis, calycibus brevioribus conicis 3o-striatis, petalis bipartitis, capsula ovatâ. (I) in arenosis Galliæ mediæ, occidentalis et australis. — Fl. fr. 4. p. 759. Jacq. aust. t. 253. (v. v.)

5. S. CONOIDEA (L. sp. 598.) caulis pubescens, foliis lanceolato-linearibus ferè glabris, floribus solitariis aut paniculatis, calycibus longis conoidis 3o-


striatis, petalis integris obovatis, capsulâ lageniformi. (1) in arenosis Niceæ ex All. Monspelii ex Gou., Calvadosii ex cl. de Brébisson. — Fl. fr. 4. p. 760. — Clus. hist. 1. p. 288. f. 2. (v. v. c.)

§. 5. *Caulescentes, calycibus cylindricis campanulatisve.*

* *Floribus spicatis.*

6. S. ANGLICA (L. sp. 594.) pilosa, caulis ramosis, foliis lanceolatis acutis, calycibus ventricoso-cylindricis 10-striatis, dentibus longissimis acutis, petalis obcordatis parvis, appendicibus pyramidalibus. (1) in provinciis occidentalibus. — Fl. fr. 4. p. 757. Eng. bot. t. 1178. (v. s.)
7. S. TRIDENTATA (Desf. atl. 1. p. 349.) caulis ramosis, foliis linearis-lanceolatis, spicâ secundâ, calycibus subcylindricis decemcostatis, dentibus longis, petalis 3-dentatis. (1) Tarba ad pontem Aturis reperit cl. Ramond. — Fl. fr. p. 758. — Clus. hist. 1. p. 299. f. 1. An à priori satis distincta species? (v. s.)
8. S. LUSITANICA (L. sp. 594.) pilosissima, caulis ramosissimis, foliis inferioribus obovato-spathulatis, superioribus lanceolatis obtusis, spicâ distichâ, calycibus cylindrico-ventriculosis 10-striatis, dentibus longioribus, petalis indivisis, limbo margine exteriore denticulato. (1) Monspelii. — Fl. fr. 5. p. 606. — Dill. elth. p. 311. f. 401. Nymia cum sequente affinitas. (v. s.)
9. S. GALlica (L. sp. 595.) hirsuta, caulis ramosis, foliis inferioribus spathulatis, superioribus lanceolatis obtusis, spicâ secundâ, calycibus cylindrico-ventriculosis 10-striatis, dentibus brevibus acutis, petalis obovatis coronatis. (1) in Galliâ mediâ, occidentali et in Occitanîa. — Fl. fr. 4. p. 757. S. stricta Lapeyr. abr. 246. ex autopsiâ cl. Arnott. — Vaill. bot. par. t. 16. f. 12. (v. v.)
10. S. QUINQUEVULNERA (L. sp. 795.) caulis villosis, foliis pubescensibus inferioribus spathulatis, superioribus lanceolatis, spicâ distichâ, calycibus villosis cylindricis demum ventricosis 10-striatis, petalis obovatis retusis coronatis purpureis margine pallescentibus. (2) in provinciis australioribus. — Fl. fr. 4. p. 758. Eng. bot. t. 86. (v. v.)
f. cerastoïdes, petalis pallidioribus. — S. cerastoïdes L. sp. 596. Vill. Danph. 4. t. 48. Fl. fr. 4. p. 756. (v. v.)
11. S. NOCTURNA (L. sp. 595.) caule subramoso infrâ piloso, foliis pubescensibus basi longè ciliatis, inferioribus spathulatis, superioribus linearis-lanceolatis, spicis secundis densis, calycibus cylindricis subglabris reticulatocostatis, petalis bipartitis angustatis. (1)? in provinciis mediterraneis et agro Syrtico ex Thore. — S. spicata DC. fl. fr. 4. p. 759. — Dill. elth. t. 310. f. 400. (v. v.)
12. S. BRACHYPETALA (Rob. et Cast. in DC. fl. fr. 5. p. 607.) caule simplici, foliis obovato-spathulatis obtusis hirsutis basi longè ciliatis, floribus secundis erectis, calycibus subcylindricis hirsutis dentibus longis, petalis bifidis minimis. (1) Massiliae. (v. v. D.)
13. S. NUTANS (L. sp. 596.) pubescens, caulis basi foliosissimis, foliis radicalibus spathulatis, superioribus lanceolato-linearibus, floribus paniculatis secundis pendulis, calycibus cylindrico-ventricosis, petalis bipartitis reflexis longè coronatis. 2 in vineis, ad muros et in nemoribus. — Fl. fr. 4. p. 753. Fl. dan. t. 292. S. paradoxa, Lapeyr. abr. 246. ex cl. Arnott. (v. v.)
14. S. NICÆENSIS (All. ped. t. 44. f. 2.) viscosissimo-villosa, caulis ramosis, foliis linearibus obtusis, floribus paniculatis suberectis, calycibus cylindricis, petalis longè unguiculatis semibifidis, lobis ovatis planis, appendice bifida. (1) in maritimis Corsicæ, Niceæ, Galloprov. orientalis. — Fl. fr. 4. p. 754. (v. v.)
15. S. sedoides (Jacq. coll. supp. t. 14. f. 1.) viscosa - pubescens, caulis erectis ramosissimis, foliis subearniosis inferioribus spathulatis, superioribus ovatis, floribus parvis terminalibus et in dichotomiâ, petalis obcordatis coro-





- natis. (I) in apricis rupestribus maritimis Massiliæ. — Fl. fr. 5. p. 605. — Bocc. sic. t. 12. f. 4. (v. v.)
16. S. QUADRIDENTATA (DC. fl. fr. 4. p. 748.) cespitosa, caulinis erectis gracilibus ramosis, foliis parvis linearibus angustissimis, floribus minimis paniculatis, calycibus campanulatis, petalis breviter 4-dentatis. (I) ♀ in Alpibus et Pyrenæis. — S. quadrifida L. sp. 602. — Seg. ver. t. 5. f. 1. (v. v.)
17. S. RUPESTRIS (L. sp. 602.) glabra, caulinis erectis ramosis, foliis ovato-lanceolatis, floribus paniculatis minimis, calycibus campanulatis, petalis obcordatis. ♀ in saxosis umbrosis Voges. Alp. Cebenn. Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 748. — J. Bauh. 3. p. 360. f. 3. (v. v.)
- §. 6. Caulescentes, calycibus clavatis, floribus solitariis paniculatis.**
18. S. SAXIFRAGA (L. sp. 602.) cespitosa, caulinis assurgentibus, foliis linearibus acutis, pedunculis longissimis, floribus terminalibus solitariis raro axillaribus, calycibus longè clavatis, petalis bipartitis, unguiculo ciliato, appendice bicuspidata. ♀ in saxosis apricis Alpium, Ceben., Pyren. — Fl. fl. 4. p. 749. — Wald. et Kit. hung. 2. t. 163. (v. v.)
19. S. BICOLOR (Thore land. p. 174.) cespitosa glabra subviscosa, caulinis basi ramosis, foliis linearibus, floribus paniculatis, calycibus longè clavatis reticulatis, petalis bifidis, lobis lanceolatis. (I) in Galliâ occidentali. — DC. fl. fr. 4. p. 751. ic. rar. t. 42. (v. v.)
20. S. CLANDESTINA (Jacq. coll. supp. t. 3. f. 3.) pubescens, caule erecto ramosissimo gracili, foliis inferioribus oblongis obtusis, superioribus lanceolatis subangustis, floribus laxè paniculatis, petalis brevibus bifidis, calycibus ventricosis, capsulis rugulosis in calyce subsessilibus. (I) in prov. occidentalibus et australibus? — S. rubella. Fl. fr. 5. p. 604. nou L. S. annulata Thore land. (v. s.)
21. S. INAPERTA (L. sp. 600.) glabra, caulinis erectis ramosis, foliis acutis inferioribus lanceolatis, superioribus linearibus, floribus laxè paniculatis, calycibus oblongo-clavatis, petalis inapertis obcordatis, capsula levi in calyce pedicellata. (I) in Corsicâ et inter Narbonam et Perpignanum. — Fl. fr. 5. p. 604. S. polyphylla Fl. fr. 4. p. 750. — Dill. elth. t. 314. f. 407. (v. v.)
22. S. PAUCIFLORA (Otth. in DC. prod. 1. p. 383.) cespitosa pubescens, caulinis numerosis simplicibus gracilibus oligophyllis, foliis linear-lanceolatis basi numerosis, floribus solitariis vel paniculatis paucis, calycibus angustis, petalis bipartitis reticulatis. ♀ in Corsicâ. (v. s.)
23. S. CILIATA (Ponrr. act. Toul. 3. p. 328.) pubescens, caulinis numerosis prostratis basi valde foliosis, foliis linearibus setaceo-ciliatis, floribus paucis secundis, calycibus inflato-clavatis, petalis bipartitis, sinibus calycis deflexis. ♀ in Pyrenæis et summo Arvernia jugo Cantal. — Fl. fr. 4. p. 756. S. stellata Lapeyr. nou Ait. S. Pourretii. Poir. (v. v.)
24. S. PARADOXA (Lin. sp. 1678.) caulinis erectis pubescentibus, foliis scarubrisculis vix ciliatis, inferioribus lanceolato-spathulatis, superioribus linearibus, floribus magnis paniculatis, calycibus longis cylindrico-clavatis, petalis 2-lobis, lobis latis obovatis, appendice bipartita. ♀ in Corsicâ et circa la Roche des Arnauds in Delphinatû ex Vill. — Fl. fr. 4. p. 754. Jacq. vind. 3. t. 84. (v. s.)
25. S. MUSCIPULA (L. sp. 601.) glabriuscula viscosa, caule erecto, ramis alternis longis, foliis inferioribus lanceolato-spathulatis, superioribus linearibus, floribus paniculatis, calycibus ample-clavatis reticulatis, petalis bifidis. (I)? circa Draguignan, Narbonam et in Corbariensibus. — Fl. fr. 4. p. 752. — Clus. hist. 1. p. 289. f. 1. (v. v. DC.)
26. S. NOCTIFLORA (Lin. sp. 599.) viscoso-pubescentis, caulinis erectis ramosis, foliis magnis, inferioribus spathulatis, superioribus lanceolatis, floribus magnis paniculatis, calycibus ventricosis venosis, dentibus longissimis, petalis 2-partitis denticulatis. (I) in Alsatiâ, Vogesis, Delph. ex Vill. Galloprov. ex Ger. — Fl. fr. 4. p. 755. Eng. bot. t. 291. (v. s.)

27. *S. SERICEA* (All. ped. t. 79. f. 3.) caulis ramosis, foliis basi longè ciliatis, inferioribus spathulatis, superioribus linear-i-oblongis, floribus magnis terminalibus seu paniculatis paucis, calycibus clavatis, petalis longè unguiculatis bipartitis coronatis. (I) in Corsicæ et Galloprovinciæ maritimis. — Fl. fr. 4. p. 759. *S. pubescens*. Lois. *S. velutina*. Pourr. Otth. in DC. prod. 1. p. 373. (v. s.)
28. *S. DECUMBENS* (Bern. sicul. cent. 1. p. 75.) pubescens, caulis numerosis decumbentibus diffusis ramosis, foliis parvis spathulato-lanceolatis, floribus inclinatis, spicâ dichotomâ, calycibus clavatis angustis, petalis longè unguiculatis bipartitis. (I) in Corsicâ reperiit Ph. Thomas. An à præcedente satis distincta? (v. s.)
29. *S. VALLESTIA* (Lin. sp. 603.) cespitosa viscidio-pubescentia, radice lignosâ, caulis humilibus assurgentibus parùm ramosis, foliis lanceolatis, inferioribus spathulatis, floribus terminalibus raro geminis, calycibus longissimis reticulatis, petalis bifidis. ♀ in Alpibus Delph. et Galloprovinciæ. — Fl. fr. 4. p. 756. All. ped. t. 34. f. 2. (v. v. DC.)
30. *S. CORSICA* (DC. fl. fr. 4. p. 756.) pubescens viscosissima, caulis procumbentibus foliosis, foliis obovatis, floribus terminalibus erectis, calycibus clavatis, petalis longissimè unguiculatis bipartitis coronatis. ♀ in Corsicâ. — Boce. mus. t. 54. (v. s.)
31. *S. ITALICA* (DC. fl. fr. 4. p. 753.) piloso-pubescentia, caulis ramosissimus, foliis inferioribus ovato-spathulatis, superioribus linearibus, floribus amplio-paniculatis, calycibus longis clavatis, petalis bilobis nudis. ♀ in lapidosis ad sepes in provinciis australibus et circâ Mimatet et Albi. — Jacq. obs. 4. t. 79. (v. v.)
- β. *cana* (Otth.) parùm ramosa mollissima, paniculâ densâ. — In Corsicâ et Galloprovinciâ. *S. Salzmanni*. Otth. in DC. prod. 1. p. 381. (v. s.)
32. *S. CONGESTA* (Sib. et Sm. prod. fl. græc. 1. p. 300. ex Otth. in DC. prod. 1. p. 384.) pubescens, caule subramoso, foliis obovatis acuminatis petiolatis, floribus corymboso-congestis, calycibus longissimè clavatis, petalis bipartitis nudis. (I) in Pyrenæis propè Fontpedrouze reperiit Ph. Thomas. An species à præcedente distincta? (v. s.)
33. *S. REQUIENII* (Otth. in DC. prod. 1. p. 381.) pubescens, radice crassâ lignosâ, caule erecto subsimplici folioso præcipue basi, foliis oblongo-ovatis acuminatis, floribus paucis paniculatis, calycibus longissimis. ♀ in Corsicâ. — *S. fruticosa* Fl. fr. 5. p. 606. An L. sp. 597? (v. s.)
34. *S. ARMERIA* (L. sp. 601.) glaberrima glauca viscosa, caule ramoso, foliis ovato-lanceolatis, floribus paniculato-corymbosis, calycibus longè clavatis petalis obcordatis coronatis. (I) in Galliæ mediâ, occidentali et australi. — Fl. fr. 4. p. 751. — Clus. hist. 1. p. 288. f. 1. (v. v.)

VI. LYCHNIS. DC. fl. fr. 4. p. 761. — Lychnis et Agrostemma. Lin.

Calyx tubulosus, 5-dentatus, nudus; petala 5 unguiculata, fauce sæpius coronatâ; stamina 10; styli 5; capsula 1-5-locularis, anthophoro longo vel nullo.


Sect. I. VISCARIA. DC. fl. fr. 4. p. 761.


Calyx cylindrico-clavatus, capsula semiquinque locularis; anthophorum longum.

*. L. *VISCARIA* (Lin. spec. 625.) caule sub geniculis viscoso, limbo petalorum subintegro, foliis linearibus subspathulatis. ♀ in pratis siccis Galliæ borealis et mediæ. — Fl. fr. 4. p. 761. — Clus. hist. 1. p. 289. f. 2. (v. s.)

Sect. II. EULYCHNIS. DC. l. c.

Calyx cylindrico-clavatus, capsula unilocularis, petala fauce appendiculata, anthophorum longum aut subabbreviatum.





2. L. CHALCEDONICA (Lin. spec. 625.) glabriuscula, floribus fasciculatis, calycibus cylindrico-clavatis costatis, petalis bilobis, anthophoro longo, foliis lanceolatis cordatis subpilosis amplexicaulibus. ♀ in hortis culta sub nom. Croix de Malte. — Fl. fr. 4. p. 762. — Clus. hist. 1. p. 292. f. 1. (v. v. c.)
3. L. FLOS-JOVIS (Lin. sp. 625.) tomentosa, floribus umbellato-capitatis, calycibus cylindrico-clavatis costatis, petalis bilobis, anthophoro brevi crasso, foliis lanceolato-linearibus amplexicaulibus sericeo-tomentosis. ♀ in saxosis apicis Delphinatū ex Vill., Galloprovinciæ ex Ger. — Fl. fr. 4. p. 763. — Moris. hist. 2. s. 5. t. 36. n. 2. (v. v. in Helv.)
4. L. CÆLI-ROSA (Desronss. in Lam. dict. 3. p. 644.) glabra, caule dichotomo paniculato erecto, floribus solitariis terminalibus, calycibus clavatis decem-costatis, lobis acutissimis, petalis lobatis, anthophoro longo, foliis linearibus acutis. (I) circā Nicæam ex All. et in Corsicâ. — Fl. fr. 4. p. 764. — Moris. s. 5. t. 22. n. 32. (v. v. c.)

Sect. III. AGROSTEMA. DC. fl. fr. 4. p. 763.

Calyx ovoideus, dentibus brevibus; capsula 1-locularis; anthophorum brevissimum vel nullum.

5. L. SYLVESTRIS (Hope. cent. exs. 3. n. 33. DC. fl. fr. 4. p. 763.) floribus (ruberis) dichotomo-paniculatis subdioicis, petalis semibifidis, lobis angustis divergentibus, capsulis subrotundis, valvis recurvis, foliis ovatis vel lanceolatis. ♀ in umbrosis humidis. — Fl. fr. 4. p. 763. Eng. bot. t. 1579. Fl. inodori subsessiles. (v. v.)
6. L. DIOICA (Lin. spec. 626. var. ♂. DC. fl. fr. 4. p. 762.) floribus (albis) dichotomo-paniculatis dioicis, petalis semibifidis, lobis latis approximatis, capsulis conicis, apicibus rectis, foliis ovatis. ♀ ad vias et sepes. — Fl. fr. 4. p. 762. Eng. bot. t. 1580. Flores odorati pedunculati. (v. v.)
7. L. LÆTA (Ait. Kew. ed. 2. t. 3. p. 134.) caule simplici, floribus solitariis, calycibus 10-striatis, petalis 2-fidis, foliis linear-lanceolatis. (I) in arenosis paudosis agri Syrtici reperierunt Cl. Laterrade et Des Moulins. — Planta vix 2-pollicaris, fl. cærulentes? (v. s.)
8. L. CORSICA (Lois. not. 73.) caule erectus ramoso subdichotomo, pedunculis elongatis unifloris, petalis oblongis subemarginatis, foliis linear-lanceolatis glabris. ♀? in Corsicâ. — Fl. fr. 5. p. 607. Pedalis et ultrà, fl. rubelli. An var. præcedentis? (v. s.)
9. L. PYRENAÏCA (Berg. fl. bass. pyren. 2. p. 264.) glabra, caulis cespitosis diffusis, floribus dichotomo-fasciculatis, flore longè pedunculato in dichotomiâ, calycibus campanulatis, lobis brevibus, petalis subemarginatis appendiculatis, foliis coriaceis, radicalibus spatulatis longè petiolatis, canulinis cordatis sessilibus. ♀ ad rupe in Pyrenæis occidentalibus. — Fl. fr. 5. p. 608. L. nummularia Lapeyr. abr. 263. (v. v. DC.)
10. L. FLOS-CUCULI (Lin. spec. 625.) caulis adscendentibus glabriusculis, floribus dichotomo-fasciculatis, calycibus campanulatis decemcostatis, petalis laeviappendiculatis, foliis lanceolato-linearibus. ♀ in pratis humidis. — Fl. fr. 4. p. 762. — Clus. hist. 1. p. 292. f. 2. (v. v.)
11. L. ALPINA (Lin. spec. 626.) glabra, caulis cespitosis strictis, floribus densè umbellato-capitatis, calycibus campanulatis, petalis bifidis, anthophoro nullo, fructibus globosis, foliis linear-lanceolatis. ♀ in pratis editiorum Alpiem et Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 762. — Hall. helv. t. 17. f. 4. (v. v.)
12. L. CORONARIA (Lam. dict. 3. p. 643.) tomentosa, caule dichotomo, pedunculis elongatis 1-floris, calycibus subcampanulatis costatis, petalis emarginatis coronatis serratis, foliis lanceolatis latissimis coriaceis. ♀ Alpibus Helvetiae et Pedemontii indigena, in hortis culta. — Fl. fr. 4. p. 763. Cart. bot. mag. t. 24. (v. v. c.)

Sect. IV. GITHAGO. Desf. cat. 159.

Calyx cylindrico-campanulatus coriaceus, laciinis longissimis; capsulæ 1-lo-
culares; anthophorum nullum.

13. L. *GITHAGO* (Lam. dict. 3. p. 643. DC. fl. fr. 4. p. 764.) *hirsuta*, caule dichoto-
mico, floribus longè pedunculatis, foliis linearibus. (1) abundè inter segetes
— *Agrostemma Githago* L. sp. 624. — Fuchs. hist. 127. ic. (v. v.)

VII. VELEZIA. Lin. gen. n. 448. Gærtn. fruct. 2. t. 129. f. 12.

Calyx tubulosus, 5-6-dentatus; petala 5-6 brevia, unguibus filiformibus barbatis, limbo emarginato; stamina 5-6; styli 2; capsula 1-
locularis.

1. V. *RIGIDA* (Lin. spec. 474.) calycibus filiformibus pubescens, petalis
bisidis. (1) in aridis Galloprovinciæ et Occitaniæ. — Fl. fr. 4. p. 765. — Barr.
ic. 1017 et 1018. (v. s.)

Trib. II. ALSINEÆ. DC. fl. fr. 4. p. 766.

Calycis sepala 4-5 libera aut imâ basi vix subcoalita.

VIII. GOUFFEIA. Robill. et Cast. diss. ined. DC. fl. fr. 5. p. 609.

Calyx 5-partitus patulus; petala 5 integra; stamina 10; styli 2; capsula globosa 1-locularis 2-valvis 1-2-sperma.

1. G. *ARENARIOIDES* (Rob. et Cast. ined. DC. l. c.) ramis divaricatis, floribus
subcorymbosis, foliis linearibus brevibus deflexis. (2) in rupestribus apricis
Massiliæ. (v. v. D.)

IX. BUFFONIA. Sauv. meth. fol. 141. Lin. gen. n. 225. Gærtn. fruct. 2. t. 129. f. 1.

Calyx 4-sepalus; petala 4 integra; stamina 4; styli 2; capsula com-
pressa, 1-locularis, 2-valvis, 2-sperma.

1. B. *ANNUA* (DC. fl. fr. 4. p. 768.) caule basi laxè paniculato, ramis divari-
catis brevibus firmis, striis calycinis rectis parallelis, capsulis calycem vix
sequantibus, foliis subulatis basi dilatatis. (1) ad sepes et vias Galliæ austra-
lis, in montosis agri Ligericini, Arverniæ et circè Divionem (Cordienne).
— Fl. fr. 4. p. 768. — Lam. ill. t. 87. f. 1. (v. s.)

2. B. *PERENNIS* (Pourr. act. tonl. 3. p. 219.) caule apice ramoso, ramis filiformi-
bus elongatis, striis calycinis arenatis convergentibus. (2) in siccis agri
Ruscinonensis, Narboneus et Monsp. — Fl. fr. 4. p. 768. Lam. ill. t. 87.
f. 2. (v. s.)

X. SAGINA. Lin. gen. n. 236. Gærtn. fruct. 2. t. 129. f. 10.


Calyx 4-5-partitus; petala 4-5- aut o; stamina 4-5; capsula 4-5-
valvis, 1-locularis, ∞ -sperma.

1. S. *PROCUMBENS* (Lin. spec. 185.) glabra ramis procumbentibus, foliis linea-
ribus mucronatis, pedunculis fructiferis adscendentibus, petalis brevibus
obtusis, laciinis calycinis subrotundis. (1) ad muros et in arvis sabulosis.
— Fl. fr. 4. p. 768. Eng. bot. t. 880. (v. v.)

2. S. *APETALA* (L. mant. p. 759.) hispido-pubescentis, ramis erectiusculis di-
chotomis, foliis linearibus mucronatis, pedunculis fructiferis adscendentibus,
petalis brevissimis subrotundis, laciinis calycinis lanceolatis obtusiusculis.
(1) in sabulosis passim. — Fl. fr. 4. p. 769. — Arduin. spec. 2. t. 8. f. 1. (v. s.)

S. agglomerata (Ser.) floribus sessilibus pedicellatisque agglomeratis. Circè
Agatham. (Ph. Thomas.) (v. s.)





3. *S. ERECTA* (Lin. spec. 185.) caulis erectis subunifloris glabris, foliis linearibus acutis, pedunculis strictis, petalis brevibus, sepalis lanceolatis acutis. (I) in sterilibus glareosis.—Fl. fr. 4. p. 769.—Vaill. bot. par. t. 3. f. 2. *Moenchia glauca* Pers. (v. v.)

XI. MOEHRINGIA. *Lin. gen. 264. Gærtn. fruct. 226. t. 129. f. 11.*

Calyx 4-partitus; petala 4; stamina 8; styli 2; capsula 4-valvis, 1-locularis, ∞ -sperma.

1. *M. MUSCOSA* (Lin. spec. p. 515.) foliis linearibus connatis, laciinis calycinis planis longitudine ferè internodiorum lanceolatis acutis. $\frac{M}{U}$ in humidis montosis.—Fl. fr. 4. p. 771.—Pluck. t. 74. f. 3. et t. 75. f. 1. (v. v.)

XII. ELATINE. *Lin. gen. n. 685. Gærtn. fruct. 2. p. 142. t. 102. f. 2.*

Calyx 3-4-partitus; petala 3-4 unguibus destituta; stamina petalis numero æqualia? aut dupla, ideo 3-4 aut 6-8; styli 4 apice capitati; capsula 4-valvis, 4-locularis, ∞ -sperma; semina cylindracea.

1. *E. HYDROPIPER* (Lin. spec. 527.) foliis oppositis, floribus alternis pedicellatis octandris tetrapetalis. $\frac{M}{U}$ in Galliæ occidentalis, borealis, orientalisve inundatis.—Fl. fr. 4. p. 771. var. α ; ic. rar. t. 43. f. 2.—Vaill. bot. t. 2. f. 2. (v. s.)

2. *E. HEXANDRA* (DC. ic. pl. rar. 1. p. 14. t. 43. f. 1.) foliis oppositis, floribus alternis pedicellatis hexandris tripetalis. $\frac{M}{U}$ in inundatis Galliæ occidentalis, mediæ et boreali-orientalis.—Fl. fr. 5. p. 609.—Vaill. bot. t. 2. f. 1. (v. v. circa Genevam D.)

3. *E. ALSINASTRUM* (Lin. spec. 527.) foliis verticillatis, floribus sessilibus verticillatisque. $\frac{M}{U}$ in inundatis circa Argentoratum, Parisios, Lugdunum, etc.—Fl. fr. 4. p. 772.—Vaill. bot. par. 1. f. 6. (v. v.)

XIII. HOLOSTEUM. *Lin. gen. n. 136. Gærtn. fruct. t. 130. f. 5. excl. p.*

Calyx 5-sepalus; petala 5 dentata; stamina 5 aut abortu 3-4; styli 3; capsula 1-locularis apice in 6 dentes dehiscens; embryo intra albumen replicatus.

1. *H. UMBELLATUM* (L. sp. 130.) foliis radicalibus ellipticis glaucis glabris, caulinis majoribus ovatis, floribus umbellatis, pedicellis post anthesin deflexis, valvis circinnatis. (I) in muris et arvis passim.—*Alsine umbellata*. Fl. fr. 4. p. 770. Lam. ill. t. 31. f. 1. (v. v.)

XIII. SPERGULA. *Lin. gen. n. 798. Gærtn. fruct. t. 130. f. 4.*

Calyx 5-partitus; petala 5 integra; stamina 5-10; styli 5; capsula 1-locularis, 6 valvis, ∞ -sperma.

§. 1. *Foliis verticillatis basi stipulatis.*

1. *S. ARVENSIS* (Lin. spec. 630.) foliis verticillatis basi stipulatis, floribus decandris, seminibus spheroïdeis hispidulis angustè marginatis nigris. (I) in arvis sabulosis.—Fl. fr. 4. p. 773. Lam. ill. t. 392. f. 1 (v. v.)

2. *S. PENTANDRA* (Lin. spec. 630.) foliis verticillatis basi stipulatis, floribus subpentandris, seminibus lenticularibus margine punctatis alatisque. (I) in sylvaticis Galliæ mediæ, occidentalis et australis.—Fl. fr. 4. p. 773. Lam. ill. t. 392. f. 2. (v. s.)

§. 2. *Foliis oppositis, junioribus in axillâ fasciculatis; stipulis nullis.*

3. *S. NODOSA* (Lin. spec. 630.) foliis oppositis subulatis lævibus obtusiusculis, infimis latè vaginantibus, caulis cespitosis subsimplicibus paucifloris, petalis calyce duplo longioribus, seminibus subreniformibus rugosis. $\frac{M}{U}$ in paludo-

- sis Galliae occidentalis, mediæ, boreali-orientalis. — Fl. fr. 4. p. 773. — J. Bauh. 3. p. 724. ic. (v. v.)
4. *S. SAGINOÏDES* (L. spec. 631.) caule repente, foliis oppositis linearibus levibus, pedunculus solitarius longissimus, petalis obtusissimis sepala obtusa vix aequantibus, seminibus subreniformibus punctatis. (I) in Gallia occidentali et circa Valleretum ex Ramond. — Fl. fr. 4. p. 774. Eng. bot. t. 2105. (v. s.)
 5. *S. SUBULATA* (Swartz act. holm. 1789. p. 45. t. 1. f. 3.) subpilosa, foliis oppositis subsecundis linearie-subulatis subaristatis, pedunculus solitarius longissimus, petalis calycis longitudine. ♀ (I) in sabulosis Galliae occidentalis et circa Parisios. — Fl. fr. 4. p. 775. Eng. bot. t. 1082. (v. s.)
 6. *S. PILIFERA* (DC. fl. fr. 4. p. 774.) foliis oppositis linearibus aristatis subrigidis glabris fasciculatis, caulibus repentibus ramosis cespitosis, pedunculis longissimis, petalis calyce duplò longioribus, semin. subovoideis. — In montibus editoribus Corsicæ. (v. s.)
 7. *S. GLABRA* (Wild. spēc. 2. p. 821.) decumbens, foliis oppositis filiformibus glabris subacutis, floribus decandris, petalis calyce majoribus. ♀ in Alpibus Delph. Galloprov. Corsicæ. — Fl. fr. 4. p. 774. — All. ped. t. 64. f. 1. (v. v. DC.)

XIV. LARBREA. St.-Hil. in mem. mus. 2. p. 287.

Calyx 5-fidus basi urceolatus; petala 5 bipartita perigyna; stamina 10 perigyna; styli 5; ovarium 1-loculare, ∞ -spermum, capsula apice 6-valvis.

1. *L. AQUATICA* (St.-Hil. 1. c.) caulis dichotomis, foliis lanceolatis superiores sessilibus, floribus axillaris longè pedunculatis post anthesin deflexis. ♀ in paludosis et ad fossas. — Ser. in DC. prod. 1. p. 393. excl. syn. L. et Sm. — *Stellaria aquatica* Poll. pal. 422. Fl. fr. 4. p. 795. — Eng. hot. t. 1074. (v. v.)

XV. STELLARIA. Lin. gen. n. 773. Gærtn. fruct. 2. t. 130. f. 3.

Calyx 5-partitus; petala 5 bifida; stamina 10 aut abortu 3-8; styli 3; capsula 1-locularis, apice 6-valvis, ∞ -sperma.

1. *S. NEMORUM* (Lin. spec. 603.) foliis inferioribus cordatis petiolatis, superioribus lanceolatis subsessilibus, paniculâ dichotomâ, petalis calyce duplò longioribus, seminibus orbiculatis compressis margine tuberculatis. ♀ in nemoribus et umbrosis. — Fl. fr. 4. p. 793. Eng. bot. t. 92. (v. v.)
2. *S. LATIFOLIA* (Pers. encr. 1. p. 561.) caulis diffusus dichotomis basi subradicibus, foliis ovatis, inferioribus petiolatis subcordatis, superioribus sessilibus, pedicellis axillaris, junioribus umbellato-aggregatis, fructiferis reflexis, petalis calyce brevioribus, seminibus disciformibus rugosis. (I) in aquaticis circa Monspelium. — Fl. fr. 5. p. 614. (v. s.)
3. *S. MEDIA* (Smith. engl. bot. t. 537. fl. brit. p. 473.) caulis procumbentibus lineâ laterali pilosâ alternâ, foliis lanceolatis tenerrimis, fructibus deflexis, capsulis profundè 6-valvibus calyce vix longioribus, seminibus subreniformibus rugosis. (I) in cultis frequens. — *Alsine media*. L. sp. 389. Lam. ill. t. 214. DC. fl. fr. 4. p. 770 (v. v.)
4. *S. VISCIADA* (Bieb. taur. 1. p. 342.) villoso-viscosa, foliis lineari-lanceolatis, caulis dichotomis diffusis, petalis calyce longioribus, capsulis subcylin-drîcis sepalis lanceolatis duplò longioribus. (I) prope Metz. (cl. Soleiroli.) — Ser. in DC. prod. 1. p. 397. Waldst et Kit. hung. 1. t. 22. (v. s.)
5. *S. DUBIA* (Bast. suppl. p. 24. DC. fl. fr. 5. p. 614.) foliis linearibus glabris margine subciliatis, caule erecto, pedunculus erectis, sepalis trinerviis. (I) in agro Nannetensi et Andegaviensi. (v. s.)
6. *S. HOLOSTEA* (Lin. sp. 711.) foliis lanceolatis acuminatis serrulatis scabrius-culis, superioribus latioribus brevioribusque, pedunculus filiformibus præ-





- longis, petalis semibifidis calyce lanceolato acuto longioribus. \mathcal{U} ad sepes et in dumiatis. — Fl. fr. 4. p. 794. Eng. bot. t. 511. (v. v.)
7. S. GRAMINEA (Lin. spec. 604.) foliis linearibus margine lævibus, caulis diffusis, floribus paniculatis divaricatis, petalis calycis longitidine. \mathcal{U} ad margines sylvarum. — Fl. fr. 4. p. 795. Eng. bot. t. 803. (v. v.)
8. S. GLAUCÀ (With. bot. arrang. 1. p. 420.) glauca, foliis linear-lanceolatis margine lævibus, floralibus scariosis, petalis calyce duplò longioribus, canle erectiusculo debili. \mathcal{U} ad fossas et in pratis humidis Gallia boreali-occidentalibus et circa Parisios. — Fl. fr. 4. p. 794. Eng. bot. t. 825. (v. s.)
9. S. CERASTOÏDES (Lin. spec. 604.) foliis oblongis pubescens, pedunculis unifloris geminatis, fructiferis deflexis, petalis calyce majoribus, capsulis oblongis sepalis obtusis ferè duplò longioribus, caulis cespitoso-decumbentibus subdichotomis biflorisque. \mathcal{U} in herbosis humidis propè nives in Alpibus et Pyrenæis. — Fl. fr. 4. p. 796. Cerastium trigynum Vill. dauph. 3. t. 46. (v. v.)
10. S. RADICANS (Lapeyr. fl. Pyr. t. 93. ex Abr. p. 250.) caulis prostratis teretibus multifloris, foliis ellipticis obtusis lucidis, caulinis subsecundis, pedunculis divaricatis, sepalis linearibus obtusis corollâ duplò longioribus, capsulis pyriformibus. \mathcal{U} in Pyrenæis ex Lapeyr. Cum priori conjungit cl. Bentham. †.

XVI. ARENARIA. Lin. gen. n. 774. Gærtn. fruct. 2. t. 130. f. 9.

Calyx 5-sepalus; petala 5 integra; stamna 10 aut abortu pauciora; styli 5; capsula 1-loocularis, apice 6-3-valvis, ∞ -sperma.

Sect. I. SPERCULARIA. Pers. enc. 1. p. 504.

Capsula trivalvis; folia linearia, stipulis scariosis ad basin donata.

1. A. SEGETALIS (Lam. fl. fr. 3. p. 43.) glabra, caule erecto, foliis subulatis stipulatis subsecundis, sepalis scariosis medio lineâ viridescente longitudinaliter notatis, petalis calyce brevioribus, pedunculis defloratis deflexis, seminibus subpyriformibus rugosis. (1) inter segetes circa Parisios, Rothomagum, in Delphinatû et Andegaviâ. — Fl. fr. 4. p. 792. — Vaill. bot. par. t. 3. f. 3. (v. s.)
2. A. RUBRA (Lin. spec. 606.) caulis prostratis pilosis, foliis filiformibus internodio brevioribus stipulatis, sepalis lanceolatis obtusiusculis margine scariosis, pedunculis defloratis deflexis, seminibus angulato-subpyriformibus rugosis immarginatis. (1) in Galliâ passim. — Fl. fr. 4. p. 792.
- a. campestris* (L. sp. 606.) pilosa. — In arvis sabulosis. — J. Banh. 3. p. 723.
f. 3. (v. v.)
 - b. marina* (L. sp. 606.) glabriuscula. — In maritimis salsis. (v. v.)
3. A. MEDIA (Lin. spec. 606.) caulis prostratis, foliis semi-cylindricis carnosis internodia æquantibus stipulatis, sepalis lanceolatis obtusiusculis margine scariosis, pedunculis defloratis deflexis, seminibus alâ membranaceâ cinctis. (1) in pratis et sabulosis maritimis. — A. marginata DC. fl. fr. 4. p. 793. ic. rar. t. 48. Affinis A. rubræ marinæ sed minus ramosa. (v. v.)


Sect. II. ARENARIUM. Ser. in DC. prod. 1. p. 401.

Folia graminea linearia lanceolata vel rotundata, exstipulata; capsula 3-6-valvis.

§. I. Foliis subulatis linearibusve.

4. A. LARICIFOLIA (L. sp. 607.) foliis subulatis denticulato-ciliatis, caulis ascendentibus 3-6-floris subscabris, calycibus cylindricis, sepalis oblongis obtusiusculis triplinerviis hirtis corollâ duplò brevioribus, capsulis 3-valvis calycem superantibus. \mathcal{U} in Alpibus et Pyrenæis. — Fl. fr. 5. p. 612.
- a. multiflora* (Ser.) calycibus pedunculisque tomentoso-hirtis. — A. laricifolia Vill. dauph. 4. t. 47. f. 5. (v. v.)

- β. striata* (Ser.) calycibus pedunculisque hirsuto-viscosis.—*A. striata* Vill. dauph. 4. t. 47. f. 6. (v. v.)
5. *A. AUSTRIACA* (Jacq. aust. 3. t. 270.) foliis linearisubulatis 3-nerviis, caule subpaniculato, pedunculis terminalibus longissimis binis puberulis, petalis obtusis emarginatis, sepalis 3-nerviis acutissimis patentibus. ♀ in Alpibus Delph. et Galloprovinciæ. — Fl. fr. 4. p. 736. — All. ped. t. 64. f. 2. *A. triflora* Vill. dauph. 4. t. 47. (v. s.)
6. *A. GRANDIFLORA* (L. sp. 608.) foliis subulatis latiusculis planis trinerviis ciliatis, radicalibus confertis, caulis subunifloris, pedunculus longissimus pubescentibus, sepalis ovatis aristatis grosse 3-nerviis corollâ duplò minoribus, capsulis ovatis 6-valvibus calycem vix superantibus. ♀ in petrosis editioribus Jurassi, Alpium, montium Occitaniæ, Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 787. All. ped. t. 10. f. 1. *A. mixta* Lapeyr. abr. p. 255. (v. v.)
- β. triflora* (Ser.) caulis 2-4-floris, foliis angustioribus recurvis. In montosis sabulosis Fontis-Bleaudi, Jurassi, montis Ventosi, Pyrenæorum. (v. v.)
- γ. stolonifera* (Ser.) caulis ramosissimis, foliis inferioribus latiusculis brevibus densis, superioribus sepalisque angustissimis longissimis distantibus. In Delphinatū. (v. s.)
7. *A. VERRNA* (L. mant. 72.) cespitosa multicaulis, foliis subulatis obtusiusculis nervosis, caulis subpaniculatis elongatis, sepalis ovato-lanceolatis acuminatis striatis, petalis obovatis calycem vix æquantibus, capsulis cylindricis 3-valvibus. ♀ in collibus sabulosis montanis. — Fl. fr. 4. p. 788. Vaill. bot. t. 2. f. 3. (v. v.)
- β. cespitosa* (Ser.) caulis valde foliosis, calycibus pedunculisque glabriusculis. — *A. cespitosa* Ehrh. Fl. fr. 5. p. 613. (v. v.)
8. *A. GERARDI* (W. sp. 2. p. 729.) erecta ramosa, foliis linearisubulatis 3-nerviis, pedunculus geminis terminalibus 1-floris, sepalis acuminatis margine membranaceis 3-nerviis. ♀ in pratis sterilibus Alpium Galloprovinciæ ex Ger? Delphinatū ex Vill. — Fl. fr. 4. p. 788. — Ger. Gallop. t. 15. f. 1. An praecedentis var? (v. s. ex Pedem.)
9. *A. HISPIDA* (L. sp. 608.) cespitosa erecta multicaulis piloso-hispida, panicula dichotoma, foliis subulatis sepalisque subtus hispidis vix striatis, corollâ calycem superante, capsulis subglobosis trivalvibus calyce vix longioribus. ♀ circa Monspelium. — Fl. fr. 4. p. 789. Habitus Spergulæ, caules simplices pilis raris adspersi. (v. v. DC.)
10. *A. TENUIFOLIA* (L. sp. 607.) foliis subulatis setaceis, caule ramosissimo dichotomo, sepalis subulatis striatis petalis multò longioribus, capsula 3-valvi calycem vix superante. (1) ad muros et in sabulosis. — Fl. fr. 4. p. 789.
- a. Vaillantii* (Ser.) caulis cespitosis strictis glabris supernè ramosis. — Vaill. bot. t. 3. f. 1. (v. v.)
- β. Barrelieri* (DC.) caulis ramosissimis glabris subprocumbentibus. — A. Barrelieri Vill. — Barr. ic. t. 580. (v. s.)
- γ. hybrida* (DC.) caule supernè ramoso glabro striato, calycibus piloso-glandulosis viscidis. — *A. hybrida* Vill. dauph. 4. t. 47. *A. pentandra* Duf. ann. gen. 7. p. 292. (v. v.)
- δ. viscidula* (DC.) caule erecto supernè ramoso calycibusque hispido-viscidis. — *A. viscidula* Thuil. *A. viscosa* Pers.
11. *A. RECURVA* (All. ped. t. 89. f. 3.) foliis radicalibus congestis recurvis subulatis subsecundis, caulis cespitosis simplicibus subtrifloris, sepalis ovato-lanceolatis striatis pedunculisque piloso-glandulosis, petalis ovatis calycem æquantibus, capsulis ovatis 3-valvibus calyce brevioribus, seminibus subreniformibus vix punctato-rugosis. ♀ in pratis saxosis editiorum Alpium et Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 790. Jacq. coll. 2. t. 16. f. 1. sed in icoue fl. nimis magni. (v. v.)
12. *A. SETACEA* (Thuil. fl. par. ed. 2. p. 220.) caule ramosissimo, floribus



paniculato-fastigiatis, foliis setaceis fasciculatis secundis basi ciliatis, calycibus ovato-acutis margine albo-membranaceis petala subæquantibus, capsulis 3-valvibus calycem superantibus. ♀ ad saxa in collibus circa Parisios et Fontem-Bleaudi. — Fl. fr. 4. p. 790. A. heteromalla Pers. (v. s.)

13. A. FASCICULATA (Gou. ill. 3o.) foliis subulatis fasciculatis setaceis, caulinibus erectis strictis subsimplicibus, floribus fasciculatis, pedicellis folio brevioribus, sepalis acuminatis submembranaceis 2-lineatis petalis subduplicè longioribus, capsulis 3-valvibus calyce brevioribus, seminibus reniformibus rugosis margine subserratis. (1) (2) in apricis montanis Jurassi, Delphinatûs, et agri Ligericini. — Fl. fr. 4. p. 791. — Hall. helv. t. 17. (v. v.)

14. A. MUCRONATA (DC. fl. fr. 4. p. 791.) foliis setaceis basi non ciliatis, caulinibus cespitosis basi prostratis, paniculâ subdichotomâ, pedunculis folio longioribus, sepalis acuminatis submembranaceis bilineatis aristatis petala capsulasque trivalves superantibus. (1)? in saxosis montanis prov. austr., Pyrenæorum et agri Mimatensis. — A. mutabilis Lapeyr. abr. 256. An var. præcedentis. (v. v.)

15. A. ULIGINOSA (DC. fl. fr. 4. p. 786. ic. rar. t. 46.) erecta basi ramosa glabra, foliis linearibus obtusiusculis, ramis supernè nudis, pedunculis geminis unifloris subterminalibus basi bibracteatis, sepalis lanceolatis enerviis petalis ovatis vix longioribus, capsulis ovatis calycem æquantibus trivalvibus, seminibus subreniformibus. ♀ in paludosis turfosis Jurassi. (v. s.)

§. 2. *Foliis lanceolatis ovalibus rotundatisque.*

16. A. TETRAQUETRA (L. sp. 605.) caulinibus cespitosis, foliis oblongis coriaceis infernè margine ciliatis, sepalis ovato-lanceolatis coriaceis rigidis acutis trinerviis corollam subæquantibus, capsulis ovatis truncatis calycem æquantibus, seminibus reniformibus tuberculatis. ♀ in sterilibus montosis Galliæ Mediterraneæ. — Fl. fr. 4. p. 781. Gay. in ann. sc. nat. 3. p. 27.

a. *uniflora* (Gay.) caulinibus floriferis brevissimis, foliis dense imbricatis, floribus solitariis, sepalis petalisq. 4, stamin. 8. In Pyrenæis editioribus. (v. v.)

β. *aggregata* (Gay.) caulinibus floriferis elongatis, foliis supernè laxis, floribus 5-10 aggregatis, sepalis petalisque 5, staminibus 10. — Barr. ic. t. 595. (v. v.)

17. A. LANCEOLATA (All. ped. t. 26. f. 5.) cespitosa villosula, ramis ascendentibus, foliis lanceolatis angustis acutis rigidis nervosis, pedicellis foliis duplò longioribus, sepalis lanceolatis acutis nervosis corollâ vix longioribus, capsulis ovatis longitudine calycis 3-valvibus, valvis apice callosis. ♀ In Alpibus Galloprovinciæ et Delphinatûs. — Fl. fr. 4. p. 785. A. cherlerioides Vill. dauph. 4. p. 47. t. 47. Folia imbricata. (v. v. DC.)

18. A. PURPURASCENS (Ram. in DC. fl. fr. 4. p. 785.) cespitoso-decumbens, ramis erectis 2-3-floris, foliis ovato-lanceolatis acuminatis glabris, pedicellis tomentosis folia vix superantibus, sepalis lanceolatis lævibus margine scarosis corollâ longioribus, capsulis ovato-cylindricis semi-sexvalvibus calycem superantibus, valvis acutis, seminibus reniformibus. ♀ in Pyrenæis editissimis. — Fl. fr. 6. p. 611. ic. rar. t. 45. A. cerastoïdes Lap. (v. v.)

19. A. MONTANA (L. sp. 606.) pubescens, foliis lanceolato-linearibus, caulinibus sterilibus longissimis procumbentibus, pedunculis terminalibus longis unifloris, fructiferis nutantibus, sepalis lanceolatis acuminatis corollâ multò brevioribus, capsulis ovato-globosis 6-valvibus calycem æquantibus, valvis obtusiusculis, seminibus reniformibus rugosis. ♀ in sabulosis Galliæ occidentalis, in montanis circa Mimatem, Monspelium, et Pyren. orient. ex Benth. — Fl. fr. 4. p. 784. Vent. cels. t. 34. A. linearifolia Poiret. (v. v.)

20. A. SERPYLLIFOLIA (L. sp. 606.) foliis ovatis acutis sessilibus ciliatis, caulinibus ramosissimis, sepalis lanceolatis acutis trinerviis corollâ ferè duplò majoribus, capsulis ovatis apice 6-valvibus calycem æquantibus, seminibus reniformibus rugosis. (1) ad muros et in arvis sabulosis. — Fl. fr. 4. p. 784. Fuchs. hist. 23. ic. (v. v.)

21. *A. CINEREA* (DC. fl. fr. 5. p. 811.) piloso-cinerea, foliis ovato-lanceolatis acutis ciliatis, superioribus distantibus lanceolatis acutis, floribus paniculato-dichotomis longè pedunculatis, sepalis lanceolatis acutis subcarinatis corollâ ferè duplò minoribus, capsulis ovatis calycem æquantibus sexvalvibus, valvis calliosis. $\frac{2}{\mu}$ in Galloprovinciæ petrosis. (v. s.)
22. *A. CILIATA* (L. sp. 608.) foliis ovatis obovatissimis nervosis ciliatis, caulinis procumbentibus, sepalis lanceolatis acutis nervosis corollâ ferè duplò brevioribus, capsulis ovatis 6-valvibus calycem æquantibus. $\frac{2}{\mu}$ in Alpibus Delphinatūs, Galloprov., Arverniæ, Pyrenæis. — Fl. fr. 4. p. 783. — Hall. hist. t. 17. f. 3. (v. v.)
β. multicaulis (DC.) foliis subcoriaceis sepalisque vix nervosis. — *A. multicaulis* Wulf. in Jacq. coll. 1. t. 17. f. 1. (v. v.)
23. *A. TRINERVIA* (L. sp. 605.) caule gracili ramoso, foliis ovatis acutis petiolatis ciliatis nervosis, pedunculis longis post anthesin deflexis, sepalis lanceolatis acutis margine membranaceis corollâ multò longioribus, capsulis ovatis calycem æquantibus 6-valvibus, valvis apice circinnatis (I) in nemorosis. — Fl. fr. 4. p. 788. Fl. dan. t. 429. (v. v.)
24. *A. CERASTIIFOLIA* (Ram. in DC. fl. fr. 4. p. 783.) cespitosa sublignosa ramosa, foliis ovato-lanceolatis trinerviis pubescentibus, pedunculis terminibus unifloris piloso-glandulosis, sepalis lanceolatis obtusiusculis nervosis corollâ brevioribus, capsulis ovatis calycem vix superantibus trivalvibus. $\frac{2}{\mu}$ in rimis saxorum in editioribus Pyrenæis. — *A. Ramondi* Poir. (v. v. DC.)
25. *A. BALEARICA* (L. syst. nat. ed. 12. app. 230.) cespitosa repens, foliis ovatis lucidis subcarnosis ciliatis, pedunculis elongatis 1-floris, floribus cernuis, sepalis ovatis obtusiusculis enerviis corollâ multò brevioribus, capsula ovata calycem vix superante 6-valvi, valvis apice subcircinnatis. $\frac{2}{\mu}$ in Corsicâ. — Fl. fr. 4. p. 782. L'Her. stirp. 1. t. 15. (v. s.)
26. *A. BIFLORA* (L. mant. 71.) foliis ovato-subrotundis glabris subimbricatis, caulinis procumbentibus ramosissimis, pedunculis bifloris lateralibus, sepalis ovatis obtusis corollâ brevioribus, capsulis ovatis longitudine calycis 3-valvibus. $\frac{2}{\mu}$ in Alpibus editissimis Delphinatūs propè nives. — Fl. fr. 4. p. 782. All. ped. t. 44. f. 1. et t. 64. f. 3. (v. v. in Pedem.)
β. apetala (DC.) foliis imbricatis ciliatis, floribus apetalis. — *A. apetala* Vill. dauph. t. 48. (v. s.)

XVII. *ADENARIUM*. Rafin. journ. phys. 1818. DC. in prod. t. 3. ined. — Honckeneyea, Ehr. beytr. 2. p. 181. — *Arenaria sp. auct.*

Calyx 5-partitus; petala 5, imò calyci inserta integrâ; stam. 10, cum petalis inserta; styli 3-5; glandulæ 10, in toro circâ ovarium; capsula 3-5-valvis 1-locularis; semina pauca.

1. *A. PEPOIDES* (Rafin. l. c.) foliis ovatis carnosis, floribus solitariis, seminibus maximis subpyriformibus. $\frac{2}{\mu}$ in arenosis maritimis secùs Oceani ripas. — *Arenaria peploides*. L. sp. 605. Ser. in DC. prod. 1. p. 413. Fl. fr. 4. p. 781. fl. dan. t. 624. non Lapeyr. (v. v.)


XVIII. *CERASTIUM*. L. gen. 797.


Calyx 5-partitus; petala 5 bifida; stamina 10; styli 5; capsula 1-locularis cylindrica aut globosa, apice dehiscens dentibus 10 circinnatis vel ascendentibus.

§. 1. *Calyce petala æquante vel superante.*

1. *C. VULGATUM* (L. sp. 627.) hirsutum, caulinis erectis, foliis ovatis obtusissimis hirsutis, floribus dichotomis subumbellatis pedunculis longioribus, petalis calycem æquantibus, capsulis oblongis attenuatis calyce duplò longioribus. (I) (2) in ruderatis. — Fl. fr. 4. p. 775. — Vaill. bot. t. 30. f. 3. (v. v.)

β. glomeratum (DC.) foliis obtusissimis, floribus umbellato-glomeratis.
C. ovale. Pers. (v. v.)





2. *C. viscosum* (L. sp. 627.) hirsuto-viscosum, caulis erectis, foliis lanceo-lato-oblongis, floribus dichotomo-subumbellatis, pedunculis petalisque calycem æquantibus, capsulis subpendulis teretibus calyce duplò longioribus. (I) in ruderatis. — Fl. fr. 4. p. 776. *C. obscurum* Chaub. in St.-Am. agen. et bouq. t. 4. f. 1. — Vaill. bot. t. 30. f. 1. (v. v.)
3. *C. SEMIDECANDRUM* (L. sp. 607.) hirsuto-viscidum, caulis erectis, foliis ovato-lanceolatis, floribus pentandris dichotomo subumbellatis, pedunculis calyce longioribus, capsulis teretibus post flore sechtiam deflexis calyce duplò longioribus. (I) in sabulosis et ad margines agrorum. — Fl. fr. 4. p. 776. — Vaill. bot. t. 30. f. 2. (v. s.)
- β. *alsinoides* (DC.) lobis calycinis margine apiceque scariosis. — *C. alsinoides* Pers. — Circè Monspelium et Massiliam (Solier). (v. v.)
- γ. *pellucidum*, lobis calycinis bracteisque apice scarioso-pellucidis. — In arenosis versus Aginnum. — *C. pellucidum* Chaub. in St.-Am. agen. et bouq. t. 4. f. 2. Ser. in DC. prod. 1. p. 416. (v. s. D.)
4. *C. ANDROSACEUM* (Ser. in DC. prod. 1. p. 416.) pilosissimum, caule dichotomo divaricato, foliis ovatis obtusis, floribus solitariis aut subcapitatis pedunculatis basi subinvolutatis, sepalis linearibus angustis acutissimis, petalis ovato-lanceolatis obtusis calyce triplò brevioribus, capsula oblonga calyce paulò breviore. (I) ad vias Corsicæ propè Calvi detexit cl. Soleiro. (v. v.)
5. *C. BRACHYPETALUM* (Desp. in Pers. enh. 1. p. 520.) caule erecto tomentoso dichotomo, foliis ovatis, floribus paniculatis, pedunculis flore longioribus, calyce villoso petalis longiore, capsulis calycem vix superantibus. (I) in agro Mimatensi, Aginnensi, Cœnomanensi, Aureliensi et Argentor., probabiliter in omni Galliâ boreali et occidentali. — Fl. fr. 4. p. 777. ic. rar. t. 44. Caulis foliaque pilosissima. (v. s.)
6. *C. MURALE* (Desp. in DC. fl. fr. 5. p. 609.) hirsutum suberectum rigidum, foliis ovato-oblongis acutis numerosis, floribus fasciulatis longitudine pedicelli, petalis emarginatis calycem æquantibus, capsulis oblongis calycem vix superantibus. ♀? circè Cœnomanum et Beauvais ex D. Gravet. (v. s.)

§. 2. *Petalis calycem superantibus.*

7. *C. AQUATICUM* (L. sp. 609.) foliis cordatis sessilibus, floribus laxe dichotomo-paniculatis, petalis bifidis calyce vix longioribus, capsulis pendulis subglobosis calycem subæquantibus. ♀ in fossis aquosis prope lacus. — Fl. fr. 4. p. 780. Eng. bot. t. 538. (v. v.)
8. *C. SOLEIROLI* (Ser. ined.) hirsuto-viscosum, caulis prostratis ascendentibus 1-2-floris, foliis inferioribus ovatis confertis, superioribus lanceolatis, floribus erectis, pedunculis calycem subæquantibus, sepalis lanceolatis apice subscariosis, capsulis calycem æquantibus? ♀ in Corsicâ reperiit Soleiro. (v. s.)
9. *C. TEMENTOSUM* (L. sp. 629. var. β) caulis repente diffusis foliisque oblongis spathulatis tomentoso-canis, pedunculis erectis dichotomis, sepalis oblongis tomentoso-canis margine-scariosis, capsula subcylindracea calyce longiore. ♀ in montibus Galloprovinciæ, in hortis vulgatissimum. — Fl. fr. 4. p. 777. — Col. phytob. ed. 1744. p. 115. t. 31. (v. v.)
10. *C. LANATUM* (Lam. dict. 1. p. 680.) caulis prostratis cespitosis, foliis densè lanatis inferioribus subrotundis, superioribus ovatis, floribus dichotomis, sepalis lanceolatis margine scariosis, capsula ovato-cylindrica calyce subduplicata longiore. ♀ in Pyrenæis, Alpibus et Arverniæ summo jugo Cantal. — Fl. fr. 4. p. 778. (v. v.)
- β. *Thomasianum* (Ser.) caulis foliis calycibusque glabris. — in valle Pyren. orient. dictâ Eynes. (v. s.)
11. *C. ALPINUM* (L. sp. 628.) caulis prostratis, foliis ovato-lanceolatis pilosis nudisve, floribus dichotomis paucis longè pedunculatis, sepalis oblongis.

- obtusiusculis margine scariosis pilosis, petalis calyce duplò longioribus, capsulà oblongâ calyce subduplicatè longiore. \mathcal{L} in herbosis humidis Alpium, Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 779. — Rai. syn. p. 349. t. 15. (v. v.)
12. *C. LATIFOLIUM* (L. sp. 627.) hirsuto - subviscosum, caulis prostratis, foliis ovatis 1-rarò 3-floris, floribus terminalibus, pedunculo florem æquante, sepalis ovatis margine scariosis, petalis calyce duplò longioribus, capsulà ovatâ turgidâ calycem superante. \mathcal{L} in Alpibus Delph. et Galloprovinciæ. — Fl. fr. 4. p. 778. Jac. coll. 1. t. 20. (v. v. in Pedem.)
13. *C. ARVENSE* (Lin. sp. 628.) caulis declinatis, foliis linear-lanceolatis obtusiusculis subpilosis, floribus dichotomo-paniculatis, pedunculis deflexo-pubescentibus, petalis calyce duplò majoribus, capsulà oblongo-cylindrica calyce duplò longiore. \mathcal{L} ad vias et in versuris agrorum. — Fl. fr. 4. p. 778. — Vaill. bot. par. t. 30. f. 4. 5. (v. v.)
14. *C. STRICTUM* (L. sp. 629? DC. fl. fr. 5. p. 610.) caulis declinatis, foliis sub-linearibus acuminatis glabris aut subhirsutis, pedunculis glanduloso-pubescentibus, petalis calyce duplò majoribus, capsulà oblongâ. \mathcal{L} in Alpibus et Galloprovinciæ montanis. An *C. arvensis* var.?
- α . *suffruticosum* (DC.) foliis angustissimis glabriusculis. — *C. suffruticosum*. L. Fl. fr. 4. p. 780. Benth. cat. 70. (v. v.)
 - β . *lineare* (DC.) foliis linear-lanceolatis elongatis acuminatis glabris. — *C. lineare* All. ped. t. 88. f. 5. (v. v.)
 - γ . *commune* (DC.) foliis linearibus obtusiusculis. — *Scop. carn.* 1. t. 19 f. 1. (v. v.)

XIX. CHERLERIA. *Hall. itin. helv.* 1. *L. gen. n.* 775.


Calyx 5-sepalus; petala 5 minima emarginata; stamina 10, styli 3, capsula 3-locularis? 3-valvis, loculis 2-spermis.

1. *C. SEDOMES* (L. sp. 608.) cespitosa parvula, foliis triquetris obtusiusculis nervosis patulis, capsulae valvis obtusiusculis apice callosis calyce duplò longioribus. \mathcal{L} propè nives æternas in editioribus Alpibus et Pyrenæis. — Fl. fr. 4. p. 781. Lam. ill. t. 379. (v. v.)
-

Ordo XV. LINEÆ. DC. theor. ed. 1. p. 217. prod. 1. p. 423.

Cal. sepala 3, 4, aut sæpiùs 5, basi vix imâ subcohærentia, per aestivationem imbricata cum pedunculo continua et ideò persistentia. Petala tot quot sepala, hypogyna, basi unguiculata, cum staminum annulo et interdùm inter se subcoalita, sepalis alterna, per aestivationem contorta. Stam. petalorum numero æqualia, petalis alterna, basi in annulum monadelpha. Antheræ basi insertæ, biloculares, birimosæ. Ovarium subglobosum loculis sæpissimè intùs tot quot sunt sepala, rarò paucioribus. Styli tot quot loculi. Capsula globosa, constans carpellis marginibus induplicatis, apice bivalvi dehiscentibus, intùs disseppimento incompleto è centro orto in concamerationes duas divisus. Semina in quoque carpello 2, inversa. Albumen sæpissimè nullum at hujus loco endoplevra tumida carnosa. Embryo rectus, radiculâ ad hylum sursus tendente. — Herbæ aut suffrutiçes, foliis integris extipulatis.







~~4.6~~ - Perennials

I. LINUM. C. Bauh. Smith. fl. brit. 1. p. 342. DC. prod. 1. p. 423.

Flores proportione partium quinariâ; sepala integra; styli rarissimè 3, cum petalis staminibus sepalisque 5.

§. 1. *Floribus flavis.*

1. L. GALLICUM (L. sp. 401.) glabrum, sæpiùs multicaule, foliis alternis linearis lanceolatis, floribus laxè paniculato-corymbosis, pedicellis calycis longitudine, sepalis basi ciliatis apice subulatis, petalis obtusis calyce duplò longioribus. (I) in arvis et sterilibus Galliæ australis et occidentalis. — Fl. fr. 4. p. 796. Ger. Gallop. t. 16. f. 1. (v. v.)

2. L. STRICTUM (L. sp. 400.) glabrum erectum, foliis linearis lanceolatis strictis sepalisque acuminatissimis ciliato-scabris, paniculâ corymbosâ confortâ, pedicellis brevissimis, petalis calycis longitudine. (I) in agris et arenosis Galliæ australis et occidentalis. — Fl. fr. 4. p. 798. — Lob. ic. t. 411. f. 2. (v. v.)

fl. alternum (Pers.) caule supernè evidentius corymboso. In Corrèia et Occitaniâ maritimâ ex cl. Benth. (v. s.)

3. L. MARITIMUM (L. sp. 400.) glabrum erectum, foliis lanceolatis trinerviis alternis, infimis oppositis obtusis, paniculâ laxâ subcorymbosâ, sepalis ovatis breviter mucronatis, petalis calyce triplò longioribus. ♀ in herbosis submaritimis Galliæ australis. — Fl. fr. 4. p. 797. — Lob. ic. t. 412. f. 2. (v. v.)

4. L. GLANDULOSUM (Mœnch. meth. 287.) glabrum erectum basi suffruticosum, foliis basi biglandulosis lanceolatis alternis, infimis subspathulatis obtusis, sepalis acuminatis, petalis calyce triplò longioribus. ♀ ♂ . L. campanulatum. Fl. fr. 4. p. 797.

a. campanulatum (L. sp. 400.) basi fruticosum glaucum, floribus corymbosis, sepalis linearis-lanceolatis. ♂ in montanis lapidosis Galliæ australis. — Lob. ic. 414. f. 2. (v. v.)

fl. flavum (L. sp. 399.) basi suffruticosum virens, floribus corymbosis, sepalis subserratis. ♀ ♂ in Gallopr.? (v. s. ex Gennâ.)

§. 2. *Floribus cæruleis roseisve raro albis.*

5. L. HIRSUTUM (L. sp. 398.) foliis lanceolatis 3-5-nerviis alternis suboppositisque cauleque hirsutis, summis sepalisque margine pilos glanduloso-capitatos gerentibus, stylis stamina ferè duplò superantibus. ♀ in agro Nicæensi et Pyrenæis orientalibus ex Lapeyr. — Fl. fr. 4. p. 800 et 5. p. 616. Jacq. fl. aust. t. 31. (v. s.)

6. L. NARBONENSE (L. sp. 398.) glabrum erectum, foliis lanceolato-linearibus acutissimis rigidiusculis, paniculâ subcorymbosâ, calycibus acuminatisimis basi ad marginem scariosis. ♀ in collibus sterilibus Galliæ australis. — Fl. fr. 4. p. 799. — Barr. ic. t. 1007. (v. v.)

7. L. USITATISSIMUM (L. sp. 397.) glabrum erectum, foliis lanceolatis linearibus, paniculâ corymbosâ, sepalis ovatis acutis margine membranaceis, petalis subcrenatis calyce triplò majoribus. (I) in arvis. — Fl. fr. 4. p. 798. Black. herb. t. 180. (v. v.)

8. L. ANGUSTIFOLIUM (Huds. ang. 134.) glabrum multicaule suberectum, foliis linearis-lanceolatis acutis sub-3-nerviis, sepalis ellipticis sub-3-nerviis acutiusculis, petalis calyce vix duplò majoribus. ♀ in pascuis Galliæ mediæ, occidentalis et australis. — Fl. fr. 4. p. 799. Eng. bot. t. 381. Flores pallidè cærulei. (v. v.)

9. L. MONTANUM (Schleich. cat. DC. prod. 1. p. 427.) glabrum erectiusculum multicaule, foliis linearibus lanceolatis acutis erectiusculis, floribus paniculato-corymbosis, pedicellis fructiferis erectis, sepalis ovalibus basi trinerviis, ext. acutis, int. obtusis margine membranaceis, petalis obtusis calyce triplò majoribus. ♀ in herbosis Jurassi, Alpium et Pyrenæorum. — L. Aus-

- triacum Fl. fr. 5. p. 615. non Lin. L. Alpinum Fl. fr. 4. p. 799. non L.—Scop. carn. ed. 2. t. 11. (v. v.)
10. L. ALPINUM (L. sp. 1672.) glabrum multicaule decumbens, foliis linearisubulatis erectis, floribus paucis subcorymbosis, pedicellis fructiferis erectis, sepalis ovalibus basi trinerviis, exter. subacutis, inter. obtusis margine membranaceis, petalis obtusis calyce triplò majoribus. ♀ in siccis montatis Galloprov., Arverniae, Pyrenæorum.—Fl. fr. 5. p. 615. non 4. p. 799. Jacq. aust. t. 321. Flores cærulei. (v. v.)
11. L. TENUIFOLIUM (L. sp. 398.) caulinibus a basi ramosis erectis glabris, foliis linearisetaceis glabriusculis, sepalis laeveolatis acuminatis medio glandulosociliatis capsulam superantibus, petalis calyce triplò longioribus. ♀ in collibus aridis Galliae occidentalis, australis, mediae et orientalis passim. — Fl. fr. 4. p. 800. — Clus. hist. 1. p. 318. f. 2. Petala sordidè albo-carnea. (v. v.)
12. L. SALSOLOIDES (Lam. dict. 3. p. 521.) caulinibus basi fruticosis subtortuosis ramosis, ramis ascendentibus, sterilibus brevioribus, foliis linearisetaceis glabriusculis, sepalis ovatis acuminatis medio glanduloso-ciliatis capsula subbrevioribus, petalis calyce triplò longioribus. ♀ in aridis Gallopr., Occitaniae, Vasconiae et Pictaviæ ex cl. Bast. — L. suffruticosum. Fl. fr. 5. p. 616. non Cav. — Barr. ic. t. 795? Corolla præcedentis. (v. v.)

§. 3. *Floribus albis, foliis oppositis.*

13. L. GATHARTICUM (L. sp. 401.) glabrum erectum, foliis oppositis obovato-lanceolatis, caule supernè dichotomo. (I) in pascuis et arvis.—Fl. fr. 4. p. 801. — Barr. ic. t. 1165. f. 1. (v. v.)

II. RADIOLA. *Gm. syst. 1. p. 289.*

Flores proportione partium quaternariâ; sepala ad medium ferè coalita, apice trifida.

1. R. LINOIDES (Gmel. l. c.) (I) in sabulosis humidis. — L. Radiola L. sp. 402. Fl. fr. 4. p. 801. — Vaill. bot. t. 4. f. 6. Herba pusilla floribus numerosis minimis. (v. v.)

Ordo XVI. MALVACEÆ. *Brown. cong. p. 8. DC. prod. 1. p. 429. — Malvaceæ s. 1. 2. 3. Juss. gen. 271.*

Calyx constans sepalis 5, rarissimè 3-4, basi plus minus coalitis per aestivationem valvatis, sèpè extùs gerens bracteas seu sepala exteriora involucrum calycemve exteriorem constituentes. Petala tot quot sepala et iis alterna, hypogyna, inter se æqualia, per aestivationem spiraliter contorta; nunc omnino distincta, sèpius imo staminum tubo adnata. Stamina numero petalorum æqualia aut sèpius multiplicita, definita aut sèpius indefinita, hypogyna; filamentis in tubum coalitis inæqualibus, exterioribus brevioribus; antheris unilocularibus rimâ transversali dehiscentibus. Ovarium carpellis plurimis sèpius circà axim verticillatis, interdùm congestis, rariùs liberis, ferè semper coalitis constans; styli tot quot carpella nunc distincti, nunc in unum coaliti; stigmata tot quot carpella plus minus distincta. Carpella nunc 1-2-sperma intùs rimâ dehiscentia,

nunc polysperma loculicido-dehiscentia aut medio septifera, septo ad latus interius semina gerente, nunc sublibera, nunc in capsulam multilocularem, nunc in baccam anomalam con-nata. Albumen nullum. Embryo rectus, radiculâ tereti, cotyledonibus chrysaloideo - contortuplicatis. — Herbae, frutices aut arbores, foliis alternis sæpius petiolatis stipulatis.

I. MALOPE. *L. gen. n.* 843.

Calyx cinctus involucro 3-phyllo, foliolis cordatis; carpella plurima 1-sperma in capitulum aggregata.

1. *M. MALACOIDES* (L. sp. 974.) foliis ovatis crenatis, stipulis oblongo-linearibus, pedunculis axillaribus 1-floris. (1) in pratis Galloprovinciæ circâ Grasse et Cannes. — Fl. fr. 4. p. 827. — Cav. diss. t. 27. f. 1. — Barr. ic. t. 1189. (v. s.)

II. MALVA. *L. gen. n.* 841.

Calyx cinctus involucro triphyllo rariu 5-6-phyllo, bracteolis oblongis setaceisve; carpella capsularia plurima in orbem disposita.

Sect. I. *Bismalvæ.* (Medik.)

Pedicellis axillaribus solitariis 1-floris, involucro 3-phyllo, foliis multipartitis, caule herbaceo.

1. *M. TOURNEFORTIANA* (L. sp. 971.) foliis multipartitis, lobis trifidis linearibus, caule decumbente, pilis subnullis fasciculato-stellatis. (1) in maritimis Galloprovinciæ circâ Forum Julii, et agri Ruscinonensis ex cl. Arnott. — Fl. fr. 4. p. 830. Cav. diss. 2. t. 17. f. 3. (v. s.)
2. *M. ALCEA* (L. sp. 971.) foliis inferioribus angulatis, superioribus 5-partitis incisis, caulinis calycibusque pube stellatâ fasciculatâ subvelutino-sebris. ♀ ad sylvarum oras, in incultis et umbrosis. — Fl. fr. 4. p. 829. Cav. diss. 2. t. 17. f. 2. — Fuchs. hist. 80. (v. v.)

3. *M. MOSCHATA* (L. sp. 971.) foliis inferioribus reniformibus incisis, caulinis multipartitis, laciniis linearibus, caulinis calycibusque pilis simplicibus scabris. ♀ in siccis et sterilibus. — Fl. fr. 4. p. 830. Cav. diss. 2. t. 18. f. 1. (v. v.)

β. laciniata (Desrouss.) foliis etiam inferioribus multifidis, laciniis linearibus. — Moris. s. 5. t. 18. n. 4. Variat etiam omnino glabra. (v. s.)

4. *M. FASTIGIATA* (Cav. diss. 2. t. 23. f. 2.) foliis cordatis 5-lobis acuminatis inaequaliter dentatis medio productiore cauleque erecto pubè stellatâ tomentosis, pedicellis axillaribus et in corymbum terminalem approximatis. (2) in Arverniâ et propè Aginnum ex St.-Am. — Fl. fr. 5. p. 625. (v. v. DC.)

Sect. II. *Fasciculatæ.* (DC.)

Foliis angulatis cordatis 5 nerviis, pedicellis axillaribus plurimis 1-floris, calyce exteriore 3-phyllo, caule herbaceo.

5. *M. SYLVESTRIS* (L. sp. 969.) caule erecto, foliis 5-7-lobatis acutis, pedicellis petiolisque pilosis. (2) in incultis et ad sepes frequens. — Cav. diss. 2. t. 26. f. 2. Fl. fr. 4. p. 829. — Lob. ic. t. 650. f. 2. (v. v.)
6. *M. ROTUNDIFOLIA* (L. sp. 969.) caule prostrato, foliis cordato-orbiculatis obtusissimè 5-lobatis, pedicellis fructiferis declinatis petiolisque pubescens, corollis calyce duplò majoribus. ♀ in incultis et ad sepes. — Fl. fr. 4. p. 829. Cav. diss. 2. t. 26. f. 3. — Lob. ic. t. 651. f. 1. (v. v.)
7. *M. NICÆENSIS* (All. ped. n. 1416.) caule prostrato, foliis angulatis acutis, pedicellis 3-4 erectis petiolo quadruplò brevioribus, calycibus pilosis corollâ brevioribus. (1) in ruderatis circâ Nicæam, Monspelium et Burdigalam (Des Moulins). — Fl. fr. 4. p. 828. Cav. diss. 2. t. 25. f. 1. (v. v. D.)

8. *M. PARVIFLORA* (Lin. amœn. 3. p. 416.) caule patulo, foliis subrotundis obtuse angulatis crenatis glabrinsculis, floribus axillaribus sessilibus glomeratis, corollis vix calyce longioribus. ♀ circa Niceam, Massiliam (Solier.), Mons pelium et in Pyren. orient. — Fl. fr. 4. p. 828. Cav. diss. t. 26. f. 1. Carpella supernè rugosa margine dentata. (v. s.)
9. *M. CRISPA* (L. sp. 970.) caule erecto, foliis angulatis dentatis crispis glabris, floribus axillaribus sessilibus. (1) ex Syriâ orta, in cultis et hortis subsponsanea. — Fl. fr. 4. p. 829. Cav. diss. 2. t. 23. f. 1. (v. v.)

III. ALTHEA. Cav. diss. p. 91.

Calyx cinctus involucello 6-9-fido; carpella capsularia 1-sperma in orbem disposita.

Sect. I. ALTHEASTRUM. DC. prod. 1. p. 436.

Carpella emarginata, margine membranaceo destituta; involucellum saepius 8-9-fidum.

1. *A. OFFICINALIS* (L. sp. 966.) foliis atrinque molliter tormentosis cordatis ovatis dentatis indivisis subtrilobis, pedunculis axillaribus multifloris folio multò brevioribus. ♀ in humidis passim, præsertim in provinciis occident. borealibusque. — Fl. fr. 4. p. 831. Cav. diss. 2. t. 30. f. 2. — Fuchs. hist. p. 15. ic. (v. v.)
2. *A. NARBONENSIS* (Pourr. in Cav. diss. 2. t. 29. f. 2.) foliis pubescentibus sub-tomentosis inferioribus 5-7-partitis, superioribus 3-fidis, pedunculis multifloris folio longioribus laxisculis. ♀ in agro Narbonensi, et maritimis Mons-pelii ex cl. Bentham. — Fl. fr. 4. p. 832. Jacq. ic. rar. 1. t. 138. (v. s.)
3. *A. CANNABINA* (L. sp. 966.) foliis pubescentibus subtus subincanis, inferioribus palmato partitis, superioribus 3-partitis, lobis angustis grossè dentatis, pedunculis axillaribus multifloris laxis folio longioribus. ♀ ad sepes et in vineis Galliæ australis occidentalisque passim. — Fl. fr. 4. p. 832. Cav. 2. t. 30. f. 1. — Lob. ic. t. 656. f. 1. (v. v.)
4. *A. HIRSUTA* (L. sp. 965.) foliis cordatis piloso-scabris suprà glabris, infimis obtusis, superioribus 5-lobis, caule hispido, pedicellis 1-floris folio longioribus. (1) ad sepes et in incultis Galliæ mediterraneæ, occidentalis et circa Parisios ex cl. Merat. — Fl. fr. 4. p. 832. Cav. diss. 2. t. 29. f. 1. (v. v.)

Sect. II. ALCEA. L. gen. n. 840.

Carpella margine membranaceo sulcato circumdata; involucellum 6-7-fidum.

5. *A. ROSEA* (Cav. diss. 2. t. 29. f. 3.) caule stricto hirsuto, foliis cordatis 5-7-angulatis crenatis rugosis, floribus axillaribus sessilibus ad apicem subspicatis, petalis subcrenatis, unguibus villosis. (2) Ex Oriente indigena, in hortis culta. — Fl. fr. 4. p. 821. Alcea rosea. L. (v. v. e.)

IV. LAVATERA. L. gen. n. 842.

Calyx cinctus involucello 3-6-fido, foliolis nempè ad medium coa-litis; carpella capsularia, 1-sperma, in orbem circa axim varie dilatum disposita.


Sect. I. STEGIA. Fl. fr. 4. p. 835.


Receptaculum seu axis fructus apice expansus in discum ovaria tegentem.

1. *L. TRIMESTRIS* (L. sp. 974.) caule herbaceo, foliis glabrinsculis subrotundo-cordatis, superioribus angulatis, pedicellis solitariis, orbiculo carpella omnino tegente. (1) circa Niceam ex Allioni, Massiliam (Solier), et in agro Ruscinonensi ex Lapeyr. — Cav. diss. 2. t. 3. f. 1. Stegia Lavatera Fl. fr. 4. p. 836. (v. s.)

Sect. II. OLBIA. Medik. malv. p. 41.

Receptaculum fructus centrale conicum exsertum.





2. *L. OLBIA* (L. sp. 972.) caule fruticoso pilis subfasciculatis distantibus subscabro, foliis molliter cano-tomentosis 5-lobis, lobo medio elongato, summis oblongis subindivisis, floribus solitariis sessilibus. ♂ in sepiibus rupestribusque circà Olbiām, in insulâ Margaritæ (Stire), et agro Ruscinonensi propè Bagnols ex cl. Benth. — Fl. fr. 4. p. 833. — Lob. ic. t. 653. f. 2. (v. v.)
3. *L. PUNCTATA* (All. auct. p. 26.) caule herbaceo pube stellatâ subscabro, foliis subtomentosis, inferioribus orbiculato-cordatis, summis trilobis, pedicellis solitariis 1-floris folio longioribus. (I) in agris et cultis Niceæ, Gallo-provinciæ, Corsicæ. — Fl. fr. 4. p. 835. (v. v.)

Sect. III. AXOLOPHÆ. DC. prod. 1. p. 439.

Receptaculum apice truncatum in cristas tot quot carpella membranaceas laterales verticales expansum.

4. *L. MARITIMA* (Gou. ill. t. 11. f. 2.) caule fruticoso foliisque tomentosis subrotundis obtusè angulatis crenatis, pedicellis axillaribus solitariis. ♂ in rupesribus maritimis provinc. mediterran. — Fl. fr. 4. p. 834. Cav. diss. 2. t. 32. f. 3. (v. v.)

Sect. IV. ANTHEMA. Med. malv. p. 42.

Receptaculum parvum foveolatum, nec exsertum, nec in cristas expansum.

5. *L. ARBOREA* (L. sp. 972.) caule arboreo, foliis 7-angularibus subtomentosis plicatis, pedicellis axillaribus 1-floris confertis petiolo multò brevioribus. (2) in Corsicâ et Caloneso (Belle-Ile en mer.) ex cl. Bory in herb. DC. — Fl. fr. 4. p. 834. Cav. diss. 5. t. 139. f. 2. (v. v. c.)

6. *L. NEAPOLITANA* (Ten. cat. 1819. n. 125.) caule herbaceo scabro erecto, foliis subrotundis 7-nerviis obtusissimè 7-lobatis crenatis, pedunculis axillaribus aggregatis, involucello calyce breviore, calycis lobis acuminatis. (2) circà Bonifacio ex cl. Viviani cors. 11. (v. s. ex Neap.)

7. *L. CRETICA* (L. sp. 973.) caule herbaceo hispido-scabro, foliis 5-lobis acutis, pedicellis axillaribus 1-floris aggregatis petiolo multò brevioribus. (1) in Corsicâ ex cl. Viviani. — Cav. diss. 2. t. 32. f. 1. (v. s. ex Cretâ.)

V. HIBISCUS. L. gen. n. 846.

Calyx cinctus involucello saepius polyphyllo, rarius foliolis paucis aut inter se coalitis; stigmata 5; carpella in capsulam 5-locularem coailita, valvis intùs medio septiferis, loculis polyspermis aut rarius 1-spermis.

1. *H. SYRIACUS* (L. sp. 978.) caule inermi arboreo, foliis cuneiformi-ovatis trilobis dentatis, pedicellis petiolo vix longioribus, involucello 6-7-phyllo, carpellis polyspermis. 5 ex Syriâ et Carniolâ ortus, in hortis cultus. — Fl. fr. 4. p. 837. Cav. diss. 3. p. 69. f. 1. (v. v. c.)

2. *H. ROSEUS* (Thore in Lois. gall. p. 434.) foliis cordatis dentatis subtrilobis subtùs cano-tomentosis, pedicellis axillaribus à petiolo liberis 1-floris supra medium articulatis, involucello 8-15-phyllo, carpellis polyspermis. (2) in agro Syrtico propè Dax ad ripas fluminis Adour. — Fl. fr. 5. p. 626. *H. palustris* Fl. fr. 4. p. 837. non L. (v. v.)

VI. SIDA. Cav. diss. p. 5.

Calyx nudus 5-fidus; stylus apice multifidus; carpella 6-30 circà axim verticillata plus minusve inter se coalita 1-locularia mono aut oligosperma.

1. *S. ABUTILON* (L. sp. 963.) foliis subrotundo-cordatis acuminatis dentatis tomentosis, pedunculis petiolo brevioribus, carpellis 15 truncatis birostratis pilosis. (1) in paludosis propè Vindomagum. — Fl. fr. 4. p. 836. (v. s.)

Ordo XVII. TILIACEÆ. *Juss. gen. p. 290. s. 2. excl. gen. DC. prod. 1. p. 503.*

Calyx extus nudus 4-5-sepalus, sepalis per aestivationem valvatis. Petala tot quot sepala, iis alterna saepè ad unguem foveolata, integra, rarissimè nulla. Stam. hypogyna, libera, numero saepius indefinita, raro definita. Antheræ biloculares rimâ dupli longitudinali dehiscentes. Glandulæ tot quot petala, iis oppositæ, stipiti ovarifero adnatæ. Ovarium 1 carpellis 4-10 coalitis constans. Styli totidem in 1 coaliti, stigmatibus saepius liberis. Capsula plurilocularis; semina in loculis plurima. Albumen carnosum. Embryo erectus, cotyledonibus planis foliacis. — Arbores fruticesve, foliis simplicibus bistipulatis.

I. TILIA. *L. gen. n. 660.*


Calyx 5-partitus deciduus; petala 5 intus aut nuda aut squamulâ aucta; stam. 20 filamentis liberis aut subpolyadelphis; ovarium globosum villosum 1-stylum 5-locul., loculis 2-spermis; nux coriacea, abortu 1-locularis 1-2-sperma.

1. *T. MICROPHYLLA* (Vent. diss. p. 4. t. 1. f. 1.) foliis cordato - subrotundis acuminatis argute serratis glabris ad axillas venarum subtus barbatis petiolo vix longioribus, fructibus subglobosis vix costulatis tenuissimis fragilibus. δ in sylvis passim. — Fl. fr. 4. p. 825. (v. v.)
 2. *T. PLATYPHYLLA* (Scop. carn. n. 641.) foliis cordato - subrotundis acuminatis argute serratis subtus puberulis, fructibus turbinatis prominulo-costatis lignosis crassis. δ in sylvaticis submontanis. — Fl. fr. 4. p. 826. Vent. l. c. p. 6. t. 1. f. 2. (v. v.)
-

Ordo XVIII. AURANTIACEÆ. *Corr. ann. mus. 6. p. 376.*
DC. prod. 1. p. 535.

Calyx urceolatus campanulatusve, disco subadnatus, brevis, 3-5-dentatus, marcescens. Petala 3-5 basi lata, nunc libera, nunc inter se subcoalita, disco hypogyno extus inserta, per aestivationem marginibus leviter imbricata. Stam. numero petalorum æqualia dupla aut multiplicia, disco hypogyno inserta; filaments basi complanata nunc libera, nunc inter se variè adnexa polyadelphia, nunc longè monadelphia, semper apice libera subulata; antheræ terminales basi insertæ erectæ. Ovarium ovatum multiloculare. Stylus 1; stigma subdivisum. Fructus (*Aurantium DC.*) constans 1°. indusio crasso glanduloso evalvi indehiscente; 2°. carpellis plurimis circa axim rationalem verticillatis membranaceis, nunc semina tantum





foventibus, nunc intùs pulposis carnosisve. Semina ad carpelorum angulum interiorem adfixa, nunc plurima nunc solitaria, exalbuminosa, sæpiùs pendentia. Embryo rectus, radiculâ retractâ superâ ad hilum versâ, cotyledonibus magnis crassis. — Arbores aut frutices, in foliis, calycibus, petalis, stam. filamentis, fructus, indusio et cotyledonibus glandulis vesicularibus oleo volatili fætis instructæ, foliis alternis super caulem articulatis.

I. CITRUS. L. gen. n. 1218.

Flores proportione partium sæpiùs quinariâ; calyx urceolatus 3-5-fidus; petala 5-8; stam. 20-60, filamentis compressis plus minusve basi coalitis polyadelphis, antheris oblongis; stigma hemisphæricum; fructus baccatus 7-12-locul. loculis polyspermis pulposis; spermadermis membranacea. — Folia 1-foliolata petiolo sæpè alato.

1. C. MEDICA (Risso ann. mus. 20. t. 2. f. 2.) petiolis nudis, foliis oblongis acutis, floribus 40-andris sæpè agynis, fructuum oblongorum rugosorum cortice crasso, pulpâ acidulâ. 5 in Asiâ, culta Niceæ et in Galloprovinciâ. — Ferr. hesp. t. 59. 60. 63. C. medica & Fl. fr. 4. p. 859. Petala extùs purpurascens. (v. v.)
2. C. LIMONIUM (Risso ann. mus. 20. p. 201.) petiolis subalatis, foliis oblongis acutis dentatis, floribus 35-andris sæpè agynis, fructuum oblongorum cortice tennissimo, pulpâ acidissimâ. 3 in Asiâ, nunc in Galloprovinciâ et Niceæ culta. — C. medica & Fl. fr. 4. p. 860. — Ferr. hesp. t. 247, 211, etc. Petala extùs purpurascens. (v. v.)
3. C. AURANTIIUM (Risso ann. mus. 20. t. 1. f. 1 et 2.) petiolis subnudis, foliis ovato-oblongis acutis, floribus 20-andris, fructuum globosorum cortice tenui, pulpâ dulci. 5 in Asiâ orientali, nunc in provinciis australioribus culta. — C. Aurantium & Fl. fr. 4. p. 860. — Ferr. hesp. t. 427. 385, etc. Petala alba. (v. v.)
4. C. VULGARIS (Riss. ann. mus. 20. p. 190.) petiolis alatis, foliis ellipticis acutis crenulatis, floribus 20-andris, fructuum globosorum cortice tenui scabroso, pulpâ acri amarâ. 5 in Asiâ, nunc in provinciis australioribus culta. — C. Aurantium & Fl. fr. 4. p. 860. — Ferr. hesp. t. 409, 433. Petala alba. (v. v.)

Ordo XIX. HYPERICINEÆ. DC. fl. fr. 4. p. 860. Chois. prod.
hyp. 32.

Calyx monosepalus 4-5-partitus seu 4-5-sepalus, persistens, sæpè inæqualis, nempè 2 sepalis minoribus externis, 2 aut 3 majoribus. Petala 4-5 hypogyna, calycis lobis alterna, contortè æstivata. Stamina numerosa, sæpius indefinita, basi polyadelpha rarò libera aut monadelpha; filamenta longa; antheræ oscillantes minutæ. Ovarium unicum, liberum. Styli plurimi longi aliquando in unum coaliti. Stigmata simplicia, rarò capitata. Capsula baccave multivalvis multilocularis; loculi numero stylos æquantes. Placenta integra centralis seu multipartita margine introflexo valvularum adfixa. Semina numerosissima, vulgò teretia rarò complanata. Embryo rectus; radicula infera; albumen nullum. — Herbæ aut frutices variis glandulis obsitæ, foliis oppositis rarissimè alternis sæpè punctatis.

I. ANDROSÆMUM. All. ped. n. 1440. Chois. prod. hyp. 37.

Capsula baccata sub-1-locularis; calyx 5-partitus, lobis inæqualibus; petala 5; styli 3; stamina 20 basi coalita.

1. A. OFFICINALE (All. 1. c.) foliis sessilibus, floribus terminalibus pedunculatis. ♂ in humidis provinciarum occidentalium, australium rariùs, et propè Fontem-Bleandi ex Merat. — Fl. fr. 4. p. 861. Black. herb. t. 94. (v. v.)

II. HYPERICUM. L. gen. n. 902.

Capsula membranacea; styli 3-5 in quibusdam numero variabiles; stamina 20 basi polyadelpha, rarò numero subdefinita; petala 5; sepala 5 basi plus minusve coalita et inæqualia.

Sect. I. ASCYREIA. Chois. l. c. 38.

Sepala basi coalita et inæqualia; styli 3-5. — Suffrutices, floribus vulgò terminalibus magnis paucis.

1. H. HIRZINUM (L. sp. 1103.) ramis alatis, foliis basi subemarginatis dilatatis sessilibus apice acutis ovato-lanceolatis margine glandulosis, pedunculis 2-bracteatis, staminibus corollam superantibus, seminibus 2 appendiculatis. ♂ in Corsicâ. — Schk. bot. handb. 3. t. 213. 3. (v. s.)

Sect. II. PERFORARIA. Chois. l. c. 44.


Calyx 5-sepalus, sepalis æqualibus, styli vulgò 3. — Herbæ aut suffrutices, floribus axillaribus paniculatisve.

* Sepalis integris.

2. H. QUADRANGULUM (L. sp. 1104.) caule herbaceo quadrangulo recto ramoso, foliis ovatis obtusis pellucido-punctatis margine nigro-punctatis, floribus paniculis multifloris, calyce lanceolato, antheris nigro-punctatis. ♀ in paludosis fossisque humidis. — Fl. fr. 4. p. 862. — Cam. epit. 676. ic. (v. v.)

♂. dubium (Chois. in DC. prod. 1. p. 548.) caule minus ramoso, calyce





vix punctato, corollâ nigro-punctatâ, foliis vix pellucido-punctatis minus obtusis. — In Pyren. et montosis Galliae ab Argentorato ad Olbias. — H. dubium Leers. Fl. fr. 4. p. 862. Vill. dauph. 3. t. 44. Benth. cat. 91. (v. v.)

3. H. REPENS (L. sp. 1103.) caule suffruticoso tereti purpurascente ascendentē et prostrato, foliis ovato-linearibus obtusis approximatis vix perforatis, corymbo paucifloro, calyce ovato-lanceolato aento nigro-punctato. ♀ in Corsicâ et Galloprovinciâ inter Cannas et Antipolim. (v. s.)

4. H. CRISPUM (L. mant. 106.) caule tereti ramosissimo, foliis sessilibus lanceolatis basi undulato-sinuatis pellucido-punctatis, calyce minimo obtuso. ♀ in sterilibus Monspelii propè Pont-Juvenal, forsan in laniis extraneis allatum. — Fl. fr. 4. p. 863. — Bocc. mus. 2. t. 12. (v. v.)

5. H. HUMIFUSUM (L. sp. 1103.) caule herbaceo humifuso, foliis oblongis obtusis tenuissimè pellucido-et nigro-punctatis, floribus cymosis terminibus, calyce linear-lanceolato corollam superante, staminibus 15-20. ♀ in arenosis et agris. — Fl. fr. 4. p. 863. — Clus. hist. 2. p. 181. f. 3. (v. v.)

β. Liottardi (DC.) caule humili erectiore bisannuo, floribus aliquandò 4-partitis, calyce longiore. (2) in agris post messem circa Gratianopolim. — H. Liottardi Vill. dauph. t. 44. (v. s.)

6. H. PERFORATUM (L. sp. 1105.) caule ancipi, foliis obtusis ovato-ellipticis pellucido-punctatis, floribus paniculatis, calyce lanceolato pellucido-punctato, antheris nigro-punctatis, stylis divergentibus. ♀ in sylvis, incultis et ad sepes frequens. — Fl. fr. 4. p. 862. — Fuchs. hist. p. 835. ic. (v. v.)

β. elatum (Chois.) caule elatiore, internodiis distantioribus, foliis minoribus margine revolutis, paniculis laxis paucifloris. (v. s.)

γ. mycrophyllum (DC.) omnibus partibus minoribus confertioribus, paniculis strictis multifloris. (v. s.)

* * Sepalis dentatis sœpè dentato-glandulosis.

7. H. ELODES (Lin. sp. 1106.) caule herbaceo villosō tereti, foliis subrotundis ovatis sessilibus suprà emarginatis, paniculis laxis paucifloris, calyce serrato-glanduloso linearī acuto, staminibus paucis, stigmatibus capitatis. ♀ in paludosis Galliæ mediae et occidentalis. — Fl. fr. 4. p. 866. — Mentz. pug. t. 7. f. 3. Chironia oliginosa Lapeyr. abr. supp. 39. (v. v.)

8. H. TOMENTOSUM (L. sp. 1106.) caule herbaceo tomentoso tereti ascendentē, foliis ovatis obtusis subamplexicaulibus margine nigro-punctatis, paniculis laxis dichotomis, calyce acuminate, stigmatibus simplicibus. ♀ in pratis humidiusculis Galliæ mediterraneæ. — Fl. fr. 4. p. 865. — Moris. 2. s. 5. t. 6. n. 5. (v. v.)

9. H. HIRSUTUM (L. sp. 1105.) caule tereti suffruticoso hirsuto recto, foliis ovato-oblongis nervatis pellucido-punctatis, paniculâ longâ racemosâ, calyce linearī subacuto, stylis divergentibus. ♀ in sylvis montosis passim — Fl. fr. 4. p. 865. — Moris. hist. 2. s. 5. t. 6. n. 11. (v. v.)

10. H. NUMMULARIUM (L. sp. 1106.) caule tereti ascendentē herbaceo, foliis orbiculatis petiolatis, calyce ovato obtuso. ♀ in saxosis Pyrenæorum et Alpium Delphinatū. — Fl. fr. 4. p. 866. Lam. ill. t. 643. f. 3. (v. v.)

11. H. PULCHRUM (L. sp. 1106.) caule herbaceo recto tereti, foliis amplexicaulibus cordatis obtusis pellucido-punctatis margine subrevolutis, calyce ovato obtuso, corollâ glandulosâ. ♀ in umbrosis siccis. — Fl. fr. 4. p. 865. Lam. ill. t. 643. f. 4. (v. v.)

12. H. DENTATUM (Lois. gall. p. 499. t. 17.) caule suffruticoso tereti ascendentē, foliis amplexicaulibus oblongis subobtusis pellucido-punctatis, superioribus aliquandò dentatis, calyce lanceolato acuto pilis glandulosis ciliato, corollâ antherisque nigro-punctatis. ♀ in insulis Stæchadum, prope Olbias et Telenem. — Fl. fr. 5. p. 631. (v. v. D.)

13. H. MONTANUM (L. sp. 1105.) caule herbaceo tereti recto, foliis amplexicaul-

- libus ovatis obtusis tenuissimè pellacido-punctatis margine nigro-punctatis, internodiis superioribus longioribus, calyce linearilanceolato acuto, antheris nigro-punctatis. ♀ in montanis. — Fl. fr. 4. p. 864. — J. Bauh. 3. p. 283. f. 2. (v. v.)
14. *H. FIMBRIATUM* (Lam. dict. 4. p. 148.) caule herbaceo tereti purpurascente simplici, foliis amplexicanibus ovatis margine nigro-punctatis non pellucido-punctatis, calyce ovato acuto ciliato, stylis 3-5. ♀ in declivibus Juras, Alpium, Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 863. *H. Richeri* Vill. dauph. 3. t. 44. (v. v.)
f. androsæmifolium (Chois.) caule magis repente, foliis magis ovatis. Vill. dauph. 3. t. 44. (v. s.)
v. Burseri (DC. fl. fr. 5. p. 630.) caule altiore, foliis obtusioribus, bracteis longioribus, minus ciliatis, calyce breviore minus ciliato. Pluck. t. 93. f. 6. (v. s.)
15. *H. HYSSOPIFOLIUM* (Vill. dauph. 3. t. 44.) caule suffruticoso tereti ascendente, foliis oblongo-lanceolatis subobtusis utrinquè attenuatis pellucido-punctatis in axillâ fasciculatis, calyce subobtuso, stylis 3-4. ♀ in montosis Galloprovinciæ, Cebennarum (cl. Prost), Pyren. orient. — *H. diversifolium* Fl. fr. 5. p. 631. (v. s.)
16. *H. LINEARIFOLIUM* (Vahl. symb. 1. p. 65.) caule herbaceo recto tereti, foliis linearibus obtusis margine nigro-punctatis non pellucido-punctatis, calyce lanceolato nigro-punctato. ♀ in ericetis provinc. occidentalium, circâ Mimatem (cl. Prost). — Fl. fr. 5. p. 631. (v. s.)
17. *H. CORIS* (L. sp. 1107.) caule suffruticoso ascendentे tereti, foliis verticillatis linearibus margine revolutis, calyce subobtuso. ♀ in collibus aridis Galloprovinciæ, Niceæ. — Fl. fr. 4. p. 867. bot. mag. 178. (v. v.)

Ordo XX. ACERINEÆ. DC. theor. ed. 2. p. 244. prod. 1.
p. 593.


Cal. 5-rariùs 4-9-partitus. Petala totidem circâ discum hypogynum inserta, lobis calycinis alterna, saepius concolora, rariùs nulla. Stam. disco hypogyno inserta, saepius 8rariùs 5-12. Antheræ oblongæ. Ovarium didymum. Stylus 1. Stigmata 2. Fructus constans carpellis 2 demùm separabilibus indehiscentibus samaroïdeis, nempè 1-locul. 1-2-spermis compressis superius desinentibus in alam membranaceam divergentem ad latus inferius incrassatam. Semina basi loculamentorum adfixa oblonga. Endoplevrum subcarnosum. Albumen nullum. Embryo curvatus convolutusve, cotyledonibus foliaceis, radiculâ ad basin loculi directâ. — Arbores, foliis oppositis, (in nostris) simplicibus.


I. ACER. Mænch. met. 334. DC. prod. 1. p. 593.

Flores polygami; calyx 5-lobus interdum 5-partitus; stam. rariùs 5, saepius 7-9.

§. 1. *Floribus racemosis.*

I. A. PSEUDO-PLATANUS (L. sp. 1496.) foliis cordatis 5-lobis glabris, lobis acu-





minatis inæqualiter dentatis, racemis pendulis subcompositis rachi staminumque filamentis hirsutis, fructibus glabris, alis subdivergentibus. ♂ in sylvis montosis. — Fl. fr. 4. p. 86. Duham. arb. 1. t. 368. (v. v.)

3. A. CAMPESTRE (L. sp. 1497.) foliis cordatis 5-lobis, lobis grossè subdentatis, racemis erectis, fructuum alis divaricatissimis. ♂ in sylvis et sepibus. — Fl. fr. 4. p. 869. J. Bauh. h. 1. p. 2. p. 166. ic.

a. *hebecarpum* (DC.) fructibus velutino-pubescentibus. In Galliâ orientali et australi. (v. v.)

β. *collinum* (Wallr.) fructibus glabris, foliorum lobis obtusis, floribus minoribus. (v. v.)

§. 2. *Floribus corymbosis fasciculatisve.*

3. A. OPULIFOLIUM (Vill. dauph. 4. p. 802.) foliis cordatis subrotundis 5 lobis, lobis obtusis obtusè grossè dentatis, corymbis subsessilibus, ovariis fructibusque glabris, alis subdivergentibus. ♂ in lapidosis apricis Delphin., Galloprov., Cebennarum. — Fl. fr. 4. p. 869. (v. v.)

4. A. MONSPESSULANUM (L. sp. 1497.) foliis annuis cordatis trilobis, lobis subintegerrimis æqualibus, corymbis paucifloris erectis, fructibus glabris, alis vix divergentibus, ♂ — ♂. In apricis lapidosis Galliæ orientalis, australis et rariùs occidentalis. — Fl. fr. 4. p. 869. — Pluck. t. 251. f. 3. (v. v.)

5. A. PLATANOÏDES (L. sp. 1496.) foliis cordatis glabris 5-lobis, lobis acuminatis, dentibus paucis grossis acutis, corymbis pedunculatis erectiusculis fructibusque glabris, alis divaricatis. ♂ in sylvis montosis Arverniæ, Cebennarum, Alpium. — Fl. fr. 4. p. 868. Duham. arb. 1. t. 10. f. 1. — Cam. epit. 63. ic. (v. v. c.)

Ordo XXI. HIPPOCASTANEÆ. DC. theor. elem. ed. 2. p. 244. prod. 1. p. 597.

Cal. campanulatus 5-lobus. Petala 5 aut abortu 4, inæqualia, hypogyna. Stam. 7-8 disco hypogyno inserta, libera, inæqualia. Antheræ subincumbentes. Stylus 1. Caps. junior 3-locul. 3-valvis, loculis biovulatis, valvis medio septiferis, ovulis septis adfixis; adulta coriacea subglobosa abortu 2-3-valvis, 2-3-locularis, 2-4-sperma. Semina grossa, subglobosa, variè compressa et angulata, testâ nitidâ glaberrimâ, hilo lato discolore basili. Albumen nullum. Embryo curvatus inversus, cotyledonibus carnosis crassissimis per germinationem intrà spermodermium hypogaeis, radiculâ conicâ curvatâ ad hilum directâ. — Arbores fruticesve, foliis oppositis compositis palmatis.

I. ÆSCULUS. L. gen. n. 462. excl. sp. DC. prod. l. c.

Calyx campanulatus; petala 4-5 expansa, limbo ovato; stam. filaments introrsum recurva; capsula echinata.

1. Æ. HIPPOCASTANUM (L. sp. 488.) floribus 5-petalis 7-audris, foliolis 7 obovato-cuneatis acutis dentatis. ♂ in Indiâ boreali, in Galliâ nunc subsponsana. — Fl. fr. 4. p. 870. — Riv. pentap. irr. t. 123. (v. v.)

Ordo XXII. MELIACEÆ. Juss. gen. 263. mem. mus. 3. p. 436.

Cal. sepalis 4-5 plus minus inter se in calycem 1-phyllo
coalitis. Petala totidem sepalis alterna, hypogyna, ungue lato
sæpius basi conniventia aut coalita, æstivatione sæpius valvatâ.
Stam. numero petalorum sæpius dupla; filamenta in tubum
apice dentatum longè coalita, antheris ad faucem tubi sessili-
bus intus adnatis. Ovarium 1. Stylus 1. Fructus varius, (in
nostris) drupaceus multilocularis aut abortu 1-locularis, val-
vis (dùm adsunt) medio septiferis. Semina nunc albuminosa
nunc exalbuminosa, embryone formâ vario. — Arbores aut
frutices foliis alternis extipulatis.

I. MELIA. L. gen. n. 576.


Calyx parvus 5-fidus; petala 5 oblongo-linearia patentia; stam. 10;
ovarium toro subelevato insidens; stylus uliformis; drupa ovata,
nucleo 5-sulcato 5-locul. loculis 1-spermis; albumen carnosum.

1. M. AZEDARACH (L. sp. 550.) foliis bipinnatis, foliolis lævibus incisis subqui-
natis. ♂ ex Syriâ orta, nunc in provinciis australibus quasi spontanea. — Fl.
fr. 4. p. 858. Comm. hort. 1. t. 70. (v. v. c.)

Ordo XXIII. AMPELIDEÆ. H. B. et Kunth. nov. gen. 5.
p. 223. — Vites. Juss. gen. 267.

Calyx parvus margine integer aut subdentatus. Petala 4-5
dentibus calycinis alterna, disco ovarium ambiente extus
inserta et ideo inter hypogyna et perigyna ambigua, basi
latiora, rarius in corollam 1-petalam coalita, per æstivationem
intus apice inflexa subvalvata. Stamina tot quot petala, antè
petala disco inserta, interdum abortu sterilia; filamenta libera
aut basi subcoalita; antheræ ovatae birimosæ dorso insertæ
oscillatoriæ. Ovarium globosum liberum. Stylus 1 brevissi-
mus aut subnullus. Stigma simplex. Bacca globosa, junior
2-locularis loculis 2-spermis, adulta sæpè dissepimentis evan-
dis 1-locularis, aquosa aut subcarnosa, epicarpo non sece-
dente. Semina 4-5 (aut abortu nulla) axi centrali funiculo
brevi adfixa erecta, ossea. Albumen carnosum durum. Embryo
erectus, radiculâ teretiusculâ inferâ. — Frutices sarmentosi
scandentes, foliis basi stipulaceis, inferioribus oppositis, supe-
rioribus alternis pedunculis oppositis, pedunculis interdum
in cirrhos evadentibus.





I. VITIS. L. gen. n. 284.

Cal. sub-5-dentatus; petala 5 apice cohaerentia et instar calypræ basi absecendentia simulque decidua; stam. 5; stylus 0; bacca 2-locularis 4-sperma, loculis seminibusve sœpè abortivis.

1. **V. VINIFERA** (L. sp. 293.) foliis lobatis sinuato-dentatis nudis aut tomentosis. *§* in Asiâ australi indigena, nunc exceptis provinciis boreali-occidentalibus ubique culta. — Fl. fr. 4. p. 857. Blackw. herb. t. 154. Admodum varians. (v. v.)
 2. **V. LACINIOSA** (L. sp. 293.) foliis 5-sectis, segmentis petiolulatis multifidis. *§* passim culta. — Corn. can. t. 183. Potius prioris mera varietas ex DC. prod. (v. v.)
-

**Ordo XXIV. GERANIACEÆ. DC. fl. fr. 4. p. 838. prod. 1.
p. 637. — Gerania. Juss. gen. 268.**

Calyx persistens 5-sepalus, sepalis plus minus inæqualibus aestivatione imbricatis, interdùm uno, basi in calcar cavum cum pedunculo arctè connatum, producto. Petala 5 sepalis alterna, unguiculata, æqualia aut inæqualia, in prioribus hypogyna, in posterioribus sœpiùs calycei inserta aut cum eo connexa. Staminum filamenta rarissimè libera, ferè semper basi plus minus monadelpha, hypogyna aut perigyna, numero petalorum dupla, interdùm nonnulla sterilia, æqualia aut inæqualia. Ovarium primâ fronte 5-loculare in stylum longum crassum et stigmatibus 5 coronatum desinens, sed revera torus elongatus in axim subpentagonum gracilem. Carpella 5, submembranacea indehiscentia 1-locularia biovulata ad basim tori adpressa, apice gerentia stylos filiformes totidem secùs tori sulcos arctè adnatos et apice summo in stigmata 5 brevia acuta simplicia desinentes, post anthesim styli à basi ad apicem variis modis tortiles carpella è calyce extrahentes et cum iis demùm è toro secedentes. Semina in carpellis solitaria, pendula, exalbuminosa; embryo curvus, radiculâ deflexâ ad fundum carpelli directâ, cotyledonibus convoluto-aut flexuoso-plicatis. — Herbæ aut suffrutices, foliis ad nodos inferiores oppositis, aut alternis pedunculis tunc folio oppositis.

I. **CERANIUM**. L'Hér. ger. DC. fl. fr. 4. p. 844.

Sepala 5 æqualia; pet. 5 æqualia; stam. 10 fertilia alterna majora; glandulæ nectariferæ ad basin stam. majorum; carpellorum aristæ intus glabrae, demùm elasticè a basi ad axeos apicem circinnatim revolutæ.

* *Perennia, pedunculis 1-floris.*

1. **G. SANGUINEUM** (L. sp. 958.) caule erecto aut diffuso ramoso, pedunculis axillaribus petiolo multò longioribus medio bibracteolatis, foliis oppositis

. 5-partitis, lobis 3-fidis, lobulis linearibus. \mathcal{U} in pratis siccis sylvaticis. — Fl. fr. 4. p. 845. Cav. diss. 4. t. 76. f. 1. Flores sanguinei ampli. (v. v.)

** *Perennia, pedunculis bifloris.*

2. **G. ARGENTEUM** (L. amæn. 4. p. 324.) caule brevissimo, foliis subradicalibus longè petiolatis utrinque sericeo-canis 5-7-partitis, lobis 3-fidis, lobulis linearibus, pedunculis subradicalibus, petalis emarginatis. \mathcal{U} in Alpibus Galloprovinciae. — Vill. dauph. 3. t. 40. Cav. diss. 4. t. 77. f. 3. Fl. fr. 4. p. 849. (v. s.)

3. **G. CINEREUM** (Cav. diss. 4. t. 89. f. 1.) subacaule, foliis subradicalibus petiolatis glauco-pubescentibus 5-partitis, lobis cuneiformibus trifidis, pedunculis subradicalibus, petalis emarginatis. \mathcal{U} in Pyrenæis editioribus. — Fl. fr. 4. p. 849. (v. v.)

4. **G. TUBEROSUM** (L. sp. 953.) radice subglobosa, caule à basi ad bifurcationem nudo, foliis 5-partitis, lobis linearibus pinnatim inciso-serratis. \mathcal{U} circa Massiliam, et Agatham ex Benth. — Fl. fr. 5. p. 628. — Lob. ic. t. 661. f. 2. Moris. hist. s. 5. t. 16. n. 21. (v. v. D.)

5. **G. NODOSUM** (L. sp. 953.) caule tetragono, foliis inferioribus 5-lobis, superioribus 3-lobis, lobis oblongis acuminatis serratis, petalis emarginatis. \mathcal{U} in sylvis montosis Galloprov., Arverniæ, Mimatis, Aginni, Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 847. Cav. diss. 4. t. 80. f. 1. Carpella undique pilosa; folia subtus lucida. (v. v.)

6. **G. PHÆUM** (Lam. dict. 2. p. 658.) caule tereti, foliis 5-lobis inciso-dentatis, summis sessilibus, petalis patulis integris, staminum filamentis basi pilosis, carpellis transversè plicatis. \mathcal{U} in Alpibus et Pyrenæis. — Fl. fr. 4. p. 846.

$\alpha.$ *vulgatus* (DC.) petalis lividè rubro-fuscis basi albo-maculatis. — **G. phœum** L. sp. 933. Cav. diss. 4. t. 89. f. 2. (v. v.)

$\beta.$ *lividum* (L'Hér. ger. t. 39.) petalis roseo-violaceis subemarginatis. (v. s.)

7. **G. SYLVATICUM** (L. sp. 954.) caule tereti erecto glabro, foliis sub-7-lobis, lobis oblongis inciso-serratis, pedunculis subcorymbosis, petalis subemarginatis, staminum filamentis subulatis ad medium ciliatis. \mathcal{U} in sylvis et paucis montosis. — Fl. fr. 4. p. 847. eng. bot. t. 121. Carpella pilosa. (v. v.)

$\beta.$ *batrachioïdes* (Cav. diss. 4. t. 85. f. 1.) floribus majoribus, petalis integratis. (v. s.)

8. **G. PRATENSE** (L. sp. 954.) caule tereti erecto tomentoso, foliis sub-7-lobis, lobis linear-oblängis inciso-serratis, pedunculis subcorymbosis, petalis integris, staminum filamentis glabris basi valde dilatatis. \mathcal{U} in pratis humidis montanis Pyren., agri Ligericini (Prost), Delph., etc. — Fl. fr. 4. p. 848. Cav. 4. t. 87. f. 1. Flores ampli cærulei (v. v.)


9. **G. PALUSTRE** (L. amæn. 4. p. 323.) caule decumbente pilis patulis subhispidi, foliis 5-7-lobis, lobis inciso-dentatis, pedunculis longissimis pilosulis, pedicellis declinatis, petalis integris, staminibus subulatis glabris. \mathcal{U} in humidis Alpium Delphinatūs? — Fl. fr. 4. p. 848. Cav. diss. 4. t. 87. f. 2. — Oed. fl. dan. t. 596. (v. v. D. in Helv.)


10. **G. ACONITIFOLIUM** (L'Hér. ger. t. 40.) caule subascendente glabriusculo, foliis subpeltato-7-partitis lobis laciniatis, pedunculis calycibusque villosis, petalis integris, staminibus subulatis glabriusculis. \mathcal{U} in Alpibus Delphinatūs. — Fl. fr. 4. p. 848. **G. rivulare** Vill. dauph. 3. t. 40. Fl. albi lineati. (v. v. DC.)

11. **G. PYRENAÏCUM** (L. mant. 97.) caule erecto ramoso, foliis reniformibus 7-lobis, lobis oblongis obtusis 3-fidis, lobulis 3-dentatis, floralibus 3-partitis, petalis emarginatis calyce paulò majoribus, carpellis ecristatis pubescentibus. \mathcal{U} in montibus Delph., Arverniæ, Pyren. et circa Angers. (Bast.) — Fl. fr. 4. p. 850. eng. bot. t. 405. Cav. diss. 4. t. 99. f. 2. Variat flore albo et pallidè purpureo. (v. v.)

*** *Annuæ, pedunculis bifloris.*

12. **G. MOLLE** (L. sp. 955.) foliis reniformibus, radicalibus 9-lobis, caulinis





- 7-lobis, lobis trifidis, petalis bifidis longitudine calycis mutici, carpellis glabris rugosis, seminibus laevibus. (I) in ruderatis. — Fl. fr. 4. p. 850. — Vaill. t. 15. f. 3. (v. v.)
13. *G. PUSILLUM* (L. sp. 957.) foliis subreniformibus 7-lobis, lobis 3-fidis, petalis emarginatis longitudine calycis mutici, carpellis pubescentibus non rugosis, seminibus laevibus. (I) in ruderatis. — Fl. fr. 4. p. 852. — Vaill. bot. t. 15. f. 1. (v. v.)
- fl. humile* (Cav. diss. 4. t. 83. f. 2.) foliis tenuius incisis, caule humiliore (v. v.)
14. *G. ROTUNDIFOLIUM* (L. sp. 957.) foliis radicalibus reniformibus 7-lobis, caulinis subrotundis basi truncatis 5-lobis, lobis 3-fidis, petalis integris longitudine calycis aristati, carpellis hirsutis, seminibus reticulatis. (I) in pascais et pratis. — Fl. fr. 4. p. 852. Cav. diss. 4. t. 93. f. 2. Flores parvi rosei. (v. v.)
15. *G. COLUMBINUM* (L. sp. 956.) foliis 5-partitis, lobis multifidis linearibus, petalis emarginatis longitudine calycis aristati, carpellis glabris laevibus, seminibus reticulatis. (I) in arvis. — Fl. fr. 4. p. 851. Cav. diss. 4. t. 82. f. 1. (v. v.)
16. *G. DISSECTUM* (L. sp. 956.) foliis 5-partitis, lobis 3-fidis linearibus, petalis emarginatis longitudine calycis aristati, carpellis pilosis, seminibus reticulatis. (I) in arvis. — Fl. fr. 4. p. 851. Cav. diss. 4. t. 78. f. 2. Vaill. bot. t. 15. f. 2. Petala purpurea. (v. v.)
17. *G. LUCIDUM* (L. sp. 955.) glaberrimum, foliis rotundatis 5-lobis, calycibus pyramidato-angulatis transversè corrugatis, carpellis dorso sulcato-muricatis. (I) in rupibus umbrosis. — Fl. fr. 4. p. 850. Cav. diss. 4. t. 80. f. 2. Flores rosei. (v. v.)
18. *G. ROBERTIANUM* (L. sp. 955.) foliis 3-5-partitis, lobis trifido-pinnatifidis, petalis integris calyce angulato aristato duplò longioribus, carpellis glabris reticulato-rugosis, seminibus laevibus. (I) in rupibus, sepibus, in cultis frequens. — Fl. fr. 4. p. 855. Cav. diss. 4. t. 86. f. 1. (v. v.)
- fl. purpureum*. (Vill. dauph. 3. t. 40.) petalis calyce paulo majoribus. (v. s.)

II. ERODIUM. L'Hér. DC. fl. fr. 4. p. 838.

Sepala 5 æqualia; petala 5 regularia aut irregularia; stam. 10 filamentis basi monadelphis, 5 antheriferis, 3 alternis sterilibus; glandulæ 5 ad basin staminum sterilium; carpellorum aristæ intùs barbatæ demùm elasticè spiraliter tortæ.

* *Foliis pinnati-sectis aut pinnati-partitis.*

1. *E. PETRAEUM* (W. sp. 3. p. 625.) acaule, pedunculis multifloris, foliis glabriusculis pinnati-sectis, segmentis pinnatifidis, lobis lanceolato-linearibus, rachi inter segmenta dentatæ, petalis retusis calyce duplò longioribus. 2 in Occitaniæ, agri Ruscinonensis et Pyren. orientalium rupibus apricis. — Fl. fr. 4. p. 839. Gou. ill. t. 21. f. 1. Flores purpurascentes. (v. v.)
2. *E. GLANDULOSUM* (W. sp. 3. p. 628.) acaule, pedunculis multifloris, foliis pubescenti-glandulosis pinnati-sectis, segmentis pinnatifidis, lobis lanceolato-linearibus, rachi inter segmenta dentatæ, petalis subæqualibus acutis calyce duplò longioribus. 2 in editioribus Pyreneis. — Cav. diss. 5. t. 125. f. 2. *E. graveolens* Lapeyr. abr. 390. An à præcedente satis distinctum? (v. v. DC.)
3. *E. CICORIUM*. (W. sp. 3. p. 629.) caule ascendente foliisque subvillosis pinnati-sectis, segmentis obtusis pinnatifidis dentatis, rachi inter segmenta dentatæ, pedunculis multifloris, petalis calycis longitudine 2 subemarginatis. (I) in maritimis Occitaniæ. — Fl. fr. 4. p. 841. Cav. diss. 4. t. 95. f. 2. Calycis sepala longè mucronata. (v. s.)
4. *E. ERECTARIUM* (Léman. in DC. fl. fr. 4. p. 840.) caule prostrato aut diffuso

harto, foliis pinnati-sectis, segmentis sessilibus pinnatifidis incisis acutis, pedunculis multifloris, petalis inæqualibus. (I) in ruderatis frequens. — Fl. fr. 4. p. 840.

a. præcox (Cav. diss. 5. t. 126. f. 2.) acaule, foliis patulis, segmentis subincisis, petalis calyce majoribus. — In apricis. (v. v.)

β. pimpinellæfolium (Cav. diss. 4. t. 126. f. 1.) caulescens demum suberectum, foliis longè petiolatis, segmentis acutè incisis, petalis calyci subæqualibus. — In pratis. (v. v.)

γ. Chærophyllum (Cav. diss. 4. t. 95. f. 1.) multicaule subprostratum, segmentis tenuiter pinnati-partitis, floribus pallidis aut albis. — In siccis lapidosis. (v. s.)

δ. pilosum. (Thuil. fl. par. ed. 2. p. 347.) multicaule subprostratum undique pilosum, segmentis tenuiter pinnati-partitis, floribus intensè purpureis. — In arenosis. (v. v.)

ε. cicutæfolium (Thuil. l. c. sub cicutario.) subcaulescens, segmentis oblongis obtusè incisis, floribus pallidis roseisve. — In apricis. (v. v.)

5. E. ROMANUM (W. sp. 3. p. 630.) subacaule, foliis pinnati-sectis, segmentis ovatis pinnatifidis, pedunculis multifloris, petalis calyce majoribus æqualibus. $\frac{M}{F}$ secus vias Occitanie, agri Ruscinonensis, et Tolosæ ex Benth. — Fl. fr. 5. p. 628. Cav. diss. 4. t. 94. f. 2. — Barr. ic. t. 1245. (v. v.)

6. E. MOSCHATUM (W. sp. 3. p. 631.) caule procumbente, foliis pinnati-sectis, segmentis petiolatis ovatis inæqualiter serrato-incisis, pedunculis multifloris pubescenti-subglandulosis. (I) in siccis Niceæ, Occitaniæ, agri Ruscinonensis; circè Burdigalam ex Laterrade, Abbatisvillam ex Boucher. — Fl. fr. 4. p. 841. Cav. diss. 4. t. 94. f. 1. — Lob. ic. t. 658. f. 2. Variat glabrum et in capite costisque glanduloso-pubescentis. (v. v. c.)

7. E. BOTRYS (Bert. amæn. it. p. 35.) caulescens setis substrigosis hispidum, foliis sinuato-pinnatifidis, lobis obtusis dentatis, pedunculis 2-4-floris, calycibus pubescentibus breviter mucronatis. (I) in Corsicâ. — Ger. botrys Cav. diss. 4. t. 90. f. 2. (v. s.)

8. E. LITTOREUM (Léman in DC. fl. fr. 4. p. 842.) caulescens diffuso-prostratum glabriuscum, foliis sinuato-pinnatifidis, lobis 3-7 obtusis crenatis, pedunculis multifloris elongatis, aristis barbatis. $\frac{M}{F}$ in Corsicâ et circè Narbonam. (v. s.)

** *Foliis subtrilobatis aut indivisis.*

9. E. MALACHOIDES (W. sp. 3. p. 639.) caule herbaceo ramoso pilosiusculo, foliis cordatis indivisis trilobisve obtusis dentatis, pedunculis multifloris, petalis calycis longitudine. (I) in provinciis mediterraneis et circè Burdigalam ex Laterr. — Fl. fr. 4. p. 842. Cav. diss. 4. t. 91. f. 1. — J. Banh. hist. 3. p. 472. t. 1. (v. v.)

10. E. MALOPOIDES (W. sp. 3. p. 640.) caulescens erectum aut subacaule totum molliter cinereo-velutinum, foliis ovatis subcordatis crenatis interdàm sublobatis, pedunculis subbifloris, aristis barbatis. $\frac{M}{F}$ in Corsicæ rupibus maritimis. — E. malopoïdes β. DC. prod. 1. p. 648. E. Corsicum. Lem. in fl. fr. 4. p. 842. — Cav. diss. 4. t. 90. f. 1. (v. s.)


11. E. MARITIMUM (Smith. fl. brit. 2. p. 728.) caulescens diffuso-prostratum glabriuscum, foliis cordatis ovatis inciso-crenatis pubescentibus, pedunculis uni aut sæpius bifloris, aristis imberbis. $\frac{M}{F}$ in Galliæ Narbonensis, Armoraciæ et Picardiæ maritimis. — Fl. fr. 4. p. 843. Cav. 4. t. 88. f. 1. (v. s.)

ɛ. Bocconi (DC.) subcaulescens cespitosum pumilum, foliis ovatis inciso-crenatis, pedunculis 1-rariis-2-floris, petalis vix calycis longitudine. $\frac{M}{F}$ in Corsicæ montibus. — E. Bocconi. Viv. cors. app. 5. — Bocc. mus. 2. p. 160. f. 128. (v. s.)









Ordo XXV. TROPÆOLEÆ. *Juss. mem. mus. 3. p. 447. DC. prod. 1. p. 683.*

Calyx 5-partitus coloratus, lacinia superiore basi calcarata, calcare libero intrà florem hinc hiante extra stamina, lobis nunc liberis, nunc inter se variè coalitis. Petala 5 calyci inserta, ejusdem lobis alterna, inæqualia, irregularia, 2 superiora sessilia remota, calcaris fauci inserta, 3 inferiora unguiculata minora interdùm abortiva. Stamina 8, filamentis liberis disco insertis, antheris 2-locularibus rimâ dupli dehiscentibus. Carpella 3 arctè connata in ovarium 1 trigonum. Styli 3 in 1 connexi. Stigmata 3. Carpella 3, 1-locularia, 1-sperma. Semina magna, exalbuminosa. Embryo magnus, cotyledonibus rectis, junioribus distinctis, dein arctè conferruminatis et etiam cum spermodermate adhærentibus, imâ basi subdistinctis; radicula intrà cotyledonum processus latente, tubercula 4 mox radicellas proferentia gerente. — Herbæ foliis alternis non stipulaceis peltinerviis.

I. TROPÆOLUM. *L. gen. n. 466.*

Cal. 5-partitus, lobo superiore calcarato; petala 5 inæqualia, 3 inferiora minora aut evanida; stam. 8 ab ipsâ basi libera; carpella 3 suberosa reniformia indehiscentia hinc sulcata rotundata.

1. T. MINUS (*L. sp. 460.*) foliis peltinerviis orbiculatis subrepandis, nervis apice mucronatis, petalis acuminato-setaceis. (I) sub dio. ♀ in cald. ex Peruviâ ortum in hortis cultum. — Curt. bot mag. t. 98. (v. v. c.)
 2. T. MAJUS (*Lin. sp. 490.*) foliis peltinerviis orbiculatis subquinquelobis, nervis apice non exsertis, petalis obtusis. (I) ♀ in Peruviâ undè in Europam allatum et in hortis cultum. — Fl. fr. 4. p. 854. Curt. bot. mag. t. 23. (v. v. c.)
-

Ordo XXVI. BALSAMINEÆ. *A. Rich. dict. class. 2. p. 173.*
DC. prod. 1. p. 685.

Calyx 2-sepalus, sepalis parvis deciduis oppositis sæpè mucronatis per æstivationem imbricatis. Petala 4 hypogyna cruciata; 2 exteriora sepalis alterna apice callosa; superius forniciatum emarginatum, inferius integrum basi in calcar productum; 2 interiora prioribus alterna, magis petaloïdea, inter se æqualia, sæpè 2-fida seu appendiculata. Stamina 5 hypogyna, filamentis brevibus apice incrassatis, antheris subconnatis, 3 inferiora petalis opposita antheras constanter 2-loculares gerentia, 2 superiora antè petalum supremum orta antheras nunc 2-loculares nunc 1-loculares gerentia. Antheræ rimâ

longitudinali dehiscentes. Ovarium 1. Stylus 0. Stigmata 5 aut in unum coalita sessilia. Capsula 5-valvis, valvulis elasticè dissilientibus, placentâ centrali, 5-angulari, angulis membranaceis suturas inter valvulares attingentibus et ideo capsula junior 5-locularis. Semina pendula, in quoque loculo plurima, exalbuminosa. Embryo rectus, radiculâ superâ. — Herbæ teneræ, foliis exstipulatis penninerviis.

I. BALSAMINA. Riv. irr. tetr. ic.

Antheræ 5 biloculares; stigmata 5 distincta; capsula ovata; valvis ad maturitatem introrsum apice elasticè inflexis; cotyledones crassæ.

I. B. HORTENSIS (Desp. dict. sc. nat. 3. p. 485.) pedicellis aggregatis, foliis lanceolatis, superioribus alternis, calcaribus flore brevioribus. (1) in Indiâ orientali, in hortis culta. — *Impatiens Balsamina* L. Fl. fr. 4. p. 854. Black. t. 583. (v. v. c.)

II. IMPATIENS. Riv. tetr. ic.

Antheræ 5, nempè 3 biloculares, 2 antè petalum superius 1-loculares; stigmata 5 coalita; capsula prismatico-teretiuscula elongata, valvis à basi ad apicem extrorsum revolutis; cotyledones planiusculæ.

I. I. NOLI-TANGERE (L. sp. 1328.) pedunculis 3-4-floris folio brevioribus sub folio patulis, floribus pendulis, calcare apice recurvo, foliis ovatis grossè dentatis, geniculis caulinis tumentibus. (1) in nemoribus passim. — Fl. fr. 4. p. 855. Barr. ic. t. 1197. (v. v.)

Ordo XXVII. OXALIDEÆ. DC. prod. 1. p. 689.

Cal. 5-sepalus 5-partitusve persistens æqualis. Pet. 5 hypogyna æqualia, interdùm infernè inter se cohærentia, per aestivationem spiraliter contorta. Stam. 10, filamentis basi sæpiùs monadelphis, 5 sepalis opposita exteriora breviora, 5 petalis opposita interiora longiora. Anth. 2-loculares non adnatæ. Ovarium liberum 5-loculare. Styli 5. Stigmata penicilliformia, capitata aut subbifida. Capsula membranacea 5-locul. 5-10-valvis, ad angulos longitudinaliter dehiscens. Semina pauca, angulo loculamentorum centrali adfixa, juniora inclusa intrà arillum carnosum demùm ab apice elasticè dehiscentem et semen projicientem. Albumen cartilagineo-carnosum. Embryo inversus, radiculâ superâ longâ. — Herbæ foliis alternis rariùs oppositis.

I. OXALIS. L. gen. 582.

Cal. 5-sepalus, sepalis liberis aut basi coalitis; pet 5; stam. 10, filamentis basi breviter monadelphis; capsula pentagona oblonga aut cylindracea.



1. *O. STRICTA* (L. sp. 624.) caule erecto folioso, pedunculis umbelliferis 2-6-floris folii circiter longitudine, foliolis obcordatis, petalis integris, stylis staminum interiorum longitudine. (I) in ruderatis, sepibus passim. — Fl. fr. 4. p. 856. — Fl. dan. t. 873. Flores flavi. (v. v.)
 2. *O. CORNICULATA* (L. sp. 624.) caule decumbente ramoso radicante, pedunculis subumbellatis petiolo brevioribus, foliolis obcordatis, petalis emarginatis, stylis longitudine staminum interiorum. ♀ in cultis passim. — Fl. fr. 4. p. 856. Jacq. ox. t. 5. Flores flavi. (v. v.)
♂. *villosa*, undique hirsuta, pedunculis petiolo sublongioribus. — In arvis Corsicæ propè Bastia (cl. Soleiroli.) — *O. villosa*, Bieb. taur. 1. p. 355. DC. prod. 1. p. 692. (v. s.)
 3. *O. ACETOSELLA* (Lin. sp. 620.) acaulis, radice dentatâ repente, foliolis obcordatis puberulis, scapo foliis longiore suprà medinm bibracteolato, petalis ovalibus obtusis, stylis stamina interiora æquantibus aut superantibus. ♀ in umbrosis. — Fl. fr. 4. p. 855. — Lob. ic. 2. p. 32. f. 1. (v.v.)
-

Ordo XXVIII. ZYGOPHYLLEÆ. *Brown. gen. rem. p. 13.*
DC. prod. 1. p. 703.

Calyx sepalis 5 distinctis aut vix basi subconnexis. Petala 5 sepalis alterna receptaculo inserta. Stam. 10 distincta, hypogyna, 5 sepalis, 5 petalis opposita. Ovarium unicum 5-locul. Styli 5 in unum coaliti, interdùm apice summo subdistincti. Capsula carpellis 5 plus minus inter se et axi centrali adnatis constans, loculis ad angulum superius dehiscentibus, saepius polyspermis aut 1-spermis, nec cocculiferis nec arilliferis. Semina albuminosa aut saepius exalbuminosa, embryone recto, radiculâ superâ. — Herbæ fruticesve, foliis basi stipulaceis, in nostris oppositis.

I. TRIBULUS. *Tourn. inst. t. 141. L. gen. n. 532.*

Calyx 5-sepalus deciduus; petala 5 patentia; stamna 10; stylus 0, carpella 5 axi adnexa triangularia indehiscentia dura extus in spinas tubercula aut alas exserta, intus transverse plurilocularia, rarius 1-loccularia; semina in loculis solitaria horizontalia exalbuminosa.

1. *T. TERRESTRIS* (L. sp. 554.) foliis 6-jugis, foliolis subæqualibus, pedicellis petiolo brevioribus, carpellis 4-cornutis. (I) in arvis et ad vias Galliae australis; circè Burdigalam ex Laterr. et in insulâ Nigri-Monasterij. — Fl. fr. 4. p. 731. — Barr. ic. t. 558. (v. v.)
-

Ordo XXIX. RUTACEÆ. Juss. gen. 296. excl. sect. prima.

DC. prod. 1. p. 709.

Calyx 3-5-sepalus, sepalis basi plus minusve inter se coalitis et ideò dentatus fissus aut partitus. Petala rarissimè nulla, saepius tot quot sepala, saepè unguiculata, distincta. Discus carnoso-glandulosus ovarium cingens, è receptaculo ortus, extus petala, superius stamina gerens. Stam. saepius sepalorum numero dupla et tunc aut omnia fertilia aut alterna sessilia, rarius sepalis tripla. Carpella tot quot sepala, interdùm abortu pauciora, nunc distincta, nunc basi coalita, nunc omnino connata. Stylus è centro ovariorum ortus, unicus in stigmata tot quot ovaria divisus et sic stylis ex ovario quoque ortis et concretis compositus. Carpella in fructu saepius distincta 1-loccularia, dehiscentia, bivalvia, intus cocculosa. Semina angulo interno adfixa inversa. Embryo rectus compressus, radiculâ superâ. — Herbæ aut frutices, foliis alternis oppositisve exstipulatis.

I. RUTA. Tourn. inst t. 133. L. gen. n. 523.

Cal. persistens 4-partitus rarius 3-5-partitus; pet. totidem unguiculata subcochleata; stam. petalorum numero dupla; pori nectariferi ad basin ovarii tot quot stamina; ovarium stipite crasso brevi impositum; capsula subglobosa divisa in tot loculos quot sunt petala; albumen carnosum; embryo arcuatus.

1. R. MONTANA (Clus. hist. 2. p. 136.) foliis suprà-decompositis, lobis omnibus linearibus, petalis integris. ♂ ♂ in siccis collinis lapidosis Galliæ australis et in Andegaviâ (Bast.). — Fl. fr. 4. p. 732. — Jacq. ic. rar. 1. t. 76. (v. v.)

2. R. GRAVEOLENS (L. sp. 548. excl. var. α et β .) foliis suprà-decompositis, lobis oblongis, terminali obovato, petalis integris aut subdentatis. ♂ ♂ in siccis Galliæ australis et in hortis frequens. — Fl. fr. 4. p. 732. — Duham. arb. 2. t. 61. (v. v.)

3. R. BRACTEOSA (DC. prod. 1. p. 710.) foliis suprà-decompositis latitudine vix tripli longioribus, lobis oblongo-cuneatis subæqualibus, bracteis maximis subcordatis, petalis ciliatis. ♂ circa Niceam. (v. s.)


4. R. ANGUSTIFOLIA (Pers. encb. 1. p. 464.) foliis suprà-decompositis latitudine quadruplicè longioribus, lobis oblongo-cuneatis subæqualibus, bracteis minimis ovatis, petalis ciliatis. ♂ ♂ in apricis lapidosis Galliæ australis et in muris veteribus Aquarum Tarbellicarum. (Dax.) — R. Chaleensis. ♂ Fl. fr. 4. p. 733. — Moris. hist. s. 5. t. 35. n. 8. Folia angusta valde glauca. (v. v.)


5. R. Corsica (DC. prod. 1. p. 710.) foliis suprà-decompositis, lobis obovatis subæqualibus, racemis subsimplicibus, pedicellis elongatis 1-floris rigidè divaricatis, petalis integris. ♂ ♂ in Corsicæ montibus. — Bocc. mus. p. 70. t. 79. ic. (v. s.)

II. DICTAMNUS. L. gen. n. 522.

Cal. deciduus 5-partitus; pet. 5 subinæqualia; stam. 10 declinata filam. apice glanduloso-tuberculosis; stigma simplex; capsula carpellis 5 interne connexis compressis 2-spermis.

1. D. FRAXINELLA (Pers. encb. 1. p. 464.) ♂ in sylvaticis Galliæ australis circa Narbonam, etc., etc. in hortis culta. — D. albus L. sp. 548. Fl. fr. 4. p. 734. — Clus. hist 1. p. 99. f. 2. — Variat floribus purpureis et albis. (v. v. c.)





Subclassis II. CALYCIFLORÆ.

Calyx gamosepalus, sepalis nempè basi plus minùs inter se coalitis. Torus (1) calyci intùs ad basin plus minùs adnatus. Petala et stamina è parte tori calyci adnatâ exserta et ideò orta è calyce vulgò dicta. Petala inter se libera aut coalita. Ovarium liberum aut calyci adnatum.

Ordo XXX. CELASTRINEÆ. *R. Brown. gen. rem. p. 22. DC. prod. 2. p. 2.*

Calycis sepala 4-5 imâ basi inter se coalita, ab ovario libera, æstivatione imbricata. Petala tot quot sepala, iis alterna, rarissimè nulla. Stamina tot quot sepala, petalis alterna, nempè sepalis opposita, insertione ambiguè perigyna. Antheræ biloculares. Ovarium liberum, disco subcarnoso cinctum, 2-3-4-loculare, loculis mono-aut-polyspermis, ovulis erectis raro pendulis. Stylus 1 aut o. Stigma 2-4-fidum. Pericarpium capsulare baccatum drupaceum samaroïdeumve, formâ variâ, abortu loculorum sæpè deformatum. Semina in pluribus, præsertim capsularibus, arillatum. Albumen o aut carnosum. Embryo rectus, axilis. — Frutices vel arbores, foliis sæpè stipulatis, alternis aut oppositis.

Trib. I. STAPHYLEACEÆ. DC. l. c.

Semina ossea, ad hylum truncata, exarillata. Albumen o aut tenue. Cotyledones crassæ. — Folia composita.

I. STAPHYLEA. *L. gen. n. 374.*

Calyx 5-partitus, disco urceolato basi tectus, lobis oblongis concavis coloratis; petala 5 sepalis alterna; stamina 5 petalis alterna; ovarium 2-3-lobum; capsula 2-3-locularis, loculis membranaceis intùs dehiscentibus oligospermis.

1. *S. PINNATA* (*L. sp. 386.*) foliis pinnatis, petiolo eglanduloso, foliolis 5-7 oblongo-lanceolatis glaberrimis serratis, floribus racemosis, capsulis membranaceis vesicariis, ♂ in sylvulis Alsatiæ, in hortis cultus. — Fl. fr. 4. p. 620. — Cam. epit. 171. ic. (v. v. c.)

Trib. II. EVONYMEÆ. DC. l. c. p. 3.

Semina arillata, ad hylum non truncata. Embryo erectus in axi albuminis carnosus. Cotyledones foliaceæ. — Folia simplicia.

(1) Torus est pedunculi dilatatio è quâ originem ducunt organa floris mascula, nempè stamina seu antherifera, seu sterilia, seu in petala conversa.

II. EVONYMUS. *Tourn. Inst. t. 388. L. gen. 271.*

Calyx 4-6-lobus planus, basi disco peltato tectus; petala 4-6 patentia disco inserta, stamna 4-6, glandulis suprà discum prominulis inserta, petalis alterna; stylus 1; capsula 3-5-locularis, 3-5-angularis, valvis medio septiferis; seminibus in loculis 1-4; embryo viridis.

1. E. EUROPEUS (L. sp. 286. var. a. excl. Clas. syn.) ramis lævibus, foliis lanceolato-ovatis tenuissimè serratis, pedunculis subtrifloris, petalis oblongis subacutis, lobis capsularum obtusis. ♂ in sepibus. — Fl. fr. 4. p. 620. Bull. herb. t. 135. (v. v.)
2. E. LATIFOLIUS (Bauh. pin. 248.) ramis lævibus, foliis lato-ovatis dentie-latis, pedunculis trichotomis multifloris, petalis ovalibus, capsularum lobis acutè angulatis alæformibus. ♂ in nemoribus Delph., Galloprovinciæ. — Fl. fr. 4. p. 621. — Clus. hist. 1. p. 56. f. 2. (v. s.)

Trib. III. AQUIFOLIACEÆ. DC. prod. 2. p. 11.

Petala basi latiora, interdùm inter se coalita. Fructus indehiscentes. Seminis embryo rectus in axi albuminis carnosus. — Folia simplicia.


III. ILEX. *L. gen. n. 172.*

Calyx 4-5-dentatus persistens, petala 4-5, sepalis alterna, nunc libera, nunc basi in corollam rotatam subcoalita; stamna 4-5, petalis alterna, hypogyna; ovarium sessile, 4-loculare, stigmatibus subsessilibus 4-5 nunc distinctis nunc in 1 coalitis coronatum; bacca 4-5-pyrena, nucleis oblongis apice umbilicatis 1-spermis.

1. I. AQUIFOLIUM (L. sp. 181.) foliis ovatis acutis nitidis undulatis dentibus et apice spinosis, pedunculis axillaribus brevibus multifloris, floribus sub-umbellatis. ♂ ad sepes et in sylvis. — Fl. fr. 4. p. 621. eng. bot. t. 496. (v. v.)

Ordo XXXI. RHAMNEÆ. *R. Brown. gen. rem. p. 22. DC. prod. 2. p. 19.*

Calycis tubus ovario adhærens, lobi æstivatione valvati, numero definiti 4-5. Petala totidem lobis calycinis alterna, sèpè squamiformia limbo concavo. Stamina tot quot petala iis opposita. Antheræ 2-loculares. Ovarium nunc totum calyci adnatum, nunc imâ basi aut ad medium adhærens, 2-4-loculare, loculis 1-ovulatis. Stylus 1. Stigmata 2-4. Pericarpium sèpiùs indehiscens baccatum drupaceum samaroïdeumve, rariùs capsulare; semina erecta, arillo destituta. Albumen nullum aut sèpiùs carnosum. Embryo rectus, axilis, radiculâ inferâ. — Frutices aut arbusculæ, foliis simplicibus alternis rarissimè oppositis, sèpè stipulaceis.





I. ZIZYPHUS. *Tourn. inst. t. 403. Gærtn. fruct. 1. t. 43.*

Calyx patens, 5-fidus, medio tubi post anthesin circumscissus, basi sub fructu persistente et cum eo subadhærente; *discus glandulosus calyci* adnatus petala 5 gerens; *stamina* 5 antè petala sita; *styli* 2-3 simplices; *drupa* ovoidea nucleo evalvi biloculari 2-spermo (rarius 1-3-loc. 1-3-spermo); *semina* suborbiculata, compressa, sulco destituta, ferè exalbuminosa.

I. Z. VULGARIS (Lam. ill. t. 185. f. 1.) foliis ovatis retusis denticulatis ramulisque glabris, aculeis nullis aut geminis, altero recurvo, drupis ovato-oblongis. ♂ ex Syriâ orta, in regionibus mediterraneis nunc subsppontanea. — Fl. fr. 4. p. 626. — Cam. epit. 167. ic. (v. v.)

II. PALIURUS. *Tourn. inst. t. 387. DC. prod. 2. p. 22.*

Flores Zizyphi, sed styli 3, fructus siccus indehiscens orbicularis alâ latâ membranaceâ cinctus, intùs 3-locul. 3-spermus; semina ovata sulco destituta, albumine nullo aut parcissimo.

I. P. ACULEATUS (Lam. ill. t. 210.) ramulis pubescentibus, foliis basi ovatis acutis 3-nerviis, fructuâ alâ crenulata. ♂ in Galliæ mediterraneæ sterilibus. — Fl. fr. 4. p. 626. — Cam. epit. 83. ic. (v. v.)

III. RHAMNUS. *Lam. dict. 4. p. 461. ill. t. 128. DC. l. c. p. 23.*

Calyx 4-5-fidus, post anthesin medio sæpè circumscissus, basi sub fructu persistente et cum eo adhærente; petala lobis calycis alterna aut o; *stamina* antè petala inserta; *stylus* 2-4-fidus; *fructus* subexsuccus aut baccatus 2-4-locul., loculis coccis in exsciccis separabilibus 1-spermis (rarissimè 2-spermis), rimâ longit. intùs dehiscentibus; *semina* oblonga, ad latus exterius sulco profundo basi latiore notata.

Sect. I. ALATERNUS. *Tourn. inst. t. 366.*

Flores 5-fidi 5-andri, fructus baccatus; seminum cicatrica non exserta.

I. R. ALATERNUS (L. sp. 281.) foliis ovatis ellipticis lanceolatisve coriaceis glaberrimis serratis, floribus dioicis breviter racemosi. ♂ in provinciis australibus et circâ Nannetes. — Fl. fr. 4. p. 624. Duham. ed. nov. 3. p. 42. t. 14.

a. vulgaris (DC.) foliis ovatis serratis. (v. v.)

b. angustifolius (DC.) foliis lanceolatis sublinearibusve. (v. v.)

Sect. II. CERVISPINA. *Dill. nov. gen. t. 8. DC. l. c. p. 24.*

Flores 4-fidi 4-andri; fructus subbaccatus 4-spermus, seminum cicatrica non exserta.

* *Ramis apice spinosis.*

2. R. CATHARTICUS (L. sp. 280.) erectus, foliis ovatis dentatis, floribus fasciculatis polygamodoioicis, baccis 4-spermis subglobosis. ♂ in sylvis, sepibus et incultis passim. — Fl. fr. 4. p. 622. eng. bot. t. 1629. (v. v.)

3. R. INFECTORIUS (L. mant. 49.) procumbens diffususve, foliis ovato-lanceolatis serrulatis glabriusculis, floribus dioicis, utrinque sexus petaliferis. ♂ in Galliæ australis asperis. — Fl. fr. 4. p. 623. — Clus. hist. 1. p. 111. ic. (v. v.)

4. R. SAXATILIS (L. sp. 1671.) procumbens suberectusve, foliis ovato-lanceolatis serrulatis glabriusculis, floribus dioicis, femineis apetalis. ♂ in montibus Delphinatûs ex Villars. — Fl. fr. 4. p. 623. — Clus. hist. 1. p. 112. f. 1. An prioris var? (v. s. ex Italiâ boreali.)

5. *R. PUBESCENTS* (Poir. dict. 4. p. 464.) diffusus, foliis ovatis integerrimis coriaceis pubescentibus. ♂ inter Caunas et Carcassonam ex Dom. Fourmeault. — *R. oleoides* Fl. fr. 4. p. 623. non L. An *R. oleoides* var? (v. s. c.)
* * *Ramis apice non spinosis.*
6. *R. FUMILUS* (L. mant. 49.) procumbens ramosissimus, foliis ovatis serratis glabris, floribus hermaphroditis. ♂ in Alpibus Galloprovinciæ, Delph., Pyren. — Fl. fr. 4. p. 625. *R. rupestris* Scop. carn. ed. 2. t. .5 (v. v. DC.)
β. *rupestris* (DC.) foliis integerrimis. In Delphinatū.
7. *R. ALPINUS* (L. sp. 280.) erecto-tortuosus, foliis ovali-lanceolatis crenato-serratis glabris nervulis lateralibus plurimis lineatis, floribus dioicis, feminorum stigmate 4-fido. ♂ in Pyrenæis, Alpibus Delph., Gallo. , Jurasso. — Fl. fr. 4. p. 624. Hall. helv. t. 40. (v. v.)
β. *Corsicus*, foliis rotundatis obtusis pubescentibus, petiolis ramisque superioribus velutinis. In Corsicâ reperiit Ph. Thomas. (v. s.)

Sect. III. FRANGULA. *Tourn. inst. t. 388. DC. l. c. p. 26.*

Flores 5-fidi 5-andri, seminum cicatricula exserta.


8. *R. FRANGULA* (L. sp. 280.) foliis ovalibus integerrimis nervis lateralibus 10-12 lineatis calycibusque glabris, floribus hermaphroditis. ♂ in dumetis, sylvulis sepiibusque. — Fl. fr. 4. p. 624. Lam. ill. t. 128. f. 1. Baccæ 2-4-spermæ. (v. v.)
-

Ordo XXXII. TEREBINTHACEÆ. *Juss. gen. 368.*

Flores hermaphroditæ polygami aut dioici. Calyx sepalis 3-5 basi plus minus coalitis aestivatione imbricatis constans, ovario rarissimè adhærens. Petala rariùs 0, særissimè sepalo-rum numerum æquantia et iis alterna distincta, in paucissimis basi coalita, aestivatione imbricata aut valvatæ. Stamina cum petalis ex imo calyce aut è disco calycino, aut rariùs è toro ovarium ambiente orta, nunc petalis numero æqualia iisque alterna, nunc petalis numero dupla. Carpella nunc plurima distincta monostyla, nunc plurima ovariis coalita, nonnulla ex iis in utroque casu særè abortiva, et indè carpella in plurimis solitaria 1-locularia evadunt, sed tunc stylorum stigmatumve numerus abortionem særè indicat. Fructus capsularis aut drupaceus. Semina pauca særius solitaria særius exalbuminosa. Embryo rectus curvatus arcuatus replicatusve, radiculæ særius superæ. — Arbores fruticesve, foliis alternis non stipulaceis, floribus parvis.

Trib. I. ANACARDIEÆ. DC. prod. 2. p. 62.

Petala et stamina disco calycino aut calyci inserta. Ovarium 1, 1-loc. 1-ovulatum. Semen funiculo è fundo loculi orto apice inflexo sustentum, exalbuminosum. Cotyledones crassæ super radiculam replicatae.



Demme

I. PISTACIA. L. gen. 1108.

Flores dioïci apetali. *Masc.* Racemus amentaceus squamis 1-floris; calyx 5-fidus; stam. 5, antheris subsessilibus 4-gonis. *Fem.* Racemus laxior; calyx 3-4-fidus; ovarium 1-3-loculare; stigmata 3 crassiuscula; drupa sicca ovata nuce subossea saepius 1-locularis 1-sperma, semina in loculis solitaria. — Arbores foliis pinnatis.

1. *P. VERA* (L. sp. 1454.) foliis impari-pinnatis, foliolis ovatis basi subattenuatis apice submucronatis quinque ternis aut solitariis. ♂ ex Syriâ orta, nunc in provinciis mediterraneis subsppontanea. — Fl. fr. 4. p. 616. — Blackw. t. 461. — Bocc. mus. 2. t. 92. (v. v.)
2. *P. TEREBINTHUS* (L. sp. 1455.) foliis impari-pinnatis, foliis subseptenatis ovato-lanceolatis basi rotundatis acutis mucronatis. ♂ in provinciis australioribus. — Fl. fr. 4. p. 616. — Blackw. t. 478. (v. v.)
3. *P. LENTISCUS* (L. sp. 1455.) foliis abrupte pinnatis, foliolis octonis lanceolatis, petiolo alato. ♂ in saxosis maritimis Niceæ, Galloprovinciæ, Occitanie. — Fl. fr. 4. p. 617. Blackw. t. 195. (v. v.)
γ. *angustifolia* (DC.) foliolis sublinearibus.

Trib. II. SUMACHINEÆ. DC. prod. 1. p. 66.

Petala et stamina disco calycino aut calyci inserta. Ovarium 1, 1-loc. 1-ovulatum. Semen suniculo è basi orto sustentum, pendulum, exalbuminosum. Cotyledones foliaceæ. Radicula super earum commissuram inflexa.

II. RHUS. L. gen. n. 369.

Calyx parvus 5-partitus persistens; petala 5 ovata patentia; stamina 5, ovarium 1 subglobosum, styli breves 3 aut stigmata 3 sessilia; drupa ferè exsuccha 1-locularis, nucleo osseo (abortu?) 1-spermo et interdùm 2-5-spermo. — Frutices.

1. *R. COTINUS* (L. sp. 383.) foliis obovatis simplicibus, floribus laxè paniculatis, hermaphroditis; drupâ semicordatâ venosâ glabrâ. ♂ in collibus Galliæ austro-orientalis. — Fl. fr. 4. p. 614. Jacq. aust. t. 238. (v. v.)
2. *R. CORIARIA* (L. sp. 379.) foliis impari-pinnatis 5-7-jugis villosis, floribus paniculatis, drupâ ovato-rotundâ villosâ. ♂ in siccis provinciarum australiorum et aliquandò occidentalium. — Fl. fr. 4. p. 615. — Blackw. t. 486. (v. v.)
3. *R. RADICANS* (L. sp. 381.) foliis impari-pinnatis 3-foliolatis, foliolis glabris integris, floribus paniculatis, drupâ ovato-rotundâ. ♂ ex Americâ boreali, nunc ex cl. Le Prévost in sylvis paludosis circi Montaure propè Louviers frequens. — bot. mag. t. 1806. Tactu venenosa. (v. v. c.)

Trib. III. PTELEACEÆ. Kunth. gen. tereb. p. 22.

Petala 3-5 hypogyna sessilia, per aestivationem imbricata, rariis valvata. Stamina petalorum numero æqualia. Torus disciformis. Ovarium 2-5-loculare. Fructus indehiscens 1-5-locul., loculis 1-2-spermis. Semina saepè crustacea, albumine carnosâ, cotyledonibus planiusculis, radiculâ superâ.

III. CNEORUM. L. gen. n. 48.

Flores hermaphroditæ; calyx 3-4-dentatus parvus persistens; petala 3-4-æqualia; torus subglobosus; stamina 3-4; stigmata 3-4; drupæ baccatae 3-4 ad axem conjunctæ, putamine 2-loculari, loculis 1-spermis. — Suffrutices.

C. tricoccon (L. sp. 49.) *glabrum*, *floribus axillaribus*, *pedicellis à folio florali liberis*. ♂ in *Galliae australis glareosis rupestribus*. — Fl. fr. 4. p. 615. — Cam. epit. 973. ic. (v. v.)


Ordo XXXIII. LEGUMINOSÆ. *Juss. gen. 345. DC. prod. 2.*
p. 93.

Calyx constans sepalis 5 (rarissimè 4) basi plus minus co-
litis et ideò 5-dentatus 5-fidus 5-partitusve; sepala sæpiùs
inæqualia nunc subæqualiter coalita, nunc concreta in labia 2,
superius constans sepalis 2 apice liberis coalitisve, inferius
sepalis 3, sæpiùs apice distinctis. Petala 5 aut abortu 4, 3, 2,
1 aut 0, sæpiùs inæqualia, imo calyci sæpiùs, toro rariùs in-
serta, per æstivationem sæpiùs imbricata, rariùs valvata, ferè
semper libera, interdùm in corollam gamopetalam concreta.
Stamina cum petalis inserta, petalorum numero dupla, rariùs
aut tripla quadruplave aut pauciora; nunc omnino libera,
nunc filamentis variè connexis aut monadelpha vaginâ integra
seu supernè fissâ, aut diadelpha 9 et 1, seu 5 et 5, nunc rarissimè
triadelpha. Antheræ biloculares. Carpellum sæpiùs 1, cæteris
nempè abortivis. Ovarium sessile aut stipitatum, liberum.
Stylus 1 filiformis è suturâ superiore ortus. Stigma terminale
aut laterale. Legumen bivalve membranaceum coriaceum,
dehiscens aut indehiscens, 1-loculare, aut suturâ alterâ intro-
flexâ longitudinaliter biloculare, aut isthmis articulationibusve
transversè multiloculare. Semina 2 aut plura aut solitaria,
suturæ superiori adfixa, alternatim cuique valvulae inserta,
sæpiùs ovalia aut reniformia; funiculus varius, rarò in arillum
expansus. Testa lœvis. Endoplevra sæpè tumida albumen men-
tiens. Embryo nunc rectus, nunc homotropus seu pleurorhi-
zæus, radiculâ nempè inflexâ, super loborum commissuram
pronâ, sed in utroque casu ad hylum directâ. Cotyledones
foliaceæ aut carnosæ; aliæ exsertæ, aliæ, intrâ spermoder-
mium sub terrâ inclusæ. — Arbores frutices aut herbæ, foliis
sæpissimè alternis, bistipulatis, simplicibus aut variè compo-
sitæ, petiolatis.

Sabordo I. PAPILIONACEÆ. *L. ord. nat. 32. DC. prod. 2. p. 94.*

Embryo homotropus pleurorhizæus nempè radiculâ super lobo-
rum commissuram pronâ. Sepala per æstivationem imbricata aut
subvalvata. Petala in corollam papilionaceam disposita, semper ideò
irregularia, stamna imo calyci inserta seu perigyna.





Trib. I. *SOPHOREÆ*. Spreng. DC. prod. 2. p. 94.

Stamina libera. Legumen continuum nec articulatum. Cotyledones planæ foliaceæ.

I. *ANAGYRIS*. Tourn. inst. t. 415. L. gen. n. 509.

Calyx 5-dentatus subbilabiatus; alæ vexillo longiores et carinâ dipetalâ breviores; legumen breviter stipitatum compressum polyspermum bivalve isthmis irregulariter subinterruptum.

1. *A. FÄTIDA* (L. sp. 534.) foliis trifoliolatis, foliolis integerrimis lanceolatis acutis, leguminibus acuminatis. ♂ in collibus saxosis submontanis Galliae mediterraneæ circâ Niceam, Massiliam, Arelatem, Monspelium. — Fl. fr. 4. p. 491. — Clus. hist. 1. p. 93. ic. (v. s.)

Trib. II. *LOTEÆ*. DC. prod. 2. p. 115. leg. mem. vi.

Embryo homotropus. Stamina aut monadelpha aut diadelpha (9 et 1). Legumen continuum 1-loculare, aut rariùs suturâ alterâ introflexâ 2-loculare. Cotyledones planiusculæ per germinationem in folium stomatibus donatum conversæ.

Subtribus 1. *GENISTEÆ*. Bronn. DC. l. c.

Legumen 1-loculare. Stamina sèpissimè monadelpha. Folia simplicia aut palmatim trifoliolata rariùs pinnata. Caules sèpissimè fruticosi.

II. *ULEX*. L. gen. n. 881.

Calyx bibracteolatus, bipartitus, labio altero 3, altero 2-dentato; stam. omnia connexa; legumen ovali-oblongum turgidum vix calyce longius pluri-ovulatum oligospermum. — Frutices ramosissimi.

1. *U. EUROPAEUS* (L. sp. 1045. var. a.) erectus, foliis lanceolato-linearibus ramulisque subvillosis, bracteis ovatis laxis, calycis pubescens dentibus obsoletis conniventibus. ♂ in sterilibus et sepibus præsertim provinciarum occidentalium borealiumque. — Fl. fr. 4. p. 492. eng. bot. t. 742. (v. v.)

2. *U. NANUS* (Smith. fl. brit. 757. eng. bot. t. 713.) decumbens, foliis linearibus ramulisque glabris, bracteis minutis adpressis, calycis glabriuscui dentibus lanceolatis distantibus. ♂ in sterilibus et ericetis Galliae mediae et occidentalis. — Fl. fr. 4. p. 492. (v. v.)

3. *U. PROVINCIALIS* (Lois. not. 105. t. 6. f. 2.) erectus, foliis lanceolato-linearibus ramulisque glabriuscui, bracteis minutis adpressis, calycis subpubescentis corollamque vix superantis dentibus lanceolatis distantibus. ♂ in sterilibus Galloprovine., Occitanie, Andegaviae. — Fl. fr. 5. p. 546. (v. v.)

III. *SPARTIUM*. DC. prod. 2. p. 145.

Cal. membranaceus spathaceus supernè fissus apice 5-dentatus subbilabiatus; corollæ vexillum subrotundum complicatum, carinâ acuminatâ et petalis parùm adglutinatis bipartibilis; stam. monadelpha; legumen plano-compressum polyspermum eglandulosum.

1. *S. JUNCEUM* (L. sp. 995.) glabrum, foliis paucis lanceolatis, floribus in racemos terminales dispositis. ♂ in asperis apricis Delphin. super. ex Villars, Galloprov., Occitanie, circâ Montem-Albanum, Tolosam, Tarbam, Aginnum. — Gen. juncea. Fl. fr. 4. p. 495. (v. s.)

IV. *GENISTA*. Lam. dict. 2. p. 616. ill. t. 619. DC. leg. mem. vi. p. 204.

Calyx 2-labiatus, labio superiore 2-partito, inferiore 3-dentato, aut 5-lobus, lobis 3 inferioribus ad apicem ferè coalitis; vexillum oblongo-ovale; carina oblonga recta genitalia non omnino continens; stamina

monadelpha, legumen plano compressum aut rarius subturgidum, polyspermum, rarius oligospermum, eglandulosum. — Frutices.

* *Inermes, foliis omnibus aut plerisque trifoliolatis.*

1. *G. CANDICANS* (Lin. amæn. 4. p. 284.) foliis petiolatis 3-foliolatis, foliolis obovatis pubescentibus, ramis angulatis, capitulis terminalibus paucifloris, leguminibus hirsuto-villosis. ♂ in collibus Corsicæ, Niceæ, insularum Stæchadum, Monspelii, agri Ruscinonensis. — *Cytisus candicans* L. sp. 740. Fl. fr. 4. p. 504. (v. v. DC.)

2. *G. LINIFOLIA* (L. sp. 405.) foliis sessilibus 3-foliolatis, foliolis linearibus subtus sericeis margine demum revolutis, racemis terminalibus confertis, leguminibus hirsutis, ramis teretibus sulcatis. ♂ in insulis Stæchadum. — *Cytisus linifolius* Lam. DC. Fl. fr. 4. p. 504. — Desf. atl. 2. t. 181. (v. s.)

* * *Spinosæ, foliis aut omnibus aut nonnullis trifoliolatis.*

3. *G. HORRIDA* (DC. fl. fr. 4. p. 500.) foliis 3-foliolatis petiolatis oppositis, foliolis linearibus complicatis subsericeis, ramis angulatis spinosis confertis oppositis, floribus subterminalibus paucis, calyce pubescente. ♂ in aridis Pyren. et agri Lngdunensis. — *Spartium horridum* Valh. *G. erinacea* Gilib. bot. prat. 2. p. 239. ic. (v. v. DC.)

4. *G. LOBELII* (DC. fl. fr. 4. p. 499.) foliis paucis, imis sessilibus 3-foliolatis, cæteris ferè omnibus simplicibus sparsis linearis-oblongis subsericeis, ramis confertis spinosis striatis hinc inde tuberculatis, floribus secus ramulos paucis solitariis subracemosis pedicellatis, calyce pubescente. ♂ in aridis Corsicæ, Galloprov. — Lob. adv. p. 409. ic. (v. v. DC.)

5. *G. SALZMANNI* (DC. prod. 2. p. 147.) foliis sessilibus 3-foliolatis simplicibus oblongis obtusis adpressè pubescentibus, ramis demum striatis laxis spinosis, floribus secus ramos subracemosis geminis pedicellatis adpressè sericeo-pubescentibus, calycis lobis 3 infer. superiores subæquatibus angustioribus. ♂ in petrosis Corsicæ propè Corte. DC. mém. leg. vi. p. 211. — A præcedente vix diversa. (v. s.)

* * * *Spinosæ, foliis omnibus simplicibus.*

6. *G. CORSICA* (DC. fl. fr. 5. p. 548.) tota glaberrima, foliis lineari-lanceolatis, stipulis subspinosaentibus, spinis simplicibus rigidis, floribus axillaribus solitariis pedicellatis, carinâ vexilli glabri longitudine, legumine 4-8-spermo glaberrimo. ♂ in Corsicâ circâ Bastia, Bonifacio, etc. (v. s.)

β. *pubescens* (DC.) ramulis foliisque junioribus adpressè pubescentibus. ♂ in Corsicâ propè Calvi. (v. s.)


7. *G. SCORPIUS* (DC. fl. fr. 4. p. 498.) foliis paucissimis oblongis subsericeis, spinis ramosis patentibus striatis glabris, floribus fasciculatis subracemosis breviter pedicellatis glabris, carinâ vexilli longitudine, legumine 2-4-spermo. ♂ in sterilibus montosis Delphin. austr., Galloprov., Occit., Cebenu., Aquitanie. — *Spartium Scorpions*. L. sp. 995. — Clus. hist. 1. p. 106. f. 1. (v. v.)

8. *G. HISPANICA* (L. sp. 999.) foliis lanceolatis villosis, spinis ramosis rigidis, ramis floriferis inermibus, racemo terminali subcapitato, carinâ villosâ vexilli glabri longitudine, legumine ovali 2-4-spermo subhispido, maturo glabrusculo. ♂ in aridis montosis provinc. australium à Nicæa ad Albi. — Fl. fr. 4. p. 499. — J. Bauh. 1. p. 2. p. 400. f. 1. (v. v.)

9. *G. ANGLICA* (L. sp. 999.) tota glabra, foliis ovato-lanceolatis, spinis simplicibus, ramis floriferis inermibus, racemis paucifloris terminalibus, carinâ vexillo et alis longiore, legumine ovato-cylindraceo polyspermo. ♂ in sylvulis turfosis et ericeti Galliæ occidentalis, mediae et australis. — Fl. fr. 4. p. 498. — Lob. ic. 2. p. 93. f. 2. (v. v.)

10. *G. GERMANICA* (L. sp. 995.) foliis lanceolatis hirsutulis, spinis simplicibus aut ramosis, ramis floriferis inermibus, racemis terminalibus, floribus subvillosis, carinâ vexillo et alis longiore, legumine ovato hirsutulo 2-4-spermo.





δ in sylvis et ericetis Galliae orientalis, mediæ et australis. — Fl. fr. 4. p. 499.
— Fuchs. hist. 220. ic. (v. v.)

* * * * *Inermes, foliis omnibus simplicibus.*

11. *G. PURGANS* (L. sp. 999.) erecta ramosissima, ramis teretibus striatis, foliis paucissimis lanceolatis subsessilibus subseiceis, floribus axillaribus solitariis subpedicellatis, petalis inter se æqualibus glabris, legumine juniore adpressè pubescente. δ in siccis sterilibus montosis agri Lugdun., Arvern., Cévenn., provinc. mediter., Pyr. or. et Aureliæ ex Dub. — Fl. fr. 4. p. 494. Bull. herb. 115. (v. v.)

12. *G. CINEREA* (DC. fl. fr. 4. p. 494.) erecta ramosissima, ramis striatis, foliis lanceolatis adpressè pubescentibus, floribus secùs ramos subsessilibus solitariis, petalis sericeis longitudine subæqualibus, leguminibus adpressè villosis 4-6-spermis. δ in collibus aridis montosisque à Nicaë ad Pyr. orient. secùs limites olearum. — Fl. fr. 4. p. 494. (v. v.)

13. *G. HUMIFUSA* (L. sp. 998?) Vill. dauph. 3. p. 421. t. 44.) procumbens, ramis tortuosis tuberculis apice spinescenti-rigidis foliisque linear-lanceolatis piloso-hirsutis, floribus axillaribus solitariis subsessilibus, petalis sericeis inter se subæqualibus, lobis calycinis ovatis subacutis. δ in Delphinatûs montosis propè Gap. — Fl. fr. 4. p. 496. (v. s.)

14. *G. TINETIFORMIS* (L. sp. 998.) radice repente, caulis suberectis, ramis teretibus striatis erectis, foliis lanceolatis glabriusculis, floribus spicato-racemosis, leguminibusque glabris. δ frequens in pascuis et sylvulis. — Fl. fr. 4. p. 495.
— Fuchs. hist. 809. ic. (v. v.)

$\beta.$ *latifolia* (DC.) foliis lato-lanceolatis. In Arvernia Monte-Aureo. (v. v. DC.)

15. *G. SAGITTALIS* (L. sp. 998.) caule prostrato, ramis herbaceis ascendentibus ancipitibus membranaceis subarticulatis, foliis ovato-lanceolatis, floribus in spicam ovatam terminalem aphyllam digestis, corollis glabris cum carinâ ad dorsum lineâ villosâ. δ δ in pratis pascuisque submontosis. — Fl. fr. 4. p. 497.
— J. Bauh. 1. p. 2. p. 393. f. 3. (v. v.)

$\beta.$ *minor* (DC.) fruticulosa minor, ramis ad apicem foliisque adpressè pubescenti-sericeis. In siccioribus Galliae australis. (v. v.)

16. *G. PROSTRATA* (Lam. dict. 2. p. 618.) caulis diffuso-prostratus, ramis angulatis striatis villosulis, foliis obovatis oblongis subtus subvillosis, floribus axillaribus longè pedicellatis erectis, corollis glabris, leguminibus villosis 3-4-spermis. δ in asperis Burgundiaæ, Jurassi et ad urbem Velaunorum (le Puy en Velai). — Fl. fr. 4. p. 496. G. Halleri Reyn. mem. 1. p. 211. ic. (v. s.)

17. *G. PILOSA* (L. sp. 999.) caulis procumbentibus striatis ramosis tuberculatis, foliis lanceolatis complicatis subtus adpressè sericeis, floribus axillaribus breviter pedicellatis, corollis sericeis, leguminibus pubescentibus polyspermis. δ in asperis apricis submontosis passim. — Fl. fr. 4. p. 495. — Clus. hist. 1. p. 103. f. 2. (v. v.)

V. CYTISUS. DC. fl. fr. 4. p. 501. leg. mem. vi. — Cytisus et Spartii sp. L. Lam. etc.

Calyx bilabiatus, labio superiore sæpius integro, inferiore subtridentato; vexillum ovatum amplum; carina obtusissima genitalia includens; stamina monadelpha; legumen plano-compressum polyspermum eglandulosum. — Frutices.

Sect. I. LABURNUM. DC. prod. 2. p. 153.

Calyx campanulatus; legumina polysperma ad suturam superiore non dilatata. — Rami inermes foliosi.

1. *C. LABURNUM* (L. sp. 1041.) ramis teretibus incandescentibus, foliis petiolatis, foliolis ovato-lanceolatis subtus pubescentibus, ramis pendulis simpli-

- cibus** pedicellis calycibusque adpressissimè pubescentibus, leguminibus linearibus polyspermis adpresso pubescentibus. ♂ ♂ in lapidosis demissiorum Alpium, Jurassi, collium Bressæ, Beugesiæ, Burgundiæ, Pyrenæorum ex Dum. Cours. — Fl. fr. 4. p. 501. excl. var. β. — J. Bauh. hist. 1. p. 2. p. 36r. ic. (v. v.)
2. **C. ALPINUS** (Mill. dict. n. 2.) glabra, ramis teretibus, foliis petiolatis, foliolis ovato-lanceolatis basi rotundatis, racemis pendulis, pedicellis calycisque hirsuto-puberulis, leguminibus glabris oligospermis marginatis. ♂ ♂ in nemorosis montibus Jurassi australis. — Waldst. et Kit. hung. 3. p. 288. t. 260. **C. laburnum** β. Fl. fr. 1. c. (v. v. D.)
3. **C. SESSILIFOLIUS** (L. sp. 1041.) glaberrimus, ramis teretibus, foliis floribus subsessilibus, foliolis ovatis, racemis terminalibus erectis abbreviatis, bracteâ triphyllâ sub calyce. ♂ in asperis montosis Delph., Niceæ, Gallop., Occit., agri Ligericini et Ruscinonensis. — Fl. fr. 4. p. 502. — J. Bauh. hist. 1. p. 2. p. 373. f. 2. (v. v.)
4. **C. TRIFLORUS** (L'Her. stirp. 184.) hirsuta, ramis teretibus, foliis petiolatis, foliolis obovato-ellipticis, floribus axillaribus pedicellatis ternis apice ramorum subracemosis. ♂ in Corsicâ, circâ Narbonam, Olbias, Antipolim. — Fl. fr. 4. p. 505. — Clas. hist. 1. p. 94. f. 3. (v. s.)
5. **C. SCOPARIUS** (Link. enum. 2. p. 241.) ramis angulatis glabratiss., foliis trifoliolatis petiolatis, summis simplicibus foliolisque oblongis, floribus axillaribus pedicellatis solitariis, leguminibus ad margines pilosis. ♂ in arenosis et sylvaticis Galliæ præserîm occidentalis. — Genista scoparia. Fl. fr. 4. p. 497. non Vill. — Duham. arb. t. 84. (v. v.)

Sect. II. CALYCOTOME. Link. DC. l. c. p. 154.

Calyx campanulatus subbilabiatus dein circumscissus truncatus; legumina ad suturam superiorem incrassata. — Rami spinosi.

6. **C. SPINOSUS** (Lam. dict. 2. p. 247.) ramis angulatis spinosis, foliis trifoliolatis, foliolis obovato-oblongis, leguminibus glaberrimis. ♂ in collibus et asperis Corsicæ et Galliæ merid. à Perpignano ad Niceam passim. — Fl. fr. 4. p. 503. — Lob. ic. 2. t. 95. (v. v. DC.)
7. **C. LANIGERUS** (DC. fl. fr. 4. p. 504.) ramis striatis spinosis, foliis 3-foliolatis, foliolis obovato-ellipticis, leguminibus lanato-hirsutissimis. ♂ in Corsicæ collibus asperis. — Spartium lanigerum Desf. (v. s.)

Sect. III. TUBOCYTISUS. DC. l. c.


Calyx tubulosus apice bilabiatus. — Frutices inermes.


8. **C. SUPINUS** (Jacq. aust. 1. t. 20) caulinis decumbentibus ramosis, ramis teretibus junioribus hirsutulis adultis glabratiss., foliolis obovato-obtusis subtus hirsutis, floribus 2-4 subterminalibus pedunculatis, calycibus leguminibusque parcè villosis. ♂ in collibus herbosis apricis subdamosis Alpium Delphinensis et propè Fontem-Bleaudi ex Merat. — Fl. fr. 5. p. 549. — Clas. hist. p. 96. q. vii. ic. (v. v. DC.)
9. **C. CAPITATUS** (Jacq. aust. t. 33.) caulinis erectis, ramis strictis hispidis, foliolis ovato-ellipticis villosis, floribus ad apices ramorum plurimis capitatis, calycibus leguminibusque villoso-hispidis. ♂ ad margines sylvarum Burgundiæ orient., Lugduni, agri Ruscin. ex Benth. Andegaviæ ex Bast., Burdigalæ ex Laterr. — Fl. fr. 4. p. 505. — Clas. hist. 1. p. 96. f. 1 et 3. (v. v. DC.)

Sect. IV. LOTOÏDES. DC. l. c.

Calycis tubus brevis obconicus, labium superius bipartitum, inferius tridentatum; corolla vix calyce longior.

10. **C. ARGENTEUS** (L. sp. 1043.) caulinis decumbentibus foliis calycibus collis leguminibusque adpresso sericeis, foliis petiolatis trifoliolatis, foliolis oblongo-lanceolatis, floribus 3-4 terminalibus. ♂ ♀ in petrosis Delphinatū,





prov. austr. usquæ ad Tolosam. — Fl. fr. 4. p. 506. — Lob. ic. 2. p. 41. f. 2.
(v. v.)

VI. ADENOCARPUS. DC. fl. fr. 5. p. 549. leg. mem. vi.

Calyx obconicus sæpè glandulosus bilabiatus, labio super. bipartito, inferiore productiore trifido; carina obtusa genitalia sovens; stam. monadelpha; legumen oblongum plano-compressum glandulas subpedicellatas undique gerens. — Frutices.

1. A. PARVIFOLIUS (DC. l. c.) calyce glanduloso-subpubescente, labii inferioris lacinia mediâ lateralibus longiore labium super. longè superante, ramis glabris, floribus remotis. ♂ in ericetis apricis Gallie occidentalis. — Cytisus complicatus. Fl. fr. 4. p. 503. — Clus. hist. 1. p. 94. f. 1. (v. v.)
2. A. TELONENSIS (DC. l. c.) calyce eglanduloso pubescente, labii inferioris laciñis subæqualibus labium superiorius paulò superantibus, ramulis glabriusculis, floribus remotis. ♂ in sterilibus et ericetis in Pyrenæis, Cebennis, montibus Galloprovinciæ. — Cyt. Telonensis Lois. in Duham. arb. ed. nov. 6. t. 47. f. 2. (v. v. DC.)

VII. ONONIS. L. gen. n. 863.

Calyx campanulatus 5-fidus, laciñis linearibus; vexillum magnum striatum; stamina monadelpha, decimo interdùm sublibero; legumen sæpius turgidum sessile oligospermum.

* *Floribus pedunculatis flavis.*


1. O. ARACHNOÏDEA (Lapeyr. abr. 409.) suffruticosa villosa non viscosa, foliis pinnatim 3-foliolatis, foliolis ovali-oblongis apice serratis, summis interdùm simplicibus, pedicellis 1-floris aristatis. ♂ ♀ in Pyrenæis orientalibus secùs torrentes et propè Perpignanum. — Fl. fr. 5. p. 552. Vexillum rubro striatum. Rami villis non viscosis molliter hirsuti. (v. v.)
2. O. NATRIX (DC. fl. fr. 4. p. 514.) suffruticosa viscosa-pubescentes, stipulis ovatis acuminatis, pedicellis 1-floris aristatis aristâ parte pedunculi superiore longiore, calycis hirsuto-glandulosi laciñis lanceolato-linearibus. ♂ ♀ in apricis. — Fl. fr. 4. p. 514.
 - a. vexillo flavo. — O. Natrix L. sp. 1008. — Cam. epit. 444. ic. (v. v.)
 - β. vexillo rubro striato. — O. pinguis. L. sp. 1009. (v. v.)
3. O. RAMOSISSIMA (Desf. atl. 2. t. 186.) basi suffruticulosa ramosissima pubescenti-viscosa, stipulis lanceolatis acuminatis, pedunculis aristatis aristâ parte superiore pedunculi longiore, calycis viscido-hirsuti laciñis linearibus. ♂ ♀ in maritimis arenosis Niceæ. — Fl. fr. 4. p. 515. Vexillum venis purpurascens striatum. An satis ab. O. Natrice β. distincta? (v. v.)
4. O. ARENARIA (DC. cat. Monsp. 128.) basi suffruticulosa ramosissima pubescenti-viscosa, stipulis linear-lanceolatis longè acuminatis, pedicellis 1-floris folio brevioribus breviter aristatis. ♂ ♀ in arenosis maritimis Monspelii. — Fl. fr. 5. p. 551. Vexillum flavum non striatum. Flores minores quam in 2 præcedentibus. (v. v. DC.)
5. O. VIScosa (L. sp. 1009. var. α.) herbacea pubescens viscosa, foliis superioribus simplicibus, inferioribus 3-foliolatis foliolo medio majore, stipulis petiolum subæquantibus, pedunculis unifloris aristatis folio longioribus, corollâ calycinis lobis longiore. (I) circâ Olbias et Monspelium. — Fl. fr. 4. p. 513. — Barr. ic. t. 1239. Flores flavi vexillo subpurpurascente. (v. s.)
6. O. BREVIFLORA (DC. prod. 2. p. 160.) herbacea pilosa subviscosa, foliis superioribus simplicibus, infer. 3-foliolatis, foliolis ellipticis obtusis serratis, medio majore, stipulis serratis petiolum subæquantibus, pedunculis 1-floris longè aristatis folii longitudine, corollâ lobis calycinis breviore. (I) ex Foro-Julii (Fréjus) misit. cl. Solier. — O. viscosa β. L. DC. 4. fr. 4. p. 515. Legumen calyce duplò longius. (v. s.)

7. *O. RUBESCENS* (L. mant. 267.) herbacea erecta viscoso-pubescentis, foliis superioribus simplicibus, cæteris 3-foliolatis, foliolis ovali-oblongis serratis, stipulis amplis acuminatis integris, calycibus latis striatis, pedunculis 1-floris muticis folio brevioribus. (I) in apricis agri Monspeliensis. — Fl. fr. 5. p. 551. *Vexillum subrhombescens*. (v. s.)
8. *O. ORNITHOPODIOIDES* (L. sp. 1009.) herbacea viscosa-pubescentis, foliolis trifoliolatis, foliolis oblongis, pedunculis 1-2-floris aristatis, leguminibus linearibus cernuis inter semina contractis. (I) in Corsicâ (cl. Soleiroli). — Cav. ic. 2. t. 192. (v. s.)


* * *Floribus pedunculatis purpurascensibus rarius albis.*

9. *O. ROTUNDIFOLIA* (L. sp. ed. 1. p. 719. non ed. 2.) fruticosa, foliis trifoliolatis, foliolis ovatis dentatis, pedunculis trifloris ebracteolatis. ♂ in Pyrenæis et Alpibus. — Fl. fr. 4. p. 515. — Lob. ic. 2. p. 73. f. 1. (v. v.)
β. aristata (DC.) pedunculis trifloris aristatis.
10. *O. FRUTICOSA* (L. sp. 1010.) fruticosa, foliis trifoliolatis, foliolis sessilibus lanceolatis serratis, stipulis in unicam vaginam 4-aristatam connatis, summis aphyllis, pedunculis trifloris in racemum dispositis. ♂ in apricis montosis Delphini. et Galloprovinciæ. — Fl. fr. 4. p. 514. — Duh. ed. nov. 1. t. 58. (v. v.)
11. *O. CENISTA* (L. mant. 267.) basi suffruticosa multicaulis cespitoso-prostrata, glabra, foliis palmatum trifoliolatis, foliolis cuneatis stipulisque serratis, pedunculis 1-floris muticis folio longioribus. ♂ ♀ in petrosis Alpium Delphini. et Galloprovinciæ. — Fl. fr. 4. p. 512. All. ped. t. 10. f. 2. — Barr. ic. t. 1104. (v. v. DC.)
β. subaristata (DC.) pedunculis subaristatis. In Pyrenæis orientalibus, et centralibus. (v. s.)
12. *O. RECLINATA* (L. sp. 1011.) herbacea diffusa, foliis 3-foliolatis, foliolis obovatis serratis viscosa-pubescentibus, stipulis late ovatis acutis serratis, pedunculis 1-floris longitudine folii subapice subbracteolatis, calyce corollâ longiore. (I) in Galliæ australis maritimis. — Fl. fr. 4. p. 512. — Barr. ic. t. 761. (v. s. sine fructu.)
13. *O. MOLLIS* (Lam. nov. sp. p. 22.) herbacea erectiuscula, foliis trifoliolatis, foliolis oblongo-obovatis apice serratis, stipulis integriusculis, pedunculis unifloris muticis folii longitudine, calyce corollæ et demum legumini æquali. (I) in Corsicæ collibus circè Bastia reperiit Ph. Thomas. (v. s.)
14. *O. CHERLERI* (L. sp. 1007.) herbacea hirsuta, foliis 3-foliolatis, foliolis oblongo-cuneatis apice serratis, stipulis subintegris, pedunculis 1-floris muticis folio brevioribus in racemum aggregatis, calyce corollâ longiore legumini æquali. (I) in petrosis aridis Corsicæ, Nîcæ, Massiliæ, Monspeli. — Fl. fr. 4. p. 512. — J. Bauh. hist. 2. p. 394. f. 2. (v. s.)
- * * * *Floribus sessilibus aut brevissimè pedunculatis, purpureis rarius albis.*
15. *O. ALTISSIMA* (Lam. dict. 1. p. 506.) erecta, ramulis inermibus undique villosis subviscidis, foliis trifoliolatis, foliolis oblongo-lanceolatis acutis serratis, floribus subgeminatis, lobis calycinis villosis leguminis longitudine. ♂ ♀ in arvis et arenosis Delphinatûs? — Fl. fr. 4. p. 509. *O. hircina* Jacq. hort. vind. t. 93. — Clas. hist. 1. p. 99. f. 1. (v. s. ex Valesiâ.)
16. *O. PROCURRENS* (Wallr. sch. crit. p. 381.) caulinis basi radicante procurrentibus diffusis, ramulis floriferis ascendentibus undique pubescentibus, foliis trifoliolatis, foliolis ovato-subrotundis utrinquè glandulosis sub-serratis, lobis calycinis legumen superantibus. ♂ ♀ in campis arenosis Galliæ. — *O. arvensis* Lam. dict. 1. p. 505. DC. fl. fr. 4. p. 509. — Fuchs. hist. 60. ic.
β. repens (DC.) ramis foliisque hirsutioribus, foliolis obtusissimis. — *O. repens* L. — Dill. elth. t. 25. f. 28. In arenosis maritimis. (v. v.)









γ? caduca (DC.) ramis villosò-viscosis, foliolis oblongis pubescentibus.
In montibus Delphinatūs. O. caduca Vill. (v. s.)

17. O. SPINOSA (Wall. sch. crit. p. 379.) caulis erectusculis ramulisque spinosis bifariam unifariamve pubescentibus, foliis trifoliolatis, foliolis oblongis basi cuneatis subintegris, floribus solitariis, calycinis lobis legumine brevioribus. ♂ ♀ ad vias et fossas. — O. spinosa L. sp. 1006. — Tabern. hist. 913. ic. An. O. senescens Lapeyr. abr. p. 405? (v. v.)

♀ glabra (DC.) foliolis oblongis, ramis glabris. ♂ ♀ in Galliæ præser-tim australis siccis. — O. antiquorum L. Fl. fr. 3. p. 509. (v. v.)

18. O. MITISSIMA (L. sp. 1007.) caulis erectis subpilosus albidis, foliis trifoliolatis, foliolis ovalibus serratis, floribus in spicam elongatam bracteis stipularibus scarioso-albidis variegatam dispositis. (I) in Corsicâ et agro Rusci-nonensi? ex Lapeyr. — Dill. eth. t. 24. f. 27. (v. s.)

19. O. SERRATA (Forsk. desc. 131? Vahl. symb. 1. p. 52.) tota pubescenti-viscosa multicaulis decumbens, foliis trifoliolatis, foliolis obovatis oblongisve serratis, stipulis subdenticolatis, floribus spicato-racemosis, calycibus corollæ et legumini æqualibus, lacinias calycinis subtrinerviis. (I) in Corsicæ arenosis. Flores albidæ et purpurei. (v. s.)

20. O. ALOPECUROÏDES (L. sp. 1008.) caule solitario erecto subpiloso, foliis r-foliolatis, foliolo elliptico obtuso stipulisque maximis subserratis, floribus densè spicatis, calycinis lobis hispidis corollâ et legumine duplò ferè longioribus. (I) in Corsicâ circâ Bonifacio ex cl. Viviani (eors. 13.) sed ait calycis lacinias corollâ tantum paulò longiores. — Schkuhr. handb. t. 194. Corolla rosea. (v. s. c.)

**** *Floribus sessilibus aut subsessilibus flavis.*

21. O. ARRAGONENSIS (Asso. syn. arr. 96. t. 6. f. 2.) fruticosa, foliis trifoliolatis glabris, foliolis subtrotundis serratis, floribus subsessilibus geminatis in racemum aphyllum dispositis, calycibus villosis corollâ dimidio brevioribus. ♂ in Pyrenæis Galliæ conterminis circâ Benasque. — Fl. fr. 5. p. 552. O. dumosa Lapeyr. — Magn. hort. Monsp. 17. t. 21. (v. s.)

22. O. STRIATA (Gouan. ill. 47.) caulis diffuso - prostratis ramosis, foliis trifoliolatis subscabris, foliolis obovato-cuneatis striatis stipulisque serratis, floribus capitatis, corollis calyce hirsuto-viscoso longioribus. ♂ ♀ in mon-tanis Pyr., Cebenn., Galloprov. superioris, Delphinatus. — Fl. fr. 4. p. 511. Variat ferè glabra et glanduloso-scabra subhirsuta. (v. v.)

23. O. COLUMNAE (All. ped. 1. t. 20. f. 3.) pubescens, canibus subcespitosis, foliis trifoliolatis, foliolis obovato-oblongis stipulisque serratis, summis sim-plicibus, floribus in spicam foliosam aggregatis, corollis calyce brevioribus. ♀ in collibus et sabulosis Galliæ occidentalis, mediæ, australisque. — O. parviflora Lam. DC. fl. fr. 4. p. 510 non Thunb. O. minutissima Jaeq. austr. t. 240. non L. (v. v.)

24. O. MINUTISSIMA (L. sp. 1007.) glabra, caulis subcespitosis, foliis trifoliolatis, foliolis oblongo-ovato cuneatis serratis, stipulis subulatis integris, floribus in spicam foliosam aggregatis, corollis calyce brevioribus. ♀ in saxosis apricis provinc. australium. — Fl. fr. 4. p. 510. O. barbata Cav. ic. t. 153. Radix interdùm frutescit. Calycis lobi subulati elongati. Flores verna-les plerumque apetali ex cl. Benth. (v. v.)

25. O. VARIEGATA (L. sp. 1008.) glabra diffusa, foliis unifoliolatis, foliolo ses-sili obovato striato serrato, stipulis amplis subvaginantibus serratis, floribus subsessilibus axillaribus, corollis calyce pubescente longioribus. (I) in are-nosis maritimis Corsicæ, insularum Stæchadum ex Ger. — Desf. atl. t. 185. (v. s.)

VIII. ANTHYLLIS. L. gen. n. 864.

Cal. tubulosus 5-dentatus post anthesin persistens, plus minus ve-sicarius inflatus; cor. alæ carinæ et vexillo subæquales; stam. omnia

connexa; legumen ovatum 1-2-spermum rariū oblongo-lineare polyspermum semper calyce indusiatō tectum.

Sect. I. DORYCNIÖIDES. DC. prod. 2. p. 168.

Calyx vix inflatus, legumen 1-loculare 1-spermum. — Herbæ perennes.

1. A. GERARDI (L. mant. 100.) herbacea diffusa, foliis pinnatis glabriusculis, foliolis 5-9 oblongo-linearibus mucronatis, capitulis 15-20-floris. ♀ in apricis saxosis sylvaticisque subherbosis Galloprovinciæ, Corsicæ et agri Ruscinonensis. — Fl. fr. 4. p. 517. — Ger. gallop. 490. t. 18. (v. v. DC.)

Sect. II. ASPALATHOÏDES. DC. l. c.

Calyx vix inflatus, legumen 1-locul. 1-2-spermum. — Frutices humiles.

2. A. CYTISOIDES (L. sp. 1013.) fruticosa inermis ramosissima virgata, foliis simplicibus aut trifoliolatis, foliolo impari lateralibus multò majore, ramis canis adpressè velutinis, floribus paucis ad axillas superiores sessilibus in spicam interruptam digestis. ♂ ad rupes et colles propè Perpignanum et Telenem, in Corsicâ ex Viviani. — Fl. fr. 4. p. 518. — Barr. ic. t. 1182. fl. flavi. (v. v. DC.)
3. A. HERMANNIÆ (L. sp. 1014.) fruticosa ramosissima ramis spinescentibus glabriusculis, foliis subsessilibus simplicibus 3-foliolatis, foliolis oblongo-cuneatis glabris aut adpressè pubescentibus, capitulis panicifloris ad axillas superiores subsessilibus. ♂ in Corsicâ. — Fl. fr. 4. p. 518. — Alp. exot. t. 26. Flores flavi parvi. (v. s.)

Sect. III. ERINACEA. Clus. hist. 1. p. 107. ic.

Calyces post anthesin inflato-vesicarii; leg. 1-loc. 1-2-ovul. (ovulo inferiore solo superstite). — Frutex ramosissimus spinosus ferè aphyllus.

4. A. ERINACEA (L. sp. 1014.) fruticosa, ramis spinescentibus, foliis paucissimis ovalibus oblongis, floribus subcapitatis. ♂ in Corsicâ ex Viv. et Pyren. Catalonensis Galliæ conterminis ex Benth. — Bot. mag. t. 676. Flores cæruleo-purpurei. (v. s. c.)

Sect. IV. VULNERARIA. DC. l. c.

Calyces post anthesin inflato-vesicarii, legum. 1-locul. 1-2-sperma. — Frutices aut herbæ perennes, foliis impari-pinnatis.

5. A. BARBA-JOVIS (L. sp. 1013.) fruticosa, foliis pinnatis ramulisque sericeo-tomentosis, foliolis 9-13 oblongo-linearibus æqualibus, bracteis capitula globosa multiflora æquantibus. ♂ in rupibus maritimis Corsicæ, Niceæ, Galloprovinciæ orientalis. — Fl. fr. 4. p. 517. — Barr. ic. t. 378. Flores pallidè flavi. (v. v. D.)

6. A. MONTANA (L. sp. 1012.) herbacea cespitoso-ascendens, foliis pinnatis ramisque villosis, foliolis 15-19 ovali-oblongis, capitulis solitariis longè pedunculatis. ♀ in montibus præsertim provinc. australium. — Fl. fr. 4. p. 516. — Barr. ic. t. 722. Flores purpurascentes. (v. v.)

7. A. VULNERARIA (L. sp. 1012.) herbacea erectiuscula, foliis pinnatis, foliolis 5-13 inæqualibus infimis minoribus, terminalibus multò majoribus, capitalis subduplicatis. ♀ in pratis et pascais frequens. — Fl. fr. 4. p. 516.


α. *vulgaris*, floribus flavis, foliis caulibusque parcè villosis aut subglabratris. — Lam. ill. t. 615. f. 1. (v. v.)


β. *rubriflora* (DC.) floribus coccineis rubrisve, foliis caulibusque parcè villosis aut subglabris. — In montosis. — Dill. elth. t. 320. f. 413. (v. v.)

γ. *hirsutissima* (DC.) floribus coccineis rubrisve, foliis caulibus capitulisque hirsutissimis. — In Corsicâ et Pyrenæis. (v. v.)

Sect. V. CORNICINA. DC. l. c. p. 170.

Calyces inflati, legamina glabra intùs septulis transversis semina sejungen-tibus 2-aut multilocularia. — Herbæ annuæ.





8. *A. TETRAPHYLLA* (L. sp. 1012.) herbacea procumbens, foliis pinnatis, foliolio terminali ovato maximo, cæteris 3 minimis acutis, capitulis axillaribns sessilibus paucifloris, legumine recto 2-spermo 2-locul. intrà calycem inclusa. (I) in agris et cultis apricis Galliæ australis. — Fl. fr. 4. p. 515. — Barr. ic. t. 554. (v. s.)

Subtribus II. *TRIFOLIEÆ*. Bronn. diss. DC. prod. 2. p. 171.

Legumen 1-loculare. Stamina diadelpha. Caules herbacei rariū frutescentes. Folia særissimè palmata 3-5-foliolata, rarissimè impari-pinnata.

IX. *MEDICAGO*. L. gen. n. 1214. Ser. in DC. prod. 2. p. 171.

Calyx subcylindricus 5-fidus; carina à vexillo subremota; stamna diadelpha; legumen polyspermum semper falcatum vel in spiram contortum.

Sect. I. *HYMENOCARPOS*. Ser. l. c.

Legumina submembranacea compressa arenata; folia 3-5-foliolata.

1. *M. CIRCINATA* (L. sp. 1096.) foliis pinnatis 5-foliolatis foliolis integris ovatis terminali maximo oblongo, pedunculis 2-4-floris subcorymbosis, leguminibus reniformibus pilosis, margine dentato non alato. (I) in maritimis Niceæ, Galloprov., Corsicæ. — Fl. fr. 4. p. 548. — Barr. ic. t. 576. (v. s.)
2. *M. RADIATA* (L. sp. 1096.) foliis 3-foliolatis, foliolis obovatis argutè denticulatis, stipulis dentatis, pedicellis 1-floris, leguminibus latis compressis reniformibus margine lato alato dentato, alà reticulato-venosâ. (I) circa Niceam ex All., Narbonam ex Benth. — Moris. hist. s. 2. t. 15. n. 3. (v. s. c.)

Sect. II. *LUPULARIA*. Ser. l. c.

Legumina reniformia, falcata vel subcochleata, margine integro. — Folia 3-foliolata.

3. *M. LUPULINA* (L. sp. 1097.) caule procumbente, foliolis obovato-cuneatis apice denticulatis, stipulis lanceolatis acutis integrisculis, pedunculis racemoso-spicatis, floribus sessilibus, leguminibus reniformibus 1-spermis arcuato-reticulatis, seminibus ovato-subreniformibus. (2) in arvis. — Fl. fr. 4. p. 541. Melilotus Wildenowii Mer. par. t. 2. p. 411. — Fuchs. hist. 819. ic. Variat caule foliisque plus minusve pilosis. (v. v.)
4. *M. FALCATA* (L. sp. 1096.) caulis prostratis, foliolis oblongis apice dentatis, stipulis integrerrimis, pedunculis racemosis, leguminibus falcato-cochleatis glabriusculis, seminibus oblongis, radiculâ vix prominulâ. ♀ in pratis siccis montanis. — Fl. fr. 4. p. 540. eng. bot. t. 1016. (v. v.)
5. *M. SUFFRUTICOSA* (Ram. in DC. fl. fr. 4. p. 541.) caulis prostratis suffruticosis, foliolis obovato-rotundis subintegris vel obcordatis, stipulis lanceolatis lati dentatis, pedunculis racemosis petiolo duplò longioribus, leguminibus pubescentibus subspiralibus arcuato-reticulatis, seminibus irregulariter cordatis, radiculâ prominulâ. ♀ in Pyrenæis et montosis agri Ruscinonensis. (cl. Arnott.) (v. v. DC.)

β. *Benthamii*, caulis foliolis pedunculisque pubescentibus, leguminibus villosis subreticulatis cochleato-contortis. — In Pyrenæis orientalibus editionibusque ex cl. Bentham cat. 100.

6. *M. LEIOPCARPA* (Benth. l. c.) glaberrima, caulis prostratis suffruticosis, foliolis obovato-rotundis subintegris obcordatisve, stipulis lati integris vel subdentatis, pedunculis racemosis petiolo duplò longioribus, leguminibus cochleato-contortis, cyclis 2-5 arcuato-reticulatis, seminibus subreniformibus. ♀ in collibus aridis Galliæ Narbonensis detexit cl. Bentham. (v. s.)
7. *M. SATIVA* (L. sp. 1096.) caule erecto glabro, foliolis obovato-oblongis dentatis mucronatis, stipulis lanceolatis subdentatis, pedunculis racemosis, leguminibus lævibus cochleato-contortis tenuissime reticulatis, seminibus


irregularibus ovatis cordatis. 2^e colitur in pratis et inde nunc ferè in omni Galliâ spontanea. — Fl. fr. 4. p. 539. — Lob. ic. 2. p. 36. f. 2. (v. v.)


Sect. III. SPIROCARPOS. Ser. 2. c.

Legumina cochleato-orbiculata, margine integro rugoso vel spinoso. Folia 3-foliolata.

* Leguminibus inermibus.

3. M. OBSCURA (Retz. obs. fasc. 1. p. 24. t. 1.) caule decumbente, foliolis rhomboeo-obovatis denticulatis, nervis numerosis prominentibus, stipulis lanceolatis profundè dentatis, pedunculis multifloris, leguminibus reniformibus vel orbiculariter cochleatis integrerrimis glabris venosis 2-spermis, venis marginem versus anastomosantibus, seminibus reniformibus. (I) in Galliâ australi ex cl. Loiseleur. — Fl. fr. 4. p. 566. (v. s. ex Italiâ.)
9. M. SOLEIROLI (Duby mss.) caule decumbente angulato piloso, foliis trifoliolatis, foliolis latè rhomboeo - obovatis denticulatis subtus pubescens, nervosis, stipulis dentato-pinnatifidis laciniis setiformibus, pedunculis racemosis multifloris, floribus magnis, laciniis calycinis villosis setaceis, leguminibus congestis inermibus cochleatis plano-convexis longitudinaliter reticulatis. (I) in Corsicâ, propè Calvi (cl. Soleiroli.). (v. s. D.)
10. M. ORBICULARIS (All. ped. n. 1150.) caulinibus diffusis, foliolis obcordatis apice dentatis, stipulis laciniatis, laciniis angustissimis divergentibus, pedunculis 1-2-floris, leguminibus cochleatis compressis glabris reticulato-venosis polyspermis, seminibus subtriangularibus. (I) in Galliâ australi et circâ Parisios. — Fl. fr. 4. p. 542. — Moris. hist. s. 2. t. 15. n. 2. (v. v.)
11. M. SCUTELLATA (All. ped. n. 1155.) pilosa, caulinibus diffusis, foliolis obvatis ambitu dentatis, stipulis lanceolatis dentatis, pedunculis 1-2-floris, leguminibus cochleatis polyspermis supra convexo-hemisphæricis subtus planis venoso-reticulatis, venis margine tenui anastomosantibus, semiibus maximis reniformibus. (I) in arvis et messibus Niceæ, Galloprov., Delphinatûs ex Vill., Monspelii, Meloduni ex Merat. — Fl. fr. 4. p. 543. — Moris. hist. s. 2. t. 15. n. 3. (v. v.)
12. M. RUGOSA (Lam. dict. 3. p. 632.) caulinibus procumbentibus, foliolis rhomboeo-obovatis versus apicem denticulatis, stipulis lanceolatis dentatis, pedunculis 2-4-floris, leguminibus 2-3-cyclis reticulato-venosis, seminibus reniformibus compressis apice subtruncatis. (I) in Galliâ meridionali ex cl. Loiseleur. — Fl. fr. 5. p. 566. — Moris. hist. 2. s. 2. t. 15. n. 4. (v. s. c.)
13. M. TORNATA (W. sp. 3. p. 1409.) caulinibus diffusis, foliolis obovatis dentatis, stipulis ciliato-dentatis, pedunculis multifloris, leguminibus cochleato-cylindricis utrinquè truncatis glabris lèvissimis, cyclis subconcretis, seminibus reniformibus apice truncatis. (I) in arvis Galloprovinciæ ex Ger., circâ Bayonam ex Lois. — Fl. fr. 4. p. 543. (v. s. c.)
14. M. RETICULATA (Benth. cat. 101.) subglabra, stipulis laciniatis, legum. adpressè cochleatis 4-6-cyclis cylindricis utrinquè planis reticulatis, margine crasso bisulcato tuberoso. (I) in segetibus demissorum Corbariensium propè Cascastel detexit cl. Benth.
15. M. TURBINATA (W. sp. 3. p. 1409.) caulinibus diffusis, foliolis rhomboeo-obovatis stipulisque dentatis, pedunculis subbifloris, leguminibus cochleato-ovatis utrinquè convexis, margine crassissimo subconcreto, seminibus reniformibus apice truncatis. (I) in messibus prov. austral. Niceæ, Galloprovinciæ ex Ger., Occitanie ex Gouan. — Fl. fr. 4. p. 544. — Moris. hist. 2. s. 2. t. 15. n. 5. (v. s.)
16. M. TUBERCULATA (W. sp. 3. p. 1410.) caulinibus procumbentibus, foliolis rhomboeo-obovatis dentatis, stipulis lanceolatis dentatis, pedunculis 1-2-floris, leguminibus cochleato-ovatis, margine crassissimo subconcreto tuberculatis dupli serie dispositis ætate leprosis, seminibus reniformibus apice truncatis. (I) in provinciis australibus ex cl. Desf. — Fl. fr. 4. p. 544. J. Banh. hist. 2. p. 385. f. 1. — Moris. hist. s. 2. t. 15. n. 6. (v. s. c.)





17. *M. STRIATA* (Bast. journ. bot. 1814. 3. p. 19.) caulinibus procumbentibus, foliolis obovatis denticulatis, stipulis lanceolatis dentatis, pedunculis 5-6-floris leguminibus 3-5-cyclis cochleato-cylindricis, margine crassiusculo superne punctis distantibus submamillaribus subtus lineolis notato, seminibus reniformibus apice truncatis parvis. (I) in arenosis maritimis Pictaviæ. — Fl. fr. 5. p. 567. Hanc cum *M. littoralis* conjungit cl. Benth. (v. s.)

* * *Leguminibus spinosis.*

18. *M. APICULATA* (W. sp. 3. p. 1414.) caulinibus prostratis, foliolis obovatis apice vix denticulatis, stipulis ciliato-dentatis, pedunculis 3-7-floris, leguminibus cochleatis utrinquè planis 3-cyclis reticulato-sublacunosis margine muricatis glabris, spinis divergentibus rectis, seminibus oblongo-reniformibus. (I) in pratis et messibus Galliæ occidentalis australisque. — Fl. fr. 4. p. 548. (v. v.)

19. *M. DENTICULATA* (W. sp. 3. p. 1414.) caulinibus prostratis, foliolis obovatis obcordatisve denticulatis, stipulis ciliato-dentatis, leguminibus utrinquè planis 2-cyclis reticulatis margine aculeatis glabris, aculeis divergentibus hamatis, seminibus oblongo-reniformibus apice subtruncatis. (I) circa Niceam, Monspelium, Aginnum, Burdigalam (Des Moulins). — Fl. fr. 4. p. 548. An species distincta? (v. v.)

β. ciliaris (Ser.) aculeis elongatis. In prov. mediterraneis. (v. v.)

20. *M. PUBESCENTS* (DC. cat. monsp. p. 124.) molliter villosa, caulinibus prostratis elongatis, foliolis latis obovatis denticulatis, stipulis lanceolatis acuminatis denticulatis, pedunculis 2-8-floris, leguminibus cochleatis 2-4-cyclis, glabris infra marginem aculeatis, aculeis crassis convergentibus adpressis margine longioribus rectis, sem. apice subtruncatis. (I) circa Niceam, Monspelium, et in agro Andegaviensi. — Fl. fr. 5. p. 570. — J. Bauh. hist. 2. p. 385. ic? excl. spec. inf. *M. spinulosa*. Fl. fr. 5. p. 569. Ser. in DC. prod. 2. p. 176. Hanc *M. tuberculatae* refert cl. Bentham. (v. v. DC.)

21. *M. TEREBELLUM* (W. sp. 3. p. 1416.) caulinibus prostratis, foliolis obovatis retusis dentatis, stipulis ciliato-dentatis, pedunculis multifloris, leguminibus cochleato-cylindricis utrinquè planis, cyclis 5 reticulatis glabris, aculeis brevissimis distichis subulatis patentissimis, seminibus reniformibus. (I) in Corsiciæ? et provinciis australibus. — Fl. fr. 4. p. 549. Var. *M. pentacyclæ* ex Benth. (v. s.)

22. *M. MARINA* (L. sp. 1097.) densissime tomentosa, caulinibus erectis, foliolis cuneiformibus integerrimis, stipulis lanceolatis integris, pedunculis multifloris, leguminibus cochleatis nervosis subspinosis, seminibus reniformibus. ? in arenosis secùs mare Mediterraneum, secùs Oceanum rariùs. — Fl. fr. 4. p. 546. — Clus. hist. 2. p. 243. f. 2. (v. v.)

23. *M. CORONATA* (Lam. dict. 3. p. 636. non Gærtn.) villosa, caulinibus prostratis, foliolis obovato vel obcordato-subrotundis parvis denticulatis, stipulis lanceolatis integris, pedunculis 4-7-floris folio multò longioribus, leguminibus cochleatis 1-2-cyclis villosis reticulatis, aculeis divaricatis rectis coronæformibus, seminibus reniformi-lunulatis parvis. (I) in Galloprovinciâ, Occitanîâ. — Fl. fr. 4. p. 549. — Moris. hist. s. 2. t. 15. n. 16. (v. s.)

24. *M. LITTORALIS* (Rohde in Lois not. 118.) villosa; caulinibus procumbentibus, foliolis obcordatis vel obovato-cuneiformibus apice dentatis, stipulis lanceolatis dentatis, pedunculis 2-4-floris, leguminibus cochleatis subcylindricis glabris tetracyclis reticulatis margine aculeatis, cyclis crassis coriaceis, aculeis rigidis subhamosis, seminibus reniformibus. ? in arenosis maritimis Niceæ, Galloprovinciæ, Occitanie. — Fl. fr. 5. p. 568. — J. Bauh. hist. 2. p. 385. ic? (v. v.)

β. breviseta (DC.) aculeis brevibus rectis. (v. v.)

25. *M. LAPPAEA* (Lam. dict. 3. p. 637.) glabriuscula, caulinibus procumbentibus foliolis obcordatis dentatis, stipulis ciliato-dentatis, pedunculis 3-5-floris, leguminibus cochleatis glabris 3-cyclis nervosis margine aculeatis, aculeis longis hamosis, seminibus reniformibus subtruncatis. (I) in Corsiciæ, circa

- Monspelium* et Beziers. — Fl. fr. 5. p. 569. Var. *M. denticulatae* ex cl. Benth. (v. s.)
26. *M. PENTACYCLIA* (DC. cat. monsp. p. 124.) pilosiuscula, caulis prostratis, foliolis obovatis denticulatis, stipulis ciliato-denticulatis, pedunculis multifloris, leguminibus cochleatis glabris utrinquè convexis, cyclis 5 supernè reticulatis, spinis longis subdivergentibus apice uncinatis, seminibus ovato-subreniformibus compressis. (I) circà Narbonam, Perpignanum, ipse in insulis Stæchadum legi. — Fl. fr. 5. p. 569. An spec. satis distincta? (v. v.)
27. *M. DISCIIFORMIS* (DC. cat. monsp. p. 124.) pilosa, caulis procumbentibus, foliolis obcordatis dentatis, pedunculis 3-4-floris, leguminibus cochleatis glabris, cyclis 5 approximatis infrà venosis, supernè planis, 4 inferioribus margine spinulas longas setaceas apice uncinatas gerentibus, quino abortu nudo enervio, semiuibis subreniformibus. (I) in sterilibus Monspeili, et Olette Pyre. orient. (Ph. Thomas.) — Fl. fr. 5. p. 567. (v. v. DC.)
28. *M. TRIBULOÏDES* (Lam. dict. 3. p. 635.) pilosa, caulis prostratis, foliolis obovatis dentatis, stipulis profundè dentatis, pedunculis 2-floris, leguminibus cochleatis cylindricis utrinquè planis 5-cyclis rugosis, spinis lateraliibus non marginalibus crassis divergentibus apice subuncinatis, margine crassiusculo elevato non canaliculato, semiuibis reniformibus apice truncatis. (I) in Galloprovinciâ propè Arelatem. — Fl. fr. 5. p. 568. (v. s.)
- β. *Narbonensis* (DC.) spinis adpressis brevibus, cyclisque turgioribus, leguminibus tumido-verrucosis. Circà Carcassonam et Narbonam. (v. v. DC.)
29. *M. PAECOX* (DC. cat. monsp. p. 123.) caulis prostratis, foliolis obcordatis denticulatis, stipulis ciliato-dentatis, pedunculis 1-2-floris brevibus, leguminibus cochleatis glabris utrinquè planis, cyclis tenuibus, margine crasso lateraliter spinoso, spinis subdivergentibus apice subuncinatis, semiuibis ovato-reniformibus. (I) in sterilibus Corsicæ reperiit Ph. Thomas, Niceæ Stire, circà Forum-Julium cl. Balbis, *Monspelium* cl. Beuth. — Fl. fr. 5. p. 570. (v. s.)
30. *M. MINIMA* (Lam. dict. 3. p. 636.) pilosa, caulis prostratis, foliolis obovatis vel obcordatis integris apice 3-dentatis, pedunculis 1-3-floris brevibus, leguminibus cochleatis villosulis globosis, cyclis 3-5 angustissimis planiusculis, spinis compressis uncinatis basi canaliculatis, semiuibis reniformibus. (I) in campestribus. — Fl. fr. 4. p. 545. — Moris. hist. 5. 2. t. 15. n. 15. (v. v.)
- β. *canescens* (Ser.) caulis foliis calycibus leguminibusque canescens-tibus, spinis longiusculis. — In aridis.
- γ. *longiseta* (DC.) spinis longissimis, caule elongato, pedunculis multifloris elongatis. — In provinciis australibus. (v. v.)
31. *M. MACULATA* (W. sp. 3. p. 1412.) caulis prostratis, foliolis obcordatis obovatisve dentatis maculatis, stipulis dentatis, pedunculis 3-5-floris, leguminibus cochleatis utrinquè compressis albidis, cyclis 3-5 circulariter nervulosis subquadrifariam spinosis, spinis anastomosantibus reflexis, semiuibis reniformibus. (I) in sabulosis Galliæ occidentalis, mediæ et australis passim. — Fl. fr. 4. p. 548. — Moris s. 2. t. 15. n. 12. (v. v.)
32. *M. GERARDI* (W. sp. 3. p. 1415.) caulis prostratis, foliolis obovatis denticulatis, stipulis setaceo-dentatis, pedunculus subbifloris, leguminibus cochleatis villoso-tomentosis utrinquè planiusculis, cyclis 5 enerviis crassis, spinis apice uncinatis vix divergentibus, semiuibis reniformibus. (I) in provinciis australibus usque ad Aginnum. — *M. villosa* Fl. fr. 4. p. 545. — Moris. hist. 2. s. 2. t. 15. n. 18. (v. v.)
- β. *minor* (Ser.) leguminibus cylindricis, aculeis brevioribus.
33. *M. RIGIDULA* (Lam. dic. 3. p. 634.) caulis prostratis, foliolis obovatis apice denticulatis, stipulis basi dentatis, pedunculis 2-3-floris, leguminibus cylindraceis utrinquè applanatis dorso muricato-spinosis, spinis vix diver-



gentibus. (I) In Galliâ australi ex Lam. — DC. fl. fr. 4. p. 544. Cum priori conjungit cl. Benth. (v. s. c.)

34. M. MURICATA (All. ped. n. 1158.) villosissima, caulinis prostratis, foliolis rhombeo ovatis dentatis, stipulis ciliato-dentatis, pedunculis 1-3-floris, leguminibus cochleato-ovatis glabris, cyclis 5 crassis subnervosis, spinis rigidis conicis arcuatis, seminibus irregulariter reniformibus. (I) in pratis Monspelii, Niceæ, Galloprov. ex Ger., Delphin. ex Vill., Parisiorum ex Vaill., agri Mimataensis (Prost.) — Fl. fr. 4. p. 547. — Vaill. bot. par. t. 33. f. 7. (v. s.)
35. M. SPHÆROCARPOS (Bertol. ital. dec. 3. p. 60.) glabra, foliolis rhombeo-ovatis argutè serrulatis, stipulis laciniatis, pedunculis multifloris, leguminibus cochleato-globosis, cyclis arctissimè adpressis subconcretis, margine crasso longitudinaliter bisulcato, aculeis brevibus crassiusculis. (I) in Corsicâ (Ph. Thomas), circa Olbias ex Benth. — Moris. hist. s. 2. t. 15. v. 12? (v. s.)
36. M. LACINIATA (All. ped. n. 1159.) caule erecto, foliolis linearibus inciso-dentatis truncatis, stipulis ciliato-dentatis, pedunculis 1-bifloris, leguminibus cochleato-subglobosis spinosissimis, aculeis rectis subulatis uncinatis compresso-canaliculatis, margine crassiusculo planiusculo, seminibus oblongo-reniformibus. (I) circa Monspelium. — Fl. fr. 4. p. 547. — Breyn. cent. 81. t. 34. — Magn. Monsp. 270. ic. (v. v. c.)
37. M. INTERTEXTA (W. sp. 3. p. 1411.) caule procumbente, foliolis obovatis dentatis, stipulis ciliato-dentatis, pedunculis subbifloris, leguminibus pilosis cochleatis ovato-disciformibus reticulatis, aculeis rectis crassis rigidis acutis adpressis. (I) in provinciis australibus ex Lam. — Fl. fr. 4. p. 546. — Moris. hist. s. 2. t. 15. n. 8. (v. s. c.)
38. M. ECHINUS (DC. fl. fr. 4. p. 546.) caulinis prostratis, foliolis obovatis obcordatisve obsoletè dentatis, pedunculis 5-6-floris petiolis longioribus, leguminibus cochleato-ovalibus grossè reticulatis, spinis compressis divaricatis adpressis longissimis acutissimis, cyclis 6-7, seminibus reniformibus. (I) circa Niceam ex Allioni. — Moris. hist. s. 2. t. 15. n. 9. (v. s.)

X. TRIGONELLA. Lin. gen. n. 1213.

Calyx campanulatus 5-fidus; carina minima alae vexillumque subpatentes corollam 3-petalam mentientes; legumen oblongum compressum vel cylindricum acuminatum erectiusculum polyspermum.

Sect. I. GRAMMOCARPUS. Ser. in DC. prod. 2. p. 181.

Flores capitati umbellative; legumina ovata longitudinaliter nervosa longè rostrata.

1. T. UNGINATA (Ser. I. c.) caulinis ascendentibus, foliolis oblongo-ovatis denticulatis, stipulis lineari-setaceis, floribus dense spicatis, calycibus 2-labiatis, labio superiore 1-dentato brevi, inferiore 4-fido, leguminibus pilosis 1-spermis, rostro longo curvo, seminibus ovato-compressis punctulato-rugosis. (I) in Galliâ Burdigalensi circa Libourne ex Ser. I. c. — Melilotus uncinata Poir. supp. 3. p. 648. (v. s. ex Iberiâ.)

Sect. II. FENUMGRÆCUM. Tourn. inst. 1. t. 230.

Flores sessiles solitarii geminique, legumina elongata compressa longè rostrata longitudinaliter reticulata.

2. T. PROSTRATA (DC. fl. fr. 5. p. 571.) caulinis diffuso-procumbentibus, foliolis obovato-oblongis cuneiformibus argutè serratis, calycibus pilosis, dentibus subulatis longitudine tubi, leguminibus falcatis rostro longioribus 6-spermis, seminibus parvis ovato-subreniformibus punctato-rugosis. (I) in sterilibus Galloprovinciæ et Occitanie inferioris. — T. Fenum-Græcum f. fl. fr. 4. p. 551. — J. Bauh. hist. 2. p. 365. f. 2. (v. v. DC.)
3. T. FENUM-GRÆCUM (L. sp. 1402.) caule erecto simplici, foliolis obovatis obsoletè dentatis, stipulis lanceolato-falcatis integris, calycibus pilosis, dentibus subulatis longitudine tubi, leguminibus falcatis rostro duplò longiori-

bus polyspermis, seminibus magnis ovalis punctato-rugosis. (1) *circà Mons-pelium spontanea, in Alsatiâ culta.* — Fl. fr. 4. p. 551 et 5. p. 571. Gærtn. fruct. t. 152. f. 3. (v. s.)

Sect. III. BUCERAS. Ser. 1. c.

Flores racemoso-umbellati, legumina cylindraceo-compressa subarcuata reticulata mucronata.

4. T. MONSPELIACA (L. sp. 1095.) pilosa, caulis prostratis, foliolis obovato-cuneatis serrulatis, stipulis linearis-subulatis, umbellis sessilibus, lacinis calycinis subulatis longitudine tubi, leguminibus subsenis sessilibus congestis arcuatis divaricatis, seminibus oblongis. (1) *in provinciis australibus et circà Parisios.* — Fl. fr. 4. p. 552. — J. Bauh. hist. 2. p. 273. f. 1. (v. v.)
5. T. POLYGERATA (L. sp. 1093.) caulis diffusis, foliolis cuneiformibus apice dentatis, stipulis lanceolatis basi subdentatis, umbellis sessilibus, leguminibus subsessilibus subquaternis erectis subrectis longis linearibus, seminibus oblongis subtruncatis (1) *in aridis et incultis Niceæ ex All., Galloprov. ex Ger., Occitania.* — Fl. fr. 4. p. 552. (v. s. c.)

Sect. IV. FALCATULA. Brot. phyt. 160.

Flores umbellati pedunculati, legumina compressa falcata reticulata mucronata.

6. T. HYBRIDA (Pourr. act. toul. 3. p. 33.) caulis ascendentibus, foliolis obovato-cuneatis integris glabris, stipulis inæqualiter lanceolatis denticulatis, floribus racemosis 2-5, leguminibus pedicellatis glabris, seminibus irreguliter cordatis. ♀ *in montibus Corbariensibus, et propè Bayonam ex Lois.* — Fl. fr. 4. p. 350. ic. rar. t. 29. (v. s.)
7. T. ORNITHOPODIOIDES (DC. fl. fr. 4. p. 550.) caulis prostratis, foliolis obcordatis denticulatis, stipulis lanceolatis integris submembranaceis acutissimis, floribus subumbellatis 2-4, leguminibus subfalcatis calyce duplò longioribus. (1) *in herbosis sterilibus Andegaviæ, Monspelii, Pyren. ex Benth.* — Pluck. t. 68. f. 1. (v. s.)
8. T. CORNICULATA (L. sp. 1094.) caule erecto, foliolis ovatis apice dentatis, stipulis lanceolatis integris, floribus racemosis, leguminibus declinatis subfalcatis, seminibus inæqualiter cordatis. (1) *in Delphin. australi ex Vill., Galloprovinciâ ex Tourn., Niceæ ex All.* — Fl. fr. 4. p. 550. — J. Bauh. hist. 2. p. 372. f. 2? (v. v. c.)

XI. MELLOTUS. Tourn. inst. 406. t. 229.


Calyx tubulosus 5-dentatus; carina simplex, alæ vexillo breviores, legumen calyce longius, coriaceum mono-aut oligospermum vix dehiscens. — *Folia pinnatim 3-foliolata.*

Sect. I. CÆLORUTIS. Ser. in DC. prod. 2. p. 186.

Legumina lacunoso-rugosa.

1. M. KOCHIANA (Wild. enum. 790.) caule ascendentem, foliolis linearis-oblongis denticulatis, stipulis dentatis, dentibus calycinis tubum æquantibus, vexillo carinâ longiore, leguminibus 1-2-spermis ovatis acutis compressis longitudine styli, seminibus ovoideis subcompressis. (2) *in agro Monspeliensi et Pyrenæis orientalibus.* — Fl. fr. 5. p. 564. Flores flavi. (v. s.)
2. M. OFFICINALIS (Wild. enum. 790.) caule erecto ramoso, ramis patentissimis, foliolis lanceolato-oblongis obtusis remotè serratis, stipulis setaceis, dentibus calycinis inæqualibus longitudine tubi, vexillo aliquo carinam æquantibus, leguminibus 2-spermis obovatis pilosiusculis demum nigricantibus subgibbosis longitudine styli, seminibus inæqualiter cordatis. (1) *in campestribus.* — Fl. fr. 4. p. 537. Oed. fl. dan. t. 934. (v. v.)
3. M. LEUCANTHA (Koch. ex DC. fl. fr. 5. p. 554.) caule erecto ramoso, foliis ovato-oblongis apice truncatis mucronulatisqne remotè serratis, stipulis setaceis, dentibus calycinis inæqualibus longitudine tubi, vexillo carinâ aliquo longiore, leguminibus 1-spermis ovatis viridibus, seminibus exacte





- ovatis. (2) in agris. — *Trifolium officinale*. L. sp. 1078. Sturm. dents. 1. fasc. 15. f. k. Flores albi. (v. v.)
4. *M. PARVIFLORA* (Desf. atl. 2. p. 192.) caule ascendentē, foliolis inferioribus obovato - subrotundis integris, superioribus oblongis obsoletē dentatis, stipulis linearī-setaceis, floribus minutissimis densē spicatis, dentibus calycinis subæqualibus latis, alis carinæ vexilloque subæqualibus, leguminibus ovatis 1-spermis, seminibus ovoïdeis legumini adhærentibus. (1) in pratis siccis collibusque apricis Galloprov., Occit., agri Ruscinonensis et Santoniæ (Des Moulins). — Fl. fr. 4. p. 538. Flores flavi. (v. s.)
5. *M. ITALICA* (Lam. dict. 4. p. 65.) caule ramisque ascendentibus crassis, foliolis obovato-subrotundis obsoletē denticulatis, stipulis lanceolatis acutis basi sublaciniatis, dentibus calycinis inæqualibus vix longitudine tubi, alis carinæ aequalibus vexillo brevioribus, leguminibus globosis 1-2-spermis, seminibus orbiculato-compressis. (1) in Corsicā reperit Ph. Thomas. Fl. flavi. Variat foliolis subintegris. (v. s.)
6. *M. GRACILIS* (DC. fl. fr. 5. p. 565.) caule ramisque ascendentibus gracilibus, foliolis obovatis angustis apice denticulatis, stipulis subsetaceis, dentibus calycinis subæqualibus tubo vix brevioribus, alis carinæ vexilloque æquabilis, leguminibus globosis 2-spermis, seminibus orbiculato-compressis. (1) in arenosis Corsicæ, Niceæ, Fori-Julii, Nemansi, Perpignani. — Flores flavi. (v. s.)

Sect. II. CAMPYLORUTIS. Ser. l. c.

Legumina arcuatim densè venosa.

7. *M. MESSANENSIS* (Desf. atl. 2. p. 192.) caule erecto, foliolis obovato-cuneatis denticulatis, stipulis basi latis dentatis apice linearibus, racemis paucifloris, dentibus calycinis subæqualibus tubo vix brevioribus, leguminibus inæqualiter lanceolatis acutis 1-spermis, seminibus ovato-compressis magnis. (1) in agris circà Telonem ex cl. Loisel. — Fl. fr. 4. p. 539. — Moris. s. 2. t. 16. n. 9. Flores lutei. (v. s. ex Pedem.)
8. *M. SULCATA* (Desf. atl. 2. p. 193.) caule erecto, foliolis obovatis obsoletē dentatis, stipulis linearī-subulatis basi dilatatis integris dentatis, dentibus calycinis latiusculis tubo brevioribus, leguminibus obovato - subglobosis arcuatis 2-spermis, seminibus suborbiculatis. (1) circà Niceam, Monspelium, Burdigalam ex Des Moulins. — Fl. fr. 4. p. 538. — J. Bauh. 2. p. 371. f. 1. Fl. flavi. (v. s.)

XII. TRIFOLIUM. *Tourn. inst. 404. t. 228. Ser. in DC. prod. 2. p. 189.*

Calyx tubulosus persistens, 5-fidus; carina alis et vexillo brevior; stamina diadelpha; legumen parvum vix dehiscens saepius ovatum 1-2-spermum calyce brevius, rarius oblongum 3-4-spermum calycem paululum superans. — Folia palmatim 3-foliolata.

Sect. I. LAGOPUS. Ser. l. c.

Flores spicati; spicæ oblongæ basi ebracteatae, calyx post anthesin non inflatus villosus.

1. *T. ANGUSTIFOLIUM* (L. sp. 1083.) caule erecto, foliolis linearī-lanceolatis acutissimis ciliatis, stipulis longissimis angustis apice subulatis, spicis solitariis terminalibus conico-oblongis, calycibus costatis, laciniis setaceis apice spinescentibus corollam gamopetalam vix superantibus, laciniâ infimâ longiore. (1) in arvis Galliae mediterraneæ et austro-occidentalis. — Fl. fr. 4. p. 529. J. Bauh. 2. p. 376. f. 3. (v. v.)
2. *T. PURPUREUM* (Lois. gall. t. 14.) caule erecto, foliolis linearī-lanceolatis acutis integerim ciliatis, stipulis angustis apice subsetaceis, spicis ovato-oblongis terminalibus solitariis, calycibus costatis, laciniis setaceis corollâ


- multò brevioribus, laciñiā infimā longiore. (I) circà Monspelium. — Fl. fr. 5. p. 557. (v. s.)
3. *T. RUBENS* (L. sp. 1081.) caule erecto stricto, foliolis oblongis obtusissimis glaberrimis valdè denticulatis, stipulis longissimis latissimisque apice lanceolatis, spicis terminalibus subgeminis, calycibus valdè striatis, laciñiis setaceis brevissimis, infimā corollam gamopetalam vix æquante. (I) in pratis et ad margines sylvarum montium. — Fl. fr. 4. p. 525. — J. Bauh. 2. p. 375. f. 1. (v. v.)
4. *T. INCARNATUM* (L. sp. 1033.) caule erecto, foliolis subrotundo-obcordatis crenatis villosis, stipulis latis brevissimis apice obtuso sphacelato, spicis terminalibus solitariis longè pedunculatis, calycibus costatis pilosissimis, laciñiis lanceolato-setaceis æqualibus substellatis corollam gamopetalam æquantibus. (I) in pratis subhumidis Galliæ australis et occidentalis, sæpè cultum. — Fl. fr. 4. p. 528. — Mill. ic. t. 267. f. 1. (v. v. c.)
- β. Molinerii* (DC.) floribus albido-carneis, stipulis vix sphacelatis. *T. Molinerii* Balb. — In Corsicâ et circà Nicæam sæpè cum var. α colitur.
5. *T. LAGOPUS* (Pourr. ex W. sp. 3. p. 1365.) hirsutissimum, caule ramosissimo, foliolis obovato-cuneatis denticulatis, stipulis lanceolatis latissimis brevibus nervosis, spicis terminalibus oblongis solitariis sessilibus, calycibus costatis pilosissimis, laciñiis setaceis æqualibus corollâ brevioribus. (I) circà Prades in agro Ruscinoneensi reperiit Ph. Thomas. (v. s.)
6. *T. ARVENSE* (L. sp. 1083.) caule erecto, foliolis spathulatis linearibus apice subtridentatis, stipulis angustis membranaceis longissimè subulatis pilosis, spicis oblongis villosissimis mollibus, calycibus pilosissimis, laciñiis æqualibus corollâ polypetalâ longioribus. (I) in arvis frequens. — Fl. fr. 4. p. 530. — Fuchs. hist. 494. ic. (v. v.)
- β. gracile* (DC.) caule foliisque glabriusculis, laciñiis calycinis apice villosis coloratis. *T. gracile* ThUIL. — Barr. ic. 901. (v. v.)
- γ. capitatum* (Ser.) capitulis globosis sessilibus. — Barr. ic. t. 902.
7. *T. LIGUSTICUM* (Balb. in act. acad. ital. 1. p. 192. f. 2.) caule ramoso diffuso, foliolis obovatis obcordatisve latis apice subdenticulatis, stipulis latinsculis lanceolatis nervosis parvis acuminatis, spicis oblongis geminis divaricatis pedunculatis pilosis, laciñiis calycinis subulatis æqualibus tubo duplò longioribus corollamque superantibus. (I) in Corsicâ, insulis Stæchadum, et agro Ruscinoneensi propè Bagnols ex cl. Benth. — Fl. fr. 5. p. 557. L. arrectisetum. Brot. phyt. t. 63. f. 1. (v. v.)
8. *T. LAPPACEUM* (L. sp. 1082.) caule ramoso diffuso, foliolis obovatis obcordatisve denticulatis, stipulis nervosis angustis longè subulatis, spicis subglobosis hispidis terminalibus subsolitariis, laciñiis calycinis æqualibus subulatis tubo duplò triplò longioribus et corollam æquantibus. (I) in provinciis anstralibus. — Fl. fr. 4. p. 725. — Barr. ic. 871. (v. v. DC.)

Sect. II. PHLEASTRUM. Ser. I. c.

Flores capitati; capitula ovato-conica; calyx post anthesin non inflatus.

9. *T. BOCCONI* (Savi obs. trif. p. 37. n. 14.) caule erecto subramoso, foliolis oblongo-ovatis apice denticulatis, stipulis longissimè angustissimæque subulatis, capitulis ovatis densifloris geminis sessilibus terminalibus basi bracteatis, laciñiis calycinis subæqualibus angustis corollam æquantibus. (I) in rupestribus Corsicæ, Occitanie, agri Ruscinon., Andegavie. — Fl. fr. 5. p. 560 et *T. collinum* fl. fr. 5. p. 560. *T. gemellum* Lapeyr. abr. *T. semi-glabrum* Brot. phyt. t. 63. f. 2. (v. s.)
10. *T. STRIATUM* (L. sp. 1085.) caule ramoso, foliolis obovato-oblongis apice denticulatis, stipulis membranaceis latis breviter apiculatis, capitulis ovato-conicis densis terminalibus lateralibusque solitariis sessilibus basi bracteatis, tubo calycis ventricoso, laciñiis parvis inæqualibus divaricatis aristatis corollâ brevioribus. (I) in rupestribus Galliæ occident., medie australisque





passim, circa Nancy (Monnier). — Fl. fr. 4. p. 532. — Vaill. bot. t. 33. f. 2. (v. v.)

11. *T. SCABRUM* (L. sp. 1084.) caule procumbente, foliolis obovatis denticulatis, stipulis parvis submembranaceis, capitulis ovatis sessilibus terminibus lateribusque, laciinis calycinis linearis-lanceolatis rigidis recurvis subtrinerviis inaequalibus corollam polypetalam vix aequalibus. (1) in siccis et arenosis provinc. occident., mediariis et australium passim. — Fl. fr. 4. p. 532. — Vaill. bot. t. 33. f. 1. (v. v.)

Sect. III. EUTRIPHYLLUM. Ser. l. c.

Flores capitati; capitula ovata sæpè bracteata; calyx non inflatus villosus.

12. *T. MARITIMUM* (Huds. ang. ed. 1. p. 284.) caule erecto patulo, foliolis oblongo-obovatis obtusis emarginatis subdenticulatis, stipulis angustis longè subulatis, capitulis ovato-globosis subsessilibus, laciinis calycinis tubo corollâque polypetalâ brevioribus rigidis inaequalibus, inferiore 3-nervi longiore, reliquis 1-nerviis. (1) in Gallia australi et occidentali. — *T. irregulare* Pourr. et Fl. fr. 4. p. 531. — Pluckn. t. 113. f. 4. (v. v. DC.)

$\beta.$ *Bastardianum* (Ser.) spicis pedunculatis, laciinis calycinis majoribus tenuiter nervosis. (v. s.)

13. *T. SUPINUM* (Savi trif. p. 46. f. 2.) caulibus patulis ramosis, foliolis obovatis latis ciliatis, stipulis angustis nervosis parvis subulatis, capitulis subovatis pedunculatis post anthesin ovoideis, laciinis calycinis inaequalibus linearibus rigidis patentibus corollâ brevioribus. (1) circa Nemausum, Monspelium. — Fl. fr. 5. p. 558. (v. s.)

14. *T. XATARDII* (DC. fl. fr. 5. p. 558.) caule erecto villoso ramoso, foliolis obovato-elongatis subciliatis, stipulis angustis nervosis, capitulis ovatis pedunculatis, calycibus striatis glandulosis pilosisque, laciinis vix inaequalibus corollâ minoribus. (1) in Pyreueis orient. (v. s.)

15. *T. CINCTUM* (DC. cat. monsp. p. 152.) caulibus erectis pilosis subramosis, foliolis ovali-oblongis villosis, stipulis latis nervosis duabus superioribus subpalmatis, capitulis ovatis pedunculatis, calycibus striatis, laciinis inaequalibus, inferiore maximâ corollâ minore. (1) circa Monspelium (Saltzmann). — Fl. fr. 5. p. 559. Fl. ochroleuci. (v. s.)

16. *T. OCHROLEUCUM* (L. syst. nat. 3. p. 233.) pilosum, caulibus ascendentibus gracilibus, foliis distantibus, foliolis ovato-ellipticis obtusis retusis ciliatis, superioribus angustioribus, stipulis angustis nervosis petiolo multò brevioribus, capitulis terminalibus ovato-oblongis subsessilibus, calycibus costatis glabriusculis, laciinis linearis-setaceis inaequalibus rigidiusculis semi-patentibus corollâ multò brevioribus, inferiore longissimâ. 2? in pratis siccis passim. — Fl. fr. 4. p. 428. — Fuchs. hist. 818. ic. (v. v.)


$\beta.$ *saxatile* (DC.) minus villosum, foliolis latis, inferioribus emarginatis. *T. ochroleucum humile* Ser. (v. v. DC.)

$\gamma.$ *dichotomum* (Ser.) caule supernè furcato, spicis geminis approximatis. (v. s.)

17. *T. BARBatum* (DC. cat. monsp. 152.) pilosissimum, caule subramoso crasso, foliolis lanceolatis acutis integris ciliatis, stipulis basi latis nervosis lanceolato-acuminatis petiolo longioribus, capitulis terminalibus pedunculatis ovato-oblongis crassis, calycibus hirsutis sublaevibus, laciinis setaceis, infimâ cæteris duplò longiore corollâ aequante. 2? circa Monspelium ex Saltzm. — Fl. fr. 5. p. 557. *T. pannonicum* $\beta.$ Ser. in DC. prod. 2. p. 194. (v. s.)

18. *T. SQUARROSUM* (L. sp. 1082.) caule ramoso, foliis supremis oppositis alternis subpilosis, foliolis lanceolatis ant ovalibus subretusis, stipulis angustis glabriusculis submembranaceis longè acuminatis, capitulis ovatis, calycibus costatis laciinis inaequalibus 3-nerviis ciliatis, inferiore corollâ longitudine de-

- flexâ. (I) in Corsicâ, circâ Parisios, in Galloprovinciâ ex Ger. — Fl. fr. 4. p. 531.
— Moris. hist. 2. s. 2. t. 13. n. 1. (v. s.)
19. T. ALPESTRE (L. sp. 1082.) caule erecto simplici, foliolis lanceolatis coriacis integris valdè nervosis, stipulis angustis subsessilibus apice longè linearie instructis, capitulo ovato, calycibus leviter multistriatis, laciñiis inæqualibus spinulosis, infimâ corollâ monopetalâ breviore, reliquis brevissimis dentiformibus. ♀ in montosis Delph., agri Ligericini (Prost.), Pyren. — Fl. fr. 4. p. 527. Jacq. obs. 3. t. 64. (v. v.)
20. T. MEDIUM (L. faun. suec. ed. 2. p. 558.) glabriuscum, caule flexuoso ramoso, foliolis oblongis coriacis ciliatis multinerviis, stipulis angustis apice linearie-lanceolatis, capitulis subglobosis subpedunculatis, laciñiis calycinis inæqualibus pilosiusculis, inferiore reliquis duplò longiore et corollâ monopetalâ breviore. ♀ in sylvis. — Fl. fr. 4. p. 526. eng. bot. t. 190. (v. v.)
21. T. PRATENSE (L. sp. 1082.) caulinibus ascendentibus, foliolis ovatis obtusis retusisve integris, stipulis latis nervosis glabris breviter acuminatis inflexis, capitulis ovatis obtusis subsessilibus, laciñiis calycinis subpilosis subæqualibus corollâ gamopetalâ duplò triplöve brevioribus. ♀ in Alpibus pratisque frequens. — Fuchs. 817. ic. Foliola sæpè maculâ centrali notata. (v. v.)
β. multifidum (Ser.) laciñiis calycinis 6-7 piloso-hispidis. In Corsicâ. (v. s.)
22. T. MICROPHYLLUM (Desv. journ. bot. 2. p. 316.) glabriuscum, caulinibus ascendentibus, foliolis ovatis obtusis retusisve denticulatis, superioribus mucronulatis, stipulis latiusculis nervosis breviter acuminatis inflexis, capitulis ovatis obtusis sessilibus, laciñiis calycinis pilosis inæqualibus corollâ gamopetalâ brevioribus. ♀ in nemoribus siccis Pictaviæ et Parisiorum. — Fl. fr. 5. p. 656. An T. pratensis var? (v. v.)
23. T. DIFFUSUM (Ehrh. beytr. 7. p. 165.) molliter villosum glaucum, caule diffuso, foliolis ovato-lanceolatis obtusis retusisve, stipulis angustis apice linearie-lanceolatis, capitulis ovatis subhispidis, laciñiis calycinis setaceis villosissimis rectis æqualibus corollâ gamopetalâ brevioribus, legumine circumcisso dispermo. (I) in arenosis circâ Parisios. — Wald. et Kit. hung. 1. t. 50. T. ciliatum Thuil. par. ed. 2. p. 380. Fl. fr. 4. p. 525. An sequentis var.? (v. v.)
24. T. HIRTUM (All. auct. p. 20.) caule erecto, foliolis obovato-cuneatis subintegris, stipulis infimis angustis longè acuminatis, superioribus brevibus latissimis, capitulis subglobosis hispidis, laciñiis calycinis longissimis corollam subæquantibus vix inæqualibus. (I) in Corsicâ, agro Monspeliensi et Ruscinoensi. — T. hispidum Desf. atl. 2. t. 209. f. 1. Fl. fr. 4. p. 524. (v. v. DC.)
β. pictum (Ser.) foliolis denticulatis rubro-maculatis. T. pictum Roth. (v. s.)
25. T. CHERLERI (L. amæn. 4. p. 286.) caule procumbente, foliolis obcordatis integrisculis, stipulis latis apice linearibus incurvis, capitulis globosis hispidis sessilibus, stipulis 2 bracteiformibus rotundatis, laciñiis calycinis hispidis corollâ longioribus. (I) in maritimis Corsicæ et Galliæ mediterraneæ. — Fl. fr. 4. p. 524. — Barr. ic. 859. (v. v.)
26. T. STELLATUM (L. sp. 1083.) villosum, caule diffuso, foliolis obcordato-cuneatis subtriangularibus margine superiore denticulato, stipulis obovatis latissimis serrulatis, capitulis globosis, laciñiis calycinis foliaceis-linearie-lanceolatis patentibus æqualibus longitudine corollæ, leguminibus 1-spermis. (I) in sterilibus, ad vias provinc. mediterr., circâ Dax ex Thore, Burdigalam ex Laterrade. — Fl. fr. 4. p. 530. — Barr. ic. p. 860. (v. v.)
27. T. LEUCANTHUM (Bieb. fl. taur. 2. p. 214.) caulinibus erectisculis villosis, foliolis obovato-oblongis apice subserratis, stipulis lanceolato-subulatis integrerimis, capitulis subglobosis pedunculatis, laciñiis calycinis patentibus subæqualibus corollâ brevioribus, leguminibus 1-spermis. (I) in Corsicâ reperiit Ph. Thomas. (v. s.)





28. *T. SAXATILE* (All. ped. t. 59. f. 3.) caule erectiusculo, foliis villosis, foliolis cuneatis apice emarginatis parvulis integris, stipulis ovatis mucronulatis nervosis, capitulis globoso-depressis sessilibus bracteatis, calycibus tomentositis, laciinis minimis aequalibus longitidine corollæ. (1) (2) in editioribus Alpibus Delphinatûs. — Fl. fr. 4. p. 523. (v. s.)

Sect. IV. TRIFOLIASTRUM. Ser. l. c.

Flores capitati sæpè post anthesin deflexi, capitula globosa, calyces non inflati.

29. *T. SUFFOCATUM* (L. mant. 276.) glabrum, caulinibus brevissimis procumbentibus, petiolis longis, foliolis obocordato-cuneiformibus denticulatis, stipulis scariosis subnervosis breviter acuminatis, capitulis axillaribus sessilibus subglobosis glabris approximatis, floribus densis sessilibus, calycis laciinis lanceolatis acutis subæqualibus patentibus corollâ multò longioribns, leguminibus 2-spermis. (1) in siccis Corsicæ, Niceæ, Telonis, Monspelii, Aginni ex St.-Am., Andegaviae ex Bast. — Fl. fr. 4. p. 522. Brot. phyt. t. 64. (v. v. DC.)
30. *T. GLOMERATUM* (L. sp. 1084.) glabrum, caule patulo, foliolis obovatis argutè dentatis, stipulis scariosis nervosis longè acuminatis, capitulis axillaribus sessilibus distantibus globosis, floribus densis sessilibus, laciinis calycinis dentiformibus ovatis brevibus acuminatis corollâ polypetalâ brevioribus, leguminibus dispermis. (1) in pratis siccis et petrosis Galliæ mediterraneæ et austro-occidentalis, propè Falaise (de Brébisson). — Fl. fr. 4. p. 522. — Barr. ic. 882. (v. v.)
31. *T. PARVIFLORUM* (Ehrh. beit. 7. p. 165.) caule diffuso, foliolis obovatis nervosis argutè serratis, stipulis scariosis angustè acuminatis, capitulis axillaribus pedunculatis sessilibusque globosis, floribus densis sessilibus, laciinis calycinis nervosis lanceolatis acutis inæqualibus, 2 superioribus corollâ longioribus, leguminibus dispermis. (1) in Pyrenæis orient. propè Saillagouze ex cl. Arnott. (v. s. ex Hispaniâ.)
32. *T. STRICTUM* (L. sp. 1079.) glabrum, foliolis inferioribus obovatis, superioribus oblongo-ellipticis serrulatis, stipulis subscariosis latissimis obtusisculis, capitulis axillaribus longè pedunculatis globosis, bracteis membranaceis sublanceolatis, floribus densis sessilibus, laciinis calycinis subulatis inæqualibus corollâ brevioribus, leguminibus subexsertis dispermis. (1) in pratis siccis Fontis-Bleaudi, Aginni ex St.-Am., Galloprov., Corsicæ. — Fl. fr. 4. p. 520. — Michel. gen. t. 25. f. 7. (v. s.)
33. *T. REPENS* (L. sp. 1080.) caulinibus repentibus subradicantibus diffusis basi ramosis, foliolis obovato-subrotundis subretusis denticulatis, stipulis scariosis angustis lanceolatis longè mucronatis, capitulis axillaribus longissimè pedunculatis, floribus pedicellatis post anthesin deflexis, laciinis calycinis inæqualibus dentiformibus corollâ brevioribus, leguminibus 4-spermis. 2^o in pratis. — Fl. fr. 4. p. 520. — J. Bauh. hist. 2. p. 380. f. 3. (v. v.)
34. *T. CESPITOSUM* (Reyn. mem. 1. p. 162.) glaberrimum, caulinibus cespitosis brevissimis, foliolis obovatis subretusis denticulatis, stipulis scariosis angustis lanceolatis acutissimis 1-nerviis, capitulis axillaribus longè pedunculatis, floribus subsessilibus post anthesin patentibus, laciinis calycinis subæqualibus lanceolatis corollâ brevioribus, leguminibus 3-4-spermis. 2^o in pratis Alpium et Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 521. T. Thalii Vil. dauph. 3. t. 41. (v. v.)
35. *T. ANGULATUM* (Wald. et Kit. hung. 1. t. 27.) glabriuscum, caule decumbente angulato, foliolis obovatis obocordatisse argutè serratis, stipulis scariosis angustis longè acutis, capitulis axillaribus pedunculatis, floribus pedicellatis post anthesin deflexis, laciinis calycinis angustis acutis corollâ brevioribus, leguminibus exsertis 4-spermis subarticulatis. (1) circa Mons-pelium. — Fl. fr. 5. p. 555. (v. s.)
36. *T. HYBRIDUM* (Savipis. 2. p. 90.) glabrum, caule ascendeute solidio, foliolis obocordato-cuneiformibus denticulatis, stipulis latis submembranaceis angus-

tissimis acentis, capitulis subumbellatis axillaribus paucifloris, floribus pedicellatis post anthesin deflexis, laciiniis calycinis inæqualibus tubo brevioribus latiusculis corollâ multò brevioribus, leguminibus exsertis 4-spermis. (I) in provinciis australibus. — Fl. fr. 5. p. 555. Michel. nov. gen. t. 25. f. 6. T. pallescens Schreb? T. intermedium Lapeyr. ab. 437. (v. s.)

37. T. MICHELIANUM (Savi. fl. pis. 2. p. 139.) caule ascendente fistuloso, foliolis obovatis obcordatisque serrulatis, stipulis foliaceis lanceolatis acutis, capitulis subumbellatis axillaribus, floribus longè pedicellatis post anthesin deflexis, laciiniis calycinis setaceis subpatentibus tubo duplò triplò longioribus et corollâ brevioribus, leguminibus exsertis 2-spermis. (I) in Corsicâ et Galliâ occident. — Fl. fr. 5. p. 554. — Mich. gen. t. 25. f. 2. et 5. — Vaill. bot. t. 22. f. 5. (v. s.)

38. T. ELEGANS (Savi pis. p. 161. t. 1. f. 2.) caule ascendentem solidum, foliolis obovatis denticulatis, stipulis foliaceis longè angustè acuminatis, capitulis globosis axillaribus, floribus breviter pedicellatis post anthesin deflexis, laciiniis calycinis subæqualibus triquetris tubo longioribus corollâ brevioribus, leguminibus dispermis. (I) in pratis Galliae mediæ, orientalis et occidentalis. — Fl. fr. 5. p. 554. Vaill. bot. par. t. 22. f. 1. Flores pallidè rubri. (v. s.)

39. T. MONTANUM (L. sp. 1087.) pubescens, caule erecto subsimplici, foliolis lanceolato-oblongis obtusis denticulatis valde nervosis, stipulis lanceolatis acutissimis, capitulis subglobosis axillaribus pedunculatis dein oblongis, floribus subsessilibus congestis patentibus dein deflexis, laciiniis calycinis inæqualibus angustis tubi longitudine et carinâ brevioribus, leguminibus monospermis. (I) in pratis montosis. — Fl. fr. 4. p. 529. — J. Bauh. 2. p. 380. f. 2. Fl. albi. (v. v.)

40. T. BALBISIANUM (Ser. in DC. prod. 2. p. 201.) villosum, caulis cespitosus simplicibus, foliolis ellipticis obtusis denticulatis valde nervosis, stipulis lanceolatis acutis, capitulis hemisphæricis terminalibus solitariis, pedunculus caule multò longioribus, laciiniis calyciis æqualibus patulis angustis tubo cylindrico multò longioribus et carinâ brevioribus. (I) in monte Lachen Galloprovinciæ ex Ser. — Flores purpurei.

Sect. v. VESICASTRUM. Ser. l. c. p. 202.

Flores capitati densi, calycis labium superius post anthesin accrescens inflatum.

41. T. SUBTERRANEUM (L. sp. 1080.) villosum, caulis procumbentibus, foliolis obcordatis denticulatis, stipulis lanceolatis latis acutis, capitulis paucifloris subglobosis post anthesin subterraneis, florum inferiorum fertilium calycibus inflatis, superiorum steriliū vacuis elongatis deflexis, leguminibus 1-spermis. (I) in graminosis, collibus et ad oras sylvarum Galliæ australis, occidentalis et circâ Parisios. — Fl. fr. 4. p. 522. — Barr. ic. t. 881. (v. v.)

42. T. VESICULOSUM (Savi pis. 2. p. 165.) caule erecto firmo striato, foliolis lanceolatis argutè serrulatis, stipulis angustis submembranaceis longè acuminatis, capitulis ovatis crassis longè pedunculatis, calycibus scariosis inflatis, laciiniis subulatis acutissimis æqualibus corollâ multò brevioribus, leguminibus 2-spermis. (I) in Corsicâ. — Fl. fr. 5. p. 561. Lois. gall. 2. t. 15. T. recurvum. Walds. et Kit. 2. t. 165. Fl. rubelli. (v. s.)

43. T. SPUMOSUM (L. sp. 1085.) caule patulo ramoso, foliolis obovatis obcordatisve integrusculis, stipulis latis acutissimis, capitulis ovatis crassis subsessilibus, calycibus scariosis inflatis striatis transversè venosis, laciiniis setaceis divergentibus corollam subæquantibus, bracteis lanceolatis calyce brevioribus, leguminibus 4-spermis. (I) in Corsicâ, Galloprovinciâ ex Ger., Occitan. ex Gouan. — Fl. fr. 4. p. 533. — Cupan. panphyt. t. 69. f. 1. (v. s.)

44. T. RESUPINATUM (L. sp. 1086.) caule prostrato, foliolis obovatis argutè ser-





rulatis basi maculatis, stipulis brevibus linearis lanceolatis acutis, capitulis hemisphaericis dein globosis, pedunculis petiolo brevioribus, floribus sessilibus, calycibus post anthesin inflatis scariosis longitudinaliter transversèque venosis, laciinis lanceolatis acutissimis corollâ brevioribus, leguminibus subdispermis. (1) in herbosis siccis provinc. austral. et rariùs occidentalium. — Fl. fr. 4. p. 534. — Clus. hist. 2. p. 247. ic. (v. v.)

45. T. *FRAGIFERUM* (L. sp. 1086.) caule prostrato, foliolis ovatis obovatisve, stipulis angustis linearibus elongatis, capitulis ovato-globosis longè pedunculatis, floribus sessilibus, calycibus post anthesin inflatis membranaceis reticulatis pilosis, laciinis inæqualibus corollâ brevioribus, leguminibus 2-spermis. 2f ad vias et in graminosis passim. — Fl. fr. 4. p. 534. — Vaill. bot. t. 22. f. 2. (v. v.)
46. T. *TOMENTOSUM* (L. sp. 1086.) caule prostrato, foliolis obcordato-cuneiformibus argutè serrulatis, stipulis lanceolatis acutis scariosis, capitulis globosis brevissimè pedunculatis, floribus sessilibus, calycibus post anthesin inflatis membranaceis tomentosis, laciinis corollâ brevioribus, leguminibus 1-spermis. 2f (1) in herbosis maritimis Galliæ mediterraneæ. — Fl. fr. 4. p. 534. — Barr. ic. 864. (v. v.)

Sect. VI. LUPINASTER. *Mœnch. meth. supp. p. 30.*

Flores maximi; petala persistentia; laciiniæ calycinæ subulatæ erectæ.

47. T. *UNIFLORUM* (L. sp. 1085.) caule brevissimo, foliolis ovatis acuminatis dentatis nervosis, stipulis vaginantibus longè acuminatis, floribus subsolitariis breviter pedunculatis, calycibus cylindricis striatis, laciinis brevibus subulatis æqualibus, corollâ calyce multò longiore, leguminibus 2-spermis. 2f in siccis maritimis circà Massiliam. — Fl. fr. 4. p. 536. — Buxb. cent. 3. t. 31. f. 1. (v. s.)
48. T. *ALPINUM* (L. sp. 1080.) glaberrimum, caulibus brevissimis crassis subterraneis, petiolis longis, foliolis ternis lanceolato-linearibus obtusiusculis denticulatis, stipulis longissimis angustissimis linearibus acutis, capitulis umbellatis longè pedunculatis, pediculis minimis subverticillatis, calycibus campanulatis, laciinis æqualibus corollâ multò brevioribus, leguminibus 2-spermis. 2f in pascuis editiorum montium. — Fl. fr. 4. p. 519. — J. Bauh. hist. 2. p. 376. f. 1. Corolla purpurea. (v. v.)


Sect. VII. CHRONOSEMIUM. *Ser. in DC. prod. 2. p. 204.*

Flores in capitulum ovatum pedunculatum dispositi; petala scariosa flava, post anthesin badia deflexa persistentia.

49. T. *BADIUM* (Schreb. in Sturm. deutsch. fl. 1. fasc. 16. ic.) caulibus ascendentibus, foliis petiolatis, foliolis sessilibus obcordatis denticulatis, stipulis lanceolatis acutis, capitulis pedunculatis subglobosis laxiusculis, vexillo obovato, calycibus brevissimis campanulatis, laciinis inæqualibus superiore minima, leguminibus subglobosis 1-spermis. 2f in pratis editiorum montium. — Fl. fr. 5. p. 561. T. *spadiceum* Vill. et Fl. fr. 4. p. 535. non L. — Barr. ic. 1024. (v. v.)
50. T. *AGRARIUM* (L. sp. 1087.) caule ascendentem ramoso firme, foliis breviter petiolatis, foliolis oblongo-ovatis sessilibus denticulatis, stipulis foliaceis lanceolatis acutis petiolo longioribus, capitulis longè pedunculatis ovoïdeis, vexillo obcordato, calycis brevis campanulati laciinis inæqualibus glabris elongatis superiore minore, leguminibus 1-spermis. (1) in pratis subhumidis. — Fl. fr. 4. p. 585. — Vaill. bot. t. 22. f. 4. (v. v.)

51. T. *SPADICEUM* (L. sp. 1087.) caule erecto subsimplici gracili, foliis petiolatis, foliolis oblongo-ovatis sessilibus denticulatis, stipulis foliaceis angustis acuminatis, capitulis longè pedunculatis ovoïdeis, vexillo obcordato, laciinis calycinis inæqualibus exterioribus longis pilosis, 2 interioribus minimis glabris, leguminibus ovoïdeis compressis 1-spermis. 2f in pratis montosis. — Fl. fr. 5. p. 561. Sturm. deutsch. 1. fasc. 16. ic. (v. v.)

52. *T. PROCUMBENS* (L. sp. 1088.) caulinis procumbentibus, foliis breviter petiolatis, foliolis obovatis obcordatisve denticulatis terminali petiolulato, stipulis ovatis ciliatis petiolo duplò brevioribus, capitulis axillaribus ovatis, pedunculis folia superantibus æquantibusve, floribus numerosis densis, lacinias calycinis inæqualibus, 2 superioribus brevissimis, leguminibus 1-spermis. (I) in arvis et pratis siccis. — Fl. fr. 4. p: 436. — Vaill. bot. t. 22. f. 3. (v. v.)
- β. *campestre* (Ser.) caule erecto ramoso, pedunculis longitudine foliorum. — T. campestre Schreb. in Sturm. deutsch. 1. fasc. 16. ic. Fl. fr. 5. p. 562. (v. v.)
- γ. *nanum* (Ser.) caule minimo, capitulis paucis, pedunculo terminali longitudine foliorum, foliolis ovato-subcordatis.
53. *T. PARISIENSE* (DC. fl. fr. 5. p. 562.) caulinis procumbentibus, foliis breviter petiolatis, foliolis obovatis obcordatisve denticulatis, terminali sæpè petiolulato, stipulis obovatis acuminatis ciliatis petiolas plerumque subæquantibus, pedunculis filiformibus longissimis, capitulis subumbellatis paucifloris, lacinias calycinis inæqualibus, 2 superioribus brevissimis tubo longioribus, leguminibus pedicellatis 1-spermis. (I) circà Parisios, Burdigalam (Des Moulins), Tolosam et in Pyrenæis ex Benth., in Galloprovinciâ. (v. s.)
54. *T. FILIFORME* (L. sp. 1088.) caule diffuso, foliolis obovatis obcordatisve subdenticulatis terminali petiolulato, stipulis latis ovatis petioli longitudine, pedunculis filiformibus longis, floribus subumbellatis sessilibus, lacinias calycinis inæqualibus, 2 superioribus brevissimis tubo brevioribus, leguminibus 1-2-spermis substipitatis. (I) in pratis. — Fl. fr. 4. p. 556. Eng. bot. t. 1257. — Ray. syn. t. 14. f. 4. (v. v.)
- XIII. DORYCNIUM. *Tourn. inst. 391. t. 211. f. 3. Ser. in DC. prod. 2. p. 208.*
- Calyx subcampanulatus bilabiatus sursum subgibbosus; alæ vexillo breviores; carina submutica; stylus rectus; stigma oculo nudo capitatum. — Herbæ vel suffrutices.
1. *D. RECTUM* (Ser. 1. c.) villosum, caulinis erectis suffruticosis, foliis petiolatis, foliolis obovatis mucronatis, stipulis ovato-cordatis, pedunculis ebracteatis multifloris folio vix duplò longioribus, pedicellis lanatis calycis longitudine, lacinias angustissimis tubo longioribus corollâque brevioribus, leguminibus calyce duplò longioribus. ♂ in provinciis australibus. — Lotus rectus L. sp. 1092. Fl. fr. 4. p. 557. — Barr. ic. t. 544. Fl. rosei. (v. v.)
2. *D. HIRSUTUM* (Ser. 1. c.) incano-tomentosum, caule erecto suffruticoso, foliis sessilibus, stipulis lanceolatis, pedicellis fructiferis folio duplò longioribus, bracteis lanceolatis calyce æquantibus, pedicellis calyce multò brevioribus, lacinias subulatis tubo multò longioribus et corollâ brevioribus, leguminibus calyce vix longioribus. ♂ in provinciis australibus. — Lotus hirsutus. L. sp. 1091. Fl. fr. 4. p. 556. — J. Bauh. hist. 2. p. 360. ic. Fl. magni rosei. (v. v.)
- β. *incanum* (Ser.) foliis sericeo-incanis, capitulis breviter pedunculatis densioribus. — In locis apricis Niceæ et Stæchadum. — L. sericeus. Fl. fr. 5. p. 573. (v. v.)
3. *D. PARVIFLORUM* (Ser. 1. c.) hispidum, caulinis subprostratis, foliolis lanceolatis, stipulis ovatis, capitulis 4-5-floris, bracteis lanceolato-linearibus, pedunculis folio longioribus, lacinias calycinis corollam æquantibus, leguminibus oblongis calyce vix longioribus. (I) in Corsicâ et insulis Stæchadum. — Lotus parviflorus Desf. atl. 2. t. 211. DC. ic. rar. t. 30. L. hispidus. Fl. fr. 4. p. 556. non Desf. — Fl. parvi flavi. (v. s.)
4. *D. HERBACEUM* (Vill. dauph. 3. p. 417. t. 41.) caulinis herbaceis, foliolis stipulisque obovatis obtusis, calycibus pilosis, dentibus calycinis tubo multò brevioribus, capitulis longè pedunculatis, bracteis monophyllis à capitulo distantibus, leguminibus ovatis calyce duplò triplò longioribus pa-









lyspermis. 2/2 circa Nicam, in Delphinatū propè Gratianopolim ex Vill. — Fl. fr. 4. p. 558. (v. v. DC.)

5. *D. SUFFRUTICOSUM* (Vill. l. c. p. 416.) caulis suffruticosus, foliolis stipulisque linear-lanceolatis acutis, calycibus pilosis, dentibus tubo multò brevioribus, capitulis longè pedunculatis, bracteis 1-3-phyllis, leguminibus globosis calyce duplò longioribus monospermis. ♂ in provinciis australibus et austro-occidentalibus usque ad Santoniam (Des Moulins.) — Fl. fr. 4. p. 557. — Lob. ic. 2. p. 51. f. 1. 2. (v. v.)

XIV. *LOTUS*. *Seringe* in DC. prod. 2. p. 209. — *Loti sp. Lin.*

Calyx tubulosus 5-fidus; alae vexillum subæquantes; carina rotunda; legumen cylindraceum vel compressum apterum; stylus rectus; stigma oculo nudo subulatum. — Herbæ.

Sect. I. *KROKERIA*. *Mœnch*. meth. t. 43.

Legumen turgidum curvatum, flores 1-3.

1. *L. EDULIS* (L. sp. 1090.) pilosus, caulis erectis, foliolis obovatis, floribus 1-3, bracteis ovatis calycem æquantibus, leguminibus glabris. (I) in incultis et sterilibus maritimis Corsicæ, Niceæ, Galloprovinciæ. — Fl. fr. 4. p. 554. — J. Bauh. 2. p. 365. f. 2. (v. v.)

Sect. II. *LOTEA*. *Medic. phil. bot. fasc. 1. p. 204.*

Legumen compressum longum, flores subumbellati.

2. *L. ORNITHOPODIOIDES* (L. sp. 1091.) glabriusculus, caulis diffusis, foliolis obovato-rhombeis integris, stipulis ovatis, floribus 3-5, bracteis calyce multò longioribus, leguminibus compressis sublomentaceis glabris curvulis deflexis. (I) in maritimis Corsicæ, Niceæ, Galloprovinciæ, Occitanie ex Gouan, agri Syrtici? ex Thore. — Fl. fr. 4. p. 554. Cav. ic. 2. p. 48. t. 163. — J. Bauh. 2. p. 359. f. 1. Flores flavi. (v. v. DC.)

Sect. III. *EULOTUS*. *Ser. l. c. p. 210.*

Legumen cylindraceum longum, flores corymbosi.

3. *L. CRETICUS* (L. sp. 1091.) sericeus, caulis suffruticosus suberectis, foliolis obovatis, stipulis ovatis pedunculo fructifero triplò brevioribus, bracteis lanceolato-linearibus calyce minoribus, capitulis sub-4-floris, laciniis calycinis lanceolatis longitudine tubi corollâque multò brevioribus, stylo exerto, leguminibus teretibus glabriusculis nutantibus subtortulosis. ♂ circa Bonifacio reperierunt Requier et Soleiro. — Cav. ic. p. 44. t. 156. Flores flavi. (v. s.)
4. *L. CYTISOIDES* (L. sp. 1092.) caulis basi prostratis subramosis, pedicellis calycibus incanis, foliolis obovatis subcarnosis pilis adpressis tectis, laciniis calycinis tubo brevioribus, leguminibus subtortulosis glabris. (I) in maritimis Corsicæ, Niceæ, Galloprovinciæ, agri Ruscinonensis ex Lapeyr. — Fl. fr. 4. p. 555. All. ped. t. 20. f. 1. — Barr. ic. t. 1031. Fl. flavi. (v. v.)
5. *L. PILOSISSIMUS* (Poir. supp. 3. p. 504) caulis ramosis subprostratis, foliolis ovato-lanceolatis, stipulis ovatis subacutis, capitulis paucifloris longè pedunculatis, bracteis angustissimis lanceolatis, laciniis calycinis angustis acutis tubo longioribus, leguminibus subteretibus glabris. (I) in Gallia australi ex Poiret. — Cor. lutea exsiccatione viridis. An var. *L. hispida*? †
6. *L. HISPIDUS* (Desf. cat. par. 190.) caulis numerosis prostratis, foliolis hispidis oblongo-lanceolatis, stipulis ovatis, capitulis paucifloris, pedunculis folio multò longioribus, bracteis lanceolatis longitudine calycis, laciniis angustis tubo longioribus corollâque brevioribus, leguminibus compressis punctatis. (I) in Corsicâ et agro Syrtico. — Loisel. gall. 490. t. 16. Fl. fr. 5. p. 572. (v. v.)
7. *L. ANGUSTISSIMUS* (L. sp. 1090.) caulis prostratis foliisque hispidis,

foliolis stipulisque oblongo-linearibus, capitulis 1-3-floris, pedunculis folio longioribus, laciinis calycinis tubo longioribus corollâque brevioribus, leguminibus compressis angustissimis subsolitariis calyce sextuplo longioribus. (I) in incultis et siccis provinc. austral. occidentaliumque passim. — Fl. fr. 5. p. 573. — J. Bauh. hist. 2. p. 356. f. 2. (v. v.)

$\beta.$ *diffusus*, minus hispidus, caulis elongatis, pedunculis folio plurumque triplò longioribus. — L. *diffusus* Soland. Sm. eng. bot. t. 925. Fl. fr. 5. p. 573. Ser. in DC. prod. 2. p. 213. (v. v.)

8. *L. CONIMBRENSIS* (Brot. phyt. p. 127. t. 53.) glabriusculus, caulis subramosis procumbentibus, foliis glaucescentibus, foliolo intermedio obovato, lateralibus lauceolatis stipulisque ovatis apice ciliatis, pedunculis brevisimis 1-floris, laciinis calycinis angustis longitudine tubi corollâque brevioribus apice ciliato-aristatis, leguminibus cylindricis longissimis arcuatis glabris. (I) in Corsicâ et Galloprovinciâ. — L. *aristatus* DC. fl. fr. 5. p. 572. Fl. albi cum carinâ purpureâ. (v. s.)

9. *L. CORNICULATUS* (L. sp. 1092.) caulis prostratis, foliolis obovatis vel linearibus glabris pilosive, stipulis ovatis, bracteis lanceolatis linearibusve, pedunculis longissimis, capitulis depressis 3-10-floris, calycibus campanulatis, laciinis acutis longitudine tubi et corollâ multò brevioribus, leguminibus teretibus. \mathcal{Y} in pratis frequens. — Fl. fr. 4. p. 555. Fl. flavi sæpè extus rubri exsiccatione virides.

$\alpha.$ *arvensis* (Ser.) glabriusculus, caulis subprostratis, foliolis obovatis, floribus luteis. — Oed. fl. dan. t. 991. (v. v.)

$\beta.$ *major* (Ser.) caulis erectis plus minusve pilosis majoribus fistulosis. In sepibus humidis. — Sow. eng. bot. t. 2091. (v. v.)

$\gamma.$ *villosus* (Ser.) caulis foliisque villosis erectis. L. *vilosus* Thuil. (v. v.)

$\delta.$ *crassifolius* (Pers.) pilosus, foliolis ovatis subcarnosis, caulis foliosis prostratis. — In sterilibus maritimis. (v. v.)

$\epsilon.$ *Alpinus* (Schleich.) caulis foliisque minimis, floribus sæpè extus ruberrimis. In Alpibus. (v. v.)

$\zeta.$ *tenuifolius* (Poll.) caulis suberectis filiformibus, foliolis stipulisque linearis-lanceolatis. — In ruderatis. L. *tenuis* Kit.

XV. TETRAGONOLOBUS. Scop. carn. 2. p. 87. Ser. in DC. prod. 2. p. 215.

Calyx tubulosus 5-fidus; alæ vexillo breviore; carina rostrata; stylus flexuosus, stigma infundibuliforme demùm obliquè rostratum; legumen cylindraceum alis foliaceis 4 marginatum. — Herbæ.

1. *T. PURPUREUS* (Mœnch. meth. p. 164.) pilosus, caulis subdecumbentibus, foliolis obovatis, floribus solitariis geminis, bracteis calyce longioribus, leguminibus glabris latè alatis. (I) circa Niceam ex All. — Lotus tetragonolobus L. et Fl. fr. 4. p. 553. — J. Bauh. hist. 2. p. 258. f. 2. Fl. atropurpurei. (v. v. c.)

2. *T. SILIQOSUS* (Roth. germ. 1. p. 323.) pilosus, caulis subdecumbentibus, foliolis obovatis, stipulis obtusisculis, floribus solitariis longè penduculatis, bracteis obovato-linearibus calyce brevioribus, leguminibus glabris angustissimè alatis. \mathcal{Y} in pratis humidis. — L. *siliquosus* L. sp. 1089. Fl. fr. 4. p. 553. — J. Bauh. 2. p. 359. f. 2. Flores flavi. (v. v.)

$\beta.$ *maritimus* (DC.) foliis carnosis glabriusculis. — In maritimis. L. *maritimus* L. (v. v.)

3. *T. CONJUGATUS* (Ser. l. c.) pilosus, caulis subdecumbentibus, foliolis obovatis, stipulis parvis acuminatis, floribus conjugatis, bracteis obovatis calyce longioribus, leguminibus glabris subteretibus angustissimè alatis. (I) circa Monspelium? ex L. et Gouan, Vallètiam? ex Lapeyr. — L. *conjugatus* L. et Fl. fr. 4. p. 554. Fl. purpurei. Dubia civis. (v. s. c.)

+ month

Subtrib. III. CLITORIEÆ. DC. prod. 2. p. 216. leg. mem. vi.

Legumen 1-loculare. Stam. saepius diadelpha. Caules herbacei aut suffrutescentes.

XVI. PSORALEA. L. gen. n. 894.

Sepala 5 ad medium concreta in calycem 5-fidum persistentem, lobis acuminatis, infimo paulò productiore; legumen calycis longitudo evalve 1-spermum interdum in rostrum desinens.

1. P. PALÆSTINA (Gon. ill. 51.) foliis pinnatim 3-foliolatis, foliolis inferiorum ovatis, superiorum lanceolatis, petiolis pubescentibus sulcatis, pedunculis axillaribus folio triplò quadruplò longioribus, spicis capitatis, calycibus pubescentibus demum subvesicariis. $\frac{2}{3}$ circè Monspelium propè Pont-Juvenal ex seminibus in lanis extraneis allatis. — Fl. fr. 5. p. 554. Jacq. vind. 2. t. 184. Sequenti similis sed subinodora. (v. v.)
2. P. BITUMINOSA (L. sp. 1075.) foliis pinnatim 3-foliolatis, foliolis ovato-lanceolatis, petiolis pubescentibus laevibus, pedunculis axillaribus folio triplò quadruplò longioribus, spicis capitatis, calycibus pubescentibus. $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{5}$ in provinciis australibus usquè ad Lugdunum ex el. Balbis. — Fl. fr. 4. p. 518. Lam. ill. t. 614. f. 1. Bitumen redolens. (v. v.)

Subtrib. IV. GALEGEÆ. Bronn. diss. DC. prod. 2. p. 243.

Legumen 1-loculare. Stamina diadelpha, rariùs monadelpha. Caules herbacei fruticosi aut arborei.

XVII. GLYCYRHIZA. Tourn. inst. 210. L. gen. n. 882.

Calyx nudus tubulosus 5-fidus bilabiatus; cor. vexillum ovato-lanceolatum rectum, carina biceps aut dipetala recta acuta; stam. diadelpha; stylus filiformis; legumen compressum 1-loculare 1-4-spermum.

1. G. GLabra (L. sp. 1046.) foliolis ovatis subretusis subtùs subglutinosis, stipulis nullis, spicis pedunculatis folio brevioribus, floribus distantibus, leguminibus glabris 3-4-spermis. $\frac{2}{3}$ in provinciis australioribus. — Fl. fr. 4. p. 560. Lam. ill. t. 625. f. 2. (v. v. c.)

XVIII. GALEGA. Tourn. inst. t. 222. Lam. ill. t. 625.

Calyx dentibus 5 subulatis subæqualibus; corolla vexillo obovato-oblongo; carina obtusa; stam. monadelpha, decimo nempè ad medium concreto; stylus filiformis glaber; stigma terminale punctiforme; legumen teretiusculum torulosum obliquè striatum.

1. G. OFFICINALIS (L. sp. 1063.) foliolis lanceolatis mucronatis glabris, stipulis lato-lanceolatis, racemis folio longioribus. $\frac{2}{3}$ in glareosis Galliæ passim. — Fl. fr. 4. p. 560. Mill. ic. t. 137. (v. s. ex Pedem.)

XIX. ROBINIA. DC. prod. 2. p. 261. — Robiniae spec. Lin.

Calycis dentes 5 lanceolati, 2 superiores breviores approximati; cor. papilionacea vexillo ampio, carina obtusa; stam. diadelpha decidua; ovarium 16-20-ovulatum; stylus anticè barbatus; legumen compressum subsessile polyspermum, valvis planis tenuibus, suturâ seminiferâ marginatâ.

1. R. PSEUDACACIA (L. sp. 1043.) spinis stipularibus, ramis virgatis, racemis laxis pendulis leguminibusque glabris, foliolis ovatis. $\frac{3}{5}$ ex Americâ boreali in Galliam ubi nunc subspontanea introducta. — Fl. fr. 4. p. 561. Lam. ill. t. 606. f. 1. (v. v.)

XX. COLUTEA. R. Brown. hort. kew. ed. 2. vol. 4. p. 325. — Coluteæ sp. L.

Calyx 5-dentatus; vexillum explanatum bicallosum carinâ obtusâ majus; stamina diadelpha (9 et 1); stigma laterale sub apice styli uncinato; stylus posticè longitudinaliter barbatus; legumen stipitatum cymbiformi-ovatum inflatum scariosum. — Frutices.

1. C. ARBORESCENS (L. sp. 1045.) foliolis ellipticis retusis, pedunculis subsex-floris, vexilli gibbis abbreviatis, leguminibus clausis. ♂ ad sepes in Galliâ australi. — Fl. fr. 4. p. 561. Duham. arb. ed. nov. 1. t. 22. (v. v.)

Subtrib. V. ASTRAGALEÆ. Adans. fam. DC. prod. 2. p. 273.

Legumen suturâ alterâ introflexâ longitudinaliter 2-loculare aut semibiloculare. Stamina diadelpha (9 et 1). Caules herbacei aut suffrutescentes. Folia pinnata.

XXI. PHACA. L. gen. n. 891.

Cal. 5-dentatus, dentibus 2 superioribus remotioribus; carina obtusa; stylus imberbis; stigma capitatum; legumen subturgidum uniloculare suturâ superiore seminiferâ tumidâ.

* *Floribus albidis aut ochroleucis.*

1. P. ALPINA (Jacq. ic. rar. 1. t. 151.) caule erecto ramoso pubescente, stipulis linear-lanceolatis, foliolis 9-12-jugis oblongis obtusis pubescens, leguminibus compressis semi-ovatis acutis glabriusculis. ♀ in apricis asperis Alpium et Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 562. — Till. pis. t. 914. f. 2. (v. v.)

** *Floribus purpurascensibus aut albo et violaceo pictis.*

2. P. GLABRA (Clar. bull. philom. n. 61. DC. astr. n. 4.) caule ramoso prostrato glabro, stipulis latis ovatis, foliolis 6-7-jugis ovali-oblongis acutis glabris, pedunculis folio longioribus, alis integris, leguminibus stipitatis turgidis glabris. ♀ in Alpibus demissioribus Galloprovinciæ. Corolla alba apice et margine violacea. — Fl. fr. 4. p. 563. (v. s.)

3. P. AUSTRALIS (Linn. mant. 103.) caule ramoso cespitoso ascendente glabro, stipulis ovatis, foliolis 6-8-jugis linear-lanceolatis glabris, impari sessili, pedunculis folio longioribus, alis apice bifidis carinâ longioribus, leguminibus stipitatis ovoideis demùm glabratris. ♀ in asperis Alpium et Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 563. Jacq. misc. 2. t. 3. Corolla pallida apice purpurascens. (v. v.)

4. P. ASTRAGALINA (DC. astr. n. 9.) caule brevi procumbente adsurgente glabriusculo, stipulis ovatis acutis, foliolis 10-11-jugis ovatis adpressè utrinquè pubescens, pedunculis folio longioribus, alis integris carinâ brevioribus, leguminibus stipitatis pendulis, junioribus nigro-hirsutis. ♀ in editioribus Alpibus et Pyrenæis. — Fl. fr. 4. p. 564. — Schenckz. itin. alp. 50g. f. 7. Fl. violacei. (v. v.)

XXII. OXYTROPIS. DC. astr. n. IV. ed. maj. p. 19. et 53. — Astragali spec. Linn.


Calyx 5-dentatus; corollæ carina in mucrone exsertum summo dorso desinens; legumen biloculare aut semibiloculare, suturâ superiore introflexâ. — Herbæ.

- §. I. Acaules, nempe caulinis subnullis, stipulis petiolo adnatis, foliolis conjugatis.

* *Floribus purpurascensibus aut albis.*

1. O. MONTANA (DC. l. c. n. 1.) subacaulis villosa, pilis petiolorum et scapi





patulis, foliolis elliptico-lanceolatis, scapis vix folio longioribus, racemis abbreviatis, bracteis calyce dimidiò brevioribus, leguminibus erectis tereti-oblongis villosis stylo acuminatis semibilocularibus. \mathcal{L} in Alpibus, Pyrenæis, montibus editioribus Arvernæ. — Fl. fr. 4. p. 565. Astragalus montanus L. Scop. carn. t. 45. Fl. cæruleo-purpurei. (v. v.)

2. O. URALENSIS (DC. astr. n. 3.) acaulis villoso-sericea, foliolis ovato-lanceolatis, scapis folio longioribus calycibusque hirsuto-lanatis, capitulis multifloris ovatis, floribus erectis, bracteis etiam infimis calyce paulò brevioribus, leguminibus confertis erectis ovatis acuminatis pubescentibus bilocularibus. \mathcal{L} in herbosis fertilibus Alpium Galloprovincie et Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 565. Astr. Uralensis. Jacq. ic. rar. 1. t. 155. eng. bot. t. 466. Fl. cæruleo-purpurei. — Differet videtur ab A. Uralensi L. sp. 1071. Conf. DC. prod. 2. p. 276. (v. v. DC.)

** *Floribus ochroleucis.*

3. O. CAMPESTRIS (DC. astr. n. 10.) acaulis, foliolis multijugis lanceolatis sericeis, scapo sèpiùs decumbente foliis subæquali, spicis capitatis, bracteis calyce paulò brevioribus, floribus erectis, leguminibus erectis ovatis inflatis pubescentibus semibilocularibus. \mathcal{L} in declivibus herbosis Alpium et Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 566. — Hall. helv. t. 13. (v. v.)

\mathcal{E} . *viscosa* (DC.) foliolis pubescentibus subviscosis. — Astr. viscosus. Vill. dauph. 3. t. 43. (v. s.)

4. O. FOETIDA (DC. astr. n. 11.) acaulis, foliolis multijugis lanceolato-linearibus glabris viscosis, scapo foliis sublongiore supernè lanato, spicis capitatis paucifloris, bracteis calyce brevioribus, leguminibus erectis tereti-inflatis subincurvis pubescentibus. \mathcal{L} in editioribus Alpibus Delphinatûs ex Villaës. — Fl. fr. 4. p. 566. Astr. fœtidus. Vill. dauph. 3. t. 43. A. Halleri. All. (v. v. in Helv.)

§. 2. Caulescentes, nempè caulinis elongatis, stipulis caulinis nec petiolo adnatis, foliolis conjugatis.

5. O. PILOSA (DC. astr. n. 27.) caulescens erecta molliter pilosa, foliolis lanceolatis acutis, pedunculis axillaribus folio longioribus, spicis ovato-oblongis, leguminibus erectis tereti-subulatis villosi. \mathcal{L} in rupestribus montosis Galliæ austro-orientalis. — Fl. fr. 4. p. 567. — Astr. pilosus. L. Jacq. austr. t. 51. Fl. ochroleuci. (v. v.)

XXIII. ASTRAGALUS. DC. astr. n. v. ed. maj. p. 22 et 79. — Astragali spec. Linn.

Calyx 5-dentatus; corolla carinâ obtusâ; stamna diadelpha; legumen biloculare aut semibiloculare, suturâ inferiore introflexâ. — Herbæ aut suffrutices.

Series 1. PURPURASCENTES.

Stipulis à petiolo liberis, floribus purpurascensibus.

§. 1. HYPOGLOTTIDEI. DC. prod. 2. p. 281.

Floribus purpureis aut albis, stipulis à petiolo liberis inter se coalitis et ideo quasi bifidis et oppositifoliis.

1. A. HYPOGLOTTIS (Linn. mant. 274.) diffuso-procumbens piloso-subvillosus, stipulis (saltem junioribus) concretis oppositifoliis, foliolis obovatis oblongis sèpè emarginatis 8-10-jugis, spicis capitatis, pedunculis folio longioribus, bracteis calycis tubo dimidiò brevioribus, calycibus nigro-pilosis, leguminibus erectis capitatis hirsutis ovato-trigaebris, loculis monospernis. \mathcal{L} in collibus arenosis passim. — Fl. fr. 4. p. 570. DC. astr. n. 18. t. 14. (v. v.)

2. A. PURPUREUS (Lam. dict. 1. p. 314.) diffuso-procumbens subvillosus, stipulis (saltem junioribus) concretis oppositifoliis, foliolis obovatis apice

bidentatis, spicis capitatis, pedunculis folio longioribus, leguminibus erectis capitatis hirsutis ovato-triquetris, localis trispermis. \mathcal{L} in montanis Delphinatūs, Galloprov., Niceæ, agri Mimatensis (Prost.). — DC. fl. fr. 4. p. 569. astr. n. 17. t. 12. (v. s.)

3. A. BAYONENSIS (Lois. fl. gall. 474.) diffuso-procumbens pube adpressâ albâ subtomentosus, stipulis concretis oppositifoliis, pedunculis 4-6-floris folio subæqualibus, leguminibus subsessilibus tumidiuseculis tomentosis latitudine duplò longioribus. \mathcal{L} in arenosis maritimis Galliæ occid. à Bayonâ ad Rupellam passim. — Fl. fr. 5. p. 573. A. Austriacus Thore non L. (v. v. D.)

§. II. DISSITIFLORI. (DC. l. c.)

Stipulis nec petiolo nec inter se adnatis, floribus purpurascentibus aut albis distantibus nec densè spicato-racemosis, leguminibus rectis.

4. A. AUSTRIACUS (L. spec. 1070.) diffuso-procumbens, foliolis glabris linearibus truncato-emarginatis, racemis pedunculatis folio longioribus, alis corollæ bifidis, leguminibus subtriquetris pendulis. \mathcal{L} in rupestribus apricis Delphinatūs ad arces Brigantii. — Fl. fr. 4. p. 567. Jacq. Aust. t. 175. (v. v. DC.)

§. III. ONOBRYCHOÏDEI. (DC. l. c.)

Stipulis à petiolo et inter se distinctis, floribus purpurascentibus densè spicatis capitatis, vexillis linearibus elongatis, leguminibus rectis rariis fallatis, radicibus perennibus.

5. A. ONOBRYCHIS (Linn. spec. 1070.) diffusus pubescens, fololis oblongis 7-9-jugis, spicis oblongo-ovatis folio longioribus, vexillo linearis alis duplò longiore, leguminibus ovato-triquetris subvillosis erectis calyce-duplò longioribus utrinquè 4-spermis, acumine brevi erecto. \mathcal{L} in pratis siccis montanis Delphinatūs, Galloprovinciæ. — Fl. fr. 4. p. 571. — Clus. hist. 2. p. 238. f. 2. (v. v. in Helv. D.)

§. IV. SESAMEI. (DC. l. c.)

Stipulis à petiolo et inter se liberis, floribus purpurascentibus densè spicatis capitatis, leguminibus rectis, radicibus annuis.

6. A. PENTAGLOTTIS (L. mant. 274.) diffuso-procumbens subvillosus, stipulis ovatis, foliolis obovatis retuso-emarginatis 4-6-jugis, pedunculis folio sublongioribus, leguminibus capitatis semiovatis subtriquetris acutis tuberculato-echinatis, papillis sæpè piliferis, loculis monospermis. \mathcal{L} in Corsicâ ex Valle, propè Cascastel in demissioribus Corbariensibus ex cl. Benth. — Fl. fr. 4. p. 569. Cav. ic. t. 188. (v. s. ex Hisp.)

7. A. GLAUX (L. sp. 197.) procumbens villosus subcanescens, stipulis ovato-lanceolatis, foliolis oblongis acutiusculis 8-9-jugis, pedunculis folio longioribus, vexillo linearis, leguminibus capitatis erectis ovato-triquetris mucronatis villosis, loculis monospermis. (I) in Castello dicto Bombaz inter Avenionem et Cabellionem et propè Béziers. — Fl. fr. 4. p. 924. — Clus. hist. 2. p. 241. f. 1. (v. v. DC.)

8. A. STELLA (Gouan. ill. 50.) diffuso-procumbens cano-villosus, stipulis lanceolatis, foliolis elliptico-oblongis 8-10-jugis, pedunculis folii longitudine aut brevioribus, leguminibus capitatis demum stellatis subteretibus dorso sulcatis mucronatis hirsutis, loculis 5-10-spermis. (I) Monspelii. — Fl. fr. 4. p. 568. — Pluck. t. 79. f. 4. Lob. ic. 2. t. 83. (v. v. DC.)

9. A. SESAMEUS (L. sp. 1068.) diffusus villosus subcanescens, stipulis lanceolatis, foliolis elliptico-oblongis 9-10-jugis, capitulis axillaribus sessilibus, leguminibus capitatis erectis subteretibus acuminatis dorso sulcatis villosis, loculis 7-8-spermis. (I) circâ Telonem, Aquas-Sextias, Monspelium, Cascastel. — Fl. fr. 4. p. 568. — Garid. aix. t. 12. (v. s.)



§. V. VESICARII. (DC. l. c.)

Stipulis nec petiolo nec inter se adnatis, floribus purpurascensibus aut albidis, calycibus vesicariis.

10. A. VESICARIUS (L. sp. 1071.) diffuso-procumbens pube adpressâ sericeo-canus, foliolis 5-7-jugis ellipticis, pedunculis folio longioribus, calycibus vesicariis pube nigra adpressa et pilis albis patulis vestitis, leguminibus hirsutis calyce paulo longioribus. $\frac{1}{2}$ in Galloprovinciæ super. et Delphinatûs apriis asperis. — Fl. fr. 4. p. 569. Vill. danph. t. 42. f. 1. (v. v.)

Series II. OCHROLEUCI. (DC.)

Stipulis à petiolo liberis, floribus ochroleucis.

§. VI. BUCERATES. (DC. l. c.)

Stipulis nec petiolo nec inter se adnatis, floribus ochroleucis, legumiibus sæpius arcuatis, radicibus annuis.

11. A. HAMOSUS (L. sp. 1067.) diffusus pubescens, foliolis cuneatis emarginatis supernè glabris, pedunculis sub-6-floris folio brevioribus, leguminibus hamatis dorso sulcatis teretibus apice subulatis, junioribus pubescentibus, adultis glabris. (1) in siccis et lapidosis provinciæ australium et in Arvernâ propè Claromontem. — Fl. fr. 4. p. 572. — Moris. hist. s. 2. t. 9. n. 10. (v. v.)
12. A. EPIGLOTTIS (L. mant. 274.) procumbens villosò-incanus, stipulis lanceolatis calycibusque nigro-villosis, foliolis oblongo-linearibus 6-7-jugis, spicis capitatis brevissime pedunculatis, leguminibus depressis subcordatis acuminatis margine subreplicatis patulis pubescentibus. (1) in nemoribus et montibus Galloprovinciæ. — Fl. fr. 4. p. 673. — Riv. tetrap. t. 109. (v. v. c.)

13. A. BÆTICUS (L. sp. 1068.) procumbens pubescens, stipulis membranaceis ovatis acuminatis, foliolis obovatis retusis 10-15-jugis, spicis brevissimè pedunculatis, leguminibus erectis triquetro-prismaticis glabris rectis apice mucronato-uncinatis. (1) in Corsicâ propè Bonifacio. — Riv. tetr. irr. t. 105. (v. s.)

§. VII. CICEROÏDEI. (DC. l. c.)

Stipulis nec petiolo nec inter se adnatis, spicis pedunculatis, floribus ochroleucis, radicibus perennibus, leguminibus sessilibus.

14. A. GLYCOPHYLLOS (L. sp. 1067.) procumbens glabriusculus, stipulis ovatis mucronatis acuminatis, foliolis 5-6-jugis ovatis, pedunculis folio brevioribus, spicis ovato-oblongis, leguminibus oblongo-subulatis subtriquetris subiucurvis sessilibus glabris erectis. $\frac{1}{2}$ in pratis, sepibus, dumetis. — Fl. fr. 4. p. 572. — Riv. tetr. t. 103. (v. v.)
15. A. DEPRESSUS (L. sp. 1073.) subacaulis aut diffusus pubescenti-canescens, stipulis ovatis membranaceis, foliolis 9-11-jugis obovatis, pedunculis folio brevioribus, leguminibus tereti-depressis rectis patulo-deflexis glabris. $\frac{1}{2}$ in Pyrenæis et editioribus Alpibus Delphinatûs. — Fl. fr. 4. p. 571. All. ped. t. 19. f. 3. (v. v. DC.)
16. A. CICER (L. sp. 1067.) diffuso-procumbens subpubescens, stipulis lanceolatis, foliolis 10-13-jugis elliptico-oblongis mucronatis, pedunculis folio brevioribus, floribus spicato-capitatis, leguminibus inflatis hirsutis mucronatis. $\frac{1}{2}$ in siccis montosis Galliæ orientalis passim. — Fl. fr. 4. p. 573. — Moris. hist. s. 2. t. 9. n. 9. (v. v.)

§. VIII. ALOPECUROÏDEI. (DC. l. c.)

Stipulis petiolo non adnatis, caulinis erectis strictis, floribus flavis dense congestis in spicas ad foliorum axillas sessiles aut brevissimè pedunculatas.

17. A. NARBONENSIS (Gouan. ill. 49. Pall. astr. t. 10.) caulescens erectus, caule molliter hirsuto, stipulis lanceolatis, foliolis oblongo-linearibus villosis, spicis subglobosis, dentibus calycinis setaceis corollâ brevioribus tubi

longitudine. \mathcal{L} in asperis circâ Narbonam, Biterras (Béziers.) — Fl. fr. 4. p. 574. (v. v. DC.)

Series III. TRAGACANTHACEI. (DC. l. c.)

Stipulis petiolo adnatis, petiolis indurato-persistentibus.

§. IX. TRAGACANTHÆ. (DC. l. c.)

Petiolis persistentibus spinescentibus, stipulis petiolo adnatis.

18. A. MASSILIENSIS (Lam. dict. 1. p. 320. DC. astr. n. 96) pedunculis sub-4-floris folio subæqualibus, calycibus cylindraceis obtusè et breviter 5-dentatis, foliolis 9-11-jugis ellipticis incanis. \mathfrak{Z} in arenosis maritimis Massiliæ, Narbonæ. — Fl. fr. 4. p. 574. — Lob. ic. 2. t. 27. Fl. albi. (v. v.)

19. A. ARISTATUS (L'Her. stirp. 170.) pedunculis sub-6-floris brevissimis, calycis dentibus longis setaceis, foliolis 6-9-jugis oblongis mucronatis pilosis, legumine vix semibiloculari. \mathfrak{Z} in sterilibus rupibus Alpium et Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 575. — Garid. aix. t. 104. Fl. albi aut purpurascentes. (v. v.)

Series IV. PODOCHEATI.

Stipulis petiolo adnatis, petiolis non-indurato-spinosis.

§. X. INCANI. (DC. l. c.)

Calycibus leguminibusque non vesicariis, vexillis valdè elongatis, leguminibus perfectè bilocularibus.

20. A. MONSPESSULANUS (L. sp. 1072.) subacaulis incano-pubescentia glabriusculus, foliolis 21-41 ovatis lanceolatis, extimis subminoribus, scapis folia superantibus, calycis dentibus longis subulatis, leguminibus tereti-subulatis subarcuatis, adultis glabris. \mathcal{L} in provinciis australibus, Pyrenæis et propè Meduntam (Mantes), Rothomagum ex cl. Le Prévost. — Fl. fr. 4. p. 576. Curt. bot. mag. t. 219. Cam. epit. 929. ic. Variat floribus purpureis pallidis aut albis. (v. v.)

21. A. INCANUS (L. sp. 1072.) acaulis incanus, foliolis 13-17 ovatis, scapis folia vix superantibus, spicis capitatis, dentibus calycinis subulatis brevibus, leguminibus subcylindraceis pubescentia canis apice incurvis subulato-mucronatis calyce vix triplo longioribus, loculis 5-6-spermis. \mathcal{L} in campis apricis et lapidosis Galliæ australis. — Fl. fr. 4. p. 376. — Magn. bot. p. 32. ic. (v. v. D.)

XXIV. BISERRULA. L. gen. n. 893.

Calyx 5-fidus; carina obtusa; stamna diadelpha; legumen depresso-planum biloculare valvis carinato-compressis dorso sinuato-dentatis. — Herba.

1. B. PELEGINUS (L. sp. 1073.) diffusa pubescens, foliis impari-pinnatis, foliolis multijugis. (1) in Galloprovinciâ orientali, et Monspeli ex Gouan. — Fl. fr. 4. p. 577. — Barr. ic. t. 1137. (v. s.)


Trib. III. HEDYSAREÆ. DC. prod. 2. p. 307. leg. mem. VII.

Embryo homotropus. Corolla papilionacea, stamna rarò libera, sæpiùs monadelpha aut diadelpha. Legumen in loculos articulosve monospermous transversim divisum. Cotyledones planiusculæ per germinationem in folia stomatibus donata conversæ.

Subtrib. I. CORONILLEÆ. DC. prod. 2. p. 308.

Flores umbellati. Legumina teretia aut compressa.





XXV. SCORPIURUS. L. gen. n. 876. Gærtn. fruct. 2. t. 155.

Calyx 5-fidus, lobis æqualibus acutis; corolla carinâ bicipiti; stamina diadelpha (9 et 1) 5 longiora sub antherâ paululum dilatata, ovarium sulcatum; stylus filiformis acutus; legumen revolutum subspirale, articulis constans 3-6 monospermis longitudinaliter sulcatis; nervis sæpè aculeatis muricatis; embryo replicatus; cotyledones lineares. — Herbæ annuae.

1. S. MURICATA (L. sp. 1050.) leguminis glabri costis interioribus lævibus, externis tuberculis minimis subobtusis muricatis. (I) ad vias et margines agrorum Monspelii, Niceæ, Delphinatûs ex Vill. — Fl. fr. 4. p. 601. — Moris. hist. 2. t. 11. n. 4. Valdè similis sequenti, sed leguminis costæ exteriores muricatae nec aculeatae. (v. s.)

2. S. SULCATA (L. sp. 1050.) leguminis glabri costis interioribus lævibus, 4 externis aculeos rigidulos distantes apice subuncinatos gerentibus. (I) in arvis et ad vias Galliæ australis. — Fl. fr. 4. p. 601. Gærtn. fruct. 2. t. 155. (v. v.)

3. S. SUBVILLOSA (L. sp. 1050.) leguminis glabri costis interioribus lævibus, externis 6-8 aculeos rigidulos apice subuncinatos subconfertos gerentibus. (I) Hab. cùm priore. — Fl. fr. 4. p. 602. — Moris. hist. s. 2. t. 11. n. 2. Legumen crassius et magis revolutum quam in S. sulcata. (v. v.)

4. S. ACUTIFOLIA (Viv. fl. lyb. 43. t. 19. f. 4.) leguminis brevissimè hirti costis intimis lævibus, externis 8-10 aculeos rigidulos brevissimos confertos gerentibus. (I) in Corsicâ circâ Bonifacio. — An satis à præcedente distincta? (v. s.)

5. S. VERMICULATA (L. sp. 1050.) leguminis glabri costis intimis subnullis, externis 10 tuberculosis stipitatos confertos apice obtuse dilatatos gerentibus. (I) in provinciæ australiæ arvis. — Fl. fr. 4. p. 601. — Moris. s. 2. t. 12. n. 3. Legumina crassa. (v. s.)

XXVI. CORONILLA. Neck. elem. n. 1319. Lam. ill. t. 630. — Coronilla sp. L.

Calyx campanulatus brevis 5-dentatus, dentibus 2 super. approximatis subcoalitis; corolla petalorum unguibus calyce sæpius longioribus, carinâ acutâ; stamina diadelpha (9 et 1); legumen teretiusculum, gracile, demum in articulos oblongos 1-spermis secedens; semina ovata aut cylindracea. — Frutices aut Herbæ.

Sect. I. EMERUS. Tourn. inst. t. 418. Desv. journ. bot. 3. p. 121.
t. 4. f. 9.*

Legumen teretiusculum tardius et obscurius secedens, petalorum unguis calyce triplò longiores.

1. C. EMERUS (L. sp. 1146.) fruticosa, glabra, stipulis minimis, foliolis 5-7 obovatis, pedunculis 3-floris. ♂ in sepibus et dumetis Galliæ australis orientalisque. — Fl. fr. 4. p. 606. — Mill. ic. t. 132. f. 1 et 2. (v. v.)

Sect. II. CORONILLA. Tourn. inst. t. 419. Desv. journ. bot. 3. p. 119.
t. 4. f. 3.

Legumen compressiusculum evidenter secedens; petalorum unguis vix calyce longiores.

* *Floribus flavis.*

2. C. JUNCEA (L. sp. 1047.) fruticosa glabra, stipulis minimis, foliolis 3-7 linearis-oblongis obtusis subcarnosis, infimis à caule remotis, umbellis 5-7-floris. ♂ in collibus et dumetis Niceæ, Galloprovinciæ. — Fl. fr. 4. p. 606. — Barr. ic. t. 133. J. Bauh. hist. 1. p. 2. p. 383. f. 2. Rami juncei teretes subnudi. (v. v. DC.)

3. C. STIPULARIS (Lam. dict. 2. p. 120.) fruticosa glabra, stipulis subrotundis maximis deciduis, foliolis 7-9 obovatis mucronulatis glaucis, infimis à caule

- remotis, umbellis 6-8-floris. ♂ propè Niceam (D. Stire). — C. Valentina bot. mag. t. 185. (v. s.)
4. *C. GLAUCÀ* (L. sp. 1047.) fruticosa glabra, stipulis parvis lanceolatis, foliolis 5-7 obovatis obtusissimis glaucis, infimis à caule remotis, umbellis 7-8-floris. ♂ in maritimis prov. austral. præsertim in Galliâ Narbonensi et Occitanîâ. — Fl. fr. 4. p. 607. Curt. bot. mag. t. 13. (v. s.)
5. *C. MINIMA* (L. sp. 1048.) suffruticosa diffusa glabra, stipulis concretis oppositifoliis bidentatis, summis majusculis membranaceis deciduis, foliolis 7-11 ovatis obtusis retusive, infimis à caule remotis, umbellis 7-8-floris. ♀ ♂ in arenosis aridis submontanae Galliæ austro-orientalis, propè Falaise ex cl. de Brébisson. — Fl. fr. 4. p. 607. — J. Bauh. hist. 2. p. 351. f. 2. (v. v.)
6. *C. OORONATA* (L. sp. 1048.) suffruticosa suberecta aut ascendens glabra, stipulis concretis oppositifoliis bidentatis parvis, foliolis 5-9 obovatis submucronatis glaucis, infimis cauli approximatis, umbellis 8-10-floris. ♂ ♀ in aridis prov. austral., agri Ligericini, Arverniæ. — Fl. fr. 4. p. 608. — Clus. hist. 1. p. 98. f. 2. (v. v.)
7. *C. MONTANA* (Scop. carn. ed. 2. n. 912. t. 44.) herbacea erecta glabra, stipulis concretis oppositifoliis oblongis emarginatis deciduis, foliolis 7 ovatis mucronatis subglaucis, inferioribus cauli approximatis, umbellis 15-20-floris. ♀ in Jurasso. — Fl. fr. 5. p. 533. — Riv. tetrap. t. 207. (v. s.)

** *Floribus purpurascensibus aut albis.*

8. *C. VARIA* (L. sp. 1048.) herbacea diffusa glabra, stipulis minimis acutis, foliolis 9-13 oblongis mucronatis, infimis cauli approximatis, umbellis 16-20-floris, leguminibus erectis. ♀ in pratis et sterilibus. — Fl. fr. 4. p. 608. — Clus. hist. 2. p. 237. f. 2. (v. v.)

XXVII. ASTROLOBIUM. *Desv. journ. bot.* 3. p. 121. t. 4. f. 10. — *Ornithoppi* sp. L.


Calyx ebracteatus tubulosus subæqualiter 5-dentatus; *corollæ carina* minima compressa; *stamina diadelpha* (9 et 1); *legumen teretiusculum* articulis plurimis 1-spermis indehiscentibus cylindraceis utrinque truncatis constans. — Herbæ.

1. *A. EBRACTEATUM* (DC. prod. 2. p. 311.) pedunculis folio subæqualibus apice ebracteatis, stipulis subnullis, foliis omnibus pinnatis, foliolis elliptico-oblongis multijugis æqualibus, infimis à caule distantibus, leguminibus teretibus arcuatis. (I) in Galliæ occidentalis australisque sabulosis passim. — *Ornithopus ebracteatus* Brot. Ius. 2. p. 159. Fl. fr. 5. p. 582. — O. durus. Fl. fr. 4. p. 603. non Cav. — Dalech. hist. 1. p. 487. f. 1. (v. v.)
2. *A. SCORPIOIDES* (DC. l. c.) pedunculis folio longioribus ebracteatis, stipulis concretis vaginantibus, foliis 3-foliolatis, foliolis infimis minimis subrotundis cauli approximatis, terminali maximo ovali, leguminibus subincurvis subnodosis. (I) in arvis et segetibus Galliæ australis ex Niceâ ad Aginnum. — *Ornith. scorpioides* L. sp. 1049. Cav. ic. t. 37. Fl. fr. 4. p. 603. (v. v.)

XXVIII. ORNITHOPUS. *Desv. journ.* 3. p. 121. t. 5. f. 14. — *Ornithoppi* sp. L. gen. n. 884.

Calyx bracteatus tubulosus subæqualiter 5-dentatus; *corollæ carina* minima compressa; *stamina diadelpha* (9 et 1); *legumen compressum* articulis plurimis monospermis indehiscentibus utrinque æqualiter truncatis ad margines parallelis constans. — Herbæ.

1. *O. COMPRESSUS* (L. sp. 1049.) foliis villosis pedunculis subsuperantibus, foliolis lanceolatis acuminatis subsessilibus, leguminibus compressis rugosis pubescentibus apice rostro adunco articulo ultimo longiore instructis, articulis ovalibus, calyce hirsuto 5-fido corollâ vix duplò breviore. (I) in arenosis provinciarum australium. — Fl. fr. 4. p. 603. Flores flavi. (v. v.)
2. *O. ROSCUS* (Dufour in ann. sc. nat. t. 5. p. 84.) foliis pedunculo brevio-



ribus villosis, foliolis lanceolatis acuminatis subsessilibus, leguminibus compressis rugosis glabris apice rostro recto articulo ultimo breviore instructis, articulis rotundis, calyce hirsuto quinquefido corollâ duplò breviore. (I) *in sabulosis agri Syrtici propè Mont-de-Marsan.* — *O. perpusillus* & *intermedius.* DC. prod. 2. p. 312; non Roth. An *O. sativus* Brot. lusit. 2. p. 160? Fl. rosei. (v. s.)

3. *O. PERPUSILLUS* (L. sp. 1049.) *pedunculis folia superantibus subæquanti-busve, foliis villosis, foliolis subsessilibus ovatis obtusis aut vix mucronatis, leguminibus vix compressis hirsutis rostro recto brevissimo terminatis, articulis rotundis, calyce hirsuto 5-dentato, dentibus brevibus tubo quintuplò brevioribus.* (I) *in sabulosis umbrosis passim.* — Fl. fr. 4. p. 602. eng. bot. t. 369. Flores ex rubro albo et paululum flavo mixti. (v. v.)

& intermedius (Roth. germ. 2. p. 2. p. 215. non DC. prod.) *major, cau-libus vix pubescens, foliis subpetiolatis, bracteis leguminibus majo-ribus.* (Roth. 1. c.)

XXIX. HIPPOCREPIS. L. gen. n. 885.

Calyx 5-sfidus, lobis æqualibus acutis; *corolla* carinâ bicipiti; *sta-mina diadelpha* (9 et 1); *stylus* filiformis acutus; *legumen* constans articulis plurimis 1-spermis in ferri equini formam curvis, undè legumen ad latus superiorius sinubus plurimis rotundatis quasi incisum videtur; *semina* cylindracea aut compressa oblonga ad partem articuli cujusque medium adfixa curva, umbilico in medio curvaturæ.

§. 1. *Radice perenni, leguminibus sinuatis nempè articulis tantum curvis et sinus latè apertos efficientibus.*

1. *H. COMOSA* (L. sp. 1050.) *glanduloso-pubescentis, caulinis herbaceis diffusis, pedunculis folio longioribus apice umbelliferis, leguminibus subarcuatis, articulis 2-3 ad semina puberulis.* (I) *in cretaceis et calcareis vulgaris.* — Fl. fr. 4. p. 605. — Garid. aix. t. 34. (v. v.)

& scorpioides, legum. angustioribus, articulis ad semina glanduloso-hispidis. — In Galloprovinc. et Occitan. *H. scorpioides* Req. in h. DC. (v. s.)

§. 2. *Radice annuâ, leguminibus orbiculariter incisis, nempè arti-culis sinus subrotundos angustè apertos efficientibus.*

2. *H. MULTISILIQUOSA* (L. sp. 1030.) *pedunculis folio paulò brevioribus 2-4-floris, leguminibus glaberrimis circulariter incurvis.* (I) *in provinciis australibus indicata sed forsitan per confusionem cum H. ciliatâ.* — Fl. fr. 4. p. 605. — Ferrum equinum polyceratum. Col. ephr. p. 300. ic. (v. s. c.)

3. *H. VELUTINA* (Req. in h. DC.) *pedunculis folio paulò brevioribus 1-2-floris, leguminibus pube adpressâ velutinis ad semina glanduloso-hirtis circulariter incurvis, sinus extremitatis in cornua productis.* (I) *circà Monspelium propè Pont-Juvenal reperiit cl. Requien.* (v. s.)

4. *H. UNISILIQUOSA* (L. sp. 1050.) *floribus axillaribus subsessilibus solitariis, leguminibus subincurvis glabris aut in parte mediâ articulorum puberulo-hirtis.* (I) *in apricis lapidosis provinc. australium.* — Fl. fr. 4. p. 604. Lam. ill. t. 630. f. 3. (v. v.)

5. *H. CILIATA* (Wild. mag. nat. ges. Berol. 1808. p. 173.) *pedunculis 4-2-floris folio subbrevioribus, leguminibus arcuatis ad semina glanduloso-hispidis ad alterum latus subciliatis.* (I) *in Galloprovinciâ circâ Avenionem et proba-biliter in omnibus provinciis australibus.* (v. v. D.)

XXX. SECURIGERA. DC. fl. fr. 4. p. 609.

Calyx brevis bilabiatus, labio inf. 3-partito, super. bidentato; petalorum unguis calyce sublongiores; carina acuta; *stamina diadelpha* (9 et 1); *legumen* compresso-planum, suturis prominulis, inter se-

mina isthmis notatum, sed ob suturas prominulas non articulatum, lineare in rostrum longum apice desinens; semina 8-10 compressa parallelogramma.

1. *S. CORONILLA* (DC. l. c.) (I) in arvis Niceæ, Corsicæ. — *Coronilla Securidaca* L. sp. 1048. — Gærtn. fruct. 2. t. 153. f. 3. (v. v.)

Subtrib. II. EUHEDYSAREÆ DC. prod. 2. p. 313.

Flores racemosi. Legumina compressa.

- XXXI. *HEDYSARUM*. Jaum. journ. bot. 3. p. 61. excl. spec. DC. prod. 2. p. 340.

Calyx 5-fidus laciniis linearis-subulatis subæqualibus; corolla vexillo amplio, carinâ obliquè truncatâ, alis carinâ multò brevioribus; stamna diadelpha (9 et 1); genitalium fasciculus abruptè infractus; legumen constans articulis plurimis compressis monospermis orbiculatis lenticularibusve regularibus medio inter se adnexis et ideò ad utramque suturam convexis.

Sect. I. ECHINOLOBIUM. DC. l. c.

Leguminum articuli in disco villosi costati muricati aut glochidiati.

1. *H. CORONARIUM* (L. sp. 1058.) caule diffuso, foliolis 3-5-jugis ellipticis ant subrotundis subtus et margine pubescens, spicis ovatis confertis, alis calyce duplò longioribus, leguminis articulis 2-5 orbiculatis aculeatis, glabris. ♀ ex Italiæ pratis indigenum, in hortis sæpè cultum. — Fl. fr. 4. p. 610. — Dod. pempt. 549. (v. v. c.)
2. *H. HUMILE* (L. sp. 1058.) caule erectinculo, foliolis 7-9-jugis linearis-cuneiformibus obtusis, floribus racemosis, alis carinâ dimidiò brevioribus, vexillo carinâ breviore, leguminis articulis 2-3 orbiculatis junioribus tomentosis tuberculato-muricatis et villosis. ♀ in Cebennis, circâ Monspelium ex Gonan, Aquas-Sextias ex Ger. — Fl. fr. 4. p. 610. — J. Bauh. hist. 2. p. 336. f. 1. (v. v. DC.)
3. *H. SPINOSISSIMUM* (L. sp. 1058. excl. syn.) caule diffuso, foliolis 5-7-jugis obovatis aut oblongis emarginatis glabriusculis, spicis capitatis paucifloris, alis carinâ $\frac{1}{3}$ brevioribus, vexillo carinam æquante, leguminis articulis 2-3 orbiculatis pubescens, aculeatis, aculeis apice hamulosis. (I) in arenosis maritimis Galloprovincia, Niceæ. — Fl. fr. 5. p. 588. (v. v. D.)
4. *H. CAPITATUM* (Desf. atl. 2. p. 177. non Burm.) caule decumbente, foliolis 6-7-jugis oblongis acutis, spicis ovatis laxis, alis calyce duplò longioribus, leguminis articulis orbiculatis aculeatis villosis. (I) ex Corsicâ acceptum missit cl. Solier. — Sims. hot. mag. t. 1251. *H. Corsicum* Balb. (v. s.)


Sect. II. LEIOLOBIUM. DC. l. c.

Leguminum articuli læves nec echinati nec pilosi; calycis laciniæ corollâ breviore.

5. *H. OSCURUM* (L. sp. 1057.) caule erecto, foliolis ovatis glabris 5-9-jugis, stipulis etiam summis concretis oppositifoliis vaginantibus, bracteis pedicello longioribus, leguminibus pendulis glaberrimis. ♀ in glareosis ad torrentes editiorum Alpium Delphin. — Fl. fr. 4. p. 610. — Hall. enum. 1. t. 14. hist. 2. t. 12. *H. controversum* Crantz aust. 425. t. 2. f. 3. (v. v. in Pedem.)

- XXXII. *ONOBRYCHIS*. Tourn. inst. t. 211. Gærtn. fruct. 2. t. 148. DC. fl. fr. 4. p. 511.

Calyx 5-fidus, laciniis subulatis subæqualibus; corolla papilionacea; carina quasi obliquè truncata; alæ breves; stamna diadelpha (9 et 1); legumen sessile 1-articulatum, compressum 1-spermum indehiscens subcoriaceum echinatum cristatum aut alatum, latere superiore crassiore recto, inferiore convexo tenuiore.



Sect. I. EUBRYCHIS. DC. prod. 2. p. 344.

Legumen obliquum in disco rugosum aculeatumve, dorso dentatum aut interrupte cristatum.

1. *O. SATIVA* (Lam. fl. fr. 2. p. 652.) caule erectiunculo, stipulis saepius distinctis, foliolis cuneato-lanceolatis mucronatis glabris, spicis elongatis, carinâ vexillo breviore, alis calyce brevioribus, leguminis pubescens dorso denticulato, lateribus rugosis subaculeatis. ♀ in cretaceis, siccis, colibus. — Fl. fr. 4. p. 611. — Jacq. aust. t. 352. (v. v.)
2. *O. MONTANA* (DC. fl. fr. 4. p. 611.) caule subdecumbente, stipulis coalitis oppositifoliis, foliolis cuneato-lanceolatis mucronatis glabris, spicis abbreviatis, carinâ vexillo longiore, alis calyce brevioribus, leguminis dorso denticulato, lateribus rugosis pubescentibus. ♀ in Alpium et Pyrenæorum pratis elatis. — An prioris varietas? (v. v.)
3. *O. SUPINA* (DC. fl. fr. 5. p. 612.) caule diffuso subhirsuto, foliolis oblongis vix mucronulatis, spicis ovato-oblongis pedunculatis, alis calyce brevioribus, carinâ calyce breviore, leguminis villosi dorso cristato dentato, discis rugosis subaculeatis. ♀ in pratis et ruderatis Delph., Galloprov. super., Occitanie, Cebenn., Pyren. orient. et Santoniæ (Des Moulins). (v. v.)
4. *O. SAXATILIS* (All. ped. n. 1191. t. 19. f. 1.) caule ascendente, foliolis linearibus mucronatis, spicis cylindricis pedunculatis, alis calyce longioribus, carinâ vexillo paulò breviore, leguminis glabri dorso cristato integro, lateribus rugosis edentulis. ♀ in apricis, collibus, petrosis Galloprovinciæ, Delphinatus australis, Niceæ. — Fl. fr. 4. p. 612. Variat foliolis glabris et villososerriceis, leguminibus glabris et tenuissimè pubescentibus. (v. v.)
5. *O. CAPUT-GALLI* (Lam. fl. fr. 2. p. 651.) caule erecto aut diffuso, foliolis oblongis aut cuneato-obovatis mucronatis pubescentibus, spicis paucifloris, alis calyce sublongioribus, carinâ vexillo paulò breviore, leguminibus subpubescentibus undique aculeatissimis. ♀ in Galliae australis apricis asperis. — Fl. fr. 4. p. 613. — Lob. ic. 2. p. 81. f. 1. (v. v.)

6. *O. CRISTA-GALLI* (Lam. fl. fr. 2. p. 652.) caule supino, foliolis cuneatis oblongis aut obovatis obtusis retusive pubescentibus, spicis paucifloris, calycibus corollæ subæqualibus, alis et carinâ vexillum subæquantibus, leguminis glabri dorso cristato, cristâ in lacinias planas oblongas dentatas partitâ, disco rugoso subaculeato. (1) in sterilibus Niceæ ex All., Galloprovinc. austral. ex Gerard. — Fl. fr. 4. p. 613. Gærtn. fruct. 2. t. 148. (v. v. c.)

Trib. IV. *VICIEÆ*. Bronn. diss. p. 331. DC. prod. 2. p. 353.
leg. mem. VII.

Corolla papilionacea. Stam. diadelpha (9 et 1). Legumen continuum. Cotyledones crassæ farinaceæ per germinationem immutatae subterrâ intra spermodermium inclusæ remanentes. Radicula inflexo-curva. — Folia abruptè-pinnata (excepto Cicer), petiolo communia apice in setulam cirrhumve desinente basi super caulem non articulato.

XXXIII. *CICER*. Tourn. inst. 389. t. 210. f. 2. Linn. gen. n. 1189. Gærtn. fruct. 2. p. 326. t. 151.

Calyx 5-lobus, tubo ad latus superiorius plus minus basi gibbo, lobis acuminatis 2-4 superioribus vexillo incumbentibus; legumen turgidum dispermum, semina gibbosa mucronata.

1. *C. ARRIETINUM* (L. sp. 1040.) foliis impari-pinnatis, foliolis ovatis serratis æqualibus, stipulis lanceolatis subdenticulatis, calycis vix gibbosi lacinias alarum longitudine. (1) Cultum præcipue in Galliâ australi. — Fl. fr. 4. p. 600. — Cam. epit. 204. ic. (v. v.)

XXXIV. FABA. *Tourn. inst. t. 222. DC. fl. fr. 4. p. 598.* — Vicia sp. L.

Omnia Viciae; sed legumen grande coriaceum subtumidum; seminibus oblongis; hilo terminali.

1. **F. VULGARIS** (*Mœnch. meth. p. 130.*) foliis crassis, foliolis 2-5 ovalibus mucronatis, stipulis semisagittatis ovalibus, cirrhis subnullis, dentibus calycinis sublinearibus. (I) è finitimus Caspii maris orta et in hortis et agris culta. — *Fl. fr. 4. p. 598.* *Vicia Faba. L. sp. 1039.* *Potamogeton bifolium Lapeyr.* (v. v.)

XXXV. VICIA. *Tourn. inst. t. 221. Juss. gen. 360. DC. fl. fr. 4. p. 589.*

Calyx subulosus, 5-fidus aut 5-dentatus, dentibus 2 superioribus brevioribus; corolla papilionacea; stylus filiformis angulum ferè rectum cum ovario conficiens, supernè et infrà apicem subtus villosus; legumen oblongum, 1-loculare, polyspermum; semina hilo laterali ovali aut linearie.

§. I. *Floribus pedunculatis.*

1. **V. PISIFORMIS** (*L. sp. 1034.*) glaberrima, foliis 4-jugis, foliolis ovato-cordatis obtusis reticulato-venosis distantibus, infimis sessilibus, stipulis semisagittatis dentatis parvis, pedunculis multifloris longitudine folii, dentibus calycinis subæqualibus tubo brevioribus, leguminibus oblongis compressis, seminibus globosis. $\frac{1}{2}$ in sylvaticis Alsatiæ, Burgundia ex Dur., Galloprovinciæ ex Ger. — *Fl. fr. 4. p. 589.* — *Clus. hist. 2. p. 229 f. 1. Fl. ochroleuci.* (v. s.)
2. **V. DUMETORUM** (*L. sp. 1035.*) glabriuscula, foliolis reflexis ovato-lanceolatis mucronulatis reticulato-venosis alternis, stipulis semisagittatis dentatis, pedunculis multifloris folii longitudine, laciniis calycinis brevissimis subæqualibus, stylis apice barbatis, leguminibus oblongis compressis, seminibus subrotundis. $\frac{1}{2}$ in sylvis et dumetis Galliæ orientalis passim, Monspelii ex Gou. — *Fl. fr. 4. p. 590.* — *J. Bauh. 2. p. 316 f. 1. Corollæ violaceæ.* (v. s.)
3. **V. SYLVATICA** (*L. sp. 1035.*) glabra, foliolis numerosis alternis vel oppositis elliptico-oblongis mucronulatis tenuissimè reticulato-venosis, stipulis semi-sagittato-reniformibus setaceo-dentatis, pedunculis folio longioribus multifloris, laciniis calycinis tubi vix longitudine, stylis apice villosalis, leguminibus oblongo-linearibus compressis apice inenervis, seminibus globosis. $\frac{1}{2}$ in sylvis montosis Corsicae, Galloprovinciæ, Occitaniæ. — *Fl. fr. 4. p. 590.* — Hall. helv. t. 12. f. 2. *Fl. albido-violacei.* (v. s.)
4. **V. CASSUBICA** (*L. sp. 1035.*) foliolis oppositis alternisve numerosis ellipticis mucronatis subglabris, nervis numerosissimis firmis, stipulis inferioribus semi-sagittato-lanceolatis, superioribus linearibus subintegris, pedunculis multifloris folium æquantibus, racemis confertis secundis, dentibus calycinis inæqualibus tubo brevioribus, stylis apice villosi, leguminibus coriaceis vix reticulatis oblongis brevibus compressis glabriusculis, seminibus globosis. $\frac{1}{2}$ in collibus herbosis.
- a. ***glabriuscula*** (*Ser. in DC. prod. 2. p. 356.*) caule piloso, petiolis cirrhosis villosis, foliolis glabris. — *V. multiflora Pollich?* *DC. fl. fr. 5. p. 577.* *V. cassubica Sturm. deutsch. 1. fasc. 31.* — in Andegaviâ. (v. s.)
- b. ***Orobus*** (*Ser. 1. c.*) tota pilosa, foliolis pilosis vel ciliatis, cirrhis nullis vel subfoliaceis. — *V. Orobus. Fl. fr. 5. p. 577.* *Orobus sylvaticus. Fl. fr. 4. p. 586.* *O. aristatus Lapeyr. supp.* — In pratis moutosis Arverniæ, Cebenn., Pyren. (v. v. DC.)
5. **V. GRACCA** (*L. sp. 1095.*) caulinis ramosis, foliis apice cirrhosis, foliolis numerosis oblongis alternis oppositisque puberulis mucronatis, nervis subparallelis simpliciuseulis, stipulis semi-sagittato-linearibus, pedunculis multifloris folium æquantibus vel superantibus, racemis confertis secundis, dentibus calycinis inæqualibus, superioribus brevissimis inferioribus tubo brevioribus, stylis apice pilosis, leguminibus oblongis coriaceis compressis

Major
minor



- glabris, seminibus globosis. $\frac{1}{2}$ in arvis. — Fl. fr. 4. p. 591. — Riv. tetrap. t. 50. Fl. violacei. (v. v.)
6. V. GERARDI (Jacq. fl. austr. t. 229? DC. fl. fr. 4. p. 591. excl. syn.) caulinis simpliciusculis, foliis apice cirrhosis, foliolis numerosis oblongo-lanceolatis alternis oppositis sublanatis mucronatis, nervis subparallelis simpliciusculis, stipulis semisagittato-linearibus, pedunculis multifloris folio sublongioribus, racemis confertis secundis, dentibus calycinis inaequalibus, inferioribus tubo sublongioribus pilosis, stylis apice pilosis, leguminibus oblongis coriaceis compressis glabris. $\frac{1}{2}$ in pascuis Galloprovinciae, Monsp. ex Bentham, agri Ruscinonensis, Aurelianensis ex St.-Hil., Andegaviae ex Bast. — Fl. violacei. An var. V. craccae? (v. s.)
7. V. PSEUDOCRACCA (Bert. pl. rar. 58.) pubescens, caule basi ramoso diffuso, foliolis 8-12 oblongis obtusis mucronatis, stipulis semisagittato-linearibus otrinque acuminatis, pedunculis subsexfloris flexuosis folio longioribus, floribus secundis laxis deflexis, dentibus calycinis inaequalibus linearibus acutis tubo brevioribus, stylis apice villosis, leguminibus ellipticis brevibus glabris. (1) in Corsicâ reperiit Ph. Thomas. — Fl. cærulei. (v. s.)
8. V. TENUIFOLIA (Roth. germ. 2. p. 183? Ser. in DC. prod. 2. p. 358.) caule erecto flexuoso, foliis cirrhosis, foliolis numerosis linearibus alternis oppositis mucronatis subtus adpressè villosis, stipulis inferioribus semisagittato-linearibus, superioribus lineari-setaceis, pedunculis rigidis folio longioribus, racemis confertis, dentibus calycinis inaequalibus, inferioribus tubi longitudine, stylis apice pilosis, legum. lanceolatis. $\frac{1}{2}$ in Corsicâ, Pyr. orient., Cebennis. — Fl. fr. 5. p. 577. Sturm. deutsch. 1. fasc. 31. (v. s.)
9. V. SYRTICA (Duby mss.) caule flexuoso striato, foliis cirrhosis, foliolis 8-12 distantibus glabriusculis linearibus apice retusis mucronatis, stipulis semisagittatis sublaciniatis, pedicellis in axillis 2, uno brevi 1-floro, altero 3-4-floro folio vix dimidiò breviore, dentibus calycinis linearibus æqualibus longitudine tubi, stylis apice barbatis. (1) inter segetes circâ Aquas Tarbellicas (Dax). — Fl. flavi. (v. v. D.)
10. V. ONOBRYCHIOIDES (L. sp. 1036.) caulinis striatis, cirrhis simpliciusculis, foliolis numerosis linearibus alternis oppositis obtusis mucronulatisque, nervis subparallelis, stipulis semisagittato-linearibus dentatis, pedunculis multifloris longissimis, floribus distantibus, dentibus calycinis lanceolatis tubi longitudine, stylis clavatis apice barbatis, leguminibus lanceolatis. (1) in arvis montium provinc. australium. — Fl. fr. 4. p. 591. All. ped. t. 42. f. 1. Fl. purpurei. (v. v.)
- β . angustissima (Ser. in DC. prod. 2. p. 358.) foliis setaceis brevioribus. Circâ Monspelium. (v. s.)
11. V. ATROPURPUREA (Desf. fl. atl. 2. p. 164.) villosa, caulinis tetragonis, cirrhis simpliciusculis, foliolis oblongis mucronatis numerosis oppositis alternisque, stipulis semisagittato-lanceolatis latis basi sèpè dentatis, pedunculis multifloris folii vix longitudine, floribus secundis approximatis, dentibus calycinis setaceis pilosis tubo longioribus, stylis elongatis subclavatis apice barbatis, leguminibus oblongis compressis hirsutissimis, seminibus globosis subvelutinis. (1) in Corsicâ, insulis Stæchadum, Galloprovinciâ propè Telenom et St. Chinian. — Fl. fr. 4. p. 592. Vent. hort. cels. t. 84. Fl. purpurei. (v. s.)
12. V. PERENNIS (DC. cat. hort. monsp. 155. et fl. fr. 5. p. 578.) villosa, caulinis tetragonis, cirrhis simpliciusculis, foliolis oblongo-linearibus mucronatis villosis oppositis alternisque, stipulis semisagittato-lanceolatis basi sèpè dentatis, pedunculis paucifloris folii longitudine, floribus secundis laxiusculis, dentibus calycinis setaceis pilosis tubi longitudine, stylis elongatis subclavatis apice barbatis, leguminibus oblongis compressis pubescentibus, seminibus orbiculato-compressis. $\frac{1}{2}$ in messibus agri Ruscinouensis. — Fl. purpurei. An satis à præcedente distincta? (v. v. DC.)

13. *V. ARGENTEA* (Lapeyr. abr. 417.) canescens, caulis tetragonis, foliis cinerreo-argenteis cirro destitutis, foliolis oblongo-linearibus mucronatis, stipulis semisagittato-lanceolatis, pedunculis multifloris folio sublongioribus, floribus secundis laxiusculis, laciis calycinis subæqualibus longitudine tubi, stylis elongatis subclavatis apice barbatis, leguminibus oblongis compressis tomentosis. $\frac{1}{2}$ in Pyrenæis editoribus Hispaniæ conterminis. — Fl. fr. 5. p. 576. Fl. subrosei, carina apice nigro maculata. (v. s.)
14. *V. DISPERMA* (DC. cat. monsp. 154.) subpila, caulis tetragonis, cirris simpliciunculis, foliis 8-10-jugis, foliolis linear-oblongis mucronatis, stipulis semisagittatis integris, pedunculis 2-3-floris folio brevioribus, floribus minimis, dentibus calycinis subæqualibus lanceolato-subulatis tubi longitudine et corollam subæquantibus, stylis apice villosis, leguminibus oblongis compressis glabris dispermis, seminibus subglobosis. (1) in petrosis sterilibus Corsicæ, Telonis ex Lois., Monspeli, agri Ruscinonensis ex Lapeyr. — Fl. fr. 5. p. 578. Fl. parvi cærulescentes. (v. s.)

§. 2. *Floribus subsessilibus.*


15. *V. SATIVA* (L. sp. 1037.) foliis cirrhosis, foliolis 10-12 obovato-retusis vel oblongo-retusis mucronulatis pilosis vel glabriusculis, stipulis semisagittato-dentatis, floribus subgeminis sessilibus, calycibus cylindricis, laciis lanceolato-linearibus subæqualibus parallelis tubi longitudine, stylis apice barbatis, leguminibus compressis subtorulosis oblongis erectiusculis, seminibus subglobosis subvelutiniis. (2) inter segetes Europæ. Species valde polymorpha. — Fl. fr. 4. p. 593. Fl. purpurei.
- a. obovata* (Ser.) foliolis obovato-cordatis pilosis, leguminibus pubescensibus. — *V. sativa* Hoppe. in Sturm. deutschl. fl. 1. fasc. 31. icon. (v. v.)
 - β. segetalis* (Ser.) foliolis oblongis truncato-acuminatis pilosis, leguminibus pubescensibus. — *V. segetalis* Thuill. fl. par. ed. 2. p. 367. et Hoppe in Sturm. l. c. icon. Smith engl. hot. t. 334. Fl. fr. 5. p. 579. (v. v.)
 - γ. angustifolia* (Ser.) foliolis linearibus longissimis subretusis mucronulatis, seminibus subglobosis. — *V. angustifolia* Roth. germ. 310. Fl. fr. 5. p. 579. (v. v.)

16. *V. PEREGRINA* (L. sp. 1038.) foliis cirrhosis, foliolis 10-12 linearibus truncatis mucronatisque, stipulis semisagittato-linearibus integris, floribus solitariis pedunculatis, calycibus campanulatis, laciis lanceolato-linearibus subæqualibus divergentibus tubi longitudine, stylis apice barbatis, leguminibus compressis lanceolatis reticulatis inclinatis latis puberulis, seminibus subglobosis. (1) in siccis provinciarum australium. — Fl. fr. 5. p. 580. — Pluckn. t. 233. f. 6. Fl. purpureo-violacei. (v. v.)


17. *V. AMPHICARPA* (Dorth. journ. phys. 35. p. 131.) foliis subcirrhosis, foliolis inferioribus obcordatis mucronatis, superioribus linearibus retusis mucronatisque, stipulis semi-sagittatis integris vel dentatis, floribus solitariis subsessilibus, calycibus cylindricis, laciis æqualibus linearibus parallelis tubo brevioribus, stylis apice barbatis, leguminibus puberulis, superioribus linear-oblongis inclinatis, inferioribus subterraneis ovatis compressis brevibus. (1) in aridis provinc. australiorum rariis. — Fl. fr. 4. p. 594. — J. Bauh. hist. 2. p. 323. f. 1 et 2. Fl. purpurei. (v. v. DC.)

18. *V. PYRENAICA* (Pourr. act. tol. 3. p. 333.) foliis subcirrhosis, foliolis obcordatis mucronatis, stipulis semisagittatis integris vel denticulatis, floribus solitariis sessilibus, calycibus subcampanulatis, laciis inæqualibus lanceolatis subpatentibus tubo brevioribus, stylis apice barbatis, leguminibus oblongo-linearibus glabriusculis inclinatis. $\frac{1}{2}$ in pratis Pyrenæorum editorum. — Fl. fr. 4. p. 595 excl. syn. J. Bauh. Ic. rar. p. 10. t. 33. *V. Fagonii* Lapeyr. abr. 419. Fl. purpurei. (v. v.)

19. *V. LATIFLOROIDES* (L. sp. 1037.) subvillosa, caulis ramosis, foliis subcirrhosis, foliolis 4-6 obovatis retusis mucronatis, superioribus oblongis linearibus truncatis mucronulatis, stipulis semisagittatis integris, floribus so-









- litariis sessilibus, calycibus cylindricis, laciinis linearibus subæqualibus parallelis tubo brevioribus, stylis apice barbatis, leguminibus compressis glabriusculis rugositis inclinati, seminibus globosis verrucoso-punctatis. \mathcal{L} (1) in arenosis Galliae occidentalis, mediæ, australisque passim. — Fl. fr. 4. p. 594. *Ervum soloniense* L. sp. 1040. Lam. ill. t. 634. f. 2. Fl. violacei. (v. v.)
20. *V. LUTEA* (L. sp. 1037.) pilosa, canibus ramosis, foliis cirrhosis, foliolis oblongo-ovatis, stipulis brevissimis subsemisagittatis linearibusque basi denticulatis, floribus solitariis subsessilibus, laciinis calycinis inæqualibus divergentibus, superioribus brevibus, inferioribus tubo brevioribus, vexillo emarginato glabro, stylis apice barbatis, leguminibus compressis lanceolato-oblongis pilosis, seminibus subglobosis. (1) ad vias et inter segetes Galliae occidentalis, mediæ, et australis. — Fl. fr. 4. p. 596. — Moris. s. 2. t. 21. n. 5. Fl. lutei. (v. v.)
- $\beta.$ *pallidiflora* (Ser.) magis hirsuta, foliolis angustioribus, floribus albidis. — *V. hirta* Balb. Fl. fr. 5. p. 581. (v. v.)
21. *V. HYBRIDA* (L. sp. 1037.) pilosa, canibus ramosis, foliis cirrhosis, foliolis obovato-cordatis mucronulatis, stipulis semisagittatis subdentatis, floribus solitariis subsessilibus subdeflexis, laciinis calycinis angustis subæqualibus longitudine tubi, vexillo emarginato piloso, stylis apice barbatis, leguminibus lanceolato-oblongis compressis pilosis. (1) ad vias in Gallia occidentali, mediæ et australi. — Fl. fr. 4. p. 596. eng. bot. t. 482. Fl. lutei rubro striati. (v. v.)
22. *V. SEPIUM* (L. sp. 1038.) caule subramoso, foliis cirrhosis, foliolis 10-12 ovato-retusis submucronulatis ciliatis, stipulis semisagittatis, inferioribus dentatis, floribus 3-4 inclinatis, calyce obliquè campanulato, dentibus inæqualibus supernè deflexis tubo brevioribus, stylis apice barbatis, leguminibus lanceolato-oblongis inclinatis subciliatis, seminibus globosis. \mathcal{L} in umbrosis. — Fl. fr. 4. p. 596. — J. Bauh. 2. p. 313. f. 2. Fl. sordide violacei. (v. v.)
- $\beta.$ *ochroleuca* (Bast.) floribus ochroleucis. — in Pictaviâ. — Fl. fr. 5. p. 581 (v. s.)
23. *V. PANONICA* (Jacq. fl. aust. t. 34.) pilosa, caule simplici, foliis cirrhosis, foliolis oblongis numerosis, stipulis lanceolatis basi maculatis, floribus 2-4 inclinatis subsessilibus, laciinis calycinis setaceis subæqualibus tubum æquantibus superantibusve, vexillo emarginato piloso, stylis apice barbatis, leguminibus lanceolato-oblongis compressis pilosis deflexis. (1) \mathcal{L} in messibus Arverniae, Occitaniae, Bayonæ ex Lois. — *V. purpurascens* DC. cat. monsp. 155. Fl. fr. 5. p. 580. Fl. purpurei. (v. v. DC.)
24. *V. NARBONENSIS* (L. sp. 1038.) caule ascendente tetragono striato quadrifariam piloso, foliis cirrhosis, foliolis ovatis serratis integris, stipulis semisagittato-dentatis, inferioribus integris, floribus 3-4 breviter pedicellatis, calycibus campanulatis, laciinis ovatis trinerviis lateralibus supernè inflexis, stylis apice barbatis, leguminibus oblongis compressis glabris, suturis serrato-ciliatis, seminibus subglobosis. (1) in Cébennis, agro Ruscinonensi, Narbonensi, Monspelieusi, Niceensi; circè Dax ex Thore, in Arvernâ ex Delarbre. — Fl. fr. 4. p. 597. — Jacq. aust. app. t. 8. Fl. atropurpurei. Folia crassa. (v. s.)
- XXXVI. *ERVUM*: L. gen. n. 874. DC. fl. fr. 4. p. 598.
- Calyx 5-fidus, laciinis linearibus acutis corollam subæquantibus; stigma glabrum; legumen oblongum 2-4-spermum.
- Sect. 1. *LENS*. Ser. in DC. prod. 2. p. 366.
- Legumen subiuflatum lato-oblongum, 2-spermum.
1. *E. LENS* (L. sp. 1039.) caule ramoso, foliolis oblongis suboctonis glabriusculis, stipulis lanceolatis ciliatis, cirrhis subsimplicibus, pedunculus 2-3-floris folium æquantibus, leguminibus latis brevibus subtruncatis glabris,

- seminibus compressis. (I) in arvis inter segetes. — Fl. fr. 4. p. 599. — Fuchs. hist. 859. ic. (v. v.)
2. E. HIRSUTUM (L. sp. 1039.) foliis cirrhosis, foliolis linearibus obtusis mucronulatis, stipulis semisagittatis angustis, pedunculis 3-6-floris folio brevioribus, laciinis calycinis lanceolato-linearibus æqualibus tubo longioribus, leguminibus oblongis compressis subtruncatis hirsutis nutantibus, seminibus globosis variegatis. (I) in arvis Galliae mediæ et australis. — Fl. fr. 4. p. 599. — J. Bauh. 2. p. 315. f. 1. (v. v.)

Sect. II. ERVILIA. Ser. I. c.

Legumen subinflatum oblongo-lineare 4-6-spermum.

3. E. ERVILIA (L. sp. 1040.) glabrum, foliis polyphyllis subcircularis, foliolis oblongis mucronulatis, floribus subgeminis pedunculatis, stipulis sublanceolatis dentatis, laciinis calycinis æqualibus angustissimis tubo multò longioribus, leguminibus torulosis tetraspermis glabris, seminibus angulato-subrotundis. (I) in arvis passim. — Vicia Ervilia Wild. Fl. fr. 4. p. 593. — Cam. epit. 215. ic. (v. v.)
4. E. MONANTHOS (L. sp. 1040.) caulinibus cespitosis simplicibus, foliis numerosis linearibus truncatis mucronatisque, cirrhis subsimplicibus, stipulis inæqualibus, illâ linear-lanceolata integrâ, alterâ angustissimè fimbriatâ, pedunculis unifloris folium subæquantibus, laciinis calycinis linearibus æqualibus tubo longioribus, leguminibus ovalibus compressis glabris 3-4-spermis torulosis. (I) in segetibus agri Ruscinonensis, Mimatenensis (Prost), Arvernæ (Bast.). — Vicia monantha Desf. Fl. fr. 4. p. 592. (v. v.)
5. E. TETRASPERMUM (L. sp. 1039.) caulinibus cespitosis ramosis, foliis cirrhosis, foliolis 4-6 oblongis mucronulatis, stipulis lanceolato-semisagittatis, pedunculis 1-4-floris filiformibus, laciinis calycinis inæqualibus latiusculis tubo brevioribus, leguminibus oblongis compressis glabris subtorulosis, seminibus subglobosis. (I) inter segetes, ad vias et colles passim. — Fl. fr. 4. p. 599. Vicia parviflora. Lois gall. 460 in Lapeyr. abr. 418 ex cl. Arnott. — J. Bauh. 2. p. 315. f. 2. (v. v.)
- β. gracile (Ser.) foliolis angustissimis, pedunculis longioribus sæpissimè unifloris. — E. gracile DC. monsp. 190. fl. fr. 4. p. 581. Vicia gracilis Lois. gall. t. 12. (v. v.)
6. E. PUBESCENS (DC. cat. monsp. p. 109. fl. fr. 5. p. 582.) caulinibus cespitosis ramosis, foliis cirrhosis, cirrhis furcatis, foliolis 4-6 ellipticis mucronulatis, stipulis linearibus, pedunculis 1-4-floris filiformibus, laciinis calycinis inæqualibus latiusculis tubo brevioribus, leguminibus oblongis compressis villosulis subtorulosis. (I) in Galloprovinciâ propè Olbias. (v. s.)

XXXVII. PISUM. Tourn. inst. 394. t. 215. — Pisi sp. L.

Calycis laciñæ foliaceæ, 2 superioribus brevioribus; vexillum amplus reflexum; stylus compressus carinatus suprà villosus; legumen oblongum compressum non alatum; semina plura subglobosa, hilo subrotundo. — Stipulæ amplæ.

1. P. SATIVUM (L. sp. 1026.) petiolis teretibus trigangis, foliolis ovatis integris margine undulatis sæpè oppositis mucronulatis, stipulis ovato-subsemicordatis crenatis, pedunculis bi-vel multifloris, leguminibus subcarnosis. (I) ubique colitur, patria ignoratur. — Fl. fr. 4. p. 584. Lam. ill. t. 633. (v. v.)

β. umbellatum (L. sp. 1027.) stipulis quadrifidis acutis, pedunculis multifloris terminalibus subumbellatis. — Tabern. ic. t. 495. An sp. propria? (v. v.)

2. P. ARVENSE (L. sp. 1027.) petiolis teretibus? 2-3-jugis, foliolis ovato-rotundatis crenulatis mucronulatis, stipulis ovato-subsemicordatis denticulatis, pedunculis subunifloris brevissimis. (I) patria ign. — Fl. fr. 4. p. 585. — Moris. s. 2. t. 1. n. 4. (v. v.)





Æ. versicolor, caule erecto flexuoso, petiolis teretibus hexaphyllis, foliolis lanceolato-oblongis acuminatis, stipulis inferne rotundatis crenatis, pedunculis 2-3-floris folio sublongioribus. (I) inter segetes circâ Aquas Tarbellicas repertum misit cl. Grateloup. — An idem ac *P. elatum* Bieb. tanr. 2. p. 151. aut distincta species? (v. s.)

3. **P. MARITIMUM** (L. sp. 1027.) caule angulato, petiolis supra planiusculis, foliolis 5-8 ovatis vel rotundatis sèpè alternis puberulis, stipulis ovato-semisagittatis, pedunculis multifloris folio brevioribus, leguminibus oblongis parvis, seminibus parvis numerosis approximatis rotundatis. (I) ad ostium Somonæ, in maritimis Niceæ ex All. — Fl. fr. 4. p. 585. — Moris. s. 2. t. 1. n. 5. (v. s.)

XXXVIII. **LATHYRUS**. L. gen. n. 1186. Ser. in DC. prod. 2. p. 369.

Cal. campanulatus 5-fidus, lobis 2 superioribus brevioribus; cor. papilionacea; stam. diadelpha; stylus complanatus, apice dilatatus, antice villosus aut pubescens; legumen oblongum, polyspermum, bivalve, 1-locul.; semina globosa aut angulata. — Stipulæ semisagittatae.

Sect. I. EULATHYRUS. Ser. l. c.

Vexillum basi edentatum; foliola opposita vel abortu nulla; petiolus angustè-alatus.

§. 1. Perennes, pedunculis multifloris.

* *Foliis unijugis.*

1. **L. SYLVESTRIS** (L. sp. 1033.) glaberrimus, caulinis prostratis alatis, foliis unijugis, foliolis linear-lanceolatis attenuatis coriaceis, stipulis semisagittatis folio brevioribus, pedunculis 6-12-floris folii longitudine, leguminibus compressis, seminibus subrotundis verrucoso-punctatis. (f) in sylvis et sepibus montanis. — Fl. fr. 4. p. 583. — Lob. ic. 2. p. 68. f. 2. Fl. rosei aut purpurei.

a. *ensifolius* (Ser.) foliolis valde elongatis angustissimis. — In provinciis australibus. (v. s.)

Æ. *oblongus* (Ser.) foliolis brevioribus elliptico-oblongis, stipulis multò minoribus. — OED. fl. dan. t. 325. An sp. distincta?

2. **L. LATIFOLIES** (L. sp. 1083.) glaberrimus, caulinis prostratis alatis, foliis unijugis, foliolis ovato-ellipticis sublanceolatis 3-5-nerviis obtusis mucronatisque, stipulis semisagittatis latis, pedunculis multifloris folio longioribus, leguminibus compressis. (f) in vineis, sylvis, pratisque umbrosis provinc. austral. passim. — Fl. fr. 4. p. 583. Eng. bot. t. 1108. Fl. purpurei. (v. v. DC.)

3. **L. PRATENSIS** (L. sp. 1033.) glabriuscus, caulinis erectiunculis tetragonis, foliis unijugis, foliolis oblongis vel linear-lanceolatis trinerviis, stipulis sagittatis ovatis foliolis brevioribus, pedunculis multifloris folio duplò longioribus, calycibus nervosis, dentibus subæqualibus longitudine tubi, leguminibus compressis, seminibus globosis laevissimis. (f) in pratis humidis. — Fl. fr. 4. p. 583. — J. Bauh. 2. p. 304. f. 2. Fl. flavi. (v. v.)

Æ. *velutinus* (DC.) caule foliolisqne velutinis, leguminibus subpilosis. — In locis aridis. — Fl. fr. 5. p. 575. (v. v.)

4. **L. TUBEROSUS** (L. sp. 1033.) caule debili tetragono, foliis unijugis, foliolis oblongo-ellipticis submucronulatis, stipulis semi-sagittatis angustis acutis petiolum æquantibus, pedunculis 3-6-floris folio duplò triplò longioribus, calycibus aveniis, dentibus subæqualibus latis tubum subæquantibus, stylis arcuatibus, leguminibus compressis, seminibus subrotundis laevibus. (f) ad margines agrorum passim. — Fl. fr. 4. p. 582. — Lob. ic. 2. p. 70. f. 2. Fl. rosei. (v. v.)

** *Foliis multijugis.*

5. **L. PALUSTRIS** (L. sp. 1034.) glaberrimus, caulinis alatis erectiunculis, fo-

liolis 3-jugis, petiolo subalato, foliolis oblongis mucronulatis, stipulis semi-sagittatis acutis parvis, pedunculis 3-5-floris folio vix longioribus, laciinis calycinis inæqualibus sublinearibus longitudine tubi, leguminibus compressis. $\frac{1}{2}$ in pascuis paludosis Galliae mediae, borealis, orientalisque, Pyren. centr. ex cl. Benth. — Fl. fr. 4. p. 584. fl. dan. t. 399. Fl. pallide purpurei. (v. v.)

β . *subexstipulatus* (Ser.) foliolis linearis-oblongis 2-jugis, stipulis minimis setaceis. — Circà Argentoratum. (v. s.)

6. L. *HETEROPHYLLUS* (L. sp. 1034.) caule erecto rigido alato, foliis uni et 2-jugis, foliolis lanceolatis mucronulatis, petioli basi alatis, stipulis lanceolato-semisagittatis, pedunculis 6-8-floris, leguminibus compressis glabris. $\frac{1}{2}$ in petrosis passim praesertim in provinc. australibus. — Fl. fr. 4. p. 583. — J. Bauh. hist. 2. p. 304. f. 1. Fl. purpurei. (v. s. c.)

§. 2. *Annui, pedunculis 1-3-floris.*

* *Petiolis aphyllis.*

7. L. *APHAEA* (L. sp. 1029.) caule erecto, petiolis cylindricis filiformibus aphyllis, stipulis sagittato-ovatis maximis, pedunculis 1-floris apice articulatis, bracteâ minimâ angustissimâ, laciinis calycinis tubo duplò longioribus, leguminibus valde compressis oligospermis latis, seminibus compressis. (I) inter segetes. — Fl. fr. 4. p. 577. — Lob. ic. 2. p. 70. f. 1. Petioli rarissimè 1-jugi, pedunculi rarissimè 2-flori. Fl. lutei. (v. v.)

8. L. *NISSOTIA* (L. sp. 1029.) caule erecto, petiolis dilatatis foliaceo-gramineis 3-5-nerviis aphyllis, stipulis minimis subulatis sèpè nullis, floribus solitariis longè pedunculatis, pedunculis apice articulatis ebracteatis, leguminibus compressis angustis nervosis reflexis. (I) in arvis lapidosis, dumetis et ad margines pratorum Galliae occidentalis et australis passim. — Fl. fr. 4. p. 578. — Lob. ic. 2. p. 71. f. 1. Fl. purpurei. (v. v.)

** *Foliis unijugis.*

9. L. *INCONSPICUUS* (Linn. sp. 1030.) caulis obsoletè triquetris, foliolis lanceolatis subtus striatis acuminatis, stipulis semisagittato-lanceolatis, cirrhis inferioribus ferè nullis, superioribus filiformibus elongatis, pedunculis brevissimis unifloris. (I) in agro Occitanico et Ruscinonensi ex cl. Bentham. — Corolla pallida tam parva ut vix calyce longior.


10. L. *SPHÆRICUS* (Retz. obs. 3. p. 39.) glabriusculus, caulis erectis tetragonis apice subalatis, foliolis ensiformibus mucronatis nervosis, stipulis semisagittato-linearibus longitudine pedunculi et petioli, pedunculis unifloris crassiusculis, dentibus calycinis angustis tubo longioribus, leguminibus subtorulosis nervosis, nervis valde numerosis crassis, seminibus sphæricis. (I) in siccis et lapidosis provinc. austr. — Fl. fr. 4. p. 580. ic. rar. t. 32. L. axillaris. Fl. fr. 5. p. 574. Fl. rubri. (v. v.)

11. L. *MICRANTHUS* (Gér. in Lois. not. 106.) caulis tetragonis, cirrhis simplicibus brevissimis, foliolis lanceolato-linearibus, pedunculis brevissimis 1-floris, laciinis calycinis corollam subæquantibus, leguminibus sub-sessilibus strictis patentibus cylindricis subvillosis. (I)? in arvis Galloprov. ex Ger. — Fl. fr. 5. p. 575. An var. præcedentis. †

12. L. *ANGULATUS* (L. sp. 1031.) glaber, caulis erectis tetragonis, foliolis linearibus acuminatis, cirrhis 3-fidis, stipulis semisagittato-linearibus acutis petiolo vix longioribus, pedunculis unifloris filiformibus stipulis duplò triplò longioribus foliumque vix æquantibus longè aristatis, dentibus calycinis acutis tubi longitudine, leguminibus angustis compressis. (I) inter segetes, in sterilibus provinc. australium et aliquandò occidentalium et mediarij. — Fl. fr. 4. p. 580. — Buxb. cent. 3. t. 42. f. 2. Fl. purpurei minores. (v. v.)

13. L. *SETIFOLIUS* (L. sp. 1031.) glaber, caulis erectis tetragonis, foliolis linearibus angustissimis, stipulis semisagittatis angustissimis longitudine





petioli, cirrhis trifidis, pedunculis unifloris filiformibus folio duplò brevioribus apice articulatis bracteolâ minimâ instructis, dentibus calycinis acutis tubi longitudine, leguminibus ovato-oblongis brevibus, seminibus globosis verrucoso - rugosis. (I) in provinciis australibus. — Fl. fr. 4. p. 581. — J. Bauh. 2. p. 308. ic. Fl. rosei. (v. v.)

14. L. ~~SATIVUS~~ (L. sp. 1030.) glabriusculus, caulinibus diffusis alatis, foliolis linearis - oblongis, cirrhis trifidis, stipulis semisagittato - ovatis ciliatis vix petioli longitudine, pedunculis unifloris petiolo longioribus apice articulatis bracteolatis, laciinis calycinis lanceolatis foliaceis tubo ferè triplò longioribus, leguminibus ovatis latis brevibus dorso alatis, seminibus trigonis subtruncatis lœvibus. (I) ex Hispaniâ ortus, in agris reperitur. — Fl. fr. 4. p. 579. — J. Bauh. 2. p. 306. f. 2. Flores albi, rosei aut violacei. (v. v.)

15. L. ~~CICERA~~ (L. sp. 1030.) glabriusculus, caulinibus diffusis alatis, foliolis linearis - oblongis, cirrhis 3-4-fidis, stipulis semisagittato-lanceolatis subdentatis ciliatis petioli longitudine, pedunculis unifloris stipulâ longioribus, bracteolis minimis, laciinis calycinis lanceolatis foliaceis tubo ferè triplò longioribus, leguminibus oblongis dorso canaliculatis non alatis, seminibus trigonis subtruncatis lœvibus. (I) ex Hispaniâ orta, in arvis Galliæ australis colitur. — Fl. fr. 4. p. 579. Jacq. f. ecl. t. 115. Fl. purpurei. (v. v.)

16. L. ~~ANNUUS~~ (L. sp. 1032.) glaber, caulinibus diffusis alatis, foliolis linearibus elongatis, cirrhis 3-fidis, stipulis semisagittatis angustissimis petiolo multò brevioribus, pedunculis 1-2-floris folioli longitudine, bracteolis minimis, laciinis calycinis lanceolatis tubo vix longioribus, leguminibus oblongo-lanceolatis non alatis. (I) in arvis provinc. australium. — Fl. fr. 4. p. 581. — Buxb. cent. 3. t. 42. f. 1. Fl. lutei parvi. (v. s.)

17. L. ~~HIRSUTUS~~ (L. sp. 1032.) caulinibus diffusis alatis, foliolis linearis - oblongis, stipulis semisagittato - linearibus petiolum subæquantibus, pedunculis 1-3-floris folio vix longioribus, laciinis calycinis ovatis tubi longitudine, leguminibus oblongis hirsutis, seminibus globosis verrucoso - punctatis. (I) inter segetes Galliæ australis orientalisque. — Fl. fr. 4. p. 582. — J. Bauh. hist. 2. p. 305. ic. (v. s.)

18. L. ~~ODORATUS~~ (L. sp. 1032.) hirsutus, caulinibus diffusis alatis, foliolis ovatis mucronulatis, stipulis semisagittato-lanceolatis petiolo multò brevioribus, pedunculis 2-3-floris folio multò longioribus, dentibus calycinis latis tubo longioribus, leguminibus oblongo-linearibus compressis hirsutis. (I) in hortis colitur. — Fl. fr. 4. p. 582. Fl. odori. (v. v.)

*** Foliis 2-3-jugis.

19. L. ~~CIRRHOSUS~~ (Ser. in DC. prod. 2. p. 374.) glaberrimus, caulinibus tetragonis alatis, petiolis 5-6-phyllis alatis, cirrhis ramosissimis, foliolis alternis ellipticis mucronulatis reticulato-venosis, stipulis semisagittato - linearibus acutis, pedunculis multifloris folio longioribus, laciinis calycinis inæquibus angustis tubo brevioribus, leguminibus oblongis, stylis arcuatis. — In Pyrenæis orientalibus circè Olette reperiit Ph. Thomas. (v. s.)

20. L. ~~BITHYNICUS~~ (Lam. dict. 2. p. 706.) pilosus, caulinibus diffusis tetragonis, foliis inferioribus unijugis ovato-oblongis mucronatis, superioribus bijugis linearis-lanceolatis, stipulis semisagittatis deutatis, pedunculis brevibus elongatisve 1-2-floris, laciinis calycinis linearibus tubum æquantibus superantibusve, stylis barbatis, leguminibus oblongis compressis villosis turgidis, seminibus subrotundis. (I) in provinciis mediterraneis et austro-occidentalibus usquè ad Burdigalam. — Vicia Bithynica L. sp. 1038. All. ped. t. 26. f. 2. Fl. fr. 4. p. 597. (v. v.)

Sect. II. CLYMEMNUM. DC. prod. 2. p. 375.

Vexillum basi utrinquè gibbositate conicâ notatum; folia inferiore è foliolata, superiora 2-6 foliolata, foliolis sæpè alternis; petiolis sæpè alatus.

21. L. ALATUS (Tenor. prod. 42. non Sibth.) caule tetragono alato, foliolis 6-8 lanceolato-oblongis mucronulatis alternis, petiolis alatis, stipulis lanceolatis

subsagittatis inæqualibus, pedunculis 2-3-floris folio longioribus, dentibus calycinis inæqualibus tubo brevioribus, leguminibus compressis planis polyspermis. (I) in Galloprovinciâ orientali reperiit Stire. — Fl. purpurei magni. Valdè affinis sequenti. (v. s.)

22. L. CLYMENUM (Linn. sp. 1032.) caule tetragono alato, petiolis infimis dilatatis aphyllis linear-lanceolatis, superioribus 5-6-phyllis linearibus, stipulis semisagittato-linearibus, pedunculis 1-6-floris folium æquantibus, dentibus calycinis inæqualibus tubo longioribus, leguminibus oblongis compressis, suturis seminiferis tumidis, seminibus compressis variegatis. (I) in Corsicâ, insulis Stæchadum et collibus circâ Telonem, Perpignanum. — Fl. fr. 5. p. 574. Variat vexillo rubro, alis cæruleis et flore cæruleo. (v. v. DC.)
23. L. ARTICULATUS (Linn. spec. 1031.) caule tetragono alato, petiolis inferioribus aphyllis linear-acuminatis, superioribus 5-6-phyllis linearibus, stipulis semisagittato-lanceolatis, pedunculis 1-3-floris folium æquantibus, dentibus calycinis subæqualibus tubo brevioribus, leguminibus turgescentiæ seminum nodosis, suturis seminiferis tumidis, seminibus compressis subvelutinis. (I) Niceæ, in Corsicâ, Occitanâ, agro Ruscinonensi et circâ Aquas Tarbellicas ex Thore. — Fl. fr. 4. p. 579. Gærtn. fruct. 2. t. 152. f. 2. — Mill. ic. t. 96. Fl. purpurei. (v. s.)
24. L. OCHRUS (DC. fl. fr. 4. p. 578.) caule prostrato tetragono alato, petiolis latis plerisque aphyllis, supremis 2-3-phyllis cirrhosis, stipulis inferioribus nullis, superioribus ovatis, foliolis ovatis mucronatis, pedunculis unifloris brevibus, dentibus calycinis subinæqualibus calycis longitudine, leguminum suturis seminiferis alato-membranaceis polyspermis. (I) In arvis et inter segetes Corsicæ, Niceæ ex All., Monspeli ex Gouan, Aq. Tarbellicarum ex Thore. — Pisum Ochrus L. sp. 1027. — Moris. s. 2. t. 3. n. 8. (v. s.)


XXXIX. OROBUS. Tourn. inst. t. 214. L. gen. n. 871.

Calyx campanulatus 5-fidus, lobis 2 superioribus brevibus; cor. papilionacea; stam. diadelpha; stylus gracilis linearis apice villosus; legumen cylindraceum oblongum 2-valve polyspermum; semina hylo lineari. — Stipulæ semi-sagittatæ.

§. 1. Foliis multijugis, foliolis latis, stipulis folio multò minoribus.

1. O. VERNUS (L. sp. 1028.) subpubescens, caule simplici, foliis trijugis, foliolis lanceolatis acuminatis, stipulis semisagittatis integris, pedunculis axillaribus multifloris folio brevioribus, floribus subsecundis nutantibus, laciinis calycinis latis vix longitudine tubi, leguminibus subcompressis, stylis geniculatis. ♀ in nemorosis. — Fl. fr. 4. p. 587. — Clus. hist. 2. p. 230. f. 1. (v. v.)
2. O. VARIEGATUS (Tenor. prod. suppl. 1. p. 62. et fl. napol. t. 68. non Lapeyr.) pilosus, caule simplici flexuoso, foliis 2-3-jugis, foliolis lanceolatis acuminatis, stipulis ovato-semisagittatis integerrimis acutis foliolis multò minoribus, pedunculis axillaribus multifloris folio æquantibus, laciinis calycinis angustis acutis longitudine tubi, leguminibus compressis punctatis, stylis rectis. ♀ in Corsicâ propè Bastia reperiit Ph. Thomas. — Columna phytob. p. 59. ic. (v. s.)
3. O. LUTEUS (L. sp. 1028.) glabriuscalus, caule simplici anguloso, foliis 3-5-jugis, foliolis elliptico-lanceolatis sublîus glaucis mucronulatis, stipulis semi-sagittatis basi dentatis foliolis multò minoribus, pedunculis elongatis multifloris folium vix æquantibus ascendentibus, calycibus glabriusculis, dentibus inæqualibus brevibus, leguminibus compressis sessilibus, seminibus globosis variegatis. ♀ in montibus. — Fl. fr. 4. p. 587. O. Tournefortii Lapeyr. mem. mus. 2. p. 298. t. 10. — J. Bauh. 2. p. 343. f. 1. (v. v.)
4. O. NIGER (L. sp. 1028.) glabrinseulus, caule ramoso angulato flexuoso, foliis 3-6 jugis, foliolis ellipticis mucronulatis, stipulis linear-lanceolatis acutis, pedunculis multifloris folio longioribus, dentibus calycinis inæquali-





bus tubo brevioribus, leguminibus compressis, stylis geniculatis, seminibus globosis. ♀ in nemorosis montanis. — Fl. fr. 4. p. 586. — Clus. hist. 2. p. 230. f. 2. Fl. purpurei. (v. v.)

5. *O. TUBEROSUS* (L. sp. 1028.) glaberrimus, caulis prostratis infernè tuberculatis, foliis 2-4-jugis, foliolis ellipticis mucronulatis punctato-rugosis, stipulis semisagittatis, pedunculis paucifloris folium vix superantibus, dentibus calycinis inæqualibus ovatis obtusiusculis tubo brevioribus, leguminibus compressis, stylis geniculatis, seminibus globosis. ♀ in sylvis. — Fl. fr. 4. p. 587. Fl. purpurei raro albi. (v. v.)

♂. *Pyrenaicus* (Ser.) foliolis ovato-ellipticis, stipulis lanceolato-linearibus ex ic. Pluk. phyt. t. 210. — *O. Pyrenaicus* L. sp. 1029. O. Plucknetii Lapeyr.

γ. *divaricatus* (Ser.) foliolis ellipticis oblongis, dentibus calycinis angustioribus, stipulis plus minusve dentatis. — *O. divaricatus*. Lapeyr. mem. mus. 2. p. 302. t. 2.

§. *tenuifolius* (Ser.) foliolis linear-lanceolatis.

§. 2. *Foliis multijugis, foliolis angustissimis.*

6. *O. CANESCENS* (L. f. suppl. p. 327.) caule tetragono, foliis subtrijugis, foliolis linearibus obtusiusculis pubescentibus vel punctato-rugosis, stipulis semisagittatis linearibus acutis petiolum alatum subæquantibus, pedunculis 3-5-floris folio duplo longioribus, dentibus calycinis latis tubo brevioribus, leguminibus rectis compressis glabris, stylo geniculato rhomboideo. ♀ in montosis Galloprov., Delphin. ex Vill., Pyrenæorum. — *O. filiformis* Lam. DC. fl. fr. 4. p. 588. excl. syn. Bauh. Cor. albo et cæruleo variegata. (v. v. DC.)

♂. *ensifolius* (Ser.) foliis latioribus acutis, pedunculis multifloris. — *O. ensifolius*. Lapeyr. mem. mus. 2. p. 303. t. 12. *O. atropurpureus* Lapeyr. abr. 413 non Desf. — In Pyrenæis centralibus. (v. v. DC.)

γ. *tenuis* (DC.) foliis angustissimis acutis, pedunculis multifloris. — In Pyrenæis orient. (v. s.)

7. *O. ALBUS* (L. f. suppl. 327.) caule simplici, foliis subtrijugis, foliolis linearibus mucronatis, stipulis semisagittatis latiusculis petiolo alato brevioribus, pedunculis multifloris folio longioribus, dentibus calycinis lanceolatis valde inæqualibus inferioribus multò longioribus, leguminibus compressis glabris subflexuosis, stylo lineari. ♀ in Andegaviâ (Bast.) et Delphinatûs inferioris montosis. — Fl. fr. 4. p. 588. — J. Bauh. hist. 2. p. 326. f. 2. (v. v. D.)

♂. *aspodeloïdes* (DC.) foliolis brevioribus latioribusque, tuberibus radicibus oblongis. — In Pictaviâ et Cebennis. (v. s.)

8. *O. SAXATILIS* (Vent. hort. cels. t. 94.) caulis simplicibus debilibus, foliis 2-jugis, foliolis linearibus, stipulis semisagittatis minimis, pedunculis unifloris folio multò brevioribus articulatis bracteolatis, laciniis calycinis lanceolatis subæqualibus tubo brevioribus, leguminibus subcylindricis cinereis. (I) in collibus aridis Galloprovinciæ Monspelii, Narbonæ et agri Ruscinonensis ex cl. Benth. — Fl. fr. 4. p. 589. (v. s.)

Trib. V. *PHASEOLEÆ*. Brunn. diss. p. 133. DC. prod. 2. p. 381. leg. mem. IX.


Corolla papilionacea. Stam. monadelpha aut sæpiùs diadelpha (9 et 1). Legumen polyspermum dehiscens continuum membranis cellulosis transversis inter semina sitis sæpè subdivisum non verè articulatum. Radicula super loborum commissuram inflexa. Cotyledones crassæ per germinationem immutatae aut in folia crassa vix stomatibus donata conversæ, extra terram exsertæ. Folia primordialia opposita.

XL. PHASEOLUS. L. gen. n. 866. Savi diss. 1824.

Calyx campanulatus 2-labiatus, labio superiore 2-dentato, inferiore tripartito; corolla papilionacea, carinâ cum staminibus diadelphis styloque spiraliter tortâ vel rariùs incurvâ; legumen compressum aut cylindricum bivalve intus isthmis cellulosis subdistinctum polyspermum; semina hilo ovali-oblongo.

1. P. *MULTIFLORUS* (Wild. sp. 3. p. 1030.) *volubilis glabriusculus, foliolis ovatis acuminatis, racemis pedunculatis folio longioribus, pedicellis geminatis, bracteolis calyce subbrevioribus adpressis, leguminibus pendulis subfalcatis torulosis scabris.* (I) ex Americâ calidiore orta, in hortis ornamenti causâ colitur. — Fl. fr. 4. p. 559. — Moris. hist. s. 2. t. 5. n. 4. Variat floribus coccineis et albis. (v. v. c.)
 2. P. *VULGARIS* (Savi mem. 3. p. 14.) *volubilis glabriusculus, foliolis ovatis acuminatis, racemis pedunculatis folio brevioribus, pedicellis geminis, leguminibus pendulis rectiusculis subtorulosis longè mucronatis, semine ovato subcompresso.* (I) ex Indiâ orient. ortus, in hortis frequentissimus, valde variabilis, longè volubilis aut subnanus, floribus albis lilacinis, seminibus colore valde variis. Ph. vulgaris et Ph. nana L. sp. 1016. varietates diversæ ad hunc aut sequentem pertinent. — Fl. fr. 4. p. 558. — Lob. ic. 2. t. 59. f. 2. Moris. s. 2. t. 5. n. 1. (v. v. c.)
 3. P. *COMPRESSUS* (DC. prod. 2. p. 392.) *subvolubilis glabriusculus, foliolis ovatis acuminatis, racemis pedunculatis folio brevioribus, pedicellis geminis, legumine compresso subtoruloso mucronato, seminibus compressis.* (I) Patr. ign. Fl. albi. — P. Romanus Savi mem. 3. p. 17. t. 10. f. 20. (v. v. c.)
 a. *humilis* (DC.) *caule humili recto, seminibus minoribus.* — P. nanus Fl. fr. 4. p. 559.
 b. *major* (DC.) *caule procero, leguminibus subtortis.*
 4. P. *TUMIDUS* (Savi mem. 3. p. 19. f. 16.) *humilis subvolubilis glabriusculus, foliolis ovatis acuminatis, racemis folio brevioribus, legumine rectiusculo mucronato plus minus toruloso, semine sphærico vel ovato-turgido albo immaculato, ventre tumido.* (I) Patr. ign. Fl. albi. (v. v. c.)
 5. P. *SPHÆRICUS* (Savi mem. 3. p. 20 f. 17.) *procerus volubilis glabriusculus, foliolis ovatis acuminatis, racemis folio brevioribus, legumine rectiusculo toruloso-mucronato, semine subrotundo nunquam albo.* (I) Patr. ignota. Flores pallidè violacei. (v. v. c.)
- XLI. *LUPINUS*. Tourn. inst. 392. t. 213. L. gen. n. 1176.
- Calyx profundè bilabiatus; cor. papilionacea, vexilli lateribus reflexis, carinâ acuminatâ: stam. monadelpha vaginâ integrâ, antheris 5 parvis subrotundioribus præcocioribus, 5 oblongis senioribus; stylus filiformis; stigma terminale subrotundum barbatum; legumen coriaceum oblongum compressum obliquè torulosum. — Stipulæ petiolo adnatæ; folia sæpius foliolis 5-9 digitatis constantia.*
1. L. *ALBUS* (L. sp. 1015.) *floribus alternis pedicellatis ebracteolatis, calycis labio superiore integro, infer. tridentato, foliolis obovato-oblongis subtus villosis.* (I) in provinceis australibus cultus. — Fl. fr. 4. p. 506. — Clus. hist. 2. p. 228. f. 1. Fl. albi. (v. v.)
 2. L. *VARIUS* (L. sp. 1015.) *floribus semiverticillatis aut subalternis pedicellatis ebracteolatis, calycis labio superiore bidentato, inferiore vix tridentato, foliolis oblongis subtus villosis.* (I) inter segetes agri Syrtici propè St.-Sever ex Thore, Narbonæ, Mouspelii, Galloprovinciæ ex Ger, Niceæ ex All. — Fl. fr. 4. p. 507. Fl. cærulei et purpurascentes. (v. s.)
 3. L. *HIRSUTUS* (L. sp. 1015.) *floribus alternis bracteolatis, calycis labio superiore bipartito, inferiore trifido, foliolis oblongis utrinquè hirsutis, leguminibus hirsutissimis.* (I) in coltis Corsicæ, Mouspelii. — Fl. fr. 4. p. 508. — J. Bauh. hist. 2. p. 289. ic. Flores minores quam prioris, cærulei. (v. s.)





4. *L. ANGUSTIFOLIUS* (L. sp. 1016.) floribus alternis breviter pedicellatis ebracteolatis, calycis labio superiore bifido, inferiore integro, foliolis linearibus adpresso pubescentibus, legumiibus villosis 6-spermis. (I) inter segetes Corsicæ, Galloprovinciæ, agri Ruscinonensis ex cl. Benth., Syrtici propè St.-Sever (cl. Dufour). — Fl. fr. 4. p. 507. — J. Bauh. hist. 2: p. 291. ic. excl. descr. Flores cærulei. (v. v.)
5. *L. LUTEUS* (L. sp. 1015.) floribus verticillatis sessilibus bracteolatis, calycis labio superiore bipartito, inferiore 3-dentato, foliolis oblongis, infimis obovatis. (I) in arvis circè Monspelium? ex Gouan. — Fl. fr. 4. p. 508. — J. Bauh. hist. 2. p. 290. ic. Fl. lutei odorati. (v. s. ex Hispania.)

Subordo II. CÆSALPINIEÆ. R. Brown. gen. rem. p. 19. DC. prod. 2. p. 473. teg. mem. XIII.

Flores plus minus irregulares, nunc papilionacei nunc subrosacei. Petala per aestivationem irregulariter imbricata nec valvata, interdum nulla, nunquam inter se coalita. Stamina plus minus inæqualia, semper perigyna, saepius libera. Embryonis recti plumula saepius conspicua magna.

Trib. VI. *CASSIEÆ. DC. prod. 2. p. 478.*

Calycis lobi ante explicationem imbricati. Petala perigyna subæqualia raro subpapilionacea, per aestivationem imbricata. Legumen saepissimè siccum bivalve. Cotyledones foliaceæ aut rarius carnosæ.

XLII. CERATONIA. L. gén. n. 1167. Lam. ill. t. 859.

Fl. polygami aut dioici; sepala 5 in calycem 5-partitum basi coalita; pet. 0; stam. 5; stigma sessile orbiculatum; legumen lineare coriacum indehiscens polyspermum, isthmis subcarnosis multiloculare, valvis crassis intus pulposis. — Arbores trunco crasso.

- i. *C. SILIQUA* (L. sp. 1513.) inermis, foliolis ovalibus obtusis planis. ♂ in rupestribus maritimis Niceæ, Galloprovinciæ, Corsicæ. — Fl. fr. 4. p. 490. Cav. ic. t. 113. (v. v.)

XLIII. CERCIS. L. gen. n. 510. Gærtn. t. 144.

Cal. sepala 5 concreta in urceolum obtuse 5-dentatum inferne gibbum; pet. 5 unguiculata subpapilionacea, omnia distincta, alis majoribus; stam. 10, libera inæqualia; legumen oblongum tenuem compressum 1-loc. polyspermum, suturâ superâ seminiferâ subalatâ, alterâ dehiscente; semina obovata, endoplevrâ tumida albumen mentiente; embryo rectus, radiculâ brevi, cotyl. planis, plumulâ inconspicua. — Arbores.

- i. *C. SILIQUASTRUM* (L. sp. 534.) foliis simplicibus basi cordatis integris obtusissimis glaberrimis. ♂ in rupestribus et sylvis Narbonæ ex Lin., Monspelii ex Gouan, Niceæ ex All., Delph. australis ex Vill. spontanea, in sylvulis saepè colitur. — Fl. fr. 4. p. 490. (v. v. c.)

Ordo XXXIV. ROSACEÆ. Juss. gen. 334. DC. prod. 2. p. 525.

Calyx constans sepalis sæpius 5, inter se basi in tubum cohærentibus et ideò 5-lobus, plerumque persistens, sæpius liber, interdùm ovario adhærens. Petala tot quot sepala, rariùs abortu nulla, calyci inserta, æstivatione quincunciali, ferè semper regularia. Stamina cum petalis inserta, sæpissimè indefinita, filamentis per æstivationem incurvis, antheris bilocularibus rimâ dupli dehiscentibus. Carpella plurima, nunc abortu solitaria, nunc coalitione inter se aut cum calycis tubo in ovarium primo adspectu unicum conversa. Ovaria 1-locul. Styli simplices, ex ovario sæpius lateraliter orti, nunc distincti, rariùs inter se coaliti. Semina in carpellis sæpius 1-2, rariùs plurima, erecta aut inversa, exalbuminosa. Embryo rectus, cotyledonibus nunc foliaceis, nunc carnosus. — Herbæ frutices aut arbores, foliis alternis basi bistipulatis.

Trib. I. *AMYGDALEÆ*. Juss. gen. 340. excl. gen. DC. prod. 2. p. 529. — Drupaceæ. Fl. fr. 4. p. 479.

Carpella sæpissimè abortu solitaria, rariùs 2 aut plurima, stylum filiformem ex apice ferè gerentia, desinentia in drupam nucleo solitario 2-ovulato 1-2-spermo. Funiculus umbilicalis è basi nuclei ortus, in canali laterali ad apicem ferè loculi locatus et sic semen pendulum gerens. Endoplevra subtumida. Cotyledones 2 crassæ. Calyx ovario non adhærens deciduus 5-fidus, gerens petala 5 et stam. 20-30 libera subæqualia. — Arbores fruticesve, foliorum serraturis intimis petiolisve glandulosis, stipulis liberis.

I. *AMYGDALUS*. Tourn. inst. t. 402. DC. fl. fr. 4. p. 486.

Drupa pubescenti - velutina, cortice fibrosâ exsuccâ irregulariter secedente, putamine foraminuloso aut lævi. — Folia juniora conduplicata; flores subsessiles foliis præcociiores; fructus lanati.

1. *A. COMMUNIS* (L. sp. 677.) foliis oblongo-lanceolatis serrulatis, floribus solitariis, calycibus campanulatis, fructibus ovoideo-compressis tomentosis. ♂ è Mauritanâ orta, nunc in provinciis australibus subspontanea. — Fl. fr. 4. p. 486.


a. amara (DC.) stylis ferè longitudine staminum infrâ tomentosis, seminibus amaris. (v. v. c.)

β. dulcis (DC.) stylis stamina multò superantibus, fructibus acuminatis, seminibus dulcibus. — Lam. ill. t. 430. f. 2. (v. v. c.)

II. *PERSICA*. Tourn. inst. t. 400. DC. fl. fr. 4. p. 487.

Omnia Amygdali, sed drupa valdè carnosa, epicarpo nunc velutino nunc glaberrimo, putamine sulcis insigniter rugoso.

1. *P. VULGARIS* (Mill. dict. n. 1.) fructibus tomentosis. ♂ ex Persiâ orta, in hortis colitur. — Fl. fr. 4. p. 487. *Amygdalus Persica* L. sp. 677. (v. v. c.)



2. *P. LÆVIS* (DC. fl. fr. 4. p. 487.) fructibus lævibus. ♂ Patr. ign. in hortis colitur. (v. v. c.)

III. ARMENIACA. *Tourn. inst. t. 399. Juss. gen. 341. DC. fl. fr. 4. p. 485.*

Drupa ovato-globosa carnosa extùs velutina, putamine hinc obtusò illinc acuto, utrinquè sulcato, cæterùm lævi nec rugoso. — Folia juniora convolutiva; flores subsessiles.

1. *A. VULGARIS* (Lam. dict. 1. p. 2.) floribus sessilibus, foliis cordatis vel ova-tis. ♂ ex Armeniâ orta, in hortis colitur. — Fl. fr. 4. p. 486. *Prunus Armeniaca* L. sp. 679. (v. v. c.)

2. *A. BRIGANTIACA* (Pers. enc. 2. p. 36.) foliis subcordatis acuminatis argutè dentatis, dentibus numerosis subimbricatis, floribus agglomeratis subsessilibus subcoëtaneis. ♂ in Alpibus Galloprovinciæ et Delphinatûs propè Brigantium (*Briançon*). — *Prunus Brigantiaca* Vill. dauph. 3. p. 535. Fl. fr. 4. p. 484. Lois. in Duham. ed. nov. 5. t. 5g. (v. v. DC.)

IV. PRUNUS. *Tourn. inst. t. 398. Juss. gen. 341. DC. fl. fr. 4. p. 483.*

Drupa ovata aut oblonga, carnosa, glaberrima, polline cæsio tecta; putamine compresso utrinquè acuto, ad margines subsulcato, cæterùm lævi. — Folia juniora convolutiva; florum pedicelli sæpius umbellato-fasciculati 1-flori.

1. *P. SPINOSA* (L. sp. 681.) ramis aculeatis, pedunculis solitariis, calycibus campanulatis, lobis obtusis tubo longioribus, foliis obovato-ellipticis vel ovatis subtùs pubescensibus argutè duplicatoque dentatis, fructibus globosis. ♂ in collibus apricis. — Fl. fr. 4. p. 484. Fl. dan. t. 926. *Drupa acerba*.

a. vulgaris (Ser.) foliis obovato-ellipticis, fructibus atropurpureis. — *P. spinosa* Lois. in Duham. ed. nov. 5. t. 54. f. 1. (v. v.)

b. microcarpa (Wallr.) foliis ellipticis angustis obtusiusculis, fructibus minoribus. — In sylvis agri Syrtici propè La Teste detexit cl. Des Moulins. (v. s.)

2. *P. INSITITIA* (L. sp. 680.) ramis spinescentibus, pedunculis geminis, foliis ovatis subtùs villosis convolutis, fructibus subrotundis. — In Galliâ australi? *P. domestica* ℥. Fl. fr. 4. p. 484. Au var. *P. spinosæ?* Planta valdè incerta. †

3. *P. DOMESTICA* (L. sp. 680.) floribus subsolitariis, foliis lanceolato-ovatis convolutis, ramis muticis. ♂ in pomariis colitur. — Fl. fr. 4. p. 484. excl. var. ℥. — Quoad var. confer. Ser. in DC. prod. 2. p. 533. (v. v.)

β. pyramidalis, ramis pyramidatis, fructibus ovatis plus minus obtusis elongatis violaceis, umbilico exerto, nucleo valdè compresso. — *P. pyramidalis* Fl. fr. 4. p. 485. *P. domestica prunæauliana* Ser. I. c.

V. CERASUS. *Juss. gen. 340. DC. fl. fr. 4. p. 479.*

Drupa globosa aut basi umbilicata carnosa, glaberrima, polline cæsio destituta, nucleo subgloboso lævi. — Folia juniora conduplicata; pedicelli nunc 1-flori, nunc ramosi.

Sect. 1. CERASOPHORA. *DC. prod. 2. p. 535.*

Flores umbellati, pedicelli uniflori è gemmis orti.

1. *C. AVIUM* (Mœnch meth. 672. DC. fl. fr. 4. p. 482.) floribus subcoëtaneis, fructibus rotundo-ovatis depressis, pedunculis tenuibus, carne valdè succulentâ, epicarpo carni adhærente, foliis subtùs albidis subpubescentibus, ramis validis divaricatis. ♂ in sylvis præsertim montosis et exindè in pomariis culta. Varietates coluntur sub nomine vernaculo *Merisier*. (v. v.)

2. *C. DURACINA* (DC. fl. fr. 4. p. 483.) ramis junioribus ascendentibus, adul-

- tis vix patulis, floribus subcoëtaneis, fructibus cordatis, pedunculis longis tenuibus, suturâ valde depressâ, carne dariusculâ, epicarpio carni adhærente, putamine ovato. ♂ Patr. ign. varietates coluntur subnomine *Bigareau*, quoad earum distributionem cf. Ser. in DC. prod. 2. p. 535. (v. v.)
3. C. JULIANA (DC. fl. fr. 4. p. 482.) ramis junioribus ascendentibus, adultis vix patulis, floribus subcoëtaneis, fructibus ovatis depressis cordiformibus, carne molliusculâ non acidâ, epicarpio carni valde adhærente, foliis glabris. ♂ Patr. ign. Nomen vernaculum *Guignier* aut *Cerisier*. (v. v.)
4. C. CAPRONIANA (DC. fl. fr. 4. p. 482.) ramis patulis, floribus subcoëtaneis, calycibus campanulatis amplis, pedunculis sæpissimè crassis rigidiusculis, fructibus globoso-depressis, suturâ vix depressâ, carne molli plus minus acidâ et stipitâ, epicarpio carni non adhærente, putamine rotundo. ♂ Patr. ign. Valgò *Cerisiers*, *Griottiers*. (v. v.)
5. C. SEMPERFLOBENS (DC. fl. fr. 4. p. 481.) ramis nutantibus, foliis ovatis serratis, floribus serotinis axillaribus solitariis, calycibus serratis, fructibus globosis rubris. ♂ Patr. ign. — Lois. in Duham. nov. ed. t. 5. f. A. (v. v.)

Sect. II. PADUS. DC. prod. 2. p. 539.

- Flores racemosi è ramis orti.
6. C. MAHALEB (Mill. dict. n. 4.) racemis subcorymbosis foliosis, foliis cordato-subrotundis denticulatis glandulosis curvatis, fructibus ovato-subrotundis nigris. ♂ in incultis, sylvaticis, et sepibus passim. — Fl. fr. 4. p. 480. Lois. in Duham. ed. nov. 5. t. 2. Prunus Mahaleb L. Jacq. austr. t. 227. (v. v.)
7. C. PADUS (DC. fl. fr. 4. p. 580.) racemis elongatis foliosis, foliis ovato-lanceolatis subacuminatis tenuibus patentim serrulatis, fructibus rotundis amaris. ♂ in collibus et sepibus. — Lois in Duh. l. c. 5. t. 1. Pr. Padus L. sp. 667. Fl. dan. t. 205. (v. v.)
8. C. LAUROCERASUS (Lois. in Duham. ed. nov. 5. p. 6.) racemis folio brevioribus, foliis ovato-lanceolatis remote serratis subtus 2-4-glandulosis, fructibus ovatis acutis. ♂ ex Trapezante orta, frequentissimè in hortis colitur. — Prunus Laurocerasus L. sp. 678. — Fl. fr. 4. p. 480. — Blackw. herb. t. 512. (v. v.)

Trib. II. SPIREACEÆ. DC. prod. 2. p. 541.

Carpella plurima a calyce libera, inter se distincta aut rassimè subconnata, circà axim floris idealem verticillata, sæpius 5, abortu interdum pauciora, stylo apiculata, demum capsularia suturâ interiore dehiscentia, subbivalvia. Semina 2-4, variüs abortu 1-3 è suturæ interioris margine ad medium aut propè basin orta, exarillata, exaluminosa. Embryo rectus, cotyledonibus planis crassiœculis. — Frutices aut Herbæ.

VI. SPIREA. L. gen. n. 630.

Calyx 5-fidus persistens; stamna 10-50 cum petalis toro calyci adhærenti inserta; carpella 1-∞ distincta, rarò basi coalita, sessilia rarò stipitata; semina 2-6; embryo inversus.

Sect. I. CHAMEDRYON. Ser. in DC. prod. 2. p. 542.

Torus apice liber. — Frutices floribus hermaphroditis umbellatis vel subcorymbosis, foliis integris vel dentatis exstipulatis.

1. S. HYPERICIFOLIA (DC. fl. fr. 5. p. 645.) foliis obovato-oblongis 3-4-nerviis integris dentatisve glabris puberulisve, corymbis pedunculatis aut umbellis sessilibus, pedicellis glabris puberulisve, sepalis ascendentibus. ♂ in hortis frequenter colitur.

- a. Pluckenetiana* (Ser.) foliis integerrimis glabris, corymbis sessilibus. — In sylvis Biturigum (Berri) reperiit cl. Gay ex DC. l. c. — *S. hypericifolia* L. sp. 701. — *Pluck. phyt.* t. 218. f. 5. (v. v. c.)
β. crenata (Ser.) foliis obovatis apice crenulatis subpubescentibus, corymbis sessilibus, pedunculis puberulis. — In Cebennis ex Gouan. — *S. hypericifolia* γ. DC. fl. fr. 5. p. 645. *S. crenata* β. fl. fr. 4. p. 477. — Barr. ie. t. 564. (v. v. c.)

Sect. II. ARUNCUS. Ser. l. c.

Carpella 5 libera pendula, torus apice liber crassissimus. — Herbæ floribus abortu dioicis, foliis tripinnatisectis, stipulis nullis.

2. S. ARUNCUS (L. sp. 702.) foliis tripinnatisectis, lobis acuminatis terminali ovato, lateralibus lanceolatis, floribus numerosissimis, carpellis glaberrimis. ♀ in sylvis montosis. — Fl. fr. 4. p. 479. — Cam. hort. 26. t. 9. (v. v.)

Sect. III. ULMARIA. Cambess. spir. in ann. sc. nat. 1. p. 378.

Torus obsoletus, stylus clavatus retroflexus; ovula 2 circè medianam ovarii su- turam affixa. — Herbæ floribus hermaphroditis cymoso-umbellatis, foliis pin- natisectis stipulatis.

3. S. ULMARIA (L. sp. 702.) foliis interruptè pinnatisectis subtùs tomentoso-niveis (rarò glabris), lobo terminali majore trilobato, sepalis reflexis, stylis elonga- tis, carpellis glabris contortis. ♀ in pratis humidis. — Fl. fr. 4. p. 478. Eng. bot. t. 960. (v. v.)

4. S. FILIPENDULA (L. sp. 702.) radice tuberosâ, foliis interruptè pinnatisectis, lobis oblongo-linearibus acutè dentatis, stipulis subreniformibus amplexicauli- bus dentatis, corymbis laxis, sepalis reflexis, carpellis villosis. ♀ in sylvis et pascuis umbrosis.

a. vulgaris (Camb.) caule elato foliisque glabris. (v. v.)

β. pubescens (Camb.) foliis subincano-pubescentibus. — In Galloprovinciâ propè Fonchateau. — *S. pubescens* DC. fl. fr. 5. p. 546. (v. s.)

Trib. III. DRYADEÆ. Vent. tabl. 3. p. 349. DC. prod. 2. p. 549.

Calyx 5-fidus (rariùs 4-fidus aut pluri-divisus), per aestivatio- nem valvatus, sèpè extus bracteolas lobulosve exteriore lobis alternos gerens. Pet. tot quot calycis lobi veri et iis alterna. Stam. ∞, rariùs 5 et tunc lobis cal. opposita, apice tubi calycini expansi inserta. Carpella ∞, rariùs pauca congesta, toro inserta, inter se et à calyce libera, et latere propè apicem stylifera. Akenia uni-ovulata omnino libera, exsucca aut baccata. Semen solita- riū erectum aut inversum, exalbuminosum. Embryo rectus, cotyled. planiusculis. — Herbæ aut frutices, stipulis 2 lateraliter petiolo adnatis.

VII. DRYAS. L. gen. n. 637.

Cal. 8-9-partitus extùs nudus, tubo subconcavo; pet. 8-9; stam. ∞; carpella ∞ stylo terminali demùm in caudam barbato-plumosam desi- nente, semen ascendens. — Frutices humillimi.

1. D. OCTOPETALA (L. sp. 717.) foliis crenato-serratis obtusis ovatis aut subcordati. ♂ in excelsis montibus. — Fl. fr. 4. p. 473. Eng. bot. t. 451. (v. v.)

VIII. GEUM. L. gen. n. 867.

Cal. tubus concavus, limbus 5-fidus extùs 5-bracteolatus; pet. 5;

stam. ∞ ; carpella exsucra caudata in capitulum disposita, stylo post anthesin articulato aut barbato; semen ascendens. — Herbæ, foliis pinnatisectis.

Sect. I. CARIOPHYLLASTRUM. Ser. in DC. prod. 2. p. 550.

Flores ascendentæ; calyces reflexi; styli deflexi geniculati, appendices plerumque stylo breviores.

1. G. **URANUM** (L. sp. 716.) caule erecto ramoso piloso, foliis radicalibus quinato-pinnatisectis, caulinis ternato-palmatisectis, lobis ovatis latis dentato-crenatis, supremis unilobatis ovatis, stipulis suborbiculari magnis, petalis obovatis longitudine calycis, carpellis pilosis, stylis glabris, appendicibus pilosiusculis. \mathcal{U} in sepibus. — Fl. fr. 4. p. 270. Eng. bot. t. 1400. (v. v.)

Sect. II. CARYOPHYLLATA. Tourn. inst. t. 151. Ser. l. c.

Flores erecti vel cernui; calyces erecti; styli deflexi geniculati, appendice stylum subæquante.

2. G. **RIVALE** (L. sp. 717.) pilosum, caulis erectis simpliciusculis 1-4-floris, foliis interruptè pinnatisectis lobis obovatis biserratis, foliis caulinis trilobis lobis acutis, stipulis ovatis dentatis, pedunculis pilosis elongatis, floribus nutantibus, petalis obcordatis basi angustatis longitudine calycis, ovarii valde pilosis, stylis elongatis flexilibus pilosis. \mathcal{U} in pratis humidis montosis. — Fl. fr. 4. p. 471. — Lob. ic. t. 694. Fl. rosei. (v. v.)

3. G. **PYRENAICUM** (Ram. bull. phil. n. 42. t. 10. f. 3.) pilosum, caulis erectis simpliciusculis 1-4-floris, foliis interruptè pinnatisectis, lobulis inferioribus ovatis dentatis minimis, terminali cordato-reniformi maximo biserrato, stipulis ovatis obtuse dentatis, floribus nutantibus, petalis obcordato-rotundatis brevissimè unguiculatis calyce longioribus, stylis deflexis rigidis longitudine carpellarum, carpellis valde pilosis, appendicibus pilosis. \mathcal{U} in editioribus Pyrenæis. — Fl. fr. 4. p. 472. G. Tournefortii Lapeyr. (v. v. DC.)

4. G. **SYLVATICUM** (Pourr. act. toul. ex DC. fl. fr. 5. p. 544.) pilosum, caulis erectis simplicibus, foliis interruptè pinnatisectis, lobis inferioribus ovatis dentatis, terminali subcordato biserrato maximo, foliis caulinis simplicibus profundiè dentatis, stipulis lanceolatis subdentatis, floribus ascendentibus, petalis obcordatis calyce longioribus, stylis deflexis rigidis longitudine ovarii pilosi, appendicibus glabris. \mathcal{U} in sylvaticis circa Narbonam, Monspelium, Nemausum. — G. atlanticum Desf. atl. i. p. 401. (v. v. DC.)

5. G. **THOMASIANUM** (Ser. in mem. soc. phys. gen. 2. p. 140.) pilosum, caulis erectis 1-3-floris, foliis radicalibus subinterruptè pinnatisectis, lobis subæquilibus obovatis subduplicato-serratis, caulinis ternatisectis, lobo terminali 3-lobo vel lanceolato, stipulis ovatis subduplicato-serratis, floribus ascendentibus, lobis calycinis ovatis brevibus, petalis obovatis calyce vix longioribus. \mathcal{U} in Pyrenæis orientalibus circa Mont-Louis reperiit Ph. Thomas. (v. s.)

Sect. III. SIEVERSIA. Wild. berol. mag. 1811. p. 397.—Oreogeum.
Ser. l. c.

Flores calycesque erecti; styli patentes non geniculati pilosi.

6. G. **REPTANS** (L. sp. 717.) caulis sterilibus reptantibus, floriferis erectis indivisis, foliis radicalibus interruptè pinnatifidis, lobis majoribus obovato-cuneiformibus apice profundè dentatis, minoribus ovatis integris tridentatisve, foliis caulinis trilobis, flore maximo uno, laciniis calycinis elongatis sèpè apice trifidis, petalis obcordatis calyce longioribus, stylis patentibus valde pilosis. \mathcal{U} in editioribus Alpibus. — Fl. fr. 4. p. 472. — Barr. ic. t. 400. Fl. flavi. (v. v.)

7. G. **MONTANUM** (L. sp. 717.) caulis erectis unifloris, stolonibus nullis, foliolis radicalibus interruptè pinnatifidis, lobis lateralibus minoribus den-





tatis, terminali ovato-oblongo obtuso maximo obtusè biserrato, caulinis unilobis stipulisque profundè dentatis, flore magno, lacinis calycinis indivisis, petalis obcordatis calyce longioribus, stylis patentibus valdè pilosis. Σ in editioribus montibus. — Fl. fr. 4. p. 472. — Cam. epit. 727. ic. Fl. flavi. (v. v.)

IX. *RUBUS*. L. gen. n. 864.

Calyx fundo planiusculus 5-fidus nudus; pet. 5 et stam. ∞ calyci inserta; carpella plurima toro manifeste protuberanti conico non carnosu inserta, stylo sublaterali superata, in drupellas carnosas conversa; semen inversum. — Frutices rariū herbæ perennes, foliis petiolatis.

§. 1. *Foliis pinnatis ternatisve.*

1. R. IDEUS (L. sp. 706.) villosus, caulis teretibus, aculeis tenuibus recurvis, foliis ramorum sterilium pinnatis, fertilium trifoliolatis, pinnis ovatis inciso-serratis sterilium subpalmato-quinatis subtus niveo-tomentosis, stipulis angustissimis setaceis, pedunculis subcorymbosis, lacinis calycinis ovato-lanceolatis niveo-tomentosis submucronatis, petalis obovato-cuneatis integris conniventibus calyce brevioribus, carpellis numerosis tomentosis. δ in petrosis montium. — Fl. fr. 4. p. 476. Engl. bot. t. 2442. (v. v.)

§. 2. *Foliis palmatis 3-5-foliolatis.*

* *Fruticosi, stipulis linearibus petiolaribus.*

2. R. CÆSIUS (L. sp. 706.) caule repente tereti sæpè cæsio-pruinoso, aculeis tenuibus subrecurvis, foliis ternato-quinatoque-palmatis, foliolis ovatis duplicito-serratis vel crenatis glabris subciliatis, paniculâ simpliciusculâ, lacinis calycinis longè ovato-acuminatis, carpellis crassis paucis subcaesiis. δ ad margines agrorum. — Fl. fr. 4. p. 474. — J. Bauh. hist. 2. p. 59. f. 1. (v. v.)

3. R. CORYLIFOLIUS (Smith. fl. brit. p. 542; eng. bot. t. 827.) caule fruticoso angulato, aculeis rectiusculis, foliis ternato-quinatoque-palmatis, foliolis cordato-ovatis firmis duplicato-serratis subtus pilosis, paniculâ simpliciusculâ, lacinis calycinis ovato-acuminatis demùn reflexis. δ in sepiibus passim. — Fl. fr. 4. p. 475. — Schmid. ic. t. 2. Carpella purpureo-cærulea magna. (v. v.)

β . *villosus* (DC.) foliis utrinque villosis. (v. v.)

4. R. FRUTICOSUS (L. sp. 707.) caule erecto 5-angulari subtomentoso, aculeis recurvis, foliis 3-5-palmatis, foliolis petiolulatis ovato-oblongis acutis glabris subtus adpressè tomentoso-niveis, paniculâ decompositâ angustâ strictâ, lacinis calycinis reflexis subinermibus. δ in sepiibus et dumetis. — Fl. fr. 4. p. 475. Lam. ill. t. 441. f. 2. Fructus purpureo-atri. (v. v.)

β . *inermis* (DC.) caule inermi. — Barr. ic. t. 395. (v. s.)

5. R. TOMENTOSUS (Wild. sp. 2. p. 1083.) caule erecto angulato aculeato, foliis 3-5-palmatis, foliolis breviter petiolulatis obovato-cuneatis suprà pubescentibus subtus lanuginoso-tomentosis, paniculâ decompositâ angustâ patente, lacinis calycinis subinermibus reflexis. δ in collibus siccis passim. — Fl. fr. 4. p. 476. (v. v. DC.)

6. R. COLLINUS (DC. cat. mousp. 139.) caule fruticoso, petiolis aculeatis, foliis quinato rariū ternato-palmatis, foliolis subrotundis dentatis, lateralibus subsessilibus supernè villosis, subtus tomento vix adpresso candicantis, floribus laxe paniculatis, paniculâ ramosâ, lacinis calycinis ovato-acuminatis. δ in collibus sterilibus Monspelii. — Fl. fr. 5. p. 545. — Nocca et Balb. fl. tici. t. 9. (v. v. DC.)

7. R. GLANDULOSUS (Bell. act. taur. 3. p. 230.) caule debili teretiusculo pilosohispido vel viloso, aculeis subrecurvis tenuibus acutissimis, foliis ternatis rariter quinato-palmatis villosis, foliolis ovatis duplicato-serratis, pedunculis villosis glanduloso-hispidis, floribus laxe paniculatis, calycis lacinis lan-

ceolatis acuminatis. ♂ in sylvis umbrosis montium. — Fl. fr. 4. p. 474. R. hirtus Walds. et Kit. hung. 2. t. 141. R. villosus & glandulosus Ser. in DC. prod. 2. p. 564. (v. v.)

** *Herbacei, stipulis ovatis.*

8. R. ~~saxatilis~~ (L. sp. 708.) canle herbaceo obtusangulo, foliis ternato-palmatis glabriusculis, foliolis ovato-rhomboideis crenato-serratis, lateralibus sessilibus, stipulis ovatis latiusculis, floribus subcorymbosis subsolitariisque breviter pedunculatis, laciinis calycinis subtomentosis deflexis corollam æquantibus, carpellis paucis rubris maximis. ♂ in rupestribus montosis. — Fl. fr. 4. p. 473. Eng. bot. t. 2233. (v. v.)

X. FRACARIA. *Tourn. inst. t. 152. Ser. in DC. prod. 2. p. 569.*

Calycis tubus concavus 5-fidus extus 6-bracteolatus; pet. 5; stam. ∞ ; carpella ∞ receptaculo demùm deciduo carnosò-succulento sparsè inserta exsucca, stylus lateralis; semen appensum. — Herbæ foliis 3-foliolatis.

* *Carpellis numerosissimis superficialibus, staminibus numerosis, floribus hermaphroditis.*

1. F. VESCA (L. sp. 705.) foliis ternatis plicatis suprà pubescentibus subtùs pilosis, foliolis sessilibus cuneato-subrotundis grossè dentatis dentibus acuminatis, pedunculis lanuginosis, fractibus pendulis, sepalis post anthesin reflexis petalis brevioribus. ♀ in sylvis collibusque et in hortis culta. — Fl. fr. 4. p. 468. — Blackw. herb. 77. — Quoad varietates conf. quæ scripsit cl. Ser. in DC. prod. 2. p. 569. (v. v.)

2. F. CALYCINA (Lois. gall. 1. p. 299.) foliis ternatis pilosiusculis, foliolis sessilibus cuneato-subrotundis grossè dentatis, floribus corymbosis, pedunculis scapo longioribus, calycibus corollam subæquantibus. ♀ in sylvis circa Lutetiam ex Lois. — F. vesca grandiflora. Fl. fr. 4. p. 468.

** *Carpellis paucis in foveolis receptaculi immersis, staminibus paucis, floribus abortu sæpè dioicis.*

3. F. MAJAUPEA (Duch. in Lam. dict. 2. p. 533.) stolonifera, lobis foliorum plicatis tenuibus subtùs pilosis, floribus hermaphroditis, staminibus longioribus, carpellis numerosis, calycibus post anthesin erecto-adpressis. ♀ in Galliâ, et in hortis colitur.

4. F. BRESLINGEA (Duch. in Lam. dict. 2. p. 533.) lobis foliorum plicatis subco-riaceis viridiorebus, pilis longioribus firmioribus, petalis angustioribus albo-flavicantibus, sepalis longioribus post anthesin erecto adpressis, receptaculis adhaerentibus, carpellis turgidioribus. ♀ in Galliâ, et in hortis culta. Quoad varietates conf. quæ scripsit cl. Ser. 1. c.

5. F. CHILENSIS (Ehr. beytr. 7. p. 26.) serotina, semper abortu dioica, foliis glaucis coriaceis latè crenatis subtùs et suprà pilosis, pedunculis sepalis receptaculisque erectis pendulisque crassioribus. ♀ in Americâ meridionali orta, in hortis culta.


XI. POTENTILLA: *Nestl. potent. diss. Ser. in DC. prod. 2. p. 571.* — *Tormentilla, Potentilla et Comarum L.*

Cal. tubus concavus, limbus 4-5-fidus extus 4-5-bracteolatus; pet. 4-5; stam. ∞ ; carpella ∞ stylo laterali, receptaculum persistens exsuccum; semen appensum. — Herbæ aut suffrutes, foliis compo-sitis.


Sect. I. POTENTILLASTRUM. *Ser. l. c.*

Petala obtusa obcordatave lutea; folia palmata vel pinnatisecta.










§. I. *Foliis palmatisectis.*

1. *P. MINIMA* (Hall. fil. in Ser. mus. helv. 1. p. 51. t. 8.) caulinibus diffusis filiformibus unifloris, foliis ternato-palmatisectis suprà glabriusculis subtus pilosis, lobis obovatis brevibus subretusis crenatis, laciñiis calycinis inæqualibus obtusis corollâ brevioribus, carpellis subovoïdeis lævibus. ♀ in editioribus Alpibus Delphin. et Galloprovinciae. — *P. frigida* f. Fl. fr. 4. p. 462. *P. verna* γ. Fl. fr. 5. p. 542. (v. v. DC.)
2. *P. FRIGIDA* (Vill. dauph. 3. p. 563.) pilosissima, radice crassâ, caulinibus cespitosis subdiffusis, foliis ternato-palmatisectis, lobis ovatis crenatis summo prominulo, stipulis ovato-lanceolatis, laciñiis calycinis lanceolatis acutiusculis petala obcordato-rotunda superantibus æquantibusve, carpellis lævibus. ♀ in summis Alpibus Delphinatûs ex Vill. — Nestl. pot. 70. t. 10. f. 3. non Fl. fr. 4. p. 462 ex Ser. in DC. prod. p. 572. †.
3. *P. GRANDIFLORA* (L. sp. 715.) caule ascendentē paucifloro, foliis pilosis ternato-palmatisectis, lobis obovato-cuneatis lanceolatisve profunde simpliciter vel subduplicato-dentatis dentibus obtusis, stipulis lanceolatis, laciñiis calycinis lanceolatis acutis, bracteis calycinis ellipticis pilosis brevioribus, petalis obcordatis calyce longioribus, carpellis ovoïdeis rugosis. ♀ in paschis saxosis Alpium. — Fl. fr. 4. p. 463. — Hall. helv. t. 20. f. 1. (v. v.)
4. *P. SUBACAUSTRIS* (L. sp. 715. non Lehm.) incano-tomentosa, caule brevi, foliis ternato-palmatisectis, lobis obovato-cuneiformibus apice crenatis venosis, stipulis linearibus, floribus subpaniculatis paucis, laciñiis calycinis ovatis obtusiusculis stellato-tomentosis, petalis obovatis calyce brevioribus, receptaculo villosō, carpellis rugosis. ♀ in montosis rupestribus apries Galloprov. et agri Ruscinonensis. — Fl. fr. 4. p. 465. *P. grandiflora* Scop. carn. 1. t. 22. non L. (v. s.)
5. *P. TORMENTILLA* (Nestl. pot. 65.) pilosa, radice tuberosâ, caule ascendentē dichotomo, foliis ternato-palmatisectis, caulinis sessilibus, lobis obovato-cuneiformibus plus minusve profundè dentatis, stipulis nullis vel 3-dentatis, floribus axillaribus solitariis longè pedunculatis, bracteis palmato-incisis, laciñiis calycinis lanceolato-linearibus corollam æquantibus, receptaculo villosō, carpellis rugosis. ♀ in graminosis ad vias et oras sylvarum. — *Tormentilla erecta* L. sp. 716. — Fl. fr. 4. p. 454. — Cam. epit. 685. ic. Calyx 4-5-fidus; pet. 4-5. (v. v.)
f. nemoralis (Ser.) caule debili prostrato, stipulis frequentissimè lanceolatis indivisis raro 2-3-dentatis, foliis petiolatis sæpè oppositis. — *Toment. reptans* L. Fl. fr. 4. p. 454. (v. v.)
6. *P. REPTANS* (L. sp. 714.) caule flagelliformi reptante subindiviso, foliis plus minusve petiolatis 3-5-7-palmatisectis, lobis obovatis dentatis lateralibus basi manifestè coalitis, stipulis linearibus parvis vel nullis, bracteis ovatis 2-3-lobis, floribus axillaribus solitariis folio longioribus, laciñiis calycinis ovatis latis corollâ brevioribus, petalis obcordatis, receptaculo piloso. ♀ in argillosis et glareosis subhumidis. — Fl. fr. 4. p. 461. — Fuchs. hist. 624. ic. (v. v.)
7. *P. VERNALIS* (L. sp. 712.) hirsuta, caulinibus declinatis, foliis infimis quinato-palmatisectis, lobis obovato-cuneiformibus dentatis dente ultimo minore, stipulis inferioribus linearibus integris acutis, floribus subpaniculatis, laciñiis calycinis lanceolatis acutis, petalis obovatis calycem superantibus, carpellis lævibus. ♀ in siccis et ad vias. — Fl. fr. 4. p. 459.
a. vulgaris (Ser.) foliis pilosis hirsutissime profundè dentatis, dentibus acutis, bracteis calycis laciñiisque subæqualibus conformatibusque. — *P. verna* α et γ. Ser. in DC. prod. 2. p. 575. — Clus. hist. 2. p. 106, f. 2. (v. v.)
f. montana (Wallr.) hirsuta, caulinibus prostratis filiformibus elongatis, lobis foliorum obovato-cuneatis profundè dentatis. — In pratis et rupestribus Delphin., Jurassi, Alsatiæ, Pyrenæorum. — *P. filiformis* Vill. dauph. 3. p. 564. Fl. fr. 5. p. 542. *P. heterophylla* Lapeyr. (v. v.)

- γ. *cinerea* (Ser.) caule foliisque pube stellatâ canescentibus, foliis dentatis dentibus obtusiusculis, bracteis calycis lacinias angustioribus obtusis. In Galliâ boreali et Delphinatû ex Vill. — P. *cinerea* Chaix et DC. fl. fr. 4. p. 461. — Barr. ic. 709. Au merito cum P. *vernâ* conjuncta? (v. s. ex Moguntiâ.)
8. P. *OPACA* (L. sp. 713.) hirsutissima, caulis declinatis filiformibus, foliis infimis 5-7-palmatisectis, lobis obovato-oblongis profundè dentatis, dente terminali minore, stipulis lanceolatis raro integris, floribus laxe subcorymbosis, pedunculis filiformibus, lacinias calycinis lanceolatis oblongis, petalis obovatis calycem superantibus, carpellis lævibus. \mathcal{U} in Galloprovinciâ ex Ger., Pyren. ex Lois. — Fl. fr. 4. p. 460. — Clus. hist. 2. p. 106. f. 3. (v. s. ex Pedemontio et Palatinatû.)
9. P. *SABAUDA* (DC. fl. fr. 4. p. 458.) caulis subdeclinatis, foliis radicalibus quinato-palmatisectis pilosis, lobis latè obovatis obtuse dentatis cuneatis, dente ultimo sub prominulo, stipulis lanceolatis subacutis, floribus laxe subcorymbosis, pedunculis filiformibus, calycis lacinias lanceolatis acutis bracteas angustiores obtusiusculas superantibus, petalis obovatis calycem superantibus. \mathcal{U} in Vogesis, Alpibus, Pyrenæis. — P. *aurea* Ser. in mus. helv. 1. t. 8. f. a. b. et in DC. prod. 2. p. 576. P. Salisburgensis? Hænke in Jacq. rar. 3. t. 490. An caracteres qui hanc a sequente distinguunt satis constantes sunt? (v. v.)
10. P. *AUREA* (L. sp. 712.) caulis declinatis, foliis radicalibus quinato-palmatisectis nitidis, lobis obovatis acutè dentatis sericeo-ciliatis, stipulis lanceolatis subacutis, floribus laxe subcorymbosis, lacinias calycinis lanceolatis acutis, bracteas angustioribus subobtusis lacinias subæquantibus corollâ dimidio brevioribus, petalis obcordatis. \mathcal{U} in Alpibus, editoribus montibus Arvernæ, Pyrenæis. — Fl. fr. 4. p. 459. P. Halleri Ser. in DC. prod. 2. p. 576. — Hall. helv. t. 21. f. 4. (v. v.)
11. P. *PYRENAICA* (Ram. in DC. fl. fr. 4. p. 459. 5. p. 542.) caule ascendente, foliis palmatisectis inferioribus quinatis, superioribus ternatis, lobis obovato-cuneatis acutè profundè dentatis pilosis, stipulis ovatis acutis, lacinias calycinis lanceolatis acutis bracteas linearis-lanceolatas æquantibus, petalis obcordatis calyce longioribus, carpellis ovoïdeis lævibus. \mathcal{U} in editoribus Pyrenæis. — P. grandiflora γ. Ser. in DC. prod. (v. v.)
12. P. *ARGENTEA* (L. sp. 712.) caule ascendente erecto tomentoso, foliis quinato-palmatis, lobis obovato-cuneatis subtùs incano-tomentosis supernè plerumque glabris plus minusve incisis pinnatifidis, stipulis ovato-acuminatis integris dentatisque, floribus corymbosis numerosis, lacinias calycinis lanceolatis corollâ brevioribus, carpellis ovatis rugulosis. \mathcal{U} in siccis et in cultis. — Fl. fr. 4. p. 461. — Camer. epit. 760. ic. (v. v.)
13. P. *INTERMEDIA* (L. mant. 76. non Poir.) hirsuta, caulis cespitosis subprostratis dichotomis, foliis radicalibus longè petiolatis 5-7-9-palmatisectis pallidis, lobis obovato-lanceolatis retusis incisis dente summo breviore, stipulis inferioribus angustissimis acutis, floribus numerosis longè pedunculatis, petalis obcordatis lacinias calycinis lanceolatas acutas æquatis superantibus, carpellis rugosis. \mathcal{U} in rupestribus Pyren. et montium Delphin. — Fl. fr. 4. p. 458. Nestl. pot. t. 8. Eng. bot. t. 2449. (v. s. ex Valesiâ.)
14. P. *CANESCENS* (Besser galic. 1. p. 330.) tomentoso-canescens, caule erecto firmo, foliis quinato-rariis 7-palmatisectis, lobis obovato-oblongis dentato-peccinatis, stipulis lanceolatis integris dentatis, floribus paniculatis numerosis, petalis obcordatis lacinias calycinis lanceolato-lineares incanas æquatis, carpellis rugosis. \mathcal{U} in Alsatiâ propè Argentoratum. — Fl. fr. 5. p. 541. (v. s.)
- β. *inclinata* (Ser.) caule inclinato debili, foliis suprà glabriusculis. — In Delphinatû ex Vill. — P. *inclinata* Vill. dauph. 3. t. 45. — Fl. fr. 4. p. 461. (v. v. c.)
15. P. *HIRTA* (L. sp. 712.) pilosa, caule rubello paucifloro erecto ascendente,





foliis 5-7-palmatisectis, lobis oblanceolatis angustis incisis dentibus subobtusis, stipulis lanceolatis acutis integris basi latis, caulinis petiolo brevioribus, floribus corymbosis laciniis calycinis lanceolato-ovatis acutis bracteas linearis-lanceolatas acutas superantibus, petalis obcordatis calycem superantibus subequalibus, carpellis rugosis marginulatis. ♀ in siccis et petrosis Galliae australis et Alsatiæ. — Fl. fr. 4. p. 457. All. ped. t. 71. P. pilosa Wild. Fl. fr. 5. p. 540. (v. v.)

♂. *angustifolia* (Ser.) foliorum lobis cuneatis subintegris apice 3-4-dentatis, stipulis subintegris. — In Pyren. orientalibus. — P. angustifolia Fl. fr. 5. p. 540. (v. s.)

16. P. *RECTA* (L. sp. 711.) pilosa, caule multifloro erecto, foliis quinato-ternatoque-palmatisectis adpresso pilosis, lobis lanceolatis latis incisis dentibus acutis, stipulis lanceolato-linearibus elongatis acutis basi dentatis incisisve, caulinis petiolo longioribus, calycis laciniis bracteisque lanceolatis acutis æqualibus nervosis, carpellis rugosis marginulatis. ♀ in Galloprovinciâ ex Ger., Occitaniâ, Delph. ex Vill., Bressiâ ex Latour, Burgundiâ ex Dur. — Fl. fr. 4. p. 457. All. ped. t. 71. f. 1. P. hirta L. Ser. in DC. prod. — Lob. ic. 689. f. 2. An ut vult cl. Seringe præced. var? (v. v. c.)

§. 2. *Foliis pinnatisectis.*

17. P. *FRUTICOSA* (L. sp. 709.) caule fruticoso, foliis pinnatisectis hirsutis, lobis oblongo-lanceolatis integerrimis approximatis, stipulis lanceolatis membranaceis acutis, floribus subcorymbosis, laciniis calycinis pilosis lanceolatis acutis basi latis, bracteis linearis-lanceolatis basi attenuatis, corollâ calyce longiore, receptaculo pilosissimo. ♂ in Pyrenæorum valle Eynes et sepiibus Alsatiæ superioris. — Fl. fr. 4. p. 455. Eng. bot. t. 88. P. prostrata Lap. excl. Benth. (v. s.)

18. P. *SUPINA* (L. sp. 711.) caule humifuso herbaceo, foliis pinnatisectis, lobis obovatis vel oblongis glabriusculis plus minusve dentatis, stipulis lanceolatis integris, pedunculis axillaribus solitariis, laciniis calycinis triangulari-lanceolatis, bracteis lanceolatis, petalis obovatis longitudine calycis, carpellis ovatis subcompressis. (1) in glareosis vel lapidosis inundatis Galliæ boreali-occidentalis. — Fl. fr. 4. p. 456. — Clus. hist. 2. p. 107. f. 2. (v. s.)

19. P. *PENNSYLVANICA*. (L. mant. 76.) incano-tomentosa, caule erecto herbaceo, foliis subinterruptè pinnatisectis, caulinis trilobis, lobis oblongo-obovatis profundè dentatis, stipulis lanceolatis sublaciniatis, floribus corymboso-paniculatis, laciniis calycinis triangulari-lanceolatis, bracteis oblongo-lanceolatis petala obcordata æquantibus, receptaculo piloso, carpellis rugulosis. ♀ copiosè nunc spontanea circa Parisios in sylvulâ Bononiensi ubi seminibus ex Americâ boreali certò introducta. — Fl. fr. 4. p. 456. in not. — Jacq. vind. 2. t. 189. — Gmel. sib. 3. t. 34. f. 1. (v. s.)

20. P. *ANSERINA* (L. sp. 710.) caulinibus filiformibus radicantibus, foliis interrupè pinnatisectis, lobis obovato-oblongis plus minusve profundè argute serratis, suprà glabriusculis subtus sericeis, stipulis caulinis multifidis, floribus solitariis geminisve, pedunculis longitudine foliorum, laciniis calycinis lanceolatis integris, bracteis saepius 3-5-lobis, petalis obovatis calyce longioribus, receptaculo piloso. ♀ frequens ad vias et in subhumidis. — Fl. fr. 4. p. 455. — Camer. epit. 758. ic. — Moris. hist. s. 2. t. 20. n. 4. (v. v.)

Sect. II. COMARUM. Ser. in DC. prod. 2. p. 583.

Petala acuminata rubra; folia pinnatisecta, bracteæ minores deflexæ.

21. P. *COMARUM* (Scop. carn. ed. 2. 1. p. 359.) lobis foliorum approximatis, stipulis latis coriaceis, petalis calyce minoribus, carpellis ovato-compressis levibus. ♀ in paludosis Galliæ occid., mediae, borealis orientalisque. — Comarum palustre. L. sp. 718. Fl. fr. 4. p. 469. Lam. ill. t. 444. (v. v.)

Sect. III. FRAGARIASTRUM. Ser. l. c.

Petala obtusa obcordata alba vel rubra; folia pinnata vel palmatisecta.

§. 1. *Foliū pinnatisectis.*

22. *P. RUPESTRIS* (L. sp. 711.) caule erecto dichotomo virgato, foliis pilosis radicalibus pinnatisectis, caulinis trilobis, lobis ovato-subrotundis dentatis, stipulis latis brevibus obtusis, laciniis calycinis latis lanceolatis, bracteis minimis saepè 2-lobis, petalis obovatis calyce multò longioribus, carpellis laevibus. ♀ in saxosis montosis. — Fl. fr. 4. p. 464. Jacq. austr. t. 114. — J. Bauh. hist. 2. p. 398. d. f. 2. (v. v.)

P. pygmaea, procumbens, vix 2-pollicaris, caule simplici 1-2-floro. — In pascuis humidis montium Corsicæ. (cl. Soleiroli.) (v. s.)

§. 2. *Foliū palmatisectis.*

23. *P. ALBA* (L. sp. 713.) caulis debilibus procumbentibus paucifloris, foliis radicalibus quinato-palmatis, caulinis ternato-palmatis, lobis tenuibus ovato-oblongis apice serratis serraturis subconniventibus, suprà glabriusculis subtus sericeis, stipulis linearibus acutis, laciniis calycinis lineari-lanceolatis acutis sericeis petala obcordata aequalibus, receptaculo piloso, carpellis rugulosis glabris. ♀ in sabulosis et graminosis montosis Galliæ orientalis. — Fl. fr. 4. p. 466. — Clus. hist. 2. p. 105. f. 1. (v. s.)

P. splendens (Ser.) lobis foliorum ternis quinisve latioribus suprà sericeo-pilosis, sepalis latioribus. — In arenosis et graminosis Galliæ occident., Pyren., et circà Parisios. — *P. splendens* Ram. in DC. fl. fr. 4. p. 467. (v. v.)

24. *P. ALCHIMILLOIDES* (Lapeyr. act. toul. 1. t. 17.) radice crassâ, caulis firmis crassiunculis suberectis, foliis radicalibus 5-7-palmatis, caulinis 3-lobatis, lobis subcoriaceis oblongis apice vix denticulatis suprà glabris subtus incano-tomentosis, stipulis linearibus acutis, laciniis calycinis lanceolatis tomentosis, exterioribus linearibus, petalis obcordato-subrotundis vix calyce longioribus, receptaculo piloso, carpellis valde pilosis. ♀ in Pyrenæis. — Fl. fr. 4. p. 466. (v. v.)

25. *P. CAULESCENS* (L. sp. 713.) caulis tomentosis suberectis multifloris, foliis radicalibus quinato-palmatisectis, superioribus ternatisectis, lobis obovato-cuneiformibus apice dentatis vix retusis ciliatis, stipulis inferioribus longissimis angustissimisque, superioribus ovato-lanceolatis, floribus subcorymbosis laxis, sepalis lanceolato-linearibus acutis petala obovato-cuneata subaequantibus, receptaculo piloso, carpellis non rugosis pilosis. ♀ in fissuris rupium montium. — Fl. fr. 4. p. 464. Jacq. austr. t. 220. (v. v.)

P. nivalis (Ser.) caule foliis pedunculisque villosissimis, stipulis superiores dilatatis, floribus corymboso-glomeratis. — In Corsicâ, Pyrenæis et editoribus Alpibus Galloprovinciæ, Delphin. — *P. nivalis* Lapeyr. act. toul. 1. p. 210. t. 16. Fl. fr. 4. p. 465. (v. v.)

26. *P. NITIDA* (L. sp. 714.) sericea, caulis cespitosus subbifloris, foliis radicalibus subquinato-palmatisectis, superioribus ternato-palmatis, lobis obovato-cuneiformibus sericeis integris apiceque tridentatis, stipulis angustis, laciniis calycinis lanceolatis acutis, bracteis angustissimis, petalis obcordatis latissimis calyce longioribus, receptaculo lauato, carpellis non rugosis valde pilosis. ♀ in montibus Delphinatûs. — Fl. fr. 4. p. 467. Jacq. aust. app. t. 25. — Bocc. mus. t. 9. f. 4. Fl. magni. (v. s.)

27. *P. MICRANTHA* (Ram. in DC. fl. fr. 4. p. 468.) pubescens, non stolonifera, foliis radicalibus ternato-palmatisectis, lobis ovato-rhomboïdeis dentatis subsessilibus subtus glaucescentibus, terminali subretuso, foliis caulinis 1-lobis, stipulis latis brevibus, laciniis calycinis ovatis, bracteis subdentatis, petalis obcordato-cuneatis subacuminatisque calyce brevioribus, receptaculo villoso, carpellis rugosis. ♀ in Pyrenæis. — Ser. mus. helv. 1. p. 60. t. 5. Fl. albi vix aperti. (v. v.)

28. *P. FRAGARIA* (Poir. dict. 5. p. 599.) pubescens stolonifera, caulis decumbentibus 2-floris, foliis radicalibus caulinis que ternato-palmatisectis,





lobis obovato-subrotundis, intermedio retuso dente summo minore, stipulis latis membranaceis obtusiusculis, lacinias calycinis lanceolatis, bracteis oblongis, petalis obcordatis calycem æquantibus superantibusve, receptaculo subvilloso, carpellis non rugosis. ♀ in sylvis et aridis. — Fl. fr. 4. p. 468. — *Fragaria sterilis* L. sp. 709. — *Lob. ic. t. 698. f. 1. (v. v.)*

XII. SIBBALDIA. *L. gen. n.* 393.

Omnia Potentillæ sed petala minuta; carpella et stam. sæpius 5; calyx bracteoliferus; semen in akenio inversum, receptaculum exsuccum. — Herbæ humiles.

1. *S. PROCUMBENS* (L. sp. 406.) caulinis procumbentibus, foliis 3-foliolatis, foliolis obovatis apice tridentatis supernè glabris subtus pilosis, floribus corymbosis, petalis lanceolatis acutis vix longitudine calycis. ♀ in editioribus Alpibus et Pyrenæis. — Fl. fr. 4. p. 453. Lam. ill. t. 221. f. 1. Fl. dan. t. 32. (v. v.)

XIII. AGRIMONIA. *Tourn. inst. t. 155. Nestl. pot. 16.* — *Agrimonie* *sp. L.*

Cal. tubus turbinatus foveolatus suprà lappaceus, extùs setis involucriformibus onustus, limbo 5-fido; pet. 5; stam. 15; carpella 2 stylo terminali; akenia tubo cal. indurato inclusa membranacea, semine appenso. — Herbæ foliis pinnatisectis.

1. *A. EUPATORIA* (L. sp. 643.) hirsuta, foliis interruptè pinnatisectis, lobis oblongo-ovatis crenato-dentatis, petalis calyce duplò longioribus, fructibus distantibus, tubo calycis campanulato piloso setoso, setis patulis, foveolis usque ad basin productis. ♀ ad margines viarum sylvarumque. — Fl. fr. 4. p. 450. Lam. ill. t. 409. f. 1. Fl. dan. t. 588. (v. v.)

2. *A. ODORATA* (Camer. hort. 7.) hirsuta, foliis interruptè pinuatisectis, lobis oblongo-lanceolatis profundè crenato-dentatis, petalis calyce duplò longioribus, fructibus distantibus, tubo calycis campanulato piloso, foveolis obovatis usque ad basin productis, setis ascendentibus brevibus. ♀ circè Parisios, in Andegaviâ et agro Mimatensi (Mende) (Prost). — Fl. fr. 4. p. 451. (v. s.)

Trib. IV. SANGUISORBEÆ. *Juss. gen. p. 336. excl. gen.* *DC. prod. 2. p. 588.*

Flores sæpè polygamo-dioïci. Calyx 3-5-fidus, lobis per aestivationem valvatis, tubo apice contracto carpella fovente et cum iis demùm sæpè subaccreto. Pet. 0 aut 4 basi in corollam rotatam coalita. Stam. tot quot lobi calycini; nonnulla sæpè abortiva. Carpella pauca 1-2, stylo sublaterali, stigmate rarius capitato sæpius penicilliformi aut barbato. Akenia uni-ovulata sicca indehiscentia. Semen inversum. — Herbæ aut suffrutes, foliis sæpius compositis, floribus parvis.

XIV. ALCHIMILLA. *Tourn. inst. t. 289. DC. prod. l. c.* — *Alchemilla* et *Aphanes. L. gen. n. 165 et 166.*

Calyx tubulosus tubo apice subcontracto, limbo 8-partito, bracteolis alternis minoribus interdùm minimis dentiformibus; pet. 0; stam. 1-4; carpella 1-2 lateraliter stylum filiformem apice capitatum gerentia, demùm sicca indurata 1-sperma; semen inversum. — Herbæ, foliis palmatim lobatis aut sectis.

Sect. I. ALCHEMILLA. L. l. c.

Cal. 8-fidus, lobis alternis parum minoribus; stam. 2-4. — Species perennæ.

* *Foliis 7-9-nerviis 7-9-fidis.*

1. *A. VULGARIS* (L. sp. 178.) foliis reniformibus plicato-concavis 9-lobis serratis, caule petiolisque glabriusculis, floribus dichotomis corymbosis. \mathcal{U} in sylvis et pascais frequens. — Fl. dan. t. 963. Fl. fr. 4. p. 451. excl. var. ℓ . Stipulae incisaæ. (v. v.)
2. *A. HYBRIDA* (Hoffm. germ. 1. p. 79.) foliis reniformibus 9-lobis serratis subtus caule petiolisque sericeis, floribus fastigiatis glomeratis sessilibus. \mathcal{U} in pascais siccis montanis. — *A. vulgaris hybrida* Wild. Fl. fr. 4. p. 451. — Pluck. t. 240. f. 2. Stipulae serratae. (v. v.)

** *Foliis digitato-5-7-sectis, foliolis apice serratis.*

3. *A. ALPINA* (L. sp. 179. var. α .) foliis digitato-5-7-sectis, foliolis lanceolato-cuneatis obtusis apice adpresso-serratis subtus sericeis. \mathcal{U} in pascais montium. — Fl. fr. 4. p. 452. Eng. bot. t. 244. — Cam. epit. 909. ic. (v. v.)

*** *Foliis digitato-3-5-sectis, foliolis multifidis aut per totum ambitum serratis.*

4. *A. PENTAPHYLLA* (L. sp. 179.) foliis 3-5-sectis, segmentis multifidis glabris subciliatis, stipulis foliaceis apice 2-3-dentatis. \mathcal{U} in pascais excelsis Alpium Delphinatæ. — Fl. fr. 4. p. 452. — Bocc. mus. p. 18. t. 1. (v. v. in Helv.)

Sect. II. APHANES. L. l. c.

Cal. 4-fidus, rariùs 5-fidus, dentibus minimis inter lobos interjectis; stam. 1-2 fertilia, cætera abortiva. — Species annuæ.

5. *A. ARVENSIS* (Scop. carn. 1. p. 115.) foliis pubescentibus petiolatis 3-partitis, lacinia 2-3-fidis, floribus axillaribus glomeratis. (I) in arvis et agris. — Fl. fr. 4. p. 453. — *Aphanes arvensis* L. sp. 179. OEd. fl. dan. t. 973. (v. v.)

XV. SANGUISORBA. L. gen. n. 146.

Flores hermaphroditi; cal. 4-fidus extus basi bisquamosus; pet. o; stam. 4; carpella 2 intrà calycis tubum inclusa, stylo apice penicilliformi superata, in akenia sicca indehiscentia monosperma conversa; semen inversum. — Herbae perennæ, floribus in spicas densissimas aggregatis.

1. *S. OFFICINALIS* (L. sp. 169.) spicis ovatis, staminibus calyci æqualibus, calycibus bracteis foliisque glabris, foliolis ovato-subcordatis. \mathcal{U} in pratis. — Fl. fr. 4. p. 449. Eng. bot. 1312. (v. v.)


XVI. POTERIUM. L. gen. n. 1069.

Flores monoïci seu polygami; calyx basi 3-squamosus, tubo apice coarctato, limbo 4-partito; pet. o; stam. 20-50; ovaria 2 stylo filiformi et stigmate penicilliformi superata; akenia intrà calycem industratum sicca 1-sperma; semen inversum. — Flores in spicas dense aggregati.

1. *P. SANGUISOREA* (L. sp. 1411.) herbaceum, caulinibus subangulosis foliisque glabris, foliolis ovato-subrotundis, spicis globosis, floribus inferioribus masculis superioribus feminis. \mathcal{U} in pratis asperis. — Fl. fr. 4. p. 449. Cam. epit. 777. (v. v.)

ℓ . *puberulum* (DC.) caulinibus foliisque hinc indè puberalis. (v. s.)

Pinnus - *Lapitomicea*
— *Lomaxia cerasinus* —



Trib. V. ROSEÆ. DC. prod. 2. p. 596.

Calycis tubus apice contractus, limbo 5-partito, lobis per æstivationem apice subspiraliter imbricatis sæpè pinnatim sectis. Pet. 5. Stam. 8. Carpella plurima calycis tubo demùm baccato inserta et in eo inclusa sicca indehiscentia subcrustacea, è latere interiore stylum gerentia, stylis è calycis tubo coarctato exsertis, nunc omnino liberis, nunc in stylum columnarem accretis. Semen in akenio solitarium exalbuminosum inversum. Embryo rectus, cotyledonibus planiusculis. — Frutices aut arbusculæ.

XVII. ROSA. Tourn. inst. t. 408. L. gen. n. 631. Ser. in DC. prod. 2. p. 597.

Character isdem ac tribûs.

Sect. 1. SYNSTYLÆ. DC. cat. monsp. p. 137.

Styli in columnnam cohærentes; fructus ovati vel subglobosi; folia sæpè sempervirentia; stipulæ adnatæ.

1. R. ARVENSIS (L. mant. 245.) surculis flagelliformibus, aculeis inæqualibus falcatis, foliolis 5-7-nis subtus glancescentibus glabris vel subciliatis deciduis, floribus solitariis vel corymbosis, sepalis subintegris brevibus, stylis in columnnam elongatam glabram cohærentibus, fructibus ovatis vel ovato-globosis coriaceis pedunculisque glabris vel hispidulis. ♂ in sylvis et sepibus. Stipulæ apice divergentes, fructus carmosini.

a. *vulgaris* (Ser.) foliolis ovatis acutis. — R. arvensis a Fl. fr. 4. p. 438. Eng. bot. t. 188. — J. Bauh. 2. p. 44. f. 1. (v. v.)

β. *bibracteata* (Red. et Thor.) pedunculis bi-vel-multibracteatis, floribus numerosioribus, foliis latiusculis. — R. bibracteata Bast. in DC. fl. fr. 5. p. 537. (v. s.)

γ. *prostrata* (Desv.) foliis crassiusculis sempervirentibus. — In dumetis Tolosæ. — R. prostrata Fl. fr. 5. p. 536. (v. v. DC.)

2. R. SEMPERVIRENS (L. sp. 704.) surculis scandentibus, aculeis subæqualibus falcatis, foliis persistentibus 5-7-nis coriaceis, floribus subsolitariis corymbosique, sepalis subintegris longiusculis, stylis in columnnam elongatam pilosam cohærentibus, fructibus ovatis vel ovato-globosis pedunculisque sæpiissimè glanduloso-hispidis. ♀ in sepibus ad vias et sylvulis. — Fl. fr. 5. p. 533, 4. p. 446. Stipulæ apice subfalcatae acutiores, fructus aurantiacei.

a. *scandens* (DC.) pedunculis fructibusque hispidulis. — In provinciis mediterraneis et austro-occidentalibus. — R. atrovirens Viv. fragm. 1. p. 4. t. 6. (v. v.)

β. *microphylla* (DC.) foliolis minoribus, pedunculis fructibusque hispidulis. — in aridis apricis circâ Monspelium. (v. v.)

3. R. MOSCHATA (Mill. dict. n. 13.) surculis ascendentibus, aculeis caulinis tenuis recurvis, foliolis 5-7 lanceolatis acuminatis glabriusculis, stipulis angustissimis acutis, floribus sæpè numerosissimis, pedunculis lateralibus articulatis calycibusque pilosis subhispidis, sepalis subpinnatisectis elongato-appendiculatis, fructibus ovatis rubris. ♂ ex agro Tunetano orta? in hortis colitur. — Fl. fr. 4. p. 447. Red. et Thor. ros. 1. p. 33 et 99 ic. — J. Bauh. 2. p. 46 ic. Fl. albi odoratissimi. (v. v. c.)

4. R. STYLOSA (Desv. journ. bot. 1809, v. 2. p. 317.) surculis assurgentibus, aculeis validis aduncis, foliolis 5 ovato-acuminatis argutè serratis pubescentibus, stipulis amplis breviter acuminatis, petiolis tomentosis, floribus subsolitariis, sepalis pinnatisectis subappendiculatis, stylis in columnnam glabram clavatam cohærentibus. ♂ Fl. pallidè rosei.

a. *Desvauxiana* (Ser.) foliis pubescentibus non glandulosis, pedunculis

*calycibusque glabris. — In Pictaviâ superiore. — Desv. journ. bot. 1813.
v. 2. t. 14. Fl. fr. 5. p. 536. (v. s.)*

£. leucochroa (Ser.) foliis glabriusculis non glandulosis, pedunculis hispidulis, calycibus glabris. — in Pictaviâ superiore et in Andegaviâ. — R. leucochroa Desv. journ. bot. 1819, t. 15. R. brevistyla α . et γ . Fl. fr. 5. p. 537. (v. s.)

Sect. II. CHINENSES. DC. in Ser. mus. helv. I. p. 2.

Styli liberi subinclusi; sepala integrinacula deflexa; fructus ovati vel globosi; folia persistentia nitida coriacea; stipulae subliberæ subulatae vel angustissimæ sèpiùs deciduae.

5. R. INDICA (L. sp. 705.) caulinibus erectis subcanescensibus viridibus vel pureis, aculeis validis falcatis distantibus, foliolis 3-5 ovato-acuminatis coriaceis glabris serrulatis, stipulis valde angustis cum petiolo coalitis integrinculis vel serratis, staminibus inflexis, pedunculis subarticulatis sèpè incrassatis calycibusque lèvibus vel rugoso-setosis. ♂ Ex Chinâ orta, nunc in hortis frequentissima. — Red. et Thor. ros. 1. p. 49 et 51 ic. (v. v. c.)

Sect. III. CINNAMOMEÆ Ser. mus. helv. I. p. 2, et DC. prod. 2.
p. 602.

Styli liberi inclusi raro exserti; sepala integerrima raro subpinnatisecta post anthesin sèpè conniventiae; stipulae nullæ aut adnatae; aculei stipulares gemini; fructus globosi aut globoso-depressi.

6. R. TURBINATA (Ait. kew. ed. 1. v. 2. p. 206.) caule subinermi, ramis lèvibus, foliolis 5-7 ovato-cordatis bullato-rugosis amplis simpliciter serratis subtùs villosulis, stipulis maximum amplexicaulibus, floribus subcorymbosis amplis, pedunculis hispidulis, calycibus turbinatis sublævibus, sepalis indivisis subspathulatis, fructibus globosis. ♂ Patr. ign. — Fl. fr. 4. p. 441. Red. et Thor. 1. p. 127. ic. Fl. rubro-violacei. (v. v. c.)

7. R. GALlica (L. sp. 704.) aculeis inaequalibus, stipulis angustis apice divaricatis, foliolis 5-7 coriaceis rigidis ovatis vel lanceolatis deflexis, sepalis per anthesin patentibus, fructibus subglobosis valde coriaceis calycibus pedunculisque plus minus glanduloso-hispidis subviscosis. ♂ in dumetis apricis.

α . *pumila* (DC.) foliolis ovato-subrotundis rariter lanceolatis, stipulis angustissimis apice acutis, ramis plus minus aculeatis, pedunculis calycibusque hispidulo-glandulosis. — In dumetis imprimis provinc. austr. passim. — R. pumila Jacq. austr. 2. t. 198. (v. v.)


β . *officinalis* (Red. et Thor. 1. p. 73. ic.) foliolis ovatis lanceolatisve, pedunculis calycibusque glandulosis, sepalis vix pinnatisectis. — In hortis culta. (v. v. c.)

γ . *parvifolia* (Ser.) parvula subinermis, foliolis minimis subtùs petiolisque puberulis, tubo calycis apice dilatato pedunculisque sublævibus. — In montibus Divisionensis ex Dur. et in hortis culta. — R. Remensis fl. fr. 4. p. 443. (v. v. c.)

8. R. CINNAMOMEA (L. sp. 703.) cinerea, ramis strictis, aculeis geminis falcatis stipularibus, foliolis 5-7 ovato-ellipticis serrulatis subtùs pubescenti-cineréis, stipulis dilatatis undulatis jugo foliorum inferiorum valde proximis, sepalis apice spathulatis patulis, pedunculis brevibus, fructibus globosis vel sphærico-ovatis sepalis conniventibus coronatis. ♂ in Galliâ mediâ et austro-orientali passim. — Fl. fr. 4. p. 439. — J. Bauh. hist. 2. p. 39. f. 1. (v. v.)

9. R. EGLANTERIA (L. sp. 703.) caulinibus junioribus aculeatissimis, adultis armatis aculeis sparsis raro stipularibus, foliolis ovatis obovatissime argutè serratis supra lèvibus subtùs glandulosis, stipulis angustis integrinculis apice divergentibus, pedunculis calycibusque lèvibus, sepalis patentibus pinnatifidis, fructibus globosis. ♂ Patria ign.

α . *lutea* (Red. et Thor.) petalis concoloribus, stigmatibus purpureis. — In





- sepibus propè Avenionem (Requier) et in Galloprovinciâ ex Vill. — Fl. fr. 4. p. 437. (v. s. c.)
- f. punicea* (Red. et Thor.) petalis suprà puniceis infrà luteis, stigmatibus purpureis. — R. bicolor Jacq. vind. t. 1. (v. v. c.)
10. R. SULFUREA (Ait. kew. 2. p. 201.) caule juniore aculeatissimo, aculeis ramorum sparsis tenuibus falcatis, foliolis 5-7 glancis obovatis denticulatis glabris, stipulis planiusculis angustis subfimbriatis apice dilatatis, calyce globoso aut hemisphærico, sepalis subindivisis. ♂ ex Oriente verosimiliter indigena, in hortis culta. — Fl. fr. 4. p. 438. Red. et Thor. 1. p. 29. ic. (v. v. c.)
11. R. PIMPINELLIFOLIA (L. sp. 307.) caule juniore aculeatissimo, aculeis inæqualibus horizontalibus, foliolis 5-9 ovato-rotundis coriaceis tenuibus dentatis, stipulis angustis apice dilatatis, sepalis indivisis patentibus, pedunculis særissimè incrassatis, fructibus coriaceis sepalis convergentibus coronatis. ♂ in dumetis passim. Fructus nigri. — Fl. fr. 4. p. 438.
- a. vulgaris* (Ser.) pedunculis fructibusque lœvibus, floribus albis. — R. spinosissima Jacq. fragm. 79. t. 124. — Clus. hist. 1. p. 116. f. 1. 2. (v. v.)
- f. myriacantha* (Ser.) foliolis minimis, aculeis valde numerosis, inferioribus sœpè reversis, pedunculis calycibusque hispidis. — Propè Lugdunum et Monspelium. — R. myriacantha Fl. fr. 4. p. 439 et 5. p. 533. Red. et Thor. 3. p. 11. ic. Fl. albi. (v. v. DC.)
- g. inermis* (DC.) caule ramisque inermibus. — In montosis rariùs. (v. v.)
12. R. RUBRIFOLIA (Vill. dauph. 3. p. 549.) glanca pruinosa, aculeis paucis falcatis, foliolis ovatis dentatis 5-7, stipulis latiusculis acuminatis, pedunculis subcorymbosis brevibus hispidulis glabrisve, sepalis subspathulatis rarò pinnatiseptis corollam subsuperantibus, fructibus ovato-globosis nitido-subpelicidis. ♂ in Alpibus et montanis. Fructus rubri.
- a. lœvis* (Ser.) foliolis ovatis, floribus rubris, fructibus corymbosis pedunculisque lœvibus, sepalis integris. — In pratis Vogesorum, Alpium, montium Arvernæ, Cebenn., Pyren. — Fl. fr. 4. p. 445. Red. et Thor. 1. p. 31. (v. v.)
- f. pinnatifida* (Ser. mus. helv. 1. p. 11. t. 2. f. 11.) foliolis ovatis, floribus solitariis terminalibus, sepalis pinnatifidis, fructibus globosis pedunculisque lœvibus. — In Cebennis et Pyrenæis.
13. R. GLANDULOSA (Bell. act. tur. 1790. p. 230.) glauca, junior rubicunda, aculeis geminis stipularibus rectis validis, foliolis 5-7 ovato-rotundis duplicito-serratis stipulisque latiusculis acutis margine glandulosis, floribus sub-solitariis, tubo calycis subgloboso pedunculisque glanduloso-hispidis, sepalis integris longè subspathulatis corollam superantibus. ♂ in Alpibus Delph. propè Brigantium. — Fl. fr. 5. p. 539. R. rubrifolia var. ζ. Ser. (v. v. DC.)
- Sect. IV. CANINÆ Ser. in DC. prod. 2. p. 611.
- Styliberi inclusivel exserti; sepalapinnatifida post anthesin deflexa særissimè decidua; fructus særpius ovatus; stipulae adnatæ, aculei sparsi non stipulares.
- §. 1. Foliis non glandulosis.
14. R. ALPINA (L. sp. 703.) caulis junioribus aculeis debilibus numerosis echinatis, adultis lœvibus, foliolis 5-11 ovatis obovatisve argutè serratis vel duplicito-serratis, stipulis angustis apice divergentibus, pedunculis post anthesin deflexis, sepalis indivisis patulis, fructibus ovatis rarò subglobosis pendulis plus minusve elongatis calyce connivente coronatis. ♀ in montibus.
- a. vulgaris* (Desv.) pedunculis hispidis elongatis, calycibus lœvibus. — R. Alpina DC. fl. fr. 4. p. 446. — J. Bauh. 2. p. 39. f. 2. (v. v.)
- f. Pyrenaica* (DC.) pedunculis elongatis calycibusque hispidis. — R. Alpina f. fl. fr. 5. p. 536. R. Pyrenaica Fl. fr. 4. p. 446. (v. v.)
15. R. CANINA (L. sp. 704.) aculeis distantibus validis compressis falcatisque,

foliolis subcoriaceis acutè et sèpè duplicato-serratis, stipulis latiusculis acutis tenuissimè serrulatis, sepalis piunatidis post anthesin deflexis et dein deciditis, fructibus ovatis raro subglobosis coriaceis. ♂ in sepibus dumetis sterilibusque frequens. — Fructus punicei.

a. glabra (Desv.) petiolis glabris vix puberalis, foliolis ovatis acutis glabris, fructibus ovatis pedunculisque lèvibus. Fl. fr. 4. p. 447. — R. nitens Desv. in Mer. fl. par. 192. (v. v.)

β. leucantha, petiolis puberulis sèpè glandulosis, foliolis ovato-subrotundis acuminatis subtùs pilosulis, fructibus ovatis pedunculisque lèvibus. — In Neustriâ, Andegaviâ, Pictaviâ, Occitaniâ. — R. leucantha Lois. not. 82. DC. fl. fr. 5. p. 535. (v. s.)

γ. fastigiata (Desv.) aculeis validis, petiolis puberulis, foliolis ovatis acutis subtùs puberulis, fructibus ovatis lèvibus, pedunculis hispidis. — In Andegaviâ et Delphinatû. — R. fastigiata Bast. supp. 30. Fl. fr. 5. p. 535. Styli approximati non coaliti brevissimè exserti. (v. v. DC.)

δ. hispida (Desv.) ramis aculeatis, petiolis glabriusculis, foliolis ovatis acutis glabris, fructibus ovatis pedunculisque hispidulis. — In agro Aurelianensi, Andegaviensi, Mimatensi. — R. Andegavensis Bast. ess. 189. Fl. fr. 5. p. 539. (v. s.)

ε. dumetorum (Desv.) ramis aculeatis, petiolis tomentosis lanatisque, foliolis ovatis acutiusculis subtùs puberulis tomentosive, fructibus ovatis pedunculisque sublèvibus. — R. dumetorum Thuil. fl. par. ed. 2. p. 250. Fl. fr. 5. 534. R. collina Jacq. aust. 2. t. 197. Fl. fr. 4. p. 441.

§. 2. *Foliis subtùs plus minùsve glandulosis.*

16. *R. RUBIGINOSA* (L. mant. 564.) aculeis validis compressis uncinatis rarò rectis, foliolis 5-7 ovatis vel subrotundis serratis subtùs glanduloso-rubiginosis, ovaris ellipticis brevibus pedunculisque hispidis duris. ♂ in sepibus et dumetis. Fl. roseo-purpurei. Fructus punicei.

a. vulgaris (Wild.) germinibus subsolitariis pedunculisque plus minùsve glanduloso-hispidis, foliolis ovatis obtusis glabris glandulosisque, aculeis aduncis. — R. rubiginosa L. mant. 564. Fl. fr. 4. p. 445 et 5. p. 525. var. *β.* Eng. bot. 991. (v. v.)

β. umbellata (Lindl.) floribus 3-6 fasciculatis, fructibus ovato-globosis sublèvibus, pedunculis hispidis, foliolis ovato-rotundis glabris subtùs glandulosis, aculeis aduncis. — R. umbellata Fl. fr. 5. p. 532. — Red. et Thor. 1. p. 93. ic. (v. v.)

γ. parvifolia (Wild.) punila, aculeis numerosis, floribus subsolitariis, fructibus ovato-globosis pedunculisque sublèvibus, foliolis minimis subtùs rubiginoso-glandulosis glabris. — Monspelii in aridis montis Lupi. — R. micrantha Fl. fr. 5. p. 539. non Sm. Flores alborosei. (v. s.)

δ. sepium (Ser.) aculeis validis, foliolis obovatis ellipticis lanceolatisve suprà glabris subtùs glandulosis, petiolo glabro, floribus solitariis vel corymbosis, fructibus ovatis pedunculisque lèvibus. — In collibus siccis. — R. sepium Thuil. Fl. fr. 5. p. 538. — Red. et Thor. ros. 2. p. 61. ic. et 3. p. 51. ic. (v. v.)

17. *R. TEMENTOSA* (Sm. brit. 2. p. 539.) aculeis tenuibus basi vix compressis subaduncis, foliolis ovatis subduplicato-serratis plus minùs tomentosis, serraturis rectis, fructibus ovatis pedunculisque plus minùs hispidis. ♂ in montanis. — Fr. punicei.

a. Smithiana (Ser.) foliolis ovatis vel ovato-lanceolatis molliter tomentosis, pedunculis fructibusque plus minùs hispidulis. — R. tomentosa Fl. fr. 4. p. 440. eng. bot. t. 990. (v. v.)

β. scabriuscula (Ser.) foliolis ovatis suprà scabriusculis subtùs tomentosis, fructibus ovatis pedunculisque plus minùs hispidis. — In Jurasso. — R. scabriuscula Sm. eng. bot. t. 1896. — R. montana Fl. fr. 5. p. 532. non Vill. (v. s.)

γ. fœtida (Ser.) foliolis ovatis infrà pubescentibus suprà glabriusculis ru-





gulosis, pedunculis terminalibus subsolitariis hispidis, fructibus ovatis foetidis. — Ad ripas Ligeris. — *R. foetida* Bast. supp. 29. Fl. fr. 5. p. 534. Red. et Thor. 1. p. 131. ic. (v. s.)

18. *R. VILLOSA* (L. sp. 704.) aculeis tenuibus basi vix compressis rectis, foliolis ovatis subduplicato-serratis plus minus tomentosis, serraturis rectis, ovariis globosis saepius valde hispido-aculeatis subpendulis. ♂ in calidis. — *Fructus purpurei maximi*. — Fl. fr. 4. p. 440.

a. *sylvestris* (Desv.) foliolis lanceolatis ellipticis molliter villosis dense glandulosis, calycibus ovato-globosis valde aculeatis. — In collibus siccis. — J. Bauh. hist. 2. p. 38. f. 1. (v. v.)

β. *nuda* (Desv.) foliolis ovatis obtusis villoso-glutinosis, fructibus obovato-globosis laevibus, pedunculis hispidulis. — In sterilibus. (v. v.)

19. *R. CENTRIFOLIA* (L. sp. 704.) aculeis subrectis basi vix dilatatis, foliolis 5-7 ovatis margine glandulosis flaccidiusculis subtus pilosis, stipulis latiusculis acuminatis, sepalis per anthesin patentibus, fructibus conico-ovatis calycibus pedunculisque glanduloso-hispidis viscosis fragrantibus. ♂ Patr. ign., in hortis colitur.

a. *vulgaris* (Ser.) aculeis sparsis, foliolis ovatis planis serratis, sepalis ciliatis tomentosis. — Fl. fr. 4. p. 442. Red. et Thor. 1. p. 77. ic. et p. 25. ic. (v. v. c.)

β. *muscosa* (Ser.) aculeis inaequalibus parvis numerosis, foliolis ovatis planis serratis, pedunculis calycibusque glanduloso-muscosis. — *R. muscosa* Fl. fr. 4. p. 442. — Red. et Thor. 1. p. 39. et 41. ic. (v. v. c.)

γ. *Pomponia* (Lindl.) *parvula*, foliolis floribusque minimis. — *R. Pomponia* Fl. fr. 4. p. 443. Red. et Thor. 1. p. 65. ic. (v. v. c.)

20. *R. DAMASCENA* (Mill. dict. n. 15.) aculeis numerosis inaequalibus validis basi dilatatis, foliolis 5-7 ovatis rigidiusculis, sepalis per anthesin deflexis, ovario elliptico elongato apice saepè dilatato, calycibus pedunculisque glanduloso-hispidis viscosis, fructibus ovatis. ♂ ex Syriâ orta, in hortis colitur. — Red. et Thor. 1. p. 63. 53. 37. ic. *R. semperflorens* Desf. cat. 175. Fl. fr. 4. p. 443. non Curt. nec Wild. Fl. plus minus corymbosi suaveolentes.

21. *R. ALBA* (L. sp. 705.) glaucescens, aculeis tenuibus recurvis, foliolis saepissimè ovato-rotundis breviter acuminatis, petiolis nervisque foliorum subtomentosis glandulosisque, sepalis pinnatifidis, petalis patentibus, fructibus ovatis. ♂ in hortis frequentissime culta. — Fl. fr. 4. p. 448. — Fl. albi vel pallide rosei. (v. v. c.)

Trib. VI. *POMACEÆ* Juss. gen. p. 384. DC. prod. 2. p. 626.

Calycis tubus campanulatus urceolatusque ad maturitatem carnosus carpella fovens et cum iis adhaerens; limbus 5-lobus. Pet. 5. fauci calycis inserta decidua, aestivatione quinquunciali. Stam. 80 aestivatione inflexa. Discus saepius carnosus. Ovaria saepius 5 unilocularia in stylos totidem simplices coalitosve desinentia. Pomum calyce baccato carpellisque constans. Carpella cartilaginea aut ossea bivalvia aut indehiscentia. Semina saepius in quoque carpello 1-2; plurima in *Cydoniâ*, erecta, spermopermeo cartilagineo aut osseo. Cotyledones ovales carnosæ. — Frutices aut Arbores, foliis simplicibus rarius pinnatis stipulatis.

XVIII. *CRATÆGUS* Lindl. trans. lin. 13. p. 105. DC. prod. 2. p. 626. — Cratægi et Mespili sp. auct.

Cal. tubus urceolatus, limbus 5-fidus; pet. patentia orbiculata; ovarium 2-5-loculare: styli totidem glabri; pomum carnosum ovatum

dentibus calycinis vel disco incrassato clausum, putamine osseo. — Frutices spinosi, foliis angulatis aut dentatis.

§. 1. *Foliis dentatis subintegrise nec angulato-lobatis.*

1. C. PYRACANTHA (Pers. enc. 2. p. 37.) foliis glabris persistentibus ovato-lanceolatis crenatis, calycis lobis obtusis, stylis 5. ♂ in asperis et sepibus provincie australiorum et austro-occident. usquè ad Burdigalain ex Laterrade. — *Mespilus Pyracantha* L. sp. 685. Fl. fr. 4. p. 434. — *Lob.* ic. 2. p. 182. f. 1. (v. v.)

§. 2. *Foliis sœpiùs variè lobatis incisive.*

2. C. OXYACANTHA (L. sp. 683.) foliis obovato-cuneiformibus subintegris trifidis laciniatis glabris subnitidis, floribus corymbosis 1-3-gynis, calycibus eglandulosis acutis. ♂ in sepibus vulgaris, valde varians.
 - a. *obtusata* (DC.) foliis subrhomboidis basi obovatis indivisis aut obtusè trilobis crenatis utrinquè concoloribus, floribus 1-3-gynis. — *Mespilus oxyacanthoides* Fl. fr. 4. p. 433. — Fl. dan. t. 334. (v. v.)
 - β. *vulgaris* (DC.) foliis ovatis basi cuneatis profundè trifidis pinnatifidis utrinquè concoloribus, lobis acutis divergentibus subserratis, floribus 1-3-gynis. (v. v.)
 - γ. *laciniata* (Wallr.) *Mespilus Oxyacantha* Fl. fr. 4 p. 433. (v. v.)
3. C. AZAROLUS (L. sp. 683.) foliis pubescensibus basi cuneatis trifidis, lobis obtusis grossè pauci-dentatis, ramulis corymbis calycibusque pubescensibus, cal. lobis obtusis, floribus 1-3-gynis. ♂ in sylvulis asperis Galliae australis. — *Mesp. Azarolus* Fl. fr. 4. p. 434. — J. Bauh. 1. p. 67. ic. (v. v.)

XIX. COTONEASTER Medik. gesch. bot. 1793. DC. prod. 2. p. 632.

Flores abortu polygami. Cal. turbinatus obtusè 5-dentatus; pet. brevia erecta; stam. dentium calycis longitudine; styli glabri staminibus breviores; carpella 2-3 parietalia calyce inclusa biovulata. — Frutices, foliis simplicibus integerrimis.

1. C. VULGARIS (Lindl. trans. linn. 13. p. 101.) foliis ovatis basi rotundatis, calycibus pedunculisque glabris. ♂ in rupestribus montosis Galliae australis orientalisque. — *Mespilus Cotoneaster* L. sp. 686. Fl. fr. 4. p. 435. — Clus. hist. 1. p. 60. f. 2. (v. v.)
2. C. TOMENTOSA (Lindl. l. c.) foliis ellipticis utrinquè obtusis, calycibus pedunculisque lanatis. ♂ in rupestribus Jurassi Alpium, et Pyr. or. loco dicto Font de Comps ex cl. Benth. — *Mespilus eriocarpa* DC. Fl. gall. synops. et Fl. fr. 5. p. 532. (v. v.)

XX. AMELANCHIER Medik gesch. 1793. Lindl. trans. linn. 13. p. 100.


Cal. 5-fidus; petala lanceolata; stam. calyce subbreviora; ovarii loculi 10 seu potius 5 bipartiti; ovula 10 in loculorum partitionibus solitaria; styli 5 basi subcoaliti; pomum maturum 5-5-loculare; semina 3-5 endocarpio cartilagineo. — Arbusculæ, foliis simplicibus serratis.

1. A. VULGARIS (Moench. meth. 682.) foliis subrotundo-ovalibus obtusiusculis subtus pubescensibus demum glabris. ♂ in asperis montosis. — *Crataegus Amelanchier* Fl. fr. 4. p. 432. — Clus. hist. 1. p. 62. ic. (v. v.)

XXI. MESPILOUS Lindl. l. c. p. 99. DC. l. c. — *Mespili sp.* L.

Cal. 5-fidus, laciniis foliaceis; petala suborbiculata; discus magnus mellifluus; styli 2-5 glabri; pomum turbinatum apertum 5-loculare, endocarpio osseo. — Arbusculæ, foliis lanceolatis serrulatis.

1. M. GERMANICA (L. sp. 684.) foliis lanceolatis subtus tomentosis indivisis, floribus solitariis. ♂ in dumetis et sylvaticis; colitur. — Fl. fr. 4. p. 434. Pall. fl. ross. t. 13. f. 1. (v. v.)





XXII. PYRUS Lindl. l. c. p. 97. DC. prod. 2. p. 633.—Pyrus et Sorbus L.

Cal. tubus urceolatus, limbus 5-lobus; petala subrotunda; styli saepius 5, rarius 2-3; pomum clausum 5-loculare putaminibus cartilagineis. Semina in quoque loculo 2, testâ cartilagineâ. — Arbores fructicves.

Sect. I. PYROPHORUM DC. l. c.

Petala patentia plana, styli 5 liberi; pomum plus minus turbinatum aut subglobosum nec basi umbilicatum; pedicelli simplices umbellati, folia simplicia eglandulosa.

1. P. COMMUNIS (L. sp. 686.) foliis ovatis serratis utrinquè gemmis ramulisque glabris, pedunculis corymbosis. ♂ in nemoribus sylvestris et in hortis culta. — Fl. fr. 4. p. 430.

a. *Acras* (Wallr.) spinosa, foliis ovatis acuminatis integerim longè petiolatis junioribus calycisque tubo lanatis demum glabrat, pomis basi productis. ♂ sylvestris. (v. v.)

β. *Pyraster* (Wallr.) spinosa, foliis subrotundis acutis argutè serratis junioribus calycisque tubo glabris, pomis basi rotundatis. ♂ sylvestris. — Gærtn. fr. t. 87. f. 2. (v. v.)

γ. *sativa* (DC.) inermis. — Quoad innumeratas varietates in hortis cultas vide Mill. dict. Duham. arb. fruit.

2. P. BOLLWYLLERIANA (DC. fl. fr. 5. p. 530.) foliis ovatis grossè serratis subtus gemmisque tomentosis, corymbis multifloris. ♂ in sylvis Alsatiae circâ Bollwylle. — P. Pollveria L. — J. Bauh. hist. 1. p. 59. ic. Fructus turbinati parvi intus flavidi. (v. v. DC.)

3. P. SALVIFOLIA (DC. prod. 2. p. 634.) foliis lanceolatis integerim subtus gemmisque tomentosis, superne junioribus velutinis adultis glabris. ♂ in Galliâ circâ Aureliam et Cænonanum sylvestris et culta. — Fl. fr. 5. p. 531. in adnot. (v. v. DC. sine fl.)

4. P. AMYGDALIFORMIS (Vill. cat. strab. 322.) spinosa, foliis oblongis acutis integerim subtus gemmisque tomentosis, superne junioribus velutinis, adultis glabris petiolo sextuplo longioribus, floribus corymbosis. ♂ sylvestris in asperis Galloprovinciæ, Delphinatûs, Occitanie. — Fl. fr. 5. p. 531. (v. v. DC.)

Sect. II. MALUS Tourn. inst. t. 406.

Petala patentia plana; styli 5 basi subeoaliti; pomum saepius globoso-depressum semper basi umbilicatum; pedicelli simplices umbellati; folia simplicia eglandulosa.

5. P. ACERBA (DC. prod. 2. p. 635.) foliis ovatis acutis crenatis, junioribus calycinisque tubis glaberrimis, floribus corymbosis. ♂ in sylvis et versuris. — Malus acerba Mer. fl. par. 187. Fl. fr. 5. p. 530. — Fructus acerbi. (v. v.)

6. P. MALUS (L. sp. 686.) foliis ovatis acutis crenatis subtus calycisque tubis lanatis, floribus corymbosis, stylis glabris. ♂ in nemoribus et versuris sylvestris. In hortis culta innumeratas varietates profert, de quibus videndum Duham. arb. fruit. (v. v.)

Sect. III. ARIA DC. prod. 2. p. 635.

Petala patentia plana; styli saepius 2-3; pomum globosum. — Flores racemoso-corymbosi, pedunculi ramosi; folia simplicia eglandulosa subtus albo-tomentosa.

7. P. ARIA (Ehr. heitr. 4. p. 20.) foliis ovatis duplicato-serratis subtus adpresso-albo-tomentosis, corymbis planis. ♂ 5 in nemoribus. — Crataegus Aria Fl. fr. 4. p. 432. Sorbus Aria Grantz austr. t. 2, f. 2. (v. v.)

8. P. INTERMEDIA (Ehr. beitr. 4. p. 20.) foliis ovatis inciso-lobatis dentatis subtus adpressè albo-tomentosis, corymbis planis. ♂ 5 in sylvis Delphinatūs et propè Fontembellaqueum. — Crat. latifolia Fl. fr. 4. p. 431. Duham. arb. 1. t. 8o. An satis distincta species? (v. s.)

Sect. IV. TORMINARIA DC. l. c.

Petala patentia plana subunguiculata; styli 2-5 inter se connexi glabri; pomum basi turbinatum subexsuccum calycinis lobis deciduis truncatum. — Folia lobato-angulata, adulta glabra, flores corymbosi, pedunculi ramosi.

9. P. TORMINALIS (Ehr. beitr. 6. p. 92.) foliis cordato-ovatis pinninerviis pinnatifido-lobatis, juvioribus subtus puberalis, adultis glabris, lobis serratis acuminatis, infimis divaricatis. ♂ in sylvis asperis passim. — Crataegus terminalis L. sp. 681. Fl. fr. 4. p. 431. — Cam. epit. 162. ic. (v. v.)

Sect. V. SORBUS L. gen. n. 623.

Petala patentia plana; styli 2-5; pomum globosum turbinatumve. — Folia impari-pinnata aut pinnatisecta; flores corymbosi, pedunculi ramosi.

10. P. AUCUPARIA (Gærtn. fruct. 2. p. 45. t. 87.) foliis pinnatis glabriusculis, foliolis serratis, gemmis molliter tomentosis, pomis globosis. ♂ in nemoribus montosis. — Sorbus Aucuparia L. sp. 683. Fl. fr. 4. p. 436. Crantz. austr. t. 1. f. 4. (v. v.)

11. P. SORBUS (Gærtn. fruct. 2. p. 45. f. 87.) foliis pinnatis, foliolis serratis subtus villosis demum glabris, gemmis glabris glutinosis acuminatis, pomis pyriformi-ovovatis. ♂ in montosis sylvaticis versurisque, sylvestris et culta. — Sorbus domestica L. sp. 684. Fl. fr. 4. p. 436. — Cam. epit. 160. ic. (v. v.)

Sect. VI. CHAMÆMESPILUS DC. l. c.

Petala erecta conniventia concava; styli 2; pomum ovatum. — Folia simplicia eglandulosa; flores capitato-corymbosi.

12. P. CHAMÆMESPILUS (Lindl. tr. lin. 13. p. 98.) foliis ovatis serratis glabris. ♂ in montibus. — Crat. Chamæespilus Jacq. austr. t. 231. Fl. fr. 4. p. 432. — Clus. hist. 1. p. 63. f. 1. Folia juniora subtus pube deciduâ instructa. (v. v.)

XXIII. CYDONIA Tourn. 632. inst. t. 405. DC. prod. 2. p. 638.

Cal. 5-fidus; pet. suborbiculata; stam. erecta; styli 5; pomum clausum 5-locul. loculis polyspermis cartilagineis; semina pulpâ mucilagineâ obducta. — Arbusculæ, foliis indivisis.

1. C. VULGARIS (Pers. enc. 2. p. 40.) foliis ovatis basi obtusis integerrimis subtus calycibusque tomentosis. ♂ in Occitaniæ et Galloprovinciæ sepiibus, in hortis frequenter culta. — Pyrus Cydonia L. sp. 687. Fl. fr. 4. p. 430. (v. v.)





Ordo XXXV. GRANATEÆ *Don DC. prod. t. 3. ined.*

Calycis tubus turbinatus, limbus 5-7-fidus coriaceus, lobis per aestivationem valvatis. Petala 5-7. Stam. ∞ filamentis liberis, antheris anticis bilocularibus rimâ dupli dehiscentibus. Stylus filiformis. Stigma capitatum. Fructus magnus sphæricus calycis limbo subtubuloso coronatus ejusdem tubo corticatus, indehiscens, diaphragmate horizontali inæqualiter bicameratus, camerâ superiore 5-7-locul., inferiore minore 3-loculari, septis utriusque membranaceis loculos separantibus. Placentæ cameræ super. carnosæ à parietibus ad centrum tendentes, in inferiori processus irregulares ab ipso fundo. Semina ∞ pulpâ pellucidâ baccata, exalbuminosa. Embryo oblongus, radiculâ brevi rectâ, cotyledonibus foliaceis spiraliiter convolutis. — Arbusculæ, ramulis subspinescentibus, foliis deciduis sæpiùs oppositis oblongis integris impunctatis.

I. PUNICA *Tourn. inst. t. 407. L. gen. n. 618.*

Car. isdem ac ordinis.

1. P. GRANATUM (L. sp. 676.) foliis lanceolatis, caule arboreo. ♂ ♂ in Gallia australiori. — Fl. fr. 4. p. 427. Sims. bot. mag. t. 1832. (v. v.)

Ordo XXXVI. MYRTACEÆ *Brown gen. rem. p. 14. DC. prod. t. 3. ined. — Myrti. Juss. gen. 323.*

Calycis sepala 4-6 sæpiùs 5 concreta in tubum ovario adnatum, apice nunc usque ad ovarii marginem libera, nunc paulò ultrà in faucem concreta. Petala calyci inserta tot quot sepala, iis alterna, aestivatione quinquunciali. Stamina cum petalis inserta, sæpè multiserialia, numero petalorum dupla aut multipla, filamentis nunc liberis nunc variè connexis, antheris 2-locularibus rimâ dupli dehiscentibus. Carpella 4-6 sæpiùs 5, abortu sæpè pauciora, concreta in ovarium multiloculare calyci adnatum. Stylus sæpiùs stylis partialibus omnino concretis constans et ideò unicus stigmate simplici dictus, interdùm stylis (in Philadelpho) plus minus ad apicem distinctis et ideò ferè multiplex dicendus. Fructus polyspermus. Embryo sæpiùs exalbuminosus. Cotyledones non convolutæ. — Arbores aut frutices, foliis sæpiùs oppositis exstipulatis plerisque pellucido-aut-glanduloso-punctatis.

Trib. I. *MYRTEÆ DC. l. c.*

Sepala 4-5. Petala totidem. Staminum filam. libera. Fructus carnosus plurilocularis. — Pedunculi axillares.

I. *MYRTUS Lin. gen. 617. DC. l. c.*

Calycis tubus subglobosus; pet. 5; bacca 2-3-locul. subglobosa calycis limbo coronata, semina in loculo quoque plurima subossea reniformi-incurva; embryo curvus, cotyledonibus semi-cylindricis brevissimis, radiculâ cotyledonibus duplò longiore.

1. *M. COMMUNIS* (L. sp. 673.) pedicellis solitariis 1-floris, bracteolis 2 linearibus deciduis subflore, calyceibus 5-fidis, foliis ovatis lanceolatisve acutis. ♂ in apricis rupestribus Corsicæ, Niceæ, Galloprovinciæ australis, Narbonæ et agri Ruscianonensis. — Fl. fr. 4. p. 426. Lam. ill. t. 419. (v. v.)


Trib. II. *PHILADELPHEÆ DC. l. c.*

Sepala 4-10. Petala totidem. Stam. libera. Fructus siccus plurilocularis. Semina arillata albuminosa. — Folia impunctata.


I. *PHILADELPHUS L. gen. n. 614.*

Calycis tubus obovato-turbinatus, limbus 4-5-partitus; pet. 4-5; stam. 20-25 libera petalis breviora; styli 4-5; capsula calyci semi-adnata 4-5-locularis polysperma; semina inclusa arillo membranaceo oblango; albumen carnosum; embryo inversus rectus.

1. *P. CORONARIUS* (L. sp. 671.) foliis ovatis acuminatis dentatis glabriusculis, stylis à basi ferè distinctis stamina non superantibus. ♂ ad sepes in Delphinatu, frequenter in hortis cultus. — Fl. fr. 4. p. 425. Lam. ill. t. 420. (v. v. c.)







Ordo XXXVII. CUCURBITACEÆ Juss. gen. p. 393. DC. fl. fr. 3. p. 688. St.-Hil. mem. mus. 9. p. 190. Ser. in mem. soc. Genev. 3. p. 1. p. 5.

Flores hermaphroditi monoïci vel dioïci. Calyx monosepalus suprà coarctatus, sepalis 5 plus minus basi inter se et mediante toro cum carpellis coalitis. Corolla marcescens persistens. Petala 5 libera aut coalita à calyce distincta, aut rariùs cum calyce subcontinua ex margine tori nascentia. Stamina 5 libera vel sèpius triadelpa; antheræ biloculares longissimæ rarò ovatae breves. Stylus 1 rarò subnnullus; stigmata 3-5 biloba crassa. Carpella 3-5 (abortu 1) carnosa, toro et calyce involuta. Bacca cortice duro 1-5-locularis. Semina angulo septemtorum interno adfixa horizontalia arillata, arillâ aquosâ exsiccatibne membranaceâ; funiculus umbilicalis semen versus tumidus; hylus obliquus ad apicem seminis. Embryo rectus; albumen nullum; cotyledones planæ foliaceæ; radicula hylum versus directa. — Herbæ scandentes sèpè asperæ, foliis petiolatis alternis, pilis septulatis sèpè munitis, cyrrhis axillaribus, pedunculis axillaribus mediò articulatis.

I. LAGENARIA Ser. in mem. soc. Genev. 3. p. 1. p. 25. et in DC. prod. t. 3. ined.

Calyx campanulatus, laciniis subulatis vel latiusculis tubo brevioribus; petala libera et à calyce distincta infra calycis marginem nascentia. *Masc.* Stam. 5 triadelpa. *Fem.* Stylus ferè nullus; stigm. 3; fructus 3-5?-locularis; semina obovata compressa margine tumida apice biloba. — Fl. monoïci albi.

1. *L. VULGARIS* (Ser. l. c.) molliter pubescens, cyrrhis 3-4-fidis, foliis cordatis integriusculis basi biglandulosis, floribus patentissimis fasciculatis, fructibus pubescentibus maturitate glabratris laevissimis. (I) ex Indiâ orta, in hortis culta. — *Cucurbita Lagenaria* L. sp. 1434. Fl. fr. 3. p. 692. — Moris. hist. s. 1. t. 5. n. 1. 2. 3. (v. v. c.)

II. CUCUMIS L. gen. n. 1479.

Calyx tubuloso-campanulatus, laciniis subulatis vix longitudine tubi; petala inter se et cum calyce vix coalita. *Masc.* Stam. 5 triadelpa. *Fem.* Stigmata 3 crassa; fructus 3-6-locularis, seminibus ovatis compressis non marginatis. — Fl. monoïci vel hermaphroditi lutei.

1. *C. MELO* (L. sp. 1436.) caule humifuso scabro, foliis rotundatis angulatis petiolatis, florum masculorum calycis tubo basi subventricoso apice dilatato, staminibus inclusis, hermaphroditorum stigmatibus 3-4, fructu ovato vel subgloboso sulcato. (I) ex Asiâ ortus, in hortis cultus. — Fl. fr. 3. p. 691. (v. v. c.)
2. *C. SATIVUS* (L. sp. 1437.) caule scabro, foliis cordatis obsoletè 5-lobis petiolatis, lobo terminali majore, floribus breviter pedunculatis subtornis. masculorum tubo calycis tubuloso-campanulato, petalis acutiusculis, fructibus oblongis sèpè nitidis. (I) ex Indiâ orientali ortus, in hortis cultus. — Fl. fr. 3. p. 691. — Lob. str. p. 363. f. 1. (v. v. c.)

3. *Citrullus* (Ser. in DC. prod. t. 3. ined.) valde pilosus, caule humifuso, foliis obtusè pinnati-sectis subglaucous, floribus solitariis bracteis oblongè suffultis, fructibus subglobosis glabris. (I) ex Africâ et Indiâ ortus, in hortis colitur. — *Cucurbita Citrullus* L. C. *Anguria* Duch. in Lam. dict. 2. p. 158. Fl. fr. 3. p. 694. — Lob. stirp. 364. f. 2. (v. v. c.)

III. BRYONIA L. gen. n. 1480.

Flores monoici vel dioici; petala basi vix coalita. *Masc.* Calyx 5-dentatus; stam. 3-adelpha. *Fem.* Stylus 3-fidus; fructus ovatus vel globosus oligospermus, semina ovata vix compressa plus minus marginata. — Cyrrhi simplices raro bifurci.

1. *B. ALBA* (L. sp. 621.) caule scandente, foliis cordatis 5-lobis dentatis calloso-punctatis scabris, lobo terminali vix majore, floribus racemosis monoicis, fructibus globosis. (I) in Galliâ austro-occidentali et Pyrenæis ex Lapeyr. — Fl. fr. 5. p. 432. Lam. ill. f. 796. (v. s.)
2. *B. dioica* (Jacq. aust. t. 199.) caule scandente, foliis cordato-palmatis 5-lobis dentatis calloso-punctatis, lobo terminali longiore, floribus racemosis dioicis, filamentis basi pilosis, fructibus globosis. (I) in sepibus. — Fl. fr. 3. p. 689. eng. bot. t. 439. — Mill. ic. t. 71. *Fructus rubri.* (v. v.)
3. *B. lutea* (Ser. l. c.) foliis profundè lobatis, lobis lateralibus sublinearibus terminali lanceolato lateraliter bidentato, fructibus luteis. — in sepibus et sylvaticis Arverniæ. (v. s.)

IV. MOMORDICA L. gen. n. 1477.


Fl. monoici. *Masc.* Calyx 5-fidus tubo brevissimo; cor. 5-partita; stamina 3-adelpha, antheris connatis. *Fem.* Filamenta 3 sterilia; stylus trifidus; ovarium 3-loculare; fructus sæpè muricatus, maturus elasticè dissiliens; semina compressa.


1. *M. ELATERIUM* (L. sp. 1434.) hispido-scabra glaucescens, caule nano absque cyrrhis, foliis cordatis sublobatis crenato-dentatis longè petiolatis, fructibus ovatis hispido-scabris. (I) in sterilibus Galliæ Mediterraneæ et austro-occidentalibus usque ad Burdigalam ex Laterrade. — Fl. fr. 3. p. 690. bot. mag. t. 1914. — Black. herb. t. 108. (v. v.)

V. CUCURBITA L. gen. n. 1478.

Flores monoici; corolla campanulata; petala inter se et cum calyce coalita. *Masc.* Calyx hemispherico-campanulatus; stam. 5 triadelpha et syngenesia. *Fem.* Calyx obovato-clavatus campanulatusve et post anthesin infra limbum semper circumscissus; stigm. 3; fructus 3-5-locularis; semina ovato-compressa margine vix tumidulo.

1. *C. MAXIMA* (Duch. in Lam. dict. 2. p. 151.) foliis cordatis rugosis, petiolis hispidis, tubo calycis obovato in collum breve desinente, fructibus globosis subdepressis. (I) Patria ignoratur, sæpè colitur. — Fl. fr. 3. p. 692. — Lob. ic. 641. f. 2. (v. v. c.)
2. *C. MELOPEPO* (L. sp. 1435.) foliis cordatis obtusis subquinquelobis denticulatis, calyce brevi hemispherico-campanulato, fave valde dilatata, fructibus depressis, carpellis ultrà fancem calycis proeminenter 4-5-locularibus. (I) Patria ign., colitur. — *C. pepo* ♂ Fl. fr. 3. p. 693. — J. Bauh. hist. 2. p. 224. — Moris. hist. 1. s. 1. t. 8. (v. v. c.)
3. *C. PERO* (L. sp. 1435.) foliis cordatis obtusis subquinquelobis denticulatis, calycis tubo in collum desinente, fructibus subrotundis oblongisve. (I) ex Oriente indigena, ubique colitur. — Fl. fr. 3. p. 693. excl. var. ζ. (v. v. c.)





Ordo XXXVIII. ONAGRARIÆ Juss. ann. mus. 3. p. 315.
excl. Halorageis. DC. prod. t. 3. ined.

Calycis tubus cum ovario aut totus adnatus aut basi adhærens et ultrà ovarium productus, limbus 2-5 saepius 4-lobus. Petala tot quot calycis lobi, plerumque regularia, lobis alterna, summo tubi inserta, rarius nulla. Stamina petalis æqualia nunc dupla nunc dimidiò minora, filamentis liberis, antheris oblongis aut ovatis. Ovarium pluriloculare, saepè glandulâ cupulari coronatum. Stylus filiformis. Stigma capitatum aut lobatum. Fructus capsularis baccatus aut drupaceus 2-aut 4-locularis. Semina plurima (aut rarissimè solitaria) in quoque loculo, angulo centrali adfixa, exalbuminosa (endoplevrâ tumidâ interdùm albumen mentiente), embryone recto, radiculâ longâ teretiusculâ, cotyledonibus brevibus. — Herbæ (in nostris), foliis simplicibus integris aut dentatis penninerviis.

* Trib. I. ONAGRÆ DC. l. c.

Fructus capsularis, loculis polyspermis. Calycis tubus ultrà ovarium productus. Stamina petalorum numero dupla.

I. EPILOBIUM L. gen. 471. Gærtn. fruct. 1. p. 157. t. 31. f. 6.

Calyx 4-sepalus, sepalis coalitis in tubum longum tetragonum, limbo post anthesin caduco; petala 4; stamina 8 polline non viscoso; capsula linearis obtusè tetragona 4-locularis 4-valvis polysperma; semina papposa.

Sect. I. CHAMENERION Tourn. inst. p. 302. t. 157. f. A. C. D.

Flores irregulares, petala ovata; genitalia deflexa.

1. E. SPICATUM (Lam. dict. 2. p. 373.) caule erecto stricto, foliis sparsis lanceolatis longissimis integris venosis subpellucidis, bracteis à basi pedicellorum omnino liberis et hinc pedicellis axillaribus, pistillo staminibus longiore. ♂ in sylvis montosis, in hortis saepè cultum. — Fl. fr. 4. p. 421. E. angustifolium & L. sp. 493. — J. Bauh. 2. p. 907. f. 1. (v. v.)
2. E. ROSMARINIFOLIUM (Hæncke in Jacq. coll. 2. p. 50.) caule erecto ramoso, foliis linearibus lineari-lanceolatis obsoletè denticulatis aveniis, bractearum parte inferiore cum pedicellis plus minus coadunata, stylo staminibus brevior. ♂ in sylvaticis humidis. — Fl. fr. 4. p. 421. — Moris. s. 3. t. 11. n. 2. Lob. ic. 343. f. 2. (v. v.)

♂. *Dodonæi*, caule debili tortuoso, foliis saepè latioribus. — Ad torrentes Alpium. — E. *Dodonæi* Vill. dauph. 3. p. 507. (v. v.)

Sect. II. LYSIMACHION Tausch. hort. canal. fasc. 1.

Flores regulares, petala obcordata, genitalia ascendentia.

3. E. ALPINUM (L. sp. 495.) caule basi repente, foliis ovato-oblongis obtusis denticulatis integrisve oppositis glaberrimis in brevem petiolum attenuatis, floribus ante anthesin nutantibus, stigmate indiviso, capsulis laevibus pedi-

- cellatis. ♀ in Alpibus et Pyrenæis. — Fl. fr. 4. p. 424. eng. bot. t. 2001. (v. v.)
4. E. ORGANIFOLIUM (Lam. dict. 2. p. 376.) caule ascendente in parte superiori nutante, foliis lanceolato-ovatis acutis denticulatis sessilibus oppositis glabris, floribus ante anthesin erectis, stigmate indiviso, capsulis lœvibus pedicellatis. ♀ in Alpibus, Pyrenæis, et editioribus montibus Arvernianæ. — Fl. fr. 4. p. 424. E. alsinæfolium eng. bot. t. 2000. (v. v.)
5. E. ROSEUM (DC. fl. fr. 4. p. 422. non Smith.) caule erecto simplici, foliis oppositis binis ternis lanceolato-ovatis acuminatis serrulatis pubescentibus sessilibus, petalis calyce longioribus, stigmate indiviso, floribus subsessilibus, capsulis breviter pedicellatis. ♀ in Alpibus et Pyrenæis. (v. s.)
6. E. MONTANUM (L. sp. 494.) caule erecto ramoso aut simplici, foliis alternis oppositivis lanceolatis inæqualiter serratis subsessilibus glabriusculis, petalis calyce longioribus, stigmate 4-partito, floribus sessilibus, capsulis gracilibus elongatis breviter pedicellatis. ♀ in sylvis montosis. — Fl. fr. 4. p. 423. fl. dan. t. 922. (v. v.)
7. E. PALUSTRE (L. sp. 495.) caule tereti ramoso aut simplici infernè glabro supernè puberulo, foliis sessilibus lanceolatis subdenticulatis oppositis alternisque glabris, stigmate indiviso, capsulis pubescentibus. ♀ ad marginem fossarum et stagnorum. — Fl. fr. 4. p. 422. eng. bot. t. 346. (v. v.)
8. E. HIRSUTUM (L. sp. 494.) caule ramoso hirto, foliis oppositis alternisque lanceolato - oblongis hirsutis amplexicaulibus irregulariter serratis, serraturis subhamatis, stigmate 4-partito, sepalis mucronatis. ♀ ad aquas. — Fl. fr. 4. p. 421. eng. bot. t. 838.
- α. *vulgare*, caule ramis foliisque pilosis, capsulis pilis brevibus tectis. (v. v.)
- β. *intermedium* (Ser. in DC. prod.) caule ramis foliisque pilosissimis, capsulis lanatis. — Circà Parisios, Monspelium, Nemausum. — E. *intermedium* Mer. fl. par. t. 2. p. 290. (v. s.)
9. E. MOLLE (Lam. dict. 2. p. 475.) caule stricto villoso ramoso aut simplici, foliis oblongo - lanceolatis serrulatis acutis molliter pubescentibus oppositis alternis sessilibus, stigmate 4-partito, capsulis puberulis subglabrisve. ♀ in humidis umbrosis. — Fl. fr. 4. p. 422. E. *parviflorum* Schreb. eng. bot. t. 795. — Moris. s.3. t. 11. n. 4. (v. v.)
10. E. TETRAGONUM (L. sp. 494.) caule erecto tetragono subglabro, foliis oblongo - lanceolatis serratis acutis glabris alternis oppositivis in petiolum attenuatis, stigmate indiviso, capsulis puberulis. ♀ in inundatis et ad marginem stagnorum et fossarum. — Fl. fr. 4. p. 422. eng. bot. t. 1948. (v. v.)


II. OENOTHERA L. gen. 469.

Calyx 4-sepalus, sepalis coalitis in tubum longum tetragonum aut octocostatum limbo post anthesin caduco; petala 4; stamina 8 polline viscoso; capsula oblongo-linearis obtusè tetragona aut obovato-clavata 4-locularis 4-valvis polysperma, seminibus nudis.

1. OE. BIENNIS (L. sp. 492.) caule muricato-villoso, foliis ovato-lanceolatis planis, staminibus corollâ brevioribus, petalis obcordatis, capsulis oblongis subturgidis. ② in humidis passim. — Fl. fr. 4. p. 419. — Mill. ic. t. 189. f. 2. (v. v.)

Trib. II. JUSSIEÆ DC. prod. t. 3. ined.

Fructus capsularis loculis sæpius polyspermis, rarius 1-spermis. Calycis tubus ultrâ ovarium non productus et immediatè partitus.





III. ISNARDIA DC. l. c. — Isnardiae et Ludwigiae sp. L. gen. n. 156
et 153.

Calycis tubus ovatus aut subcylindraceus brevis ovario adhærens, limbus 4-partitus persistens; petala nunc 4 calyci alterna interdum rudimentaria, nunc nulla; stam. antè lobos calycinis; stylus à basi filiformis deciduus; stigma capitatum; capsula obovata aut ferè cylindracea tetragona 4-valvis 4-locularis polysperma, loculicido-dehiscens. — Herbæ aquaticæ aut paludosæ.

1. I. PALUSTRIS (L. sp. 175.) caule procumbente radicante glabro, foliis oppositis in petiolam attenuatis ovatis acutis, floribus axillaribus solitariis sessilibus apetalis. (I) in fossis et aquosis passim. — Fl. fr. 4. p. 419. — Bocc. mus. t. 84. f. 2. (v. v.)

IV. CIRCEA Tourn. inst. t. 155. L. gen. p. 24.

Calyx brevis limbo bipartito; petala 2 obcordata; stam. 2 petalis alterna; stigma emarginatum; capsula ovata pilis uncinatis hispida 2-loc. 2-valvis 2-sperma; semina in loculis solitaria erecta.

1. C. LUTERINA (L. sp. 12.) caule erecto pubescente, foliis ovatis acutis denticulatis sæpiùs subpubescentibus. ♀ in sepibus et nemoribus umbrosis. — Fl. fr. 4. p. 417. eng. bot. t. 1056. — Lob. ic. 266. f. 2. (v. v.)
2. C. ALPINÆ (L. sp. 12.) caule basi ascendente aut radicante glabro, foliis cordatis acutis dentatis membranaceis lævibus. ♀ in umbrosis et humidis montibus. — Fl. fr. 4. p. 417. eng. bot. t. 1057. (v. v.)
♀. intermedia (Ehr. beit. 4. p. 42.) caule erecto simplici glabriusculo, foliis repando-denticulatis acuminatis. — In montosis et umbrosis. — Fl. dan. t. 256. (v. s.)

Trib. III. HYDROCARYES Link enum. hort. berol. 1.
p. 141. DC. l. c.

Fructus nucamentaceus indehiscens cornutus durus, maturus sæpiùs 1-locul. 1-spermus. Semen pendulum. Cotyledones valdè inæquales. — Herbæ natantes. — Tribus media inter Onagrarias et Halorageas.

V. TRAPA L. gen. n. 157. Gærtn. fruct. 1. p. 127. t. 26.

Calycis tubus ovario adhærens, limbus 4-partitus; pet. 4; stam. 4; stylus filiformis basi subcrassior; ovarium 2-loculare loculo uno dein abortivo; nux ferè cornea 2-4-cornuta, cornubus è basi loborum calycinorum omnibus aut 2 oppositis ortis, semen 1 magnum intrà nucem pendulum exalbuminosum; cotyledones 2 valdè inæquales, 1 maximo farinaceo intrà nucem per germinationem remanente, altero minimo esserto.

1. T. NATANS (L. sp. 175.) fructibus 4-cornutis, cornubus acutis cruciatim oppositis, 2 superioribus horizontaliter patentibus, 2 inferioribus subascendentibus. (I) in stagnis et fossis passim. — Fl. fr. 4. p. 419. — Camer. epit. 716. ic. (v. v. DC.)

Ordo XXXIX: HALORAGEÆ *R. Brown. gen. rem. p. 17.*
DC. prod. t. 3. ined.

Calycis tubus per totam longitudinem ovario adhærens, limbus partitus aut subnullus. Petala summo calycis tubo inserta, lobis alterna et iis numero æqualia aut nulla. Stamina ibidem inserta, petalis numero dupla, æqualia rariùs pauciora. Ovarium calyci adhærens, sæpiùs pluriloculare. Stylus o. Stigmata tot quot ovarii loculamenta suprà apicem sessilia. Fructus carpellis plurimis plus minus intrà calycem concretis constans et ideò plurilocularis indehiscens, membranaceus nucamentaceusve, loculis 1-spermis. Semina in loculis pendula, albumine carnosæ, embryone centrali recto, radiculâ superâ, cotyledonibus 2 brevibus. — (In nostris) Herbæ aquatice, floribus axillaribus aut in spicas terminales dispositis, interdùm abortu monoïcis aut dioïcis.


Trib. I. CERCODIANÆ *Juss. dict. sc. nat. 7. p. 441. DC. l.c.*

Calycis limbus evidenter partitus. Stamina lobis calycis numero æqualia aut dupla. Petala et fructus loculamenta sæpiùs tot quot calycis lobi.

I. MYRIOPHYLLUM *Vaill. act. acad. Paris. 1719. t. 2. f. 3. L. gen. n. 1066.*

Flores monoïci aut rariùs hermaphroditi. — *Masc.* Calyx 4-partitus; petala 4 lobis calycis alterna valde caduca; stam. 4, 6, aut sæpiùs 8. — *Fem.* Calyx 4-lobus; petala 0; carpella 4 subconcreta compressa aut subglobosa nucamentacea indehiscentia 1-sperma; semina albumine subnullo, embryone teretiusculo inverso, cotyledonibus obtusis, radiculâ longâ. — Herbæ natantes, apicibus ad anthesin emersis; floribus parvis, superioribus masculis, inferioribus femineis.

1. *M. SPICATUM* (L. sp. 1409.) foliis verticillatis pinnati-partitis lobis capillaceis, spicâ terminali nudiusculâ, foliis floralibus flore brevioribus, infimis subserratis, plerisque integrerrimis. ♀ in aquis lente fluentibus. — Fl. fr. 4. p. 416. eng. bot. t. 83. — C. Bauh. prod. 73. f. 1. (v. v.)
2. *M. PECTINATUM* (DC. fl. fr. 5. p. 529.) foliis verticillatis pinnati-partitis lobis capillaceis, spicâ terminali nudiusculâ, foliis floralibus flores paulo excedentibus omnibus serrato-pectinatis. ♀ in aquis quietis Monspelii, Arelatis. — *M. verticillatum* fl. dan. t. 1046. non Lin. (v. v.)
3. *M. ALTERNIFLORUM* (DC. fl. fr. 5. p. 529.) foliis verticillatis pinnati-partitis lobis capillaceis distantibus alternis, spicâ terminali nudiusculâ, floribus alternis, inferioribus subfasciculatis, cæteris solitariis, foliis floralibus inferioribus pinnati-partitis flores excedentibus, super. integris brevibus. ♀ in aquis quietis Galliæ occidentalis circâ Nannetes et in Vasconiâ. (v. s.)
4. *M. VERTICILLATUM* (L. sp. 1410.) foliis verticillatis pinnati-partitis lobis capillaceis oppositis, spicâ terminali foliosâ, foliis floralibus omnibus pinnati-partitis flores multò superantibus et à foliis vix distinctis. ♀ in inundatis. — Fl. fr. 4. p. 417. eng. bot. t. 218. — Clus. hist. 2. p. 252. f. 1. (v. v.)
5. *limosum* (DC.) foliorum lobis linearibus acutis regularibus et ad costam non omnino attingentibus. ♀ in inundatis subexsiccatis. (v. s.)



- Apiaqapnu

Trib. II. *CALLITRICHINEÆ* Link. enum. h. berol. 1. p. 7. DC. l. c.

Calycis limbus non conspicuus. Petala o. Stam. 1-rariūs 2. Fructus 4-locularis 4-spermus. — Herbæ aquaticæ, foliis oppositis.

II. *CALLITRICHÆ* L. gen. 13. DC. prod. t. 3. ined.

Flores polygami, hermaphroditi, dioici aut sæpius monoici; bractæ 2 oppositæ petaloïdeæ ad basin floris (Petala auct.); calyx non conspicuus veròsimiliter ovarii basi adhærens limbo abortivo. *Masc.* Stam. 1 rariūs 2 filamentis filiformibus exsertis, antherâ reniformi 1-loculari suturâ transversâ dehiscente. — *Fem.* Ovarium bisulcum; styli 2; capsula compressa bisulca constans carpellis 4 concretis per paria approximatis indehiscentibus 1-spermis lenticulari-compressis; semina cum carpello concreta, albumine carnosæ, embryone inverso subincurvo, radiculâ longâ superâ, cotyledonibus brevissimis. — Herbæ annuæ.

1. *C. Verna* (L. sp. 6.) foliis trinerviis supernè aggregatis majoribus, fructibus sessilibus, carpellorum dorso obtususcupo. (I) in aquis lente fluentibus. — *C. sessilis* excl. var. *δ.* Fl. fr. 4. p. 414.

a. vulgaris (DC.) foliis omnibus elongato-ovatibus. — *C. verna* fl. dan. t. 129. (v. v.)

β. intermedia (Hoffm.) foliis inferioribus linearibus obtusis aut emarginatis, superioribus ovalibus. — Schkuhr. handb. t. 1. *C. dubia* Thui. (v. v. DC.)

γ. stellata (Hop.) foliis omnibus ovalibus, caulinis abbreviatis. — *C. aestivalis* Thui. (v. s.)

δ. cespitosa (Schult.) foliis omnibus ovalibus rigidulis parvis, caulinis abbreviatis stellato-patentibus. — In humidis vix inundatis. (v. v. DC.)

ε. tenuifolia (Pers.) foliis omnibus linearibus, summis subtrinerviis. — In humidis subinundatis. (v. s.)

2. *C. PEDUNCULATA* (DC. fl. fr. 4. p. 415.) foliis inferioribus linearibus, superioribus oblongis trinerviis, fructibus pedunculatis, carpellorum dorso obtususcupo. (I) in aquis cœnosiæ Galliæ circâ Fontembellaqueum et in Andegavia. (v. v. DC.)

3. *C. AUTUMNALIS* (L. sp. 6.) foliis omnibus uninerviis per caulem sparsis æqualibus truncatis, fructibus sessilibus, carpellorum dorso alato-membranaceo. (I) ad littora lacuum, fluviorum, rivorum, in aquâ quietâ; primâ fronte distinguenda colore intensius viridiore et fructu majore. — *C. sessilis* δ. Fl. fr. 4. p. 414. — Gmel. sib. 3. t. 1. f. 2. (v. v. DC.)

Trib. III. *HIPPURIDEÆ* Link. enum. h. berol. 1. p. 5. DC. l. c.

Calycis limbus integer minimus. Pet. o. Stam. 1. Fructus nucamentaceus 1-locul. 1-spermus.

III. *HIPPURIS* L. gen. n. 11. Juss. ann. mus. 3. t. 30. f. 3.

Calycis tubus ovario adnatus, limbus minimus integer; stamen calycis margini insertum, stylus filiformis antheræ sulco receptus; nux 1-sperma calycis limbo marginato coronata, embryonis radicula cylindrica cotyledonibus longior.

1. *H. VULGARIS* (L. sp. 3.) foliis verticillatis 6-12. *γ.* in fossis et aquosis. — Fl. fr. 4. p. 415. eng. bot. t. 763. (v. v.)

β. fluviatilis (Hoffm.) foliis longioribus membranaceis. *γ.* in aquis profundis è quibus planta vix emergit sterilis. (v. s.)

Ordo XL. CERATOPHYLLEÆ *Gray. br. pl. arr. 2. p. 554.*
DC. prod. t. 3. ined.

Flores monoïci. Calyx (seu Perigonium) liber multi-(10-12) partitus, lobis æqualibus. Petala 0. — *Masc.* Stam. 2-20, filamentis nullis, antheris ovato-oblongis bilocularibus apice 2-3-cuspidatis sessilibus in centro calycis congestis. — *Fem.* Ovarium liberum ovatum 1-loculare, stylus filiformis incurvus. Stigma simplex. Nux 1-locularis, 1-sperma stylo apiculata, indehiscens. Semen ex apice pendulum. Albumen 0. Embryo rectus, radiculâ superâ, cotyledonibus 4 verticillatis duobus latrioribus oppositis, plumulâ valdè compositâ? — Herbae aquatice submersæ, foliis verticillatis in lobos filiformes acutos divisis, floribus axillaribus solitariis sessilibus.

I. CERATOPHYLLUM *L. gen. n. 1065. Gærtn. fr. 1. p. 212. t. 44.*


Caracter isdem ac ordinis.


1. *C. DEMERSUM* (*L. sp. 1409.*) nuce trispinosâ, nempè spinâ 1 terminali et 2 lateralibus inæqualibus. $\frac{1}{2}$ in fossis et aquis quietis. — Fl. fr. 4. p. 413. — Vaill. act. ac. par. 1719. t. 2. f. 2. Folia juniora dense conferta. (v. v.)
2. *C. SUBMERSUM* (*L. sp. 1409.*) nuce subinermi nempè styli basi tubercula 2 minima obtusa gerente. $\frac{1}{2}$ in fossis et aquis quietis. — Fl. fr. 4. p. 413. eng. bot. t. 679. Folia juniora minus conferta. (v. v.)

Ordo XLI. LYTHRARIEÆ *Juss. dict. sc. natur. 27. p. 453.*

DC. in mem. soc. hist. nat. gen. 3. p. 2. p. 65. — Salicariæ. *Juss. gen. 330.*

Calyx sepalis numero definitis ultrâ medium concretis constans, liber, tubulosus aut campanulatus, lobis per aestivationem valvatis aut distantibus, sinubus interdùm in lobulos conicos dentesve extiores productis. Petala summo calycis tubo inter lobos inserta, numero varia interdùm nulla, sæpius valdè caduca. Stamina tubo calycino infrâ petala inserta, petalis nunc æqualia nunc dupla triplave, nunc pauciora; antheræ ovales biloculares dorso insertæ. Ovarium liberum. Stylus filiformis. Stigma sæpius capitatum. Capsula membranacea, calyce tecta aut cincta, carpellis 2-4 constans, junior sæpius carpellorum marginibus tenuissimis introflexis 2-4 locularis, demùm sæpè septis evanidis unilocularis, nunc longitudinaliter dehiscens, nunc rariùs irregulariter circumscissa. Placenta centralis septis si adsunt adnata aut libera. Semina plurima parva exalbuminosa. Embryo rectus. Radicula ad hylum versa; cotyledones planæ foliaceæ. — Herbae (in nostris), foliis oppositis rariùs alternis simplicibus exstipulatis.





I. LYTHRUM Juss. gen. 332.

Calyx cylindricus striatus apice dentatus, dentibus 4-6 latioribus erectis, 4-6 alternis subulatis sæpè corniformibus interdùm nullis aut minimis; petala 4-6 (aut rariùs nulla) ex apice tubi orta, dentibus erectis alterna; stamina e medio aut basi calycis orta, petalorum numero dupla, aut æqualia aut abortu pauciora; capsula oblonga calyce tecta, bilocularis, polysperma.

Sect. I. SALICARIA DC. prod. t. 3. ined.

Stamina petalorum numero dupla; flores in axillis superioribus plurimi verticillati et spicato-racemosi.

1. L. *SALICARIA* (L. sp. 642.) foliis lanceolatis basi cordatis, floribus spicatis subsessilibus. $\frac{1}{2}$ in fossis et aquosis. — Flores purpurei aut albi, petala 6-7, stamina 12-14.

a. *vulgaris* (DC.) spicâ caulinâ terminali densâ cylindraceâ, lateralibus gracilibus, calycibus hispidulis. — Fl. fr. 4. p. 409. Lam. ill. t. 408. f. 1. (v. v.)

β. *gracilis* (DC.) spicis plurimis gracillimis, foliis caulinibus calycibusque velutinis.—In humidis areñosis maritimis propè Monspelium.—Fl. fr. 5. p. 528. (v. v. DC.)

Sect. II. HYSSOPIFOLIA C. Bauh. pin. 218. DC. l. c.

Stamina numero petalorum æqualia rariùs dupla aut dimidiò minora; flores in axillis foliorum solitarii non spicati.

2. L. *HYSSOPIFOLIA* (L. sp. 642.) foliis alternis oppositisque linear-i-lanceolatis obtusiusculis, floribus subsessilibus folio brevioribus, etiam fructiferis erectis, bracteolis acutis minimis, petalis 5-6 oblongis, staminibus 5-10. (1) in inundatis humidisque Galliæ occidentalis, mediæ, australisque. — Fl. fr. 4. p. 410. eng. bot. t. 292. (v. v.)

3. L. *THYMIFOLIA* (L. sp. 642.) foliis alternis linearibus acutiusculis, floribus subsessilibus folio brevioribus, etiam fructiferis erectis, bracteolis foliaceis linearibus calyce sæpiùs longioribus, petalis 4-5, stam. 2. (1) in paludosis subsalsis Occitaniæ, Galloprovinciæ, Niceæ ex All. — Fl. fr. 4. p. 410. L. tribracteatum Saltzm. — Barr. ic. t. 773. f. 2. Flores minimi. (v. v. D.)

Sect. III. AMMANIOÏDES DC. l. c.

Stamina 4-6; petala nulla; calyx tubuloso - campanulatus. — An hujus generis?

4. L. *NUMMULARIFOLIUM* (Lois. not. 74. non Pers.) glabrum, caule herbaceo ramoso, foliis obovato-subrotundis obtusis oppositis, rameis nonnullis alternis, floribus axillaribus solitariis. (1) in Corsicâ. — Calyx ferè Ammanniæ 8-12-dentatus, dentibus internis apice glandulnis purpureis petaloideis instructis. Stam. inclusa. Ex flore Ammanniæ ex fructu Lythri species; potius novum crederem genus. (v. s.)

II. PEPLIS L. gen. n. 446.

Calyx campanulatus 12-fidus, lobis 6 latioribus erectis, 6 alternis subulatis patulis e sinibus ortis; petala 6 minima fugacia interdùm 0; stamina 6, petalis alterna, lobis calycis latioribus opposita; stylus vix ullus; capsula bilocularis polysperma.

1. P. *PORTULA* (L. sp. 474.) foliis oppositis obovato-subrotundis in petiolum angustatis. (1) in inundatis passim. — Fl. fr. 4. p. 412. — Vaill. bot. t. 15. f. 5. Calyx florens subrubens. Petala alba 1-6 aut nulla. (v. v.)

**Ordo XLII. TAMARISCINEÆ. Desv. diss. in ann. sc. nat. 4.
p. 344. DC. prod. t. 3. ined.**

Calyx sepalis 4-5 basi coalitis constans et ideo 5-partitus, persistens, lobis per aestivationem subimbricatis. Petala tot quot sepala, iis alterna, basi calycis inserta, marcescentia, per aestivationem imbricata. Stam. numero petalorum aequalia aut dupla, filamentis nunc ferè omnino liberis nunc longius monadelphis. Ovarium liberum trigonum. Stylus unicus. Stigmata 3. Capsula trigona, trivalvis 1-locularis polysperma. Semina parietalia erecta aut ascendentia apice comosa. Albumen o. Embryo rectus, radiculâ parvâ inferâ, cotyledonibus plano-convexis oblongis. — Frutices ramis virgatis; foliis alternis parvis persistentibus squamiformibus, floribus spicatis.

I. Tamarix Desv. ann. sc. nat. 4. p. 348. — Tamarices 4-5-andræ Auct.

Calyx 4-5-partitus; petala 4-5; stam. 4-5 petalis alterna, ferè omnino libera; ovarium apice longè attenuatum; stigmata 3 longa divaricata apice glandulosa; semina imæ valvularum basi aut ferè centro capsulæ inserta; seminum coma pilis plurimis simplicibus ex apice ortis constans.


1. **T. AFRICANA** (Poir. voy. 2. p. 139.) glabra subglauca, foliis lanceolatis sub-amplexicaulibus imbricatis, spicis sessilibus squamosis densis crassis vix latitudine triplò longioribus. ♂ in maritimis Occitaniae et agri Ruscinonensis ex cl. Bentham. — Fl. fr. 5. p. 535. (v. s.)

2. **T. GALLICA** (L. sp. 386.) glabra glauca, foliis minutis amplexicaulibus adpresso acutis, spicis lateralibus subpaniculatis gracilibus latitudine quintuplò longioribus. ♂ in arenosis Galliæ Mediterraneæ frequens et secus Oceanum usque ad Pictaviam et etiam Neustriam ex cl. de Brébisson. — Fl. fr. 4. p. 399. — Lob. ic. 2. t. 218. (v. v.)

II. MYRICARIA Desv. l. c. p. 349. DC. l. c. — Tamarices monadelphæ Auct.

Calyx 5-partitus; petala 5; stam. 10, alterna breviora, filamentis ad medium circiter monadelphis; stylus o; stigmata in capitulum congesta; semina secus lineam valvularum medium inserta, apice in filum barbato-plumosum desinentia.

1. **M. GERMANICA** (Desv. l. c.) fruticosa glabra, foliis linear-lanceolatis sessilibus, spicis terminalibus solitariis, bracteis pedicello longioribus. ♂ in arenosis inundatis et fluviorum ripis Galliæ australis, mediae, orientalis borealisque. — Tamarix Germanica L. — Fl. fr. 4. p. 399. — Lob. ic. 2. t. 218. (v. v.)





**Ordo XLIII. PORTULACEÆ. Juss. gen. 313. excl. gen. DC.
fl. fr. 4. p. 398. prod. t. 3. ined.**

Calyx liber aut imo ovario subadnatus, saepius disepalus sepalis oppositis, interdum 3-5-sepalus, sepalis basi in calycem 3-5-lobum concretis. Petala rarius 0, saepius 3, 4 et 6, nunc omnino libera, nunc imâ basi in tubum brevissimum subconnexa, sepalis alterna cum numero congruunt. Stamina cum petalis nunc imo calyci, nunc forsitan toro inserta, numero in iisdem generibus immò speciebus varia, omnia fertilia; filamenta inter se libera, petalis cum (petala basi coalescunt) concreta et iis opposita (cum numero cum iis congruunt). Antheræ biloculares, rimâ dupli dehiscentes, oscillatoriæ. Ovarium et saepius subrotundum uniloculare; stylus nunc 1 apice fissus in stigmata plurima; nunc nullus aut subnullus, stigmatibus plurimis liberis ex apice ovarii ortis. Capsula 1-locularis, nunc circumscissa dehiscens, nunc 3-valvis ab apice ad basim dehiscens. Semina 80 placentæ centrali adfixa. Albumen farinosum centrale. Embryo periphericus; radicula cylindracea longa. — Herbæ (in nostris) pingues. Folia alterna rarius opposita integra exstipulata. Flores axillares aut terminales.

I. PORTULACA Juss. gen. 312.

Calyx persistens compressus 2-valvis; petala 5; stam. 6-12; ovarium calycis basi subadnatum 1-loculare, stylo et infra medium 5-fido; capsula circumscissa polysperma, seminibus columnæ centrali 5 placentis formatæ adfixis.

- i. **P. OLERACEA** (L. sp. 638.) foliis cuneiformibus confertis lèvibus sessilibus, floribus sessilibus. (I) in locis cultis. — Fl. fr. 4. p. 402. — Fuchs. hist. p. 113. ic. (v. v.)

II. MONTIA Mich. gen. t. 13. f. 2. L. gen. 101.

Calyx persistens 2-3-valvis; corolla 1-petala 5-partita laciniis 3 alternis minoribus; stamina 3-5; stylus et brevis caducus apice 3-fidus lobis interne stigmatosis; capsula abortu 3 septorum 1-locularis trivalvis trisperma, seminibus basi columnæ 3 placentis formatæ adfixis.

- i. **M. FONTANA** (L. sp. 129.) foliis oppositis. (I) in humidis secùs aquas provinc. austr., occident., medianarum borealiumque. — Fl. fr. 4. p. 402. — Vaill. bot. t. 3. f. 4. (v. v.)

Ordo XLIV. PARONYCHIEÆ. *St.-Hil. plac. lib. p. 56. Juss. mem. mus. 1. p. 387. DC. prod. t. 3. ined.*

Calyx 5-sepalus rarissimè 3-4-sepalus, sepalis nunc imâ basi (5-partitus), nunc ad medium (5-fidus) et ultrà (5-dentatus) concretis. Petala parva squamiformia staminum sterilium æmula, sæpiùs tot quot sepala, inter lobos tubo inserta, rariùs nulla. Stam. calycis tubo antè lobos exactè inserta, etiam in generibus apetalis, sepalis numero æqualia aut abortu pauciora; filamenta distincta; antheræ 2-loculares. Ovarium liberum; styli 2-3 nunc à basi distincti, nunc plus minùs concreti. Fructus siccus parvus sæpiùs membranaceus, nunc evalvis indehiscens, nunc trivalvis. Semina nunc plurima placentæ centrali adfixa, nunc solitaria ex apice funiculi longi à fundo loculi orti subpendula. Albumen farinaceum. Embryo cylindraceus lateralis incurvus aut periphericus; radicula ad hylum versa. — Herbæ aut suffrutices ramosissimi. Folia sæpiùs opposita rariùs alterna, nunc nuda, nunc stipulis scariosis utrinquè instructa, sessilia, parva, integerrima. Flores parvi, nunc in axillis sessiles, nunc in cymas terminales variè dispositi. Bracteæ stipulis analogæ.

Trib. I. TELEPHIEÆ. DC. l. c.

Calyx 5-partitus. Petala et Stam. 5 imo calyci inserta. Styli 3 liberi aut basi subconcreti. — Folia alterna stipulacea.

I. TELEPHIUM Tourn. t. 128. L. gen. 377.

Calyx ferè quinquepartitus persistens; petala 5 calyci æqualia eidem inserta; stam. 5 pariter perigyna; stylus brevis; stigmata 3; ovarium basi 3-loculare apice 1-loculare septis non ultrà productis; capsula ovata 3-quætra in mucronem supernè attenuata 1-locularis 3-valvis polysperma; embryo curvus non annularis, albumini implicitus, radiculâ ad receptaculum et seminis hylum spectante.


1. T. IMPERATI (L. sp. 388.) procumbens, foliis alternis brevissimè stipulaceis, floribus corymbosis terminalibus. $\frac{1}{4}$ in siccis et calidioribus Galliæ australis. — Fl. fr. 4. p. 400. — Clus. hist. 2. p. 67. f. 3. (v. v. DC.)

II. CORRIGIOLA L. gen. 378.

Calyx ferè 5-partitus persistens; petala 5 calyci subæqualia eidem inserta; stam. 5 pariter perigyna; stylus brevis; stigm. 3; capsula 1-sperma trivalvis sæpè indehiscens triquetra, insertus seminis versùs apicem funiculus ex imâ capsulâ oriens.

1. C. LITTORALIS (L. sp. 383.) canibus diffasis inter flores foliosis, foliis alternis linearibus. (1) in arenosis secùs rivos Galliæ austr., occid., mediae et circè Argentoratum. — Fl. fr. 4. p. 401. excl. var. f. — Barr. ic. 532. (v. v.)





2. *C. TELEPHRIFOLIA* (Pourr. act. toul. 3. p. 316.) caulis diffnsis inter flores aphyllis, foliis alternis, radicalibus linearibus, caulinis ovatis. $\frac{1}{2}$ in agro Ruscinensi. — Fl. fr. 5. p. 527. An satis à præcedente distincta? (v. v.)

Trib. II. ILLECEBREÆ. DC. l. c.

Calyx 5-partitus. Pet. 5 aut o. Stam. 2-5 imo calyci inserta. Styli 2 liberi aut subconcreti. Capsula indehiscens 1-sperma, funiculus e fundo ortus longus apice semen subpendulum gerens. — Herbæ raro suffrutices. Folia stipulis scariosis aucta opposita.

III. HERNIARIA Tourn. inst. t. 288. L. gen. n. 308. DC. l. c.

Calyx ferè 5-partitus intùs subcoloratus; petala 5 filiformia integerim sepalis alterna, interdùm o aut minima; stam. 5 aut abortu 2-3; styli 2 breves distincti aut basi concreti; caps. 1-sperma indehiscens calyce tecta.

1. *H. POLYGONOIDES* (Cav. ic. 2. t. 137.) caule erecto dichotomo frutescente, foliis ovatis mucronatis, stipulis linearibus acuminatis folio duplò brevioribus, floribus terminalibus glomeratis sessilibus. $\frac{1}{2}$ in collibus maritimis Galloprovinciæ ex Lam. — Fl. fr. 3. p. 406. — Moris. s. 5. t. 29. n. 5. Illecebrum suffruticosum L. Valde dubia civis. (v. s. ex Hisp.)
2. *H. GLABRA* (L. sp. 317.) caulis ramosissimus prostratis glabris, foliis ovatis vix acutis glabris subciliatis, stipulis minimis ciliatis, florum sessilium glomerulis axillaribus multifloris glabris. (1) $\frac{1}{2}$ in arvis et sabulosis. — Fl. fr. 3. p. 405. Fl. dan. t. 529. (v. v.)
3. *H. HIRSUTA* (L. sp. 317.) caulis ramosis prostratis hirsutis, foliis ovatis lanceolatis obtusis hirsutis stipulisque folio quintuplò brevioribus ciliatis, florum sessilium glomeratis axillaribus paucifloris hirsutis. $\frac{1}{2}$ in arvis. — Fl. fr. 3. p. 405. Paronychia pubescens Fl. fr. 3. p. 403. — Zannich. ic. 284. *H. latifolia* Lapeyr. abr. 127. (v. v.)
- fl. incana*, foliis glomerulisque plus minus incanis. — In sterilibus provinc. australium. — *H. incana* Lam. DC. fl. fr. 5. p. 375. (v. v.)
4. *H. CINEREA* (DC. fl. fr. 5. p. 375.) caulis ramosis herbaceis ascendentibus tomentosis, foliis lanceolatis acutis canescenti-hispidis, stipulis brevissimis ciliatis, florum sessilium glomerulis axillaribus multifloris canescenti-hispidis. (1) in arvis Occitaniae. (v. v. D.)
5. *H. ALPINA* (Vill. dauph. 2. p. 556. non Lois.) caulis prostratis ramosissimus puberulis, foliis obovatis obtusis crassiusculis, stipulis acutis ciliatis folio vix duplò brevioribus, florum subpedicellatorum glomerulis 1-3-floris hirsutis. $\frac{1}{2}$ in Alpibus, Delph. Galloprovinciæ. — Fl. fr. 5. p. 375. *H. Alpina* & Fl. fr. 3. p. 406. (v. v. DC.)

IV. ILLECEBRUM Gærtn. carp. t. 184. Juss. mem. mus. 1. p. 386. DC. l. c. — Illecebri sp. L.

Calyx 5-partitus ferè 5-sepalus, sepalis subcucullatis dorso incrassatis ad apicem in cornu aristatum desinentibus; petala o aut squamulae 5 subulatae sepalis alternæ; stam. 2-5 sepalorum basi inserta; stylus vix ullus; stigmata 2 capitata; capsula calyce tecta 5-valvis aut ad strias 5 scissilis; semen (abortu?) solitarium lateraliter in capsula insertum; embryo lateralis vix curvus hinc albumini farinaceo applicitus.

1. *I. VERTICILLATUM* (L. sp. 298.) prostratum, stipulis scariosis, foliis oppositis axillaribus. (1) in humidis arenosis Galliæ mediæ, occidentalis australisque. Fl. fr. 3. p. 403. — Vaill. par. t. 15. f. 1. (v. v.)

V. PARONYCHIA Juss. l. c. p. 388. DC. prod. t. 3. — Illecebri sp. L.

Cal. 5-partitus, sepalis dorso non incrassatis, saepius apice mucronatis subcucullatis; petala seu squamulae 5 lineares sepalis alternæ; stam. 5; stylus 1; stigmata 2; capsula 1-sperma indehiscentia aut 5-valvis calyce tecta.

Sect. I. CHAETONYCHIA DC. l. c.


Sepala æqualia apice dilatata membranacea, dorso in aristam desinente. — Flores cymosi.

1. P. CYMOSA (Poir. dict. 5. p. 26.) caule ramoso erecto glabriuscule, foliis verticillatis subteretibus glabris apice aristatis, stipulis bracteisque brevissimis, floribus cymosis glaberrimis, sepalis longè aristatis. (1) in Cebennis, propè Arausioñem ex Vill., Forum Julii (cl. Solier). — Fl. fr. 3. p. 402. — Illec. cymosum L. Schrad. journ. 1801. p. 408. t. 4. (v. s.)

Sect. II. EUNYCHIA DC. l. c.

Sepala æqualia apice non dilatata aristata mucronata aut subinermia. — Flores in axillis congesti.

2. P. ECHINATA (Lam. fl. fr. 3. p. 232.) caulis prostratus hirsutus, foliis lanceo-lato-ovatis acutis glabris, stipulis basi dilatatis acutis folio triplò brevioribus, floribus in axillis fasciculatis verticillatum mentientibus, bracteis subnullis, sepalis linearibus dorso aristatis. (1) in maritimis Corsicæ et Galloprovinciæ. — Fl. fr. 3. p. 402. — Bocc. sic. t. 20. f. 3. (v. s.)
3. P. POLYGONIFOLIA (DC. fl. fr. 3. p. 403.) caulis prostratus elongatis glabris, foliis lanceolato-ovatis vix acutis glaberrimis, stipulis ovatis acutis folio vix dimidiò brevioribus, bracteis lanceolatis acuminatis folio longioribus, floribus sessilibus solitariis lateralibus terminalibusque, sepalis subaentis. (2) in Delphinatū montibus et Pyrenæis editior. ex Benth. — L. polygonifolium. Vill. dauph. 2. p. 557. t. 16. (v. s.)
4. P. ARGENTEA (Lam. fl. fr. 3. p. 230.) caulis nodosis ramosis prostratis tomentosis, foliis lanceolatis acutis brevissimè ciliatis, stipulis folio brevioribus ovatis acutis, bracteis argenteis lanceolatis acuminatis flores sessiles hirsutos glomeratos axillares occultantibus, sepalis mucronatis. (2) in siccis Galliæ australis. — Fl. fr. 3. p. 404. Illec. Paronychia L. sp. 299. — Barr. ic. 726. (v. v.)
5. P. CAPITATA (Lam. fl. fr. 3. p. 229.) caulis nodosis ramosis prostratis hirsutis, foliis linear-lanceolatis acuminatis ciliatis, stipulis lanceolato-ovatis acutis folia subsuperantibus, floribus terminalibus congesto-capitatis, bracteis argenteis maximis rotundo-ovatis acuminatis florem sessilem hirsutum occultantibus, sepalis obtusis dorso aristatis. (2) in collibus siccis provinciarum mediterranearum. — Fl. fr. 3. p. 404. Illec. capitatum L. sp. 299. (v. v.)
6. P. SERPILLIFOLIA (Poir. dict. 5. p. 24.) caulis nodosis ramosis prostrato-repentibus, foliis ovatis ciliatis subacutis, stipulis linearibus acuminatis folio brevioribus, bracteis argenteis maximis oblique ovatis acutis flores hirsutos sessiles occultantibus, sepalis obtusiusculis. (2) in Pyrenæis et Alpibus Delphini. — Fl. fr. 3. p. 404. Illecebrium serpyllifolium Vill. Schrad. journ. 1801. p. 413. t. 4. (v. v.)
7. P. NIVEA (DC. prod. t. 3. ined.) caulis nodosis ramosis prostrato-repentibus, foliis lanceolatis ciliatis acutis, stipulis lanceolatis acuminatis folium superantibus æquantibusve, bracteis argenteis maximis oblique rotundato-ovatis acutis flores hirsuto sessiles occultantibus, sepalis linearibus obtusiusculis. (2) in rupestribus Narbonnæ loco dicto Pech de l'Agnèle et montis Ventosi (cl. Requier). — Illecebrium cephalotes Bieb. (v. s.)





Trib. III. POLYCARPEÆ. DC. l. c.

Calyx 5-partitus. Pet. 5 aut o. Stam. 1-5 imo calyci inserta. Styli 2-5 nunc à basi liberi, nunc concreli. Caps. 1-locularis 80-sperma. Semina placentæ centrali adfixa.—Herbæ aut suffrutescens, folia opposita; stipulæ scariosæ.

VI. POLYCARPON L. gen. n. 105. DC. l. c.

Cal. profundè 5-fidus, sepalis basi plus minus coalitis margine membranaceis concavis carinatis apice mucronatis; petala 5 emarginata; stam. 3-5; styli 2 brevissimi; caps. 1-locul. 3-valvis polysperma.

* *Floribus plerūmque 3-andris.*

1. P. TETRAPHYLLUM (L. sp. 131.) triandrum, petalis emarginatis, foliis caulinis quaternis, rameis oppositis. (I) in cultis et ad sepes umbrosas Galliæ australis et occidentalis. — Fl. fr. 4. p. 767. — Barr. ic. 534. (v. v.)

* * *Floribus plerūmque 5-andris.*

2. P. ALSINÆFOLIUM (DC. l. c.) pentandrum, petalis subintegerrimis, foliis ovalibus subcarnosis, floribus in cymas terminales congestis. (I) in arenosis maritimis Occitanie, Galloprov. — Hagea alsinæfolia Biv. manip. 3. p. 7. — Bocc. sic. t. 38. Folia lævia ovalia; flores pauciores magis congesti quàm in P. tetraphyllum. (v. v.)

3. P. PEPOIDES (DC. l. c.) pentandrum, petalis integerrimis, foliis oppositis obovatis, floribus in cymas terminales congestis. (I) in cultis et arenosis maritimis agri Ruscinonensis circè Perpignan et Collioure. — Hagea polycarpoides Biv. manip. 2. n. 3. Arenaria peploides Lapeyr. abr. 251. nou L. Folia rotundiora, cymæ densiores quàm in P. tetraphyllum. (v. v.)

Trib. IV. SCLERANTHEÆ. Linck enum. 417. DC. l. c.

Calyx 4-5-fidus, tubo urceolato. Pet. o. Stam. 1-10 fauci inserta. Styli 2, aut 1 apice emarginatus. Utriculus membranaceus 1-spermus, tubo calycis indurato tectus. Semen funiculo longo è fundo loculi orto apice recurvo suspensum. — Herbæ oppositiæ foliæ non stipulatæ.

VII. SCLERANTHUS L. gen. n. 562.

Calyx tubulosus, collo coarctatus, suprà 5-fidus; petala nulla; stamina sæpius decem minima summo calyci insidentia; styli et stigmata 2; capsula tenuissima monosperma evalvis, tecta calyce suprà coarctato.

1. S. PERENNIS (L. sp. 580.) foliis oppositis linearibus, calycibus fructus margine membranaceis obtusiusculis clausis. (I) in arvis arenosis. — Fl. fr. 4. p. 403. — Vaill. bot. t. 1. f. 5. (v. v.)
2. S. ANNUUS (L. sp. 580.) foliis oppositis linearibus, calycibus fructus margine non membranaceis acuminatis patulis. (I) in arvis. — Fl. fr. 4. p. 403. Gærtn. fruct. 2. p. 196. t. 126. (v. v.)

Trib. V. MINUARTIEÆ. DC. l. c.

Calyx 5-partitus. Pet. o aut minima. Stam. 3-10 imo calyci inserta. Styli 3. Caps. 1-locul. 3-valvis. Sem. plurima placentæ centrali adfixa. — Herbæ (O) non stipulatæ oppositifoliæ.

VIII. LOEFLINGIA L. gen. n. 52.

Calyx ferè 5-partitus laciniis basi bidentatis; petala 5 minima conniventia, stamina 3; stylus unicus, stigma triplex; capsula unilocularis trivalvis polysperma.

I. *L. HISPANICA* (L. sp. 50.) foliis oppositis minimis basi appendiculatis, appendicibus stipulaeformibus. (1) in maritimis agri Narbonensis et Ruscino-nensis. — Fl. fr. 5. p. 603. — Lœfl. it. 113. t. 1. f. 2. (v. s.)

Ordo XLV. CRASSULACEÆ. DC. *bull. phil.* 1801. n. 49. p. 1.
fl. fr. 4. p. 382. prod. t. 3. ined. — *Sempervivæ*. Juss. gen. 207.

Calyx constans sepalis plurimis 3-20 basi plus minus concretis et ideò multipartitus. Petala tot quot sepala, cum iis alterna, imo calyci inserta, nunc inter se libera, nunc in corollam gamopetalam concreta. Stam. cum petalis inserta, nunc iis numero æqualia et cum iis alterna, nunc dupla, alia petalis alterna longiora precociora, alia petalis opposita breviora seriora. Filamenta inter se libera subulata; antheræ biloculares rimâ dupli dehiscentes. Squamæ nectariferæ ad basin carpellorum solitariæ. Carpella tot quot petala et iis opposita et circâ axim idealem verticillata, inter se libera, unilocularia, rimâ longitudinali ad angulum internum dehiscentia. Semina ad angulum internum carpelli dupli serie adfixa. Albumen tenue carnosum. Embryo rectus, radiculâ ad hylum directâ. — Herbæ foliis carnosis sæpiùs alternis, floribus sæpiùs cymosis.

§. I. ISOSTEMONEÆ. (DC.)

I. *TILLÆA* Mich. gen. t. 20. DC. *bull. phil.* n. 49. p. 2. — *Tilleæ* sp. L.

Calyx 3-4-partitus; petala 3-4; stam. 3-4; squamæ o aut minimæ; carpella 3-4 medio subconstricta disperma. — Herbæ parvæ annuæ.

I. *T. MUSCOSA* (L. sp. 186.) caule ramoso, foliis basi connatis, floribus sessilibus. (1) in humidis provinc. australium, occidentalium et mediарum. — Fl. fr. 4. p. 385. Lam. ill. t. 90. f. 2. (v. v.)

II. *BULLIARDA* DC. pl. grass. p. 7. Fl. fr. 4. p. 384.

Calyx 4-fidus; petala 4; stamina 4; ovaria 4; squamæ 4 lineares calycis longitudine; carpella 4 polysperma. — Herbæ parvæ annuæ.

I. *B. VAILLANTII* (DC. pl. grass. t. 74.) caule erecto dichotomo, foliis oblongis acutis pedunculo brevioribus. (1) in umbriosis humidis ad oras aquilegiorum Fontis bellaquei. — Fl. fr. 4. p. 385. *Tillæa aquatica* Lam. ill. t. 90. f. 1. — Vaill. bot. t. 10. f. 1. (v. v. DC.)









§. II. DIPLOSTEMONEÆ. (DC.)

† Gamopetalæ.

III. UMBILICUS DC. *bull. phil.* 1801. n. 49. *prod. t. 3. ined.* — *Cotyledonis sp. auct.*

Calyx 5-partitus; cor. gamopetala campanulata 5-fida, lobis tubi circiter longitudine; stamina 10 tubo corollæ inserta; squamæ 5 ovales aut cuneatæ obtusæ; carpella 5 apice attenuata, stylis subulatis.

§. 1. *Sediformes* (DC.), *foliis caulinis alternis*. — *Herbæ annuæ.*

1. U. SEDOIDES (DC. mss.) caule subradicante glabro, foliis oblongis convexis obtusis glabris, floribus ad apicem paucis subsessilibus. (I) in summis Pyrenæis præsertim orientalibus propè nives æternas. — *Cotyledon sedoides*. DC. fl. fr. 5. p. 521. C. sediformis Lapeyr. — *Herba parva simplex ant ramosa Sedi atrati ferè facie.* (v. v.)

§. 2. *Cotyloideæ* (DC.), *corollis vix ad medium 5-fidis, foliis radi-calibus petiolatis cucullatis plus minus peltatis.*

2. U. PENDULINUS (DC. pl. grass. t. 156.) radice tuberosâ, foliis inferioribus peltatis repando-crenatis, caule subsimplici, floribus racemosis pendulis, bracteis integris. ♀ ad muros vetustos et rupes prov. australiorum et occidentalium. — Fl. fr. 4. p. 382. *Cotyledon umbilicus* L. sp. 615. — Clus. hist. 2. p. 63. f. 1. — Lob. ic. t. 386. f. 2. (v. v.)

†† Polypetalæ.

IV. SEDUM DC. *bull. phil.* n. 49. *prod. t. 3.* — *Sedum et Rhodiola L.*

Calyx 4-7-partitus sæpius 5-partitus, sepalis ovatis sæpius turgidis foliiformibus; petala et carpella totidem; stamina petalorum numero dupla, squamæ nectariferæ ovatae integræ. — Surculi steriles folia conferta gerentes.

§. 1. *Foliis planis, floribus luteis.*

1. S. RHODIOLA (DC. pl. grass. t. 143.) radice tuberosâ, foliis lanceolatis denticulatis acuminatis, floribus abortu dioicis corymboso-capitatis. ♀ in umbrosis et rupestribus Alpium Delphin. et Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 386. *Rhodiola rosea* L. sp. 1465. — Cam. epit. 169. ic. Sepala 4-5. Stam. 8-10. Caps. 4-5. (v. v. DC.)

§. 2. *Foliis planis, floribus albis aut purpurascensibus.*

2. S. TELLIMUM (L. sp. 616.) caule erecto, foliis magnis sparsis aut oppositis ovatis serratis subintegrisve sessilibus, corymbo folioso. ♀ ad muros, vineas et inter lapides. — Fl. fr. 4. p. 387. — Fuchs. hist. 800. ic. (v. v.)

♂. *latifolium* (L.) foliis latis sæpius oppositis, staminibus plerūmque (respectu corollæ) longioribus. — *S. latifolium* Bert. amoen. 366. — Clus. hist. 2. p. 66. f. 1. (v. v.)

3. S. ANNUFEROS (L. sp. 616.) caulinibus decumbentibus, foliis sparsis cuneiformibus integerrimis sessilibus, floribus corymbosis. ♀ inter rupes apricas in Alpibus Galloprovinciae et Pyren. orient. ex Lapeyr., propè Parisios ex Merat? — Fl. fr. 4. p. 387. — Lob. ic. t. 390. f. 2. (v. v.)

4. S. STELLATUM (L. sp. 617.) foliis sparsis rotundo-spathulatis ovatis obtuse angulatis basi in petiolum subattenuatis, floribus lateralibus sessilibus solitariis, capsulis stellatim patentibus. (I) in lapidosis umbrosis provinc. australiæ, Arverniæ? ex Delarbres. — Fl. fr. 4. p. 388. — Col. phyt. 30. t. 11. (v. v. DC.)

5. S. CEPÆA (L. sp. 617.) caule ramoso paniculato pubescente, foliis sparsis

verticillatisque oblongo-lanceolatis spathulatisve integerrimis, petalis aristatis. (1) *in lapidosis secùs colles et muros.* — Fl. fr. 4. p. 389. — Clus. hist. 2. p. 68. ic. (v. v.)

β. galioides (DC. ined.) *foliis superioribus suboppositis, infimis verticillatis spathulatis.* — S. galioides All. ped. t. 65. f. 3. — Fl. fr. 4. p. 389. S. verticillatum Latourr. non L. (v. v.)

γ. alsinaefolium (DC. ined.) *foliis alternis ovalibus.* — S. alsinaefolium All. ped. t. 22. f. 2. Fl. fr. 3. p. 388. (v. s.)

§. 3. *Foliis teretibus, floribus albis purpurascensibus aut cœruleis.*

6. *S. CRUCIATUM* (Desf. cat. 162.) *caulibus patulis basi ramosissimis in parte superiore glandulosis, foliis verticillatis semiteretibus oblongis obtusis glaberrimis, superioribus sparsis, floribus corymbosis, petalis acuminatis.* ♀ in Corsicæ rupibus propè Corte reperiit Ph. Thomas. — Fl. fr. 4. p. 389. S. Monregalense Balb. misc. p. 23. f. 6. (v. s.)

7. *S. ALBUM* (L. sp. 619.) *caulibus ascendentibus glabris, foliis sparsis teretiunculis oblongis obtusis patentibus glaberrimis, cymâ ramosâ, laciniis calycinis obovatis obtusis, petalis vix acutis.* ♀ in muris et lapidibus frequens. — Fl. fr. 4. p. 390. S. micranthum Bast. Fl. fr. 5. p. 523. — Fuchs. hist. 35. ic. (v. v.)

β. turgidum (DC. ined.) *foliis ovatis crassis, surculorum juniorum erectis, petalis obtusis.* ♀ in Pyrenæis editioribus circa Valletriam, usque ad aquas Bigerronus (Bagnères) descendens. — S. turgidum Ram. in DC. fl. fr. 4. p. 390. (v. v.)

8. *S. VILLOSUM* (L. sp. 620.) *foliis sparsis oblongis suprà planiusculis pedunculisque axillaribus 1-3-floris glanduloso-pubescentibus, floribus corymbosopaniculatis, laciniis calycinis lanceolatis subobtusis, petalis ovatis subobtusis.* (1) *in pratis paludosis montosis.* — Fl. fr. 4. p. 392. — Clus. hist. 2. p. 59. f. 3. (v. v.)


9. *S. HIRSUTUM* (All. ped. t. 65. f. 5.) *caule basi stolonifero, foliis villosis semi-teretibus, inferioribus confertis, superioribus sparsis, floribus cymosis, laciniis calycinis lanceolato-ovatis obtusis, petalis lanceolato-ovatis aristatis.* (2) ♀ in rupestribus montosis Galliæ australis, Arverniæ, Pyrenæorum, propè Parisios ex Merat. — Fl. fr. 4. p. 392. (v. v.)

10. *S. CORSICUM* (Duby mss.) *foliis glanduloso-villosis obovato-rotundis basi attenuatis obtusis, inferioribus confertis, superioribus sparsis, floribus cymosis laxis, laciniis calycinis lanceolato-ovatis obtusis brevibus, petalis lanceolato-ovatis subobtusis.* (1) ? in Corsicâ propè Corte reperiit Ph. Thomas. (v. s.)

11. *S. RUBENS* (L. sp. 619.) *caule erecto ramoso, foliis alternis oblongis obtusiusculis teretiunculis sessilibus patentibus glabris, cymâ ramosâ pubescente, floribus unilateralibus sessilibus, laciniis calycinis lanceolatis acutis, petalis acuminate-aristatis.* (1) *in cultis et vineis passim.* — Crassula rubens L. syst. veg. 253. Fl. fr. 4. p. 386. DC. pl. grass. t. 55. — Carpella materna puberula. (v. v.)

12. *S. CESPITOSUM* (DC. prod. t. 3. ined.) *foliis alternis ovatis obtusis glabris, caule subsimplici glabro, floribus lateralibus subsessilibus, laciniis calycinis lanceolato-ovatis, carpellis stellatim patentibus.* (1) *in apricis Monspelii, Avenionis, Antipolis, Corsicæ.* — Crassula Magnolii DC. fl. fr. 5. p. 522. C. cespitosa Cav. ic. 1. t. 69. f. 2. Tillæa rubra Gou. hort. 77. — Magn. bot. 237. ic. (v. v. DC.)

13. *S. ANDEGAVIENSE* (DC. prod. t. 3. ined.) *caule erecto basi simplici apice trichotomo, foliis subalternis rotundo-ovatis obtusis glabris, floribus pentandris in diehotomiâ et secùs ramulos sparsis sessilibus, laciniis calycinis ovatis obtusis, petalis ovatis acutisepulis, capsulis erectis.* (1) *in muris et rupibus schistosis Andegaviae.* — Crassula Andegaviensis DC. fl. fr. 5. p. 522. Sedum atratum Bast. ess. 167. — S. dasypphylli var. pentandra? (v. s.)



14. *S. DASYPHYLLUM* (L. sp. 618.) caule debili apice pubescente foliis oppositis ovatis obtusis pinguibus, floribus laxè racemosis sæpius hexapetalis, laciñis calycinis obovatis obtusis brevibus, petalis lanceolato-ovatis obtusiusculis. ♀ in aridis Galliæ orientalis, australis et Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 391. Bull. herb. t. II. (v. v.)
15. *S. BREVIFOLIUM* (DC. rapp. 2. p. 79.) caule basi fruticuloso ramoso tortuoso, ramis erectiusculis glabris, foliis crassis globoso-ovatis obtusis brevibus, in surculis oppositis, in caulinis florentibus sparsis, floribus corymboso-paniculatis, laciñis calycinis ovatis subacutis brevibus, petalis lanceolato-ovatis obtusiusculis. ♀ ad rupes apricas in Pyrenæis et in Corsicâ. — Fl. fr. 5. p. 524. *S. sphæricum* Lapeyr. (v. v.)
16. *S. ATRATUM* (L. sp. 1673.) caule ramisque erectis glabris, foliis sparsis teretibus obtusissimis glabris, floribus corymbosis fastigiatis, laciñis calycinis lanceolatis obtusis, petalis lanceolato-ovatis obtusiusculis. (I) in rupibus apricis Alpium, Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 391. All. ped. t. 65. f. 4. (v. v.)
17. *S. ANGLICUM* (Huds. ang. 196.) caulinis infirmis gracilibus pedicellisque glabris, foliis subalternis ovatis gibbis pinguibus, cymâ bifidâ, laciñus calycinis lanceolato-ovatis subacutis, petalis lanceolatis acuminatis. (I) in rupibus Pyrenæorum et Galliæ occidentalis. — Fl. fr. 4. p. 391. — Ray. syn. t. 12. f. 2. (v. v.)
18. *S. HEPTARETALUM* (Poir. voy. barb. 2. p. 169.) caulinis erectis ramosis glabris, foliis sparsis ovato-oblongis planiusculis obtusis, floribus corymboso-paniculatis, laciñis calycinis obovatis obtusis, petalis 6-7 lanceolatis acuminatis. (I)? ad rupes in Corsicâ. — Fl. fr. 4. p. 392. *Fl. azurei*. (v. s.)

§. 4. *Foliis teretibus basi solutis, floribus luteis.*

19. *S. SAXATILE* (L. sp. 619.) caule ramoso decumbente, ramis divaricatis, foliis sparsis semiteretibus obtusis, cymâ trifidâ, laciñis calycinis lanceolatis obtusis, petalis lanceolatis aristato-acuminatis. (I) in saxosis apricis Vogisorum, Alpium, Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 394. All. ped. t. 65. f. 6. *S. di-varicatum* Lapeyr. abr. 260. non Ait. — Lob. ic. 378. (v. v.)
20. *S. REPENS* (DC. fl. fr. 5. p. 525.) caulinis subsimplicibus basi repentibus ascendentibus, foliis ovato-teretibus adnato-sessilibus erectis sublaxis, floribus subcapitatis, laciñis calycinis lanceolatis obtusissimis, petalis lanceolatis subobtusis. (I)? in summis Alpibus et Pyrenæis. — *S. Guettardi* Vill. dauph. 3. p. 678. t. 45. excl. syn. (v. v. DC.)
21. *S. ARE* (L. sp. 619.) foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis alternis, cymâ trifidâ, laciñis calyciis ovalibus obtusis, petalis lanceolatis acuminatis. ♀ in apricis et muris frequens. — Fl. fr. 4. p. 393. Bull. herb. t. 30. DC. pl. grass. t. 117. (v. v.)
- β. *glaciale*, floribus congestis terminalibus, caule ramisque radicantibus. In Alpibus Galloprovinciæ ad nives. — *S. glaciale* Clarion in DC. fl. fr. 4. p. 393. (v. s.)
22. *S. SEXANGULARE* (L. sp. 620.) foliis teretibus adnato-sessilibus subpatulis ternatim verticillatis sparsisque, in surculis sexfariam imbricatis, cymâ trifidâ, laciñis calycinis lanceolatis obtusis, petalis lanceolatis acuminatis. ♀ in pratis siccis. — Fl. fr. 4. p. 394. — Cam. epit. 856. ic. S. boloniense Lois. not. 71. Fl. fr. 5. p. 525. (v. v.)
23. *S. REFLEXUM* (L. sp. 618.) foliis sparsis subulatis erectis, floribus breviter pedicellatis cymosis subcorymbosis, cymæ ramis virgineis reflexo-nutantibus, laciñis calycinis lanceolato-ovatis subacutis, petalis linearibus acutis. ♀ ad rupes et muros. — Fl. fr. 4. p. 394. — Fuchs. hist. 33. ic. (v. v.)
24. *S. RUPESTRE* (L. sp. 618.) caulinis basi ramosis, floriferis erectis, foliis teretis subulatis basi solutis glaucis, surculis sterilibus cylindraceis dense imbricatis, floribus cymosis 5-7-petalis, laciñis calycinis ovato-lanceolatis obtusis, petalis linear-lanceolatis obtusis. ♀ in muris et rupibus apricis provinc. aus-

- tralium. — engl. bot. t. 170. S. reflexum DC. pl. grass. t. 116.—Dill. elth. 2. f. 333. (v. v.)
25. S. ALTISSIMUM (Lam. dict. 4. p. 634.) foliis sparsis teretibus acutis, inferioribus imbricatis, superioribus supra planis, floribus dense cymosis, laciinis calycinis ovatis acutis, petalis 6-8 lanceolatis subobtusis. ♀ inter saxorum fragmenta in provinciis australibus et in radicibus Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 394. DC. pl. gras. t. 40. S. Nicæense All. ped. t. 90. f. 1. — Jacq. vind. t. 81. (v. v.)
26. S. ANOPETALUM (DC. rapp. 2. p. 80.) foliis sparsis teretibus acutis erectis glaucis, surculorum imbricatis, floribus cymosis sessilibus, laciinis calycinis lanceolatis acuminatis, petalis 6-7 linearibus acuminatis erectis. ♀ in collibus et rupestribus provinc. australium. — Fl. fr. 5. p. 526. S. Hispanicum Fl. fr. 3. p. 395. non L. (v. v.)
27. S. AMPLEXICAULE (DC. rapp. 2. p. 80.) foliis sparsis teretibus acutis, surculorum basi in membranam amplexicaulem dilatatis apice acuminatis, laciinis calyc. lanceolatis acutis, petalis linear-lanceolatis subobtusis. ♀ in Cebennis et monte Ventoso. — Fl. fr. 5. p. 526. (v. s.)

V. SEMPERVIVUM L. gen. 612.


Calyx 6-12-fidus; petala et ovaria totidem; stamina petalorum numero dupla; squamæ ovatae, latae, emarginatae aut lacerae.


§. 1. *Floribus ochroleucis.*

1. S. GLOBIFERUM (L. sp. 665.) foliis ciliatis, propaginibus globosis, floribus patentibus dodecagynis. ♀ in montibus Alsatiæ ex Mapp. — Fl. fr. 4. p. 397. Jacq. aust. t. 40. (v. s. ex Pedemontio.)

§. 2. *Floribus purpurascensibus.*

2. S. ARACHNOIDEUM (L. sp. 665.) propaginibus globosis villis intertextis, floribus enneagynis, squamis oblongis truncato-dentatis. ♀ ad rupes apricas Alpium, Pyrenæorum, Cebennarum et montium Velaunorum. — Fl. fr. 4. p. 397. — Barr. ic. t. 391, f. 1 et 393. (v. v.)
3. S. MONTANUM (L. sp. 665.) foliis pubescensibus, propaginibus patentibus imberibus, floribus subdodecagynis, squamis minimis. ♀ ad rupes apricas in Alpibus et Pyrenæis. — Fl. fr. 4. p. 396. Jacq. austr. app. t. 41. DC. pl. grass. t. 105. (v. v.)
4. S. TECTOREM (L. sp. 664.) foliis ciliatis, propaginibus patentibus, floribus dodecagynis, squamis cuneiformibus carunculatis. ♀ ad rupes Alpium et Pyrenæorum, in muris et tectis. — Fl. fr. 4. p. 396. — Fuchs. hist. 32. ic. (v. v.)





Ordo XLVI. NOPALEÆ. *Juss. Dict. sc. nat. 35. p. 144.* —
Cacti. Juss. gen. p. 310.

Calyx monosepalus ovario adhærens, ∞ -partitus. Petala numero indefinita. Stamina numero indefinita, cum petalis, disco ovarii apicem vestienti inserta. Stylus 1 tubulosus; Stigma multifidum. Bacca umbilicata 1-loocularis polysperma. Semina in pulpâ nidulantia, integumento dupli; externo crustaceo, interno tenui membranaceo. Albumen nullum. Embryo incurvus aut spiralis. Radicula ad hylum versa. — Frutices caulinibus carnosis, sæpè folia æmulantibus, pilorum fasciculis aut aculeis quinquunciali ordine dispositis.

I. CACTUS *L. gen. 613.*

Vide caracterem ordinis.

x. C. OPUNTIA (*L. sp. 669.*) articulato-prolifer laxus, articulis ovatis compressis, spinis setaceis, floribus luteis. *H*ex Americâ orta sponte nunc crescit in Galloprovinciâ. — *Fl. fr. 4. p. 405.* — *Mill. dict. 1. t. 191.* (*v. v. in Valesiâ.*)

Ordō XLVII. FICOIDEÆ. *Juss. gen. 315. DC. fl. fr. 5. p. 528.*

Calyx monosepalus definitè partitus liber aut ovario adhærens. Corolla summo calyci inserta polypetala aut petalis basi coalitis monopetala, aut cum calyce coalita. Stamina numero indefinita summo calyci inserta; antheræ introrsæ. Styli plures. Capsula aut drupa multilocularis, loculis numero stylorum polyspermis. Semina angulo loculorum interiori affixa. Embryo incurvus. Albumen farinaceum centrale. — Flores axillares terminalesve. Folia succulenta.

I. MESEMBRYANTHEMUM *L. gen. p. 628.*

Calyx ovario adhærens persistens 5-fidus; petala plurima linearia basi coalita; styli 4-10 sæpius 5; capsula umbilicata carnosa.

x. M. NODIFLORUM (*L. sp. 687.*) foliis alternis teretiusculis obtusis basi ciliatis, petalis calyce brevioribus. (I) in arenosis maritimis Corsicæ circâ Urcinum. — *DC. pl. gr. t. 88. fl. fr. 5. p. 529.* (*v. s.*)

Ordo XLVIII. GROSSULARIEÆ. DC. fl. fr. 4. p. 406. Berlandier diss. ined.

Calyx ovario adhærens 4-5-partitus regularis coloratus. Petala 5-4 fauci calycis inserta, cum ejus laciniis alterna, æqualia. Stamina 4-5 rarissimè 6, ibidem inter petala inserta; filamenta libera; antheræ biloculares longitudinaliter internè dehiscentes. Ovarium uniloculare, placentis 2 parietalibus oppositis. Stylus unicus 2-3-4-fidusve. Fructus baccatus umbilicatus subglobosusve, calyce persistente coronatus, unilocularis. Semina plura arillata podospermis longis filiformibus suspensa. Integumentum exterius gelatinosum membranaceum, interius tenuissimè membranaceum, albumini arctè adhærens. Albumen corneum. Embryo minutus rectus in extremitate angustiore seminis situs. Radicula obtusa. — Fru-
tices inermes vel spinosi, foliis alternis lobatis et incisis.

I. RIBES L. gen. 281.

Cal. 5-lobus; pet. 5 parva; stam. 5 rarissimè 6; semina oblonga subcompressa.

Sect. I. GROSSULARIA Tourn. inst. 1. p. 639.

Caules aculeati, pedunculi 1-3-flori, calyx plus minùs campanulatus.

1. R. UVA-CRISPA (L. sp. 292.) ramis aculeatis, foliis obtusè 3-5-lobis villosulis, pedunculis 1-2-floris rarissimè 3-floris, sepalis reflexis glabris, petalis ad apicem subrotundis glabris, fauce barbatâ, stylis puberulis. ♂ ad sepes. — Fl. fr. 4. p. 408.

a. sylvestre (DC.) foliis parvis utrinquè villoso-pubescentibus, baccis glabris. — Lob. ic. 2. p. 206. (v. v.)

β. sativum (DC.) foliis amplioribus sèpè subtùs glabris lucidis baccis majoribus glabris pilosisve.—In hortis culta—R. Grossularia L. sp. 291. (v. v. c.)


Sect. II. RIBESIA Berl. l. c.


Flores racemosi, pedunculi 4-flori, calyx campanulatus aut cylindricus, caulis inermis.

2. R. ALPINUM (L. sp. 291.) foliis 3-5-lobis obtusis subtùs lucidis suprà pilosis, bracteis lanceolatis sèpè flore longioribus, petalis minnitis subabortientibus, antheris plus minùs subsessilibus, stylis coalitis. ♂ ad sepes et in umbrosis montium. — Fl. fr. 4. p. 407. — J. Bauh. hist. 2. p. 98. ic. (v. v.)

3. R. RUBRUM (L. sp. 290.) foliis obtusè 3-5-lobis subtùs pubescentibus, junioribus sèpè subtomentosis suprà glabris, racemis nutantibus, bracteis obtusis pedicellis brevioribus, calycibus plano-campanulatis, sepalis obtusis, petalis obocordatis. ♂ in vallis Jurassi, humiliorum Alpium; et in hortis cultum.—Fl. fr. 4. p. 406. — Lob. ic. 2. p. 202. f. 1. (v. v.)

4. R. PETREUM (Wulf. in Jacq. misc. 2. p. 36.) foliis acuminatis 3-5-lobis subcordatis inciso-serratis longè pedunculatis suprà pilosis, racemis erectis, bracteis flore brevioribus, sepalis obtusis, petalis obocordatis. ♂ in montium locis umbrosis, inter lapides juxta rivos. — Fl. fr. 4. p. 407. Jacq. ic. rar. 1. t. 49. Lam. ill. t. 146. f. 2. (v. v.)





5. *R. NIGRUM* (L. sp. 291.) foliis subtùs punctato-glandulosis 3-5-lobis, racemis laxis, bracteis minutis subulatis obtusisve pedicello multò brevioribus, petalis oblongis, calycibus campanulatis, sepalis reflexis. ♂ in montibus Delph. ex Vill., Arverniae ex Delarb., Monspelii ex Gonan., in hortis cultum. — Fl. fr. 4. p. 407. — J. Bauh. hist. 2. p. 99. f. 1. (v. v. c.)
-

Ordo XLIX. SAXIFRAGEÆ. Vent. tabl. t. 2. p. 277. Ser. in DC. prod. t. 3. ined.

Calyx plus minusve gamosepalus persistens ovario adhærens vel liber; sepala 4-5. Petala 4-5 libera apici tubi sæpè brevissimi calycis inserta et cum sepalis alterna, rariùs nulla. Stamina libera calyci inserta 8-10, petalis sepalisque opposita; antheræ longitudinaliter dehiscentes. Ovarium imo calyci adnatum, 2-loculare carpellis duobus margine seminiferis inter se coalitis constans. Styli 2 rariùs 4-5. Stigmata apice dilatata. Fructus 2-locularis, intrà stylis foramine, vel a basi ad apicem dehiscens, aut indehiscens baccatus 4-5-locularis. Semina minuta sæpiùs numerosa. Albumen carnosum, embryo teres, radicula infera. — Herbæ, foliis alternis aut radicalibus sæpè carnosis.

† COROLLA POLYPETALA.

I. *SAXIFRAGA* L. gen. 559.

Calyx 5-sepalus, sepalis plus minus inter se et cum ovario coalitis; corolla 5-petala, petalis breviter unguiculatis integris; styli 2; capsula 2-locularis intrà stylis foramine dehiscens; semina numerosa rugosa vel lævia.

Sect. I. PORPHYRION Tausch. hort. canal. fasc. 1. Ser. in DC. prod. t. 3. ined.

Calyx longus gamosepalus ovarium involvens erectus, semina angulosa. Folia opposita minima coriacea vel crassa perennantia.

1. *S. OPPOSITIFOLIA* (L. sp. 575.) caulis ramosis prostratis, foliis inferioribus quadrifariam imbricatis ovatis carinatis ciliatis, caulinis cruciatim oppositis ovatis vel obovatis apice acatis unipunctatis, floribus solitariis terminalibus, calycis non adhærentis lobis obtusis ciliatis, staminibus corollâ brevioribus, seminibus oblongo-triquetris rugosis. ♀ in Alpibus, Monte-Ventoso et Pyrenæis. — Fl. fr. 4. p. 364. Lapeyr. fl. pyr. 36. t. 16. All. ped. t. 21. f. 3. (v. v.)
2. *S. RETUSA* (Gou. ill. 28. t. 18. f. 1.) glaucescens, caulis ramosis prostratis, foliis inferioribus quadrifariam imbricatis triquetris crassis glabris apice retusis 3-punctatis, foliis caulinis obovatis planiusculis ciliatis subtruncatis, floribus 1-4, calycis tubo ovario adhærente lobis obtusis glabris, staminibus corollam æquantibus, seminibus lævibus nitidis. ♀ in Pyrenæis et Alp. Delphinatûs. — Fl. fr. 4. p. 365. Lapeyr. fl. pyr. t. 18. *S. purpurea* All. ped. t. 21. f. 2. (v. v.)
3. *S. BIFLORA* (All. ped. t. 21. f. 1.) foliis obovatis subcoriaceis planis impunctatis

eruciatim oppositis subimbricatis nervosis ciliatis, floribus 2-5, calycis tubo ovario adhaerente lobis obtusis, staminibus corollam æquantibus, seminibus obovato-triquetris apice truncatis. $\frac{1}{2}$ in Alpibus et Pyrenæis propè nives. — Fl. fr. 4. p. 365. Lapeyr. pyr. t. 18. (v. s.)

Sect. II. AIZONIA Tausch. hort. canal. fasc. 1. Ser. l. c.

Calyx longus gamosepalus adhaerens ovarium involvens erectus, semina ovato-triquetra rugosa. — Folia alterna sessilia crassa coriacea glaucescentia cartilagineo-marginata.

§. 1. *Foliis ligulatis obtusis.*

4. S. COTYLEDON (L. sp. 570.) caule pedunculis calycibusque pilis glandulosis viscidis obtectis, foliis rosularum obovato-oblongis obtusissimis cartilagineo-serratis, floribus pyramidato-paniculatis, lobis calycinis linear-lanceolatis obtusis tubo campanulato longioribus, petalis cuneato-spathulatis obtusis, stylis subparallelis apice deflexis, stigmatibus subcapitatis. $\frac{1}{2}$ in rupibus humidis Alpium, Pyrenæorum. — S. pyramidalis Lapeyr. pyr. 32. Fl. fr. 4. p. 360. Stern. sax. 2. t. 2. (v. v.)
5. S. BONGARDIA (Lapeyr. fl. pyr. t. 11.) caule pedunculis calycibus pilis glandulosis viscidis obtectis, rosularum foliis spathulato-oblongis obtusis cartilagineo-crenatis, floribus paniculatis, lobis calycinis subovatis obtusis tubo hemisphaericō vix longioribus, petalis obovato-spathulatis, seminibus ovato-triquetris tenuissimè rugulosis. $\frac{1}{2}$ in rapibus editiorum Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 359. (v. v.)
6. S. AIZOON (Jacq. austr. t. 438.) pedunculis calycibusque piloso-glandulosis viscidis, foliis rosularum ovato-spathulatis obtusis cartilagineo-serratis, floribus paniculato-corymbosis, lobis calycinis ovatis obtusis, petalis obovatis, stylis divergentibus calyce longioribus, seminibus ovato-triquetris punctato-rugosis. $\frac{1}{2}$ ad saxa et rupes montium. — Fl. fr. 4. p. 360. — Barr. ic. t. 1309, 1311, 1312. (v. v.)
7. S. MUTATA (L. sp. 570.) foliis rosularum elongato-lanceolatis obtusissimis basi ciliatis, caulinis spathulatis ciliato-glandulosis, floribus pyramidato-paniculatis, pedunculis calycibusque piloso-glandulosis viscosissimis, lobis calycinis ovatis obtusis petalis linearibus oblongis acutis duplò brevioribus. $\frac{1}{2}$ in Pyrenæis ex Lapeyr. — Fl. fr. 5. p. 516. Sims. bot. mag. t. 351. Jacq. ic. rar. 3. t. 466. — Hall. helv. t. 16. f. 2. (v. v. in Sabaudiâ.)


§. 2. *Foliis ligulatis plus minusve triquetris.*


8. S. MEDIA (Gou. ill. 27.) caulinibus pedunculis calycibusque glanduloso-pilosis viscidis, fol. rosularum glabris glaucis ovato-spathulatis margine membranaceis submucronatis, caulinis lanceolatis glanduloso-ciliatis acutis, lacinias calycinis ovato-lanceolatis obtusis petala obovata superantibus. $\frac{1}{2}$ in Pyrenæorum rupibus calcareis. — Fl. fr. 4. p. 361. Lam. ill. t. 273. f. 6. S. calyciflora Lapeyr. fl. pyr. t. 12. S. diapensioides Lapeyr. abr. supp. 54 non Bell. ex cl. Dufour. — Petala calycesque purpurei. (v. v.)

$\beta.$ ambigua, petalis purpureis oblongis calycem superantibus. — In Pyrenæis propè St.-Beat. Hybrida inter S. medium et aretioidem. — S. ambigua DC. fl. fr. 5. p. 517. (v. s.)

9. S. ARETIOIDES (Lapeyr. fl. pyr. t. 13.) caulinibus pedunculis calycibusque glanduloso-viscidis, foliis rosularum linear-spathulatis subtriquetris, caulinis linearibus obtusis glanduloso-ciliatis, floribus corymbosis densis, calycinis laciuiis ovatis obtusis petalis obovatis brevioribus. $\frac{1}{2}$ in summis Pyren. — Fl. fr. 4. p. 362. Petala lutea. (v. v.)

$\beta.$ luteo-purpurea, foliis glaucis longioribus subacutis. — In Pyreneis propè St.-Beat. — S. luteo-purpurea Lapeyr. fl. pyr. t. 14. Fl. fr. 4. p. 362. Petala lutea, calyx purpureus. Hybrida inter S. aretioidem et medium monente cl. Arnott. (v. s.)





10. *S. CÆSIA* (L. sp. 571.) caule pedunculisque glabriusculis, foliis linearispathulatis plus minusve triquetris punctorum duplaci serie subtus notatis, rosularum recurvis basi ciliatis, calycis laciniis lanceolato-ovatis obtusis, petalis ovato-spathulatis. $\frac{1}{2}$ in Alpibus et Pyrenæis. — Fl. fr. 4. p. 363. Scop. carn. t. 15. Jacq. aust. t. 374. Fl. albi. (v. v.)

§. 3. *Foliis triquetris mucronatis subpungentibus.*

11. *S. VANDELLII* (Sternb. sax. 34. t. 10. f. 3. excl. syn. Jacq.) caulinibus calycibusque piloso-glandulosis, foliis firmis ciliatis, radicalibus aggregatis densis glabris pungentibus, floribus corymbosis, lobis calycis ovatis acutiusculis petalis obovato-cuneatis brevioribus. $\frac{1}{2}$ in Pyrenæis propè l'Étang d'Amsur ex Lapeyr. — *S. burseriana* Lapeyr. fl. pyr. 35. non L. (v. v. in Italia D.)

Sect. III. *DACTYLITES* Tausch. l. c. Ser. l. c.

Calyx longus gamosepalus ovario adhærens, erectus persistens. — *Folia* alternis plana margine nec cartilaginea nec punctata integra aut lobata.

* *Radice perenni stolonifera.*

12. *S. SEDOIDES* (L. sp. 572.) foliis linearispathulatis integris obtusis inferioribus patulis, superioribus villosulis ciliatis, pedunculis piloso-glandulosis 1-4-floris, calycis pilosi sepalis lanceolato-ovatis subacutis petala lanceolata acuta superantibus. $\frac{1}{2}$ in Pyrenæis orientalibus ex Lapeyr. — Fl. fr. 5. p. 518. Jacq. misc. 2. t. 21. f. 22. *S. trichodes* Scop. carn. t. 15. Fl. lutei. (v. s. ex Alp. Tyrol.)

13. *S. PLANIFOLIA* (Lapeyr. fl. pyr. p. 31.) cespitosa, foliis linearispathulatis obtusissimis planis integris piloso-glandulosis, inferioribus confertis imbricatis, caulinibus 1-3-floris piloso-glandulosis, calycis laciniis lanceolatis obtusis petalis obovatis subemarginatis duplo brevioribus. $\frac{1}{2}$ ad rupes humidas editiorum Alpium et Pyrenæis. — Fl. fr. 4. p. 367. *S. muscoides* All. ped. t. 61. f. 2. excl. syn. *Folia antiquiora cinerascentia*. Fl. ochroleuci. (v. v.)

14. *S. ANDROSACEA* (L. sp. 571.) foliis obtusis, radicalibus obovato-spathulatis integris rariis apice 3-dentatis in petiolum basi subattenuatis ciliatis, caulinis 1-3 lanceolato-ovatis lanceolatis, caulinis 1-4-floris, calycis laciniis ovatis obtusissimis petalis obovatis obtusis brevioribus. $\frac{1}{2}$ in Alpibus et Pyrenæis. — Fl. fr. 4. p. 367. *S. Pyrenaica* Scop. carn. t. 16. — Pluck. t. 222. f. 2. Fl. albescentes. (v. v.)

15. *S. MUSCOIDES* (Wulf. in Jacq. misc. 2. p. 125.) cespitosa plus minusve glanduloso-viscosa, caule erecto 1-8-floro, foliis linearibus obtusissimis integris aut apice 3-lobis, inferioribus confertis ciliatis, laciniis calycis lanceolatis obtusissimis petalis obtusis elliptico-linearibus subbrevioribus. $\frac{1}{2}$ in rupibus Alpium, Montis-Aurei, Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 376. *S. cespitosa* Scop. carn. t. 14. *S. moschata* Jacq. misc. 2. t. 21. f. 1. Lapeyr. fl. pyr. t. 37. Fl. fr. 5. p. 520. — Seg. ver. 1. t. 9. f. 4. *Variat* petalis flavescentibus aut purpureis. (v. v.)


fl. elatior (Ser.) caule elongato majore, foliis longius petiolatis, laciniis calycis ovatis petalis brevioribus. — In Jurasso (Ph. Thomas) et Pyrenæis. — *S. cespitosa* Lapeyr. fl. pyr. t. 35. (v. s.)

16. *S. EXARATA* (Vill. dauph. 4. t. 45. non All.) plus minusve piloso-viscidula, foliis nervosis obtusis cuneatis 3-5-fidis, caulinis rariis integris, radicalibus petiolatis, antiquioribus reflexis, calycis laciniis ovato-lanceolatis obtusis petalis ovatis obtusis nervosis plus minusve brevioribus. $\frac{1}{2}$ in rupibus editiorum Alpium et Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 374. *S. hypoides* All. ped. t. 21. f. 4. non L. *S. intricata* Lapeyr. fl. pyr. t. 33. Fl. fr. 4. p. 374. *S. nervosa* Lapeyr. pyr. t. 39. (v. v.)

17. *S. GROENLANDICA* (L. sp. 578.) viscosa cespitosa, foliis pubescenti-viscosis cuneatis apice 3-lobis segmentis obtusis, radicalibus densissimè imbricatis, caulinis 1-2-phyllis 2-5-floris floribus subcapitatis, laciniis calycis ovatis

- obtusis petalis obovatis obtusis multò brevioribus, staminum filamentis persistentibus demùm purpureis. \mathcal{Y} in editoribus Pyrenæis. — Fl. fr. 4. p. 376. Lapeyr. fl. pyr. t. 19. Fl. albi, calyces purpurei. (v. v. DC.)
18. *S. TUBESCENS* (DC. fl. fr. 4. p. 375.) pubescenti-viscida, foliis cuneatis apice 3-5-lobis segmentis linearibus obtusis divaricatis, radicalibus petiolatis, antiquioribus reflexis, caulibus oligophyllis, floribus subcorymbosis, laciñis calycis lanceolatis obtusis petalis rotundato-ovatis multò brevioribus. \mathcal{Y} in rupibus Alpium Galloprovinciæ, Montis-Ventosi, Cebenn., Pyren. — *S. mixta* Lapeyr. fl. pyr. t. 20 et 21. (v. v.)
19. *S. AJUGÆFOLIA* (L. sp. 578.) surculis prostratis foliosis, foliis glabris cuneato-petiolatis 3-5-fidis, segmentis lanceolatis acutis, pedunculis axillaribus ascendentibus paucifloris oligophyllis, foliis superioribus linearibus indivisis, calycis laciñis lanceolatis subacutis petalis ovato-ellipticis obtusis duplò brevioribus. \mathcal{Y} in saxosis humidis secùs nives in Pyrenæis. — Fl. fr. 4. p. 571 excl. var. β . Lapeyr. fl. pyr. t. 31. (v. v.)
20. *S. CAPITATA* (Lapeyr. fl. pyr. t. 30.) surculis basi nudis procumbentibus dein erectis foliosis, foliis subcapitatis coriaceis cuneatis basi ciliatis 3-5-fidis, laciñis latis cuneatis 3-lobis, segmentis ovatis acutis obtusisve, pedunculis axillaribus erectis, foliis superioribus linear-lanceolatis acutis, laciñis calycis ovato-lanceolatis acutis petalis rotundato-ovatis duplò brevioribus. \mathcal{Y} in editoribus Pyrenæis. — *S. ajugæfolia* β . Fl. fr. 4. p. 371. (v. v.)
21. *S. ASCENDENS* (L. sp. 579.) caule ascendente apice pubescente ramoso-paniculato, foliis crassis basi cuneatis palmato-3-5-partitis, lobis sub 3-fidis, segmentis inciso-dentatis acutis, floribus paniculatis, calycis glanduloso-pubescentis laciñis lanceolatis acutis petalis obovatis multò brevioribus. \mathcal{Y} secùs rivalos Pyrenæorum et montium Corsicæ. — Fl. fr. 4. p. 370. *S. aquatica* Lapeyr. fl. pyr. t. 28 et 29. Fl. magni albi. (v. v.)
22. *S. GERANIODES* (L. sp. 578.) viscida, caulibus erectis subnudis, foliis radicalibus reniformibus longè petiolatis sub-5-palmatis laciñis 3-lobis lobis lanceolatis ovatisve acutis, caulinis subsessilibus 5-fidis laciñis linear-lanceolatis, superioribus linearibus, floribus paniculato-corymbosis, calycis 5-fidi laciñis linearibus lanceolatis acutis petalis oblongo-ovatis triplo brevioribus. \mathcal{Y} ad rupes umbrosas Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 372. Gou. ill. t. 18. f. 2. Lapeyr. fl. pyr. t. 43. (v. v.)
23. *S. LADANIFERA* (Lapeyr. fl. pyr. t. 42.) viscida, foliis radicalibus gummiferis longè petiolatis 5-7-palmato-partitis laciñis integerrimis linearibus, caulinis subpetiolatis 3-fidis, summis linearibus, floribus paniculatis, calycis 5-fidi laciñis linear-lanceolatis acutis petalis ovato-spathulatis duplò triplo brevioribus. \mathcal{Y} ad rupes Pyren. orientalium. — Fl. fr. 4. p. 373. *S. pedatifida* β ladanifera Don in trans. linn. t. 3. p. 414. (v. v.)
- β . *pedatifida*, calycis laciñis linearibus angustis petalis ovato-spathulatis longè unguiculatis brevioribus. — In editoribus montibus agri Ligericini (Prost), Corsicæ. — *S. pedatifida* Sm. eng. bot. t. 1278. *S. cervicornis* Viv. cors. app. p. 2. (v. s.)
24. *S. PENTADACTYLIS* (Lapeyr. fl. pyr. t. 44.) glabra, surculis basi suffruticosis erectis coronatis foliis congestis rigidis plus minùsve petiolatis 3-5-palmati-partitis laciñis linearibus obtusis, antiquioribus gummiferis, floribus corymboso-paniculatis aut subcapitatis, laciñis calycinis lanceolatis acutis petalis ovato-ellipticis duplò triplo brevioribus. \mathcal{Y} ad rupes in Pyren. orient. — Fl. fr. 4. p. 374. An satis à *S. ladanifera* α distincta? (v. v.)
25. *S. HYPNOIDES* (L. sp. 579.) caulibus erectis subnudis paucifloris, ramis sterilibus abortu sàpè gemmiferis, foliis flaccidis ciliatis integris vel 3-7-sectis, laciñis linearibus acuminatis, calycis laciñis linear-lanceolatis acutis petalis oblongo-bovatis duplò triplo brevioribus. \mathcal{Y} in montibus calcareis Galliæ australis, Cebenn., Arverniæ. — Fl. fr. 4. p. 376. Vill. dauph. 4. t. 45. Planta valdè polymorpha. (v. v.)





** *Annuæ astolonosæ.*

26. *S. PETREA* (L. sp. 578. excl. syn.) caulis erectis aut ascendentibus ramosis foliosis, foliis cuneiformibus 3-5-inciso-dentatis aut integris spathulatis lanceolatis villoso-viscidis, inferioribus confertis, lacinia calycis ovato-lanceolatis obtusis petalis obovatis duplò brevioribus. (I) in rupestribus Alpium Delph. et Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 370. *S. ascendens* All. ped. t. 22. f. 3. non Gouan. *S. controversa* Sternb. sax. 43. t. 16. f. 1. — 5. (v. v.)
27. *S. TRIDACTYLITES* (L. sp. 578.) caule erecto panicifloro glutinoso, foliis crassiusculis inferioribus integris obovato-spathulatis petiolatis, mediis 3-fidis alternis lacinia ovatis obtusis, summis linearibus, cal. lacinia brevibus ovatis obtusis petalis obocordatis brevioribus. (I) in muris et arenosis. — Fl. fr. 4. p. 369. — Black. t. 212. (v. v.)

*** *Perennes astolonosæ radice bulbifera.*

28. *S. GRANULATA* (L. sp. 576.) pubescenti-viscosa, caule erecto stricto, foliis reniformibus, inferioribus longè petiolatis inciso-crenatis, superioribus sessilibus lobatis, floribus paniculato-corymbosis, calycis lacinia oblongo-lanceolatis obtusis petalis obovato-oblongis triplò brevioribus. ♀ in pratis et ad oras sylvarum passim. — Fl. fr. 4. p. 368. — Cam. epit. 719. ic. (v. v.)

♂. *Corsica* (Ser. ined.) pygmæa, caule 1-4-floro, foliis radicalibus longè petiolatis cordatis 5-7-lobis lobis rotundatis obtusis, caulinis 3-fidis. — In Corsicâ. (Ph. Thomas.)

γ. *penduliflora* (Ser.) foliis omnibus petiolatis, inferioribus profundè cordatis 7-9-lobis lobis rotundis obtusis, floribus subumbellatis cernuis, calycis lacinia ovato-lanceolatis. — In Monte-Aureo. *S. penduliflora* Bast. in journ. bot. 1814. p. 17. Fl. fr. 5. p. 519. (v. s.)

Sect. IV. ARABIDIA Tausch. l. c. Ser. l. c.

Calyx basi vix gamosepalus ovario non adhærens post anthesin reflexus, petala longè unguiculata bimaculata, semina oblonga striata, folia alterna cuneiformia vel obovata in stolonibus rosulata.

29. *S. CLUSII* (Gou. ill. p. 28. excl. plur. syn.) caulis erectis ramosis foliosis, foliis radicalibus spathulato-obovatis flaccidis basi attenuatis pilosis dentatis obtusis, caulinis cuneatis apice dentatis, superioribus linearibus, floribus paniculatis, pedicellis post anthesin divaricatis, sepalis ovatis obtusis petalis lanceolatis basi unguiculatis subinæqualibus brevioribus. ♀ in humidis umbrosis Pyren. et Cebenn. — Fl. fr. 4. p. 380. *S. leucanthemifolia* Lapeyr. fl. pyr. t. 25. (v. v.)

30. *S. STELLARIS* (L. sp. 572.) caulis erectis subsimplicibus nudis, foliis rosulatis obovato-spathulatis crassiusculis dentato-serratis obtusis basi in petiolum subattenuatis glabriusculis, floribus paniculato-corymbosis, pedicellis longis, sepalis ovatis obtusis petalis linear-lanceolatis basi unguiculatis duplò brevioribus. ♀ in humidis montium. — Fl. fr. 4. p. 379. — Pluck. t. 58. f. 2. (v. v.)

Sect. V. HYDATICA Neck. el. bot. 2. p. 387. Tausch. l. c. Ser. l. c.

Calyx basi vix gamosepalus ovario non adhærens, semina subsphærica aspera. — Folia cuneata orbiculata.

* *Calyce post anthesin reflexo.*

31. *S. CUNEIFOLIA* (L. sp. 574.) foliis rosulatis coriaceis cuneato-spathulatis obtusissimis dentato-crenatis glabris basi in petiolum attenuatis, scapo eretto nudo, floribus laxè paniculatis, calycis sepalis lanceolatis acutis petalis oblongo-lanceolatis obtusis brevioribus. ♀ in umbris humidis Alp., Cebenn., Pyren. — Fl. fr. 4. p. 377. Scop. carn. t. 13. — J. Bauh. hist. 3. p. 684. f. 2. (v. v.)

32. *S. UMBROSA* (L. sp. 574.) foliis rosulatis rotundato-spathulatis obovatis ve

subretusis cartilagineo-crenatis in petiolum dilatatum ciliatum subattenuatis, scapo erecto stricto nudo viscidio-glanduloso, floribus paniculatis, sepalis obovatis obtusis petalis ovato-oblongis duplò brevioribus. ♀ in Pyrenæis. — Fl. fr. 4. p. 378. Lapeyr. fl. pyr. t. 22. (v. v.)

33. *S. HIRSUTA* (L. sp. 574.) foliis rosulatis ovalibus basi subcordatis cartilagineo-crenatis retusis subglabris longè petiolatis, petiolis hirsutis, floribus paniculatis, sepalis ovato-lanceolatis obtusis petalis oblongo-ovatis brevioribus. ♀ in Pyrenæis. — Fl. fr. 4. p. 378. Lap. fl. pyr. t. 23. — Magn. hort. 87. ic. (v. s.)

♂. *Geum*, foliis dentatis utrinquè plus minus hirsutis. — *S. Geum* L. sp. 574. Lapeyr. fl. pyr. t. 24. Fl. fr. 4. p. 379. (v. s.)

** *Calyce post anthesin non reflexo.*

34. *S. ROTUNDIFOLIA* (L. sp. 576.) caulinibus erectis foliosis, foliis reniformicordatis inaequalibus dentatis crenatis, inferioribus longe petiolatis petiolis hirsutis, superioribus sessilibus, floribus paniculatis, sepalis linearilanceolatis acutis petalis linear-ellipticis duplò brevioribus. ♀ in umbrosis montium. — Fl. fr. 4. p. 368. — Cam. epit. 764. ic. (v. v.)

Sect. VI. *HIRCULUS Clus. Tausch. l. c.*

Calyx basi vix gamosepalus ovario non adhærens; sem. oblonga. — *Caulis* foliosus, folia alterna linearia aut lanceolata integra.

35. *S. HIRCIUS* (L. sp. 576.) caule simplici erecto folioso, foliis obtusis, radicibus spatulato-lanceolatis basi in petiolum ciliatum angustatis, caulinis oblongo-lanceolatis, sepalis oblongo-ovatis obtusissimis petalis ovatis obtusis duplò brevioribus. ♀ in paludosis turfosis Jurassi. — Fl. fr. 4. p. 377. — Hall. helv. t. 11. Fl. lutei. (v. v. DC.)

36. *S. ASPERA* (L. sp. 575.) caulinibus foliosis basi geniculatis procumbentibus, ramulis sæpè abortivis gemmiformibus, foliis linearilanceolatis mucronatis laevibus margine sæpius ciliis asperis instructis, floribus corymboso-paniculatis, sepalis ovatis obtusis petalis obovato-oblongis duplò brevioribus. ♀ in Alpibus, montibus Arverniæ, Pyren. — Fl. fr. 4. p. 363. *S. bryoides* L. sp. 572. — Scheuchz. itin. 2. t. 20. f. 3 et t. 21. f. 2. (v. v.)

37. *S. AIZOIDES* (L. sp. 576.) caulinibus basi decumbentibus foliosis, foliis linearibus basi plus minusve ciliatis crassiusculis submucronatis, floribus laxè paniculatis solitariis, sepalis ovatis mucronatis petalis oblongo-ellipticis obtusis brevioribus. ♀ in umbrosis et humidis secus rivulos moutium. — Fl. fr. 4. p. 366. *S. autumnalis* L. sp. 575. — Fl. lutei sæpè croceo maculati. (v. v.)

†† COROLLA NULLA.

II. *CHRYSOSPLENIUM* Tourn. inst. t. 60. L. gen. 558.

Calyx ovario adhærens 4-5-sepalus sepalis apice liberis; petala nulla; stam. 8-10; caps. 1-loocularis 2-valvis.


1. *C. ALTERNIFOLIUM* (L. sp. 569.) foliis alternis reniformi-cordatis subduplicato-crenatis. ♀ in humidis umbrosis imprimis montium. — Fl. fr. 4. p. 381. — Dalech. lugd. 1114. f. 1. (v. v.)

2. *C. OPPOSITIFOLIUM* (L. sp. 569.) foliis oppositis reniformibus subenneatis irregulariter crenatis. ♀ in humidis montanis. — Fl. fr. 4. p. 381. — Dalech. lugd. 1114. f. 2. (v. v.)

III. *ADOXA* L. gen. 501.

Calyx 4-5-sepalus sepalis inter se et cum ovario adnatis extus 2-4-squamulos; petala nulla; stam. 8-10; styli 4-5; bacca globosa 4-5-loocularis; semina margine membranacea, radicula supera.

1. *A. MOSCHATELLINA* (L. sp. 527.) foliis bibernatis glaucescentibus, floribus capitatis sessilibus. ♀ in sepibus, vere. — Fl. fr. 4. p. 382. — Lob. ic. 674. f. 2. (v. v.)





Ordo L. UMBELLIFERÆ. *Juss. gen. 218. Koch Umbellif. nov. disp. in novis actis nat. cur. t. 12. pars 1. p. 55.*

Calyx ovario adhærens, limbo 5-dentato vel edentulo. Petala 5 ovario aut glandulæ ovarium tegenti inserta, nunc integra in acumen sensim attenuata aut in circulum involuta apice brevi lato retuso aut in lacinulam inflexam subitò coactata, nunc emarginata bifidave. Stamina 5 petalis alterna et cum iis inserta. Styli 2 sæpiùs persistentes. Fructus constans 2 carpellis superficie plus minùs latâ conglutinatis et extùs calyce adhærente obductis, maturitate à basi ad apicem segregatis, et ex apice axis filiformis *carpophori* dicti suspensis. Carpello cuique superficies duo, altera convexior *dorsalis*, altera quâ gemina sibi incumbunt carpella planior *commissuralis*. Superficies convexior striis quinque nunc elevatis nunc depresso nunc tenuibus *juga* dictis notatur. Horum jugorum unum medium dorsi tenens *carinale*, unum utrinque marginem occupans vel non longè ab illo remotum *juga lateralia*, unum utrinque inter carinam et marginem situm *juga intermedia*, et hæc 5 primaria vocantur cùm semper saltem leniter indicata adsint. Inter juga primaria non raro quatuor alia secundaria in cujusvis *valleculæ* (id est spatii inter 2 juga interpositi plerumque depresso) existunt, quorum duo valleculas interiores *juga secundaria interiora*, duo valleculas exteriores *juga secundaria exteriora* occupant. Cujusque carpelli pericarpium sæpissimè *vittis* id est canalibus verticalibus rectis filiformibus vel clavulatis frequenter discoloribus oleum vel resinam continentibus gaudet; carpellum *paucivittatum* si vittæ solitariæ in medio vallecularum vel et binae in valleculis exterioribus adsunt, si majori sunt vittæ numero *carpellum multivittatum*, si verò nullæ *evittatum*, dicitur. Carpella in quibus seminis superficies commissuralis plana est *orthosperma*, in quibus verò seminis superficies commissuralis plus minùsve inflectitur *campylosperma* dicuntur. Embryo minimus ad apicem albuminis lignosi; radicula supera. — Herbæ foliis alternis, sæpiùs decompositis, floribus umbellatis aut rarissimè capitatis, involuero et involucello sæpiùs cinctis.

Subordo I. UMBELLIFERÆ PERFECTÆ MULTIJUGATÆ,
id est carpello jugis 5 primariis et 4 secundariis instructo.

Trib. I. THAPSIEÆ. Koch umb. p. 73.

Carpella multijugata, jugis primariis 5 filiformibus, secundariis

4, interioribus filiformibus alatisve, exterioribus alatis alâ inermi. Semen (albumen) anticè planiusculum et ideo carpellum orthospermum.

† *Fructus octo-alatus, jugis secundariis in alam insignem protractis.*

I. LASERPITIUM L. gen. 344.

Calycis margo quinquedentatus; petala obovata emarginata cum lacinula inflexâ; fructus a dorso compressus vel sectione transversali subteres; carpella jugis primariis filiformibus, 2 lateralibus plano commissurali impositis, secundariis 4 alatis alâ integrâ; valleculæ sub jugis secundariis 1-vittatæ; semen anticè planiusculum. — Involucrum et involucellum polyphyllum.

* *Fructu maturo glabro vel in jugis primariis pilis brevissimis adpressis obsito.*

1. L. SILER (L. sp. 357.) foliis bipinnatis, foliolis lanceolatis integerrimis mucronatis simplicibus ternatisque, involuci foliolis linearis lanceolatis aristato-acuminatis glabris, seminum alis brevibus. ♀ in montibus provinc. australium. — Fl. fr. 4. p. 313. Jacq. austr. t. 145. (v. v.)
2. L. AQUILEGIIFOLIUM (Murr. syst. 228.) foliis bis trifidis, foliolis ovatis basi subcordatis glabris subtus cinereis sâpè trilobis apice dentatis dentibus mucronatis, jugorum alis subæqualibus. ♀ in umbrosis humidis Pyren. et Cevennarum. — Fl. fr. 5. p. 510. L. Alpinum Wald. et Kit. hung. t. 253. (v. v.)
3. L. ASPERUM (Crantz austr. 8°. p. 50. t. 1. f. 2. et n. 6.) foliis bipinnatis tri pinnastis, foliolis ovali-oblongis oblique cordatis subtus pubescentibus dentatis, dentibus mucronatis, involuci foliolis linearis-setaceis, seminum alis crispis. ♀ in montanis. — Fl. fr. 5. p. 509. L. latifolium Fl. fr. 4. p. 312. — Lob. ic. 704. f. 2. (v. v.)
4. L. GLABRUM (Crantz austr. 3. p. 54.) foliis bipinnatis glaberrimis vaginis amplis, inferiorum foliolis rotundo-ovatis obliquè cordatis dentatis dentibus mucronatis, superiorum foliolis lanceolatis integerrimis, involuci foliolis setaceis glaberrimis, alis magnis subæqualibus crispis. ♀ in locis montosis siccis Alsatiæ, Jurassiæ, Massiliæ, Pyrenæorum ex Lapeyr. — Fl. fr. 5. p. 509. L. latifolium L. sp. 356. — Moris. s. 9. t. 19. n. 1. (v. v.)
5. L. GALLOSUM (L. sp. 357.) foliis 3-pinnatis, foliolis cuneatis plus minus 3-5-fidis glabris, laciinis oblongis apice calloso-mucronatis, involuci foliolis linearis-lanceolatis glabris acuminatis, alis subæqualibus. ♀ in montibus aridis provinc. australium orientaliumque. — Fl. fr. 4. p. 312. — Pluck. t. 198. f. 6. (v. v.)
6. L. HIRSUTUM (Lam. fl. fr. 3. p. 648.) foliis suprà-decompositis hirsutis, involuci foliolis linearis-lanceolatis aristato-acuminatis margine scariosis ciliatis. ♀ in Alpibus Delphin. et Galloprovinciæ. — Fl. fr. 4. p. 313. L. Halleri All. — Hall. helv. t. 19. (v. v. in Helv.)

* * *Fructus maturi jugis primariis setulis patentibus obsitis.*


7. L. PRUTHENICUM (L. sp. 357.) foliis 3-pinnatis, foliolis lanceolatis integerrimis acutis extimis coalitis, involuci foliolis linearis-lanceolatis aristato-acuminatis, jugorum exteriorum alis majoribus. ♀ in pascnis et dumetis Galiae boreali-orientalis. — Fl. fr. 4. p. 312. — Breyne. cent. t. 48. (v. v.)

++ *Fructus 4-alatus, jugis secundariis exterioribus tantum alatis.*

II. THAPSIA Tourn. inst. t. 171. L. gen. n. 361.

Calyx 5-dentatus; petala elliptica integra acuminata acumine inflexo vel involuto; fructus à dorso compressus; carpella jugis primariis 5 filiformibus, 2 lateralibus plano commissurali impositis, secundariis 4,





interioribus filiformibus tenuissimis, exterioribus membranaceo-alatis alâ integrâ; valleculæ sub jugis secundariis univittatae; semen complanatum. — Invol. universale et partiale oligophyllum cadueum, vittæ commissurales duæ.

1. *T. VILLOSA* (L. sp. 575.) foliis ternato-decompositis, foliolis dentatis villosis basi coadunatis. $\frac{2}{3}$ in locis sterilibus umbrosis provinc. mediterranearum. — Fl. fr. 4. p. 342. Koch umb. f. 3. 4 et 5. — Clus. hist. 2. p. 192. ic. (v. v. DC.)

Trib. II. DAUCINEÆ. Koch l. c. p. 76.

Fructus a dorso lenticulari-compressus aut sectione transversali subteres. Carpella multijugata, jugis primariis 5 filiformibus setulosis, secundariis 4 magis prominulis aculeatis. Semen antice planiusculum.

III. DAUCUS L. gen. n. 333.

Calyx 5-dentatus; petala obovata emarginata cum lacinulâ inflexâ, exteriora sèpè radiantia et profundè bifida; fructus a dorso compressus; carpella jugis lateralibus plano commissurali impositis, secundariis 4 æqualibus magis prominulis unifariam aculeatis, aculeis basi tenuissimè connexis; valleculæ sub jugis secundariis 1-vittatae. — Invol. universale et partiale polyphyllum; vittæ commissurales duæ.

1. *D. MAURITANICUS* (All. ped. t. 61. f. 1.) foliis multipinnatis glaberrimis, superiorum foliolis acuminatis linearibus trifidis glabris, inferiorum foliolis lanceolatis inciso-dentatis, involueri foliolis linear-i-pinnatifidis striatis, aculeis diametrum fructûs oblongo-ovalis subsuperantibus. (2) circâ Nicæam et in agro Ruscinonensi propè Prades. — Fl. fr. 5. p. 512 an L. sp. 348? (v. v. DC.)
2. *D. MARITIMUS* (Lam. dict. 1. p. 634.) caule elongato lœvi basi glabro supernè scabriusculo, foliis glabris, inferioribus 2-pinnatis foliolis laciniatis laciniis linearibus acuminatis, superioribus pinnatis foliolis linearibus acuminatis, involueri foliolis glabris linear-i-pinnatifidis striatis, aculeis fructûs ovati diametrum subæquantibus. (1) in arenosis littoribus Occitanie, Narbonæ et Vindilis (*Belle-île en mer*). — Fl. fr. 4. p. 329. (v. v.)
3. *D. GUMMIFER* (Lam. dict. 1. p. 634.) caule erecto basi hispido ramoso striato, foliis bipinnatis, foliolis glabriusculis ovatis dentatis incisive crassis obtusis mucronulatis, involueri foliolis striatis ciliatis pinnatifidis, laciniis lanceolato-linearibus acuminatis, aculeis fructûs ovati diametro minoribus. $\frac{2}{3}$ in littoribus saxosis maris Mediterranei. — Fl. fr. 4. p. 328. et 5. p. 512. *D. Gingidium* L. sp. 348? *D. lucidus* L. f. supp. 179. (v. v.)
4. *D. CAROTA* (L. sp. 348.) caule hispido, foliolis 2-3-pinnatis villosis, foliolis incisis laciniis linearibus acutis, involueri foliolis linear-i-pinnatifidis lœvibus ciliatis, aculeis fructûs oblongo-ovalis diametro minoribus. (2) in pascuis arvisque. — Fl. fr. 4. p. 327. Koch umb. f. 11. — Lob. ic. 723. f. 1. — J. Bauh. 3. p. 2. p. 64. (v. v.)
5. *D. HISPIDUS* (Desf. atl. 1. t. 63.) caule hispido ramoso, foliis inferioribus hispidis 3-pinnatis foliolis ovatis incisis dentatisque, superioribus glabriusculis 2-pinnatis, foliolis 3-5-fidis, laciniis linear-i-lanceolatis acuminatis, involueri foliolis linear-i-pinnatifidis ciliato-scabris basi scarioso-dilatatis, aculeis fructûs ovati diametrum subsuperantibus. (2) in saxis maritimis propè Dieppe, Cherbourg et St.-Malo ex cl. de Brébisson. — Fl. fr. 4. p. 328. (v. v. DC.)

IV. ORLAYA Hoffm. umb. ed. 2. t. 1. p. 58. — Caucalidis sp. L.

Calyx 5-dentatus; petala obovata emarginata cum lacinulâ inflexâ,

exteriora radiantia profundè bifida; fructus a dorso lenticulari-compressus; carpella jugis lateralibus plano commissurali impositis, secundariis 4 bi-trifariam aculeatis, exterioribus magis prominulis; valleculæ sub jugis secundariis univittatae; semen anticè concaviusculum. — Invol. univers. varium, partiale polyphyllum.

1. *O. GRANDIFLORA* (Hoff. l. c.) foliis bipinnatis, involuci involucellorumque foliolis integerrimis lanceolatis acuminatis margine scariosis, petalis exterioribus maximis, jugis secundariis interioribus 3-fariam, exterioribus 2-fariam aculeatis. (I) in arvis. — Koch umb. f. 13. *Caucalis grandiflora* L. sp. 346. Lam. ill. t. 192. f. 1. Fl. fr. 4. p. 330. Aculei hamati. (v. v.)
2. *O. MARITIMA* (Koch umb. p. 79.) hispido-hirsuta, foliis 3-pinnatifidis incisis, involucro involucellisque oligophyllis, foliolis linearibus acuminatis indivisis 3-fidisque, jugis secundariis interioribus bifariam aculeatis, exterioribus brevioribus alatis alâ bifariam inæqualiter aculeatâ. (I) in arenosis maritimis Corsicæ, Niceæ, Galloprovinc., Occitanie. — *Caucalis maritima* Gou. hort. 135. Fl. fr. 4. p. 331. — Ger. gallop. t. 10. Aculei apice stellatim hamati. (v. v.)
3. *O. PLATYCARPOS* (Koch umb. l. c. f. 12.) caule sparsim piloso, foliis 3-pinnatifidis incisis, involucris involucellisque oligophyllis, foliolis lanceolatis margine scariosis indivisis aut apice pinnatis, jugis secundariis bifariam aculeatis, interioribus exteriores alatos alâ bifariam inæqualiter aculeatâ æquantiibus. (I) in provinciis australioribus. — *Caucalis platycarpos* L. sp. 347. Fl. fr. p. 331. — J. Bauh. p. 2. p. 80. f. 1. Aculei purpurascentes apice hamati, maiores quam in præcedente. (v. v.)

Trib. III. CAUCALINEÆ. Koch umb. 79.

Fructus a latere contractus vel subteres. Carpella multijugata, jugis primariis 5 filiformibus setosis vel aculeatis, secundariis 4 magis prominulis aculeatis vel obliteratis copiâ aculeorum totam valleculam obtegentium. Semen involutum vel margine inflexum et idcirco carpella campylosperma.

V. CAUCALIS Hoffm. umb. ed. 2. 1. p. 55. — *Caucalidis* sp. L.

Calyx 5-dentatus; petala obovata emarginata cum lacinulâ inflexâ, exteriora radiantia profundè bifida; fructus a latere subcompressus; carpella jugis lateralibus plano commissurali impositis, secundariis 4 magis prominulis uni-bifariam aculeatis; valleculæ sub jugis secundariis 1-vittatae; semen involutum vel margine inflexum. — Invol. universale et partiale varium; vittæ commissurales 2.


1. *C. DAUCOIDES* (L. sp. 346.) caule erecto ramoso glabriusculo, foliis 3-pinnatifidis incisis, involucris involucellisque subnullis aut foliolis 1-3 subulatis minimis caducis, jugis primariis aculeolatis, secundariis unifariam aculeatis, aculeis subæqualibus, semine involuto. (I) in incultis et limitibus arborum. — Fl. fr. 4. p. 332. Koch f. 14. Umbellulæ 1-3-floræ. (v. v.)
2. *C. LEPTOPHYLLA* (L. sp. 347.) foliis bipinnatifidis, foliolis integris incisisve, involucro nullo, involucellis polyphyllis, foliolis hispidis lanceolato-linearibus acuminatis, jugis primariis setosis, secundariis bifariam aculeatis aculeis æqualibus, semine anticè profundo sulco exarato sed non involuto. (I) in arvis, locis aridis. — *C. parviflora* Lam. dict. 1. p. 657. DC. fl. fr. 4. p. 332. — Jacq. vind. 2. t. 195. Umbellæ 1-3-radiatæ. (v. v.)


VI. TURGENIA Hoffm. umb. ed. 2. 1. p. 59. — *Tordylii* sp. L.

Calyx 5-dentatus; petala obovata emarginata cum lacinulâ inflexâ, exteriora radiantia bifida; fructus a latere contractus; carpella jugis









primariis lateralibus plano commissurali impositis muriculatis, reliquis omnibus bi-trifariam aculeatis, aculeis æqualibus; valleculæ sub jugis secundariis univittatae; semen involutum. — Involucrum univ. et partiale è foliolis pluribus.

1. T. LATIFOLIA (Hoffm. l. c.) foliis pinnatis, foliolis lanceolatis inciso-dentatis recurrentibus, involueris involucellisque polyphyllis, foliolis ovato-lanceolatis scariosis acuminatis. (I) in arvis inter segetes. — Koch f. 16. Caucalis latifolia L. syst. 205. Fl. fr. 4. p. 330. — Garid. aix. t. 22. (v. v.)

VII. TORILIS Adans. Hoffm. gen. umb. ed. 2. 1. p. 53. — Tordylii et Scandicis sp. L.

Calyx 5-dentatus; petala obovata emarginata cum lacinulâ inflexâ, exteriora majora bifida; fructus a latere contractus; carpella jugis primariis setulosis, lateralibus plano commissurali impositis, secundariis copiâ aculeorum totam valleculam occupantium obliteratis; valleculæ sub aculeis univittatae; semen margine inflexum. — Involucrum varium, involucellum polyphyllum.

2. T. NODOSA (Gærtn. fruct. t. 20. f. 6.) foliis tenuiter 2-3-pinnatifidis, umbellis lateralibus breviter pedicellatis, involueri involucellorumque foliolis linearisetaceis hispidis, jugorum secundariorum aculeis caducis. (I) in locis aridis, ad margines arborum. — Caucalis nodiflora Fl. fr. 4. p. 334. C. nodosa Huds. non All. et DC. — J. Bauh. 3. p. 2. p. 83. f. 2. Fructus aculeorum caducorum basi permanente tuberculatus. (v. v.)
2. T. ANTHRISCUS (Gmel. bad. 1. p. 613.) caule ramoso elato, foliis pinnatis foliolis pinnatifidis laciñiis incisis dentatisque recurrentibus, involueri involucellique foliolis 4-5 linearisubulatis hispidis, umbellis longè pedunculatis, fructus aculeis incurvis persistentibus. (I) in locis incultis et ad sepes. — Koch umb. f. 15. Caucalis Anthriscus Fl. fr. 4. p. 333. — Bauh. prod. p. 80. ic. (v. v.)
3. T. INFESTA (Hoffm. l. c.) caule ramosissimo diffuso, foliis pinnatis foliolis pinnatifidis laciñiis incisis, involucro subnullo, involucellis foliolis 3-5 linearisubulatis hispidis, umbellis longè pedunculatis, carpellis aculeatis aculeis breviter hamatis persistentibus. (I) in arvis et ad vias. — Cauc. arvensis Fl. fr. 4. p. 333. Scandix infesta L. sp. 237. T. Helvetica Röm. et Sch. — Jacq. vind. 3. p. 12. t. 16. An satis à præcedente distincta? (v. v.)

Trib. IV. CORIANDREÆ. Koch umb. p. 82.

Fructus globosus, vel è carpellis duobus subglobosis didymus. Carpella multijugata, jugis primariis 5 depresso flexuosisque vel sulcum obsoletum tantum formantibus, lateralibus antè marginem (id est locum ubi binæ carpellorum superficies sese contingunt) accessoriū (id est à jugis lateralibus dictinctum) positis; secundariis 4 magis prominulis, omnibus apteris. Semen a basi ad apicem involutum vel curvatum, hinc anticè excavatum.

VIII. CORIANDRUM Hoffm. gen. ed. 2. 1. p. 189. — Coriandri sp. L.

Calyx 5-dentatus; petala obovata emarginata cum lacinulâ inflexâ, exteriora radiantia bifida; fructus globosus; carpella jugis primariis 5 depresso flexuosis, secundariis 4 magis prominulis carinatis; valleculæ evittatae, commissura 2-vittata; semen anticè excavatum membranâ solutâ tectum. — Invol. nullum, involucellum dimidiatum; carpella cohærentia difficile separanda.

1. C. SATIVUM (L. sp. 367.) (I) in arvis. — Koch f. 72 et 73. Fl. fr. 4. p. 292. — Cam. epit. 523. ic. Caulis teres, folia decomposita, foliolis linearibus. (v. v.)

IX. BIFORA Hoffm. umb. ed. 2. 1. p. 191.

Calycis margo obsoletus; petala obovata emarginata cum lacinulâ inflexâ; fructus carpellis subgloboso-ventricosis didymus; carpella granulato-rugulosa (juga secundaria), striis 5 impressis obsoletis notata (jugis primariis), lateralibus duobus semicircularibus antè marginem accessorum positis evittatis; commissura biforata; semen a basi ad apicem involutum. — Invol. univers. et partiale oligophyllum vel nullum.

- I. B. TESTICULATA (Spreng. ap. Röm et Sch. t. 6. p. 448.) (1) inter segetes in provinc. mediterraneis. — B. flosculosa Bieb. taur. 3. p. 234. *Coriandrum testiculatum* L. sp. 367. Fl. fr. 4. p. 293. — Plack. t. 169. f. 2. *Caulis angulatus*, folia decomposita, foliolis linearis-lanceolatis (v. v.)

Trib. V. SILERINEÆ. Koch umb. 84.

Fructus a dorso lenticulari-compresus. Carpella multijugata, jugis primariis 5, lateralibus marginantibus, secundariis 4, omnibus filiformibus apteris. Semen antice planiusculum.

- X. SILER Scop. carn. 1. p. 217. *Gærtn. fruct.* 1. p. 92. t. 21. — *Laserpitii sp. L.*

Calyx 5-dentatus; petala obovata emarginata cum lacinulâ inflexâ; fructus a dorso lenticulari-compressus; carpella jugis filiformibus elevatis obtusis, lateralibus marginantibus, secundariis minus prominulis; valleculæ sub jugis secundariis univittatæ. — Invol. univ. et partiale oligophyllum caducum.

- I. S. TRILOBUM (Scop. carn. 1. p. 217.) foliis biernatis, foliolis trilobis obtusis rotundo-ovatis crenatis. 2 in pascuis montanis Galloprovinciæ ex Ger, Pyren. ex cl. Benth. — Koch l. c. f. 34 et 35. *Laserpitium trilobum* L. *Angelica aquilegifolia* Fl. fr. 4. p. 306. et 5. p. 508. — Moris. s. 9. t. 3. n. 3. *Civitas dubia*. (v. s. c.)

Subordo II. UMBELLIFERÆ PERFECTÆ PAUCIJUGATÆ, id est carpello jugis 5 primariis, secundariis nullis, vel et primariis basi et dorso oblitteratis apice tantùm jugato.


Trib. VI. TORDYLINEÆ. Koch 85.


Fructus a dorso lenticulari-vel plano-compressus, margine dilatato incrassato noduloso vel plicato cinctus. Carpella jugis primariis 5 subinde tenuissimis vel obsoletis, lateralibus margini dilatato contiguis veleumdem formantibus. Semen complanatum et inde carpellum orthospermum.

- XI. CONDYLOCARPUS Hoffm. 1. p. 202. — *Tordylii sp. L.*

Calyx 5-dentatus; petala obovata emarginata cum lacinulâ inflexâ, exteriora radiantia bifida; fructus a dorso plano-compressus, margine accessorio incrassato noduloso-crenato cinctus; carpella jugis tenuissimis tribus dorsalibus æquidistantibus, 2 lateralibus margine incrassato contiguis remotioribus, valleculæ 3-vittatæ; vittæ striis separatae; semen complanatum. — Involuc. et involucellum foliolis pluribus; commissura multi-striata 10-12-vittata.

- I. C. OFFICINALIS (Koch umb. 87.) foliorum inferiorum foliolis ovatis incisis





crenato-dentatis, superiorum linearibus dissectis, fructu glanduloso, commissurâ 10-vittatâ. (I) in provinciis australibus ad arva. — *Tordylium officinale* L. sp. 345. Fl. fr. 4. p. 335. — J. Bauh. hist. 3. p. 2. p. 84. f. 1. (v. v.)

XII. *TORDYLIUM Hoffm. umb. 1. p. 198.* — *Tordylii* sp. L.

Calyx 5-dentatus; petala obovata emarginata cum lacinulâ inflexâ, exteriora radiantia bifida; fructus a dorso plano-compressus, margine accessorio incrassato rugoso-tuberculato cinctus; carpella jugis tenuissimis, tribus dorsalibus æquidistantibus, 2 lateralibus margini incrassato contiguis vel ab eodem obtectis; valleculæ 1-vittatæ, vittis filiformibus; semen complanatum. — *Involucrum et involucellum polyphyllum*; commissura bivittata.

1. *T. MAXIMUM* (L. sp. 345.) foliis pinnatis, inferiorum foliolis lanceolato-ovatis inciso-crenatis, superiorum foliolis lanceolatis crenatis, terminali majore, fructu hispido. (I) in incultis et marginibus arorum. — Fl. fr. 4. p. 335. Koch umb. f. 24 et 25. — Clus. hist. 2. p. 201. f. 1. *Juga* obsoleta. (v. v.)

Trib. VII. *PEUCEDANEÆ*. — *Selineæ* Koch umb. p. 88.

Fructus a dorso plano-vel lenticulari-compressus, margine dilatato lævigato alato complanato vel convexiusculo cinctus. Carpella jugis primariis 5 filiformibus subindè tenuissimis, lateralibus margini dilatato contiguis vel in eumdem abeuntibus, secundariis nullis, totâ superficie commissurali connexa et sic fructus utrinquè unialatus. Semen complanatum vel dorso convexiusculum et hinc carpellum orthospermum.

XIII. *HERACLEUM* L. gen. n. 345.

Calyx 5-dentatus; petala obovata emarginata cum lacinulâ inflexâ, exteriora sæpè radiantia bifida; fructus a dorso plano-compressus, margine dilatato complanato cinctus; carpella jugis tenuissimis, tribus dorsalibus æquidistantibus, 2 lateralibus margini dilatato contiguis remotis; valleculæ univittatæ, vittis clavulatis; semen complanatum. — *Involucrum caducum, involucellum polyphyllum*.

Sect. I. *SPHONDYLIUM* Hoffm. gen. umb. 1. p. 129.

Flores radiantes, commissura 2-vittata.

1. *H. SPHONDYLIUM* (L. sp. 1. p. 358.) foliis pinnatis aut dilatatione petiolorum pinnatifidis, foliolis 3-5-lobatis lobis incisis crenatis, involucellarum foliolis lineari-setaceis, carpellis glabris orbicularibus. ♀ in pratis et ad sepes frequens. — Fl. fr. 4. p. 315. — Lob. ic. 703. f. 2. (v. v.)
2. *H. PYRENAICUM* (Lam. dict. 1. p. 403.) foliis subtûs cano-tomentosis simplicibus rarissimè pinnatis cordato-palmatis 7-5-lobis acutis incisis crenatis, involucellarum foliolis lineari-subulatis, carpellis pubescentibus ellipticis. ♀ in pascuis Pyrenæorum præsertim orientalium. — Fl. fr. 4. p. 315. *H. setosum* Lapeyr. abr. 153 et *H. amplifolium* Lapeyr. abr. supp. 44 ex cl. Bentham. (v. v.)
3. *H. ANGUSTIFOLIUM* (L. mant. 57.) foliis tripartitis, lobis pinnatifidis laciniiis confluentibus lanceolato-elongatis remotè dentatis acuminatis, involucellarum laciniiis setaceis. ♀ in petrosis montium Lugdunensium ex Latour, Delph. propè Gratianopolim ex Vill. — Fl. fr. 5. p. 510. — Pluck. t. 63. f. 3. (v. s. ex Valesiâ.)

4. *H. MINIMUM* (Lam. fl. fr. 3. p. 413.) caule prostrato humili, foliis glaberrimis 2-pinnatis, foliolis incisis laciniatis lanceolatis acutis, involucrorum foliolis setaceis. $\frac{1}{2}$ in lapidosis Alpinis Delph. — Fl. fr. 4. p. 316. *H. pumilum* Vill. dauph. 2. t. 14. (v. s. sine fructu.)

Sect. II. WENDIA Hoffm. l. c.

Commissura evittata aut vitis 2 minimis.

5. *H. ALPINUM* (L. sp. 359.) foliis simplicibus subtus glabris cordato-palmatis lobis obtusiusculis subincisis crenato-dentatis, involucrorum foliolis setaceis, carpellis obovato-orbicularibus. $\frac{1}{2}$ in pascuis et ad oras sylvarum Jurae, Alpium Delphin. ex Vill., Galloprov. ex Ger. — Fl. fr. 4. p. 316. — C. Bauh. prod. p. 83. ic. Vittæ commissurales 2 minimæ. (v. s.)

XIV. PASTINACA L. gen. n. 362.

Calycis margo obsoletus vel minutè denticulatus; petala subrotunda integra involuta lacinulâ latâ retusâ; fructus a dorso plano-compressus margine dilatato complanato cinctus; carpella jugis tenuissimis, tribus intermediis æquidistantibus, 2 lateralibus remotis margini accessorio contiguis sed ab illo sejunctis; valleculæ 1-vittatæ; semen complanatum. — Involucrum universale et partiale nullum vel oligophyllum.

1. *P. SATIVA* (L. sp. 376.) caule profundè sulcato, foliis simpliciter pinnatis, foliolis 5-11 lanceolatis incisis grossè serratis, superioribus sèpè decurrentibus, carpellis glaberrimis ovato-orbicularibus, commissurâ 2-vittatâ. (2) in locis incultis ad sepes et vias. — Fl. fr. 4. p. 341. Lam. ill. t. 206. Koch umb. f. 26 et 27. (v. v.)
2. *P. KOCHII* (Duby mss.) caule striato foliisque simpliciter pinnatis utrinquè viridibus breviter pubescentibus, radicalibus 9-11 caulinis 3-5-foliolatis, foliolis ovatis basi cuneatis cordatisve indivisis argutè dentatis dentibus mucronatis, terminali majore subtrilobo, involucellis nullis, carpellis glabris ovato-orbicularibus, commissurâ 4-6-vittatâ, vittis 2 majoribus. $\frac{1}{2}$ in Corsicâ. — *P. graveolens* Salzm. non Bieb. (v. s.)

f. latifolia, foliolis radicalibus dilatatis amplis subincisis. (v. s.)


XV. ANETHUM Hoffm. umb. 1. p. 117. — Anethi sp. L.


Calycis margo obsoletus; petala subrotunda integra involuta lacinulâ subquadratâ retusâ; fructus a dorso lenticulari-compressus, margine dilatato complanato cinctus; carpella jugis filiformibus æquidistantibus, tribus intermediis acutè carinatis, 2 lateralibus obsoletioribus in marginem abeuntibus; valleculæ 1-vittatæ; semen convexiusculum anticè planum. — Involucrum universale et partiale nullum; vittæ commissurales dueæ.

1. *A. GRAVEOLENS* (L. sp. 377.) caule tereti glaberrimo striato, foliis decompositis glabris glaucis, lacinulis linearis-filiformibus integerrimis, carpellis glaberrimis ellipticis. (1) in Aquitanâ, Occitanâ, Galloprovinciâ et circa Parisios colitur et indè inter segetes subs spontanea aliquandò occurrit. — Lob. ic. 776. (v. s.)

XVI. PEUCEDANUM Koch umb. 1. p. 92. — Peucedani et Selini sp. L.

Calycis margo 5-dentatus; petala obovata in lacinulam inflexam coarctata emarginata vel subintegra, fructus a dorso plano-vel lenticulari-compressus, margine dilatato complanato cinctus; carpella jugis subæquidistantibus, 3 intermediis filiformibus, 2 lateralibus obsole-





tioribus conformibusve margini dilatato contiguis vel in eundem abeuntibus; semen anticè planum; valleculæ 1-3-vittatæ. — Involucrum varium, involucellum polyphyllum.

Sect. I. EUPEUDEDANUM.

Involucrum nullum aut oligophyllum; margo carpellorum minus latus.

1. P. PANICULATUM (Lois. gall. 722.) caule glaberrimo tereti striato in parte superiore ramosissimo, foliolis ternato-decompositis lacinis filiformibus, involuci foliolis 1-2 setaceis caducis, involucellis polyphyllis foliolis setaceis. ♀ in Corsicâ. — Fl. fr. 5. p. 513. Umbellæ numerosæ paniculatim dispositæ. (v. s. sine fructu.)
2. P. OFFICINALE (L. sp. 353.) caule glaberrimo striato, foliis 3-4-pinnatis, foliolis linearis-ensiformibus, involuci foliolis 2-3 setaceis caducis minimis, involucelli polyphylli foliolis setaceis æqualibus, carpellis glaberrimis ovato-ellipticis, commissurâ 2-vittatâ. ♀ in umbrosis subhumidis. — Fl. fr. 4. p. 336. — Lob. ic. 782. f. 1. et 2. Fl. lutei. (v. v.)
3. P. PARISIENSE (DC. fl. fr. 4. p. 336.) caule glaberrimo striato, foliis ter aut quater pinnatis, foliolis ensiformibus, involuco 8-10-phyllo foliolis linearis-subulatis, involucellis setaceis, commissurâ 2-vittatâ. ♀ in sylvis Galliae mediae et Occitaniæ ex cl. Bentham. — P. Gallicum Pers. Fl. albi. (v. s. sine fructu.)
4. P. CARVIFOLIUM (Vill. dauph. 2. p. 630.) caule tereti glaberrimo striato, foliis pinnatis, foliolis pinnatifidis lobis decussatis 3-5-fidis lacinis linearibus acutis, involucro nullo, involucellis 3-4-phyllis foliolis linearis-subulatis, commissurâ 4-6-vittatâ, valleculis 2-3-vittatis. ♀ in pratis sylvis et dumetis humidis Galliae mediae, borealis orientalisque. — Selinum Chabréi Jacq. austr. t. t. 72. Fl. fr. 4. p. 322. — Crantz. austr. 3. p. 22. t. 3. f. 2. (v. v.)

Sect. II. THYSELINUM Hoffm. umb. 1. p. 134.

Involucrum polyphyllum, vittæ commissurales tectæ, margo carpellorum minus latus.

5. P. PALUSTRE (Mœnch. meth. p. 82.) caule tereti glaberrimo sulcato, foliis 2-3-pinnatis foliolis pinnatifidis, lacinis linearis-lanceolatis obtusiusculis, involucro involucellisque polyphyllis, foliolis lanceolato-linearibus apice subulatis, pedunculis puberulis, fructu lanceolato-elliptico. ♀ in paludibus et pratis montanis Arverniæ ex Delarb're, Alsatiæ ex Mapp., Lotharingiæ ex Will. — Koch umb. p. 94. excl. Lin. syn. Selinum sylvestre L. hort. ups. 59. Fl. fr. 4. p. 319. Fl. dan. t. 412. Juga æqualia. (v. s. ex Daniâ.)

Sect. III. CERVARIA.

Involucrum polyphyllum, vittæ commissurales superficiales, margo carpellorum minus latus.

6. P. ALSATICUM (L. sp. 354.) caule tereti striato, foliis tripinnatis, foliolis pinnatifidis lacinis mucronatis in foliis superioribus lanceolato-ovatis, in radicalibus linearis-lanceolatis. involucris involucellisque polyphyllis, foliolis lanceolato-linearibus apice subulatis, fructu lanceolato-elliptico. ♀ in sylvis subhumidis Alsatiæ, Galloprovinc., Pyren. orient. — Fl. fr. 4. p. 337. Jacq. aust. t. 70. non Poir. (v. s.)
7. P. CERVARIA (Lapeyr. abr. 149.) caule tereti striato, foliis bipinnatis, foliolis lanceolato-ovatis incisis inæqualiter argutè serratis basi oblique cordatis dilatatis, involucro involucellisque polyphyllis, foliolis linearis-subulatis, fructu ovato. ♀ in lapidosis montanis Alpium, Jurassi, Alsatiæ, Andegaviaæ ex Bast. — Selinum Cervaria Crantz austr. 167. t. 3. f. 1. Fl. fr. 4. p. 319. — Fuchs hist. 233. ic. (v. v. DC.)
8. P. OREOSELINUM (Mœnch. meth. p. 82.) caule tereti striato, foliis 3-pinnatis, foliolis divaricatis cuneiformibus incisis 3-fidis pinnatifidis acutis, invo-

- lucro involucellisque polyphyllis, foliolis linearibus, fructu elliptico glabro.*
ꝝ in sylvis et montanis. — Selinum Oreoselinum Fl. fr. 4. p. 319. — Clas.
hist. 2. p. 195. f. 2. (v. v.)
ꝝ angulatum, caule angulato pubescente. In Pyrenæis. — Fl. fr. 5. p. 511.
(v. v. DC.)

Sect. iv. OREOSELINUM Hoffm. umb. gen. p. 155.

Involucrum polyphyllum, vittæ commissurales superficiales, margo carpelorum latus.

9. P. AUSTRIACUM (Koch. umb. p. 94.) caule subangulato sulcato glabro, foliis 3-pinnatis, foliolis ovatis 3-5-lobis lobis cuneiformibus incisis laciniis mucronatis, involucris involucellisque polyphyllis, foliolis lanceolatis lanceolato-linearibus mucronatis. *ꝝ in Monte-Aureo ex Lam., Delph. montosis ex Vill. — Selinum Austriacum Jacq. aust. t. 71. Fl. fr. 4. p. 321. Commissura sæpè 4-vittata, valleculæ exteriore subindè 2-vittatae ex Koch. (v. s. c. sine fructu.)*
10. P. MONTANUM (Koch l. c.) caule striato glabro subangulato, foliis 3-pinnatis, foliolis pinnatifidis laciniis mucronulatis, involucro involucellisque polyphyllis, foliolis lanceolato-linearibus acuminatis, stylis divaricatis reflexis, carpellis obovatis basi retusis, commissurâ 2-vittata. *ꝝ in paludibus et pratis montanis Galliæ mediæ, occident. , borealis orientalisque. — Selinum palustre L. sp. 350. Crantz austr. p. 172. t. 4. f. 1. Fl. fr. 4. p. 320 excl. syn. Crantz. Juga lateralia obsoleta. (v. s.)*

XVII. IMPERATORIA L. gen. n. 359.

Calycis margo obsoletus; petala obovata in lacinulam inflexam coarcata emarginata vel subintegra; fructus a dorso plano-vel lenticulari-compressus margine dilatato latissimo complanato cinctus; carpella jugis subæquidistantibus, 3 intermediis filiformibus, 2 lateralibus obsoletioribus margini contiguis; semen anticè planum. — Involucrum nullum.

1. I. OSTRUTHIUM (L. sp. 372.) caule tereti glabro striato, foliis ternatis, foliolis rotundo-ovatis 2-3-lobis dentatis dentibus mucronatis. *ꝝ in pascuis montanis. — Fl. fr. 4. p. 286. — Garid. aix. t. 55. (v. v.)*


XVIII. OPOPANAX Koch umb. p. 96.

Calycis margo obsoletus; petala subrotunda integra involuta cum lacinulâ acutiusculâ; fructus a dorso plano-compressus, margine dilatato convexo cinctus; carpella jugis tribus dorsalibus filiformibus tenuissimis, lateralibus nullis (præter marginem incrassatum); valleculæ trivittatae; semen complanatum. — Involucrum et involucellum oligophyllum; commissura 8-10-vittata.

1. O. CHROMIUM (Koch l. c.) caule tereti glabro striato, foliis pinnatis bipinnatisque, foliolis serrato-crenatis sinuatis basi anticâ excisis. *ꝝ ad margines arborum in provinciis mediterraneis. — Pastinaca Opopanax L. mant. 357. Gou. ill. t. 13 et 14. Fl. fr. 4. p. 341. (v. v.)*

XIX. FERULA Tourn. t. 170. L. gen. n. 343.

Calycis margo 5-dentatus; petala ovata integra acuminata, acumine ascendentे vel incurvato; fructus a dorso plano-compressus, margine dilatato complanato cinctus; carpella jugis 3 dorsalibus filiformibus tenuissimis, duobus lateralibus obsoletis in marginem dilatatum abeuntibus; valleculæ 3-vittatae; semen complanatum. — Involucrum nullum aut ut involucellum oligophyllum; commissura 4-vittata.





1. *F. GLAUCÀ* (L. sp. 355.) foliis suprà-decompositis, foliolis lanceolato-linearibus planis, superioribus limbo abortivo subsimplicibus, involucro nullo, carpellis elliptico-ovatis. \mathcal{U} Monspelii et in Galloprovinciæ insulâ Sanctæ Margaritæ (Stire). — Fl. fr. 5. p. 514. Koch umb. f. 30 et 31. — J. Bauh. hist. 3. p. 2. p. 45. f. 2. (v. v. DC.)
2. *F. COMMUNIS* (L. sp. 355.) foliis suprà-decompositis, foliolis linearis-filiformibus mucronatis, umbellis ternatis, involuci sèpè caduci foliolis 4-5 linearis-lanceolatis acuminatis, carpellis ovatis. \mathcal{U} in montosis maritimis Corsicæ, Niceæ ex All. Galloprovinciæ ex Ger., Occitaniae? et agri Ruscinon. ? — Fl. fr. 4. p. 343. — Lob. ic. 778. f. 2. (v. s.)

XX. FERULAGO Koch l. c. p. 97.

Calyx 5-dentatus; petala subrotunda integra curvata lacinulâ brevi inflexâ; fructus a dorso plano-compressus, margine dilatato complanato cinctus; carpella jugis tribus dorsalibus latiusculis obtusis, lateralibus duobus obsoletis in marginem dilatatum abeuntibus; semen complanatum undique vittis copiosissimis cooperatum, dorsalibus pericarpio crassiusculo tectis; commissuralibus superficialibus. — Invol. et involucellum polyphyllum.

1. *F. NODIFLORA* (Koch l. c.) caule striato subangulato, foliis suprà-decompositis, foliolis filiformibus acentis divaricatis, umbellis pedunculatis ad nodos verticillatis, involuci foliolis 7-10 linearis-lanceolatis acutis, carpellis ellipticis. \mathcal{U} in vineis Niceæ ex All., Corsicæ. — Ferula nodiflora L. sp. 356. Fl. fr. 4. p. 343. — Barr. ic. 835. (v. s.)

Trib. VIII. ANGELICEÆ. Koch l. c.

Fructus a dorso compressus, margine dilatato alato et ob superficies commissurales centro tantum connexas duplicato cinctus, hinc utrinquè bialatus. Carpella jugis primariis quinque, dorsalibus tribus filiformibus vel in alam expansis, lateralibus semper in alam abeuntibus duplò saltem latiorem quam dorsalium jugorum; secundariis nullis. Semen dorso convexiusculum et ideo carpellum orthospermum.

Sect. I. ANGELICEÆ NUCLEATE.

Semina in pericarpio libera nec nisi latere commissurali adnata.

XXI. ARCHANGELICA Hoffm. umb. 1. p. 166. — Angelicæ sp. L.

Calyx 5-dentatus; petala elliptica integra acuminata acumine incurvato; fructus a dorso subcompressus, utrinque 2-alatus; carpella jugis crassiusculis carinatis, tribus dorsalibus elevatis, duobus lateralibus in alam duplò latiorem dilatatis; semen vittis copiosis undique tectum. — Involucrum subnullum, involucellum dimidiatum polyphyllum.

1. *A. OFFICINALIS* (Hoffm. l. c.) foliis bipinnatis, foliolis ovato-lanceolatis inaequaliter grossè dentatis, impari lobato. \mathcal{U} in montanis Galloprov. ex Ger., Alsatiæ ex Nestler. — Koch umb. t. 17. 18 et 19. Angelica Archangelica L. sp. 360. Fl. fr. 4. p. 305. (v. s. c.)

Sect. II. ANGELICEÆ SOLIDE.

Calyx pericarpitum et semen in unum coadunata.

XXII. ANGELICA Hoffm. umb. 1 p. 158. — Angelicæ sp. L.

Calycis margo obsoletus; petala lanceolata integra acuminata acu-

mine recto vel incurvato; fructus a dorso compressus, utrinque bialatus; carpella jugis tribus dorsalibus filiformibus elevatis, lateralibus in alam membranaceam multò latiore dilatatis; valleculæ 1-vittatae; semen dorso convexum anticè planiusculum. — Involucr. oligophyllum aut nullum, involucellum polyphyllum; vittæ commissurales 2-4; carpella carinâ tantum angustâ cohærentia.

1. A. RAZOULII (Gou. ill. p. 13. t. 6.) caule striato apice pubescente, foliis 2-3-pinnatis, foliolis lanceolatis serratis acutis subtus scabris basi decurrentibus et sèpè 2-partitis, involuci foliolo 1 filiformi brevi, pedunculis pubescentibus, carpellis ovatis, vittis pericarpio tectis. $\frac{1}{2}$ in Pyrenæis. — Fl. fr. 4. p. 306 et 5. p. 508. A. ebulifolia Lapeyr. — Bocc. mus. t. 99. Stamina longissima, petalorum acumen incurvum. (v. s.)
2. A. MONTANA (Schleich. exsic. Spreng. umb. prod. 16.) caule striato apice pubescente, foliis 3-pinnatis, foliolis lauceolatis ovatisve acuminatis glaberrimis basi decurrentibus argutè serratis dentibus mucronatis, pedunculis pubescentibus, involuci foliolo unico filiformi, carpellis ovatis latis, vittis subsuperficialibus. $\frac{1}{2}$ in Jurasso, Alpibus et montibus Ligericinis (Prost). — Imperatoria montana DC. fl. fr. 5. p. 504. Stam. longissima; petalorum acumen breve subrectum. (v. s.)
3. A. SYLVESTRIS (L. sp. 361.) caule striato puberulo apice pedunculisque tormentosis, foliis 2-3-pinnatis foliolis lanceolatis argutè serratis acutis glabris basi non decurrentibus, involucro foliolis 1-2 sèpissimè abortientibus. $\frac{1}{2}$ in locis humidis et ad rivulos frequens. — Koch umb. f. 20 et 21. Imperatoria sylvestris Fl. fr. 4. p. 286. — Lob. ic. 699. Petalorum acumen subrectum. (v. v.)
4. A. PYRENÆA (Spreng. umb. gen. p. 62.) caule striato subsimplici, foliis pinnatis 2-pinnatis foliolis 2-pinnatifidis laciñis linearibus acutis, involuci foliolo unico setaceo, umbellâ 4-7-radiatâ, carpellis elliptico-ovatis, vittis superficialibus. $\frac{1}{2}$ in pascuis montanis Pyrenæorum, Arverniæ et Vogesorum. — Selinum Pyrenæum Gou. ill. p. 11. t. 5. Fl. fr. 4. p. 323. — Moris. s. 9. t. 9. n. 2. Petalorum acumen brevissimum. (v. v.)

XXIII. SELINUM Hoffm. umb. gen. 1. p. 150. — Selini sp. L.

Calycis margo obsoletus; petala obovata emarginata cum lacinulâ inflexâ; fructus a dorso compressus, carpellis centro tantum adnexis utrinquè bialatus; carpella jugis 5 membranaceo-alatis, alâ jugorum lateraliū duplò latiore; valleculæ uni-vittatae; semen subsemiteres. — Involucrum oligophyllum; involucellum polyphyllum; valleculæ exteriore sèpè bivittatae; vittæ commissurales duæ.

1. S. CARVIFOLIA (L. sp. 350.) caule sulcato acutangulo glabro, foliis 3-pinnatis, foliolis pinnatifidis incisisve, laciñis lanceolatis mucronatis, carpellis ovato-orbicularibus. $\frac{1}{2}$ in sylvis humidis et stagnis umbrosis. — Fl. fr. 4. p. 322. Jacq. austr. t. 16. Koch umb. f. 22 et 23. (v. v.)

XXIV. LEVISTICUM Koch umb. p. 101. — Ligustici sp. L.

Calycis margo obsoletus; petala incurvata subrotunda integrâ cum lacinulâ brevi; fructus a dorso compressus, carpellis versùs marginem hiantibus utrinquè bialatus; carpella jugis quinque alatis, alâ jugorum lateraliū duplò latiore; valleculæ univittatae; semen convexum anticè planiusculum. — Involucrum universale et partiale polyphyllum.

1. L. OFFICINALE (Koch l. c.) caule striato, foliis 2-pinnatis, foliolis cuneatis indivisis trilobisve apice incisis. $\frac{1}{2}$ in pascuis montanis Delph. ex Vill., Galloprov. ex Ger, Cebennarum ex Gouan, Pyr. orient. — Angelica Levisticum All. Fl. fr. 4. p. 306. Commissura quadrvittata. (v. s.)





Trib. IX. SESELINEÆ. — Seselineæ et Ammineæ. Koch
umb. p. 102 et 114.

Fructus sectione transversali teres vel a latere compressus et aliquando latusculis contractis didymus. Carpella jugis primariis quinque filiformibus vel alatis, lateralibus marginantibus, omnibus æqualibus vel lateralibus paulò tantum latioribus, secundariis nullis. Semen dorso semiteres vel gibbo-convexum, anticè planiusculum vel undique teres et ideo carpella orthosperma.

Subtrib. I. SESELINEÆ INTEGRIFOLIÆ.

Petala arcte involuta, folia non dissecta.

XXV. BUPLEVRUM L. gen. n. 328.

Calycis margo obsoletus; petala subrotunda integra arctè involuta lacinulâ latâ retusâ; fructus a latere compressus vel latusculis contractis subdidymus, stylopodio depresso coronatus; carpella jugis quinque æqualibus alatis vel filiformibus argutis, vel tenuissimis et obsoletis, lateralibus marginantibus; valleculæ vittatæ vel evittatæ; semen tereti-convexum, anticè planiusculum. — Involucrum varium.

Sect. I. ODONTITES Hoffm. umb. p. 116.

Juga tenuissima depressa, valleculæ plerumque granulatae 1-o-vittatae, involucella umbellulas superantia. — Species annuae.


1. B. TENUISSIMUM (L. sp. 342.) caule erecto substriato ramoso, ramis elongatis patulis, foliis linear-lanceolatis acutis basi attenuatis, floribus subsessilibus, umbellulis terminalibus lateralibusve, involucellis umbellulâ longioribus involuerisque 3-5-phyllo, foliolis brevibus lanceolato-linearibus acuminatis, fructibus globosis, jugis tenuibus valleculisque evittatis granulatis. (I) in sterilibus herbosis Galliae mediae, australis, occidentalisque. — Fl. fr. 4. p. 350. — Barr. ic. t. 1248. (v. v.)
2. B. GLAUCUM (DC. fl. fr. 5. p. 515.) caule diffuso obsoletè angulato à basi ramosissimo, foliis linearibus acuminatis ad basim subincrassatis, umbellis lateralibus terminalibusve, involucellis umbellulâ longioribus involuerisque 5-phyllo, foliolis linearibus aristato-acuminatis, fructibus granulatis, jugis obliteratis. (I) in arenosis maritimis Corsicæ, Narbonæ, Massiliæ, Telonis, Niceæ. (v. v.)
3. B. SEMICOMPOSITUM (L. sp. 342.) caule erecto substriato ramoso, foliis lanceolatis obtusis mucronatis basi attenuatis subsemiamplexicaulinibus, involucelli umbellulâ longioribus involuerisque 5-phyllo, foliolis linear-lanceolatis aristato-acuminatis, jugis subobsoletis valleculisque evittatis granulatis. (I) in sterilibus Narbonæ ex Lam., Niceæ ex All. — Fl. fr. 4. p. 350. Gouan ill. p. 9. t. 7. f. 1. (v. v. c.)
4. B. ODONTITES (L. sp. 342.) caule tereti striato ramoso ramis divaricatis, foliis linear-ensiformibus acuminatis glabris, involucellis umbellulam superantibus involuerisque 5-phyllo, foliolis lanceolatis venosis acuminatis, jugis tenuissimis depressis, valleculis lœvibus 1-vittatis. (I) in messibus et collibus provinc. austr., Arverniæ, Andegaviæ, Pictaviæ, et propè Cherbourg. — Fl. fr. 4. p. 349. — J. Bauh. hist. 3. part. 2. p. 201. f. 1. (v. v.)
5. B. ROTUNDIFOLIUM (L. sp. 340.) caule erecto lœviusculo apice ramoso, foliis obtusis mucronulatis inferioribus lanceolato-ovatis superioribus ovatis perfoliatis, invol. nullo, involucellis 5-phyllo, foliolis rotundo-ovatis acuminato-aristatis, jugis depressis tenuissimis, valleculis granulatis subvittatis.

① inter segetes Galliae australis, mediae occidentalisque. — Fl. fr. 4. p. 345.
Lob. ic. t. 396. f. 1. (v. v.)

Sect. II. EURUPLEVRUM.

Juga elevata subalata, valleculæ lœves 1-3-vittatæ. — Species plerumque 2.
† *Involucellis umbellulas superantibus.*

6. B. LONGIFOLIUM (L. sp. 341.) caule erecto substriato subsimplici, foliis acutis, radicalibus lanceolatis in petiolum coarctatis; superioribus cordato-ovatis amplexicaulibus, involucris inæqualibus sub-5-phyllis, involucellis umbellulâ longioribus, foliolis lanceolato-ovatis acutis, jugis membranaceo-alatis, valleculis lœvibus, vittis 3 obsoletis. 2 in lapidosis montanis Alpium, Jurassi, Vosorum, Arvernianæ. — Fl. fr. 4. p. 345. — J. Bauh. hist. 3. p. 199. f. 1. (v. v.)
7. B. PYRENÆUM (Gou. ill. p. 8. t. 4. f. 1; 2.) caule simplici lœvi erecto flexuoso folioso, foliis lanceolatis acuminatis, radicalibus in petiolum attenuatis, superioribus cordato-ovatis amplexicaulibus, involucris 3-phyllis, foliolis ovato-lanceolatis obtusis umbellarum radios æquantibus, involucellis 5-phyllis, foliolis rotundis obtusissimis umbellulam superantibus, jugis alatis, valleculis 3-vittatis. 2 in rupibus editiorum Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 346. (v. v.)
8. B. STELLATUM (L. sp. 340.) caule substriato simplici subnudo, foliis radiocalibus lanceolato-linearibus linearibus acutis in petiolum attenuatis, canino nullo aut unico sessili, involucro 1-3-phyllo, foliolis lanceolato-ovatis amplexicaulibus acutis, involucellis 9-10-phyllis, foliolis coadunatis obovatis mucronulatis umbellulam superantibus, jugis membranaceo-alatis, valleculis 1-vittatis. 2 in rupestribus Alpium et Corsicæ montium. — Fl. fr. 4. p. 346. — Hall. helv. t. 18. (v. v.)
9. B. GRAMINIFOLIUM (Vahl. symb. 3. p. 48.) caule substriato simplici stricto subnudo, foliis radicalibus numerosis gramineis linearibus longè acuminatis basi dilatatis, caulinis 1-2 ensiformibus acuminatis semi-amplexicanibus, involucro 3-6-phyllo, foliolis lanceolato-elongatis acuminatis, involucellis 7-9-phyllis, foliolis lanceolatis cuspidatis umbellulam subsuperantibus, jugis elevatis subalatis, valleculis lœvibus. 2 in Alpibus Galloprovinciæ. — Fl. fr. 4. p. 347. B. petræum Jacq. rar. t. 56. Vill. dauph. 2. t. 14. non L. (v. v. D. in Italiâ.)
10. B. RANUNCULOÏDES (L. sp. 342.) caule substriato subsimplici, foliis linearilanceolatis acuminatis, caulinis basi dilatatis amplexicaulibus, involucris 5-phyllis, foliolis inæqualibus lanceolatis ovatis acutis, involucellis 5-6-phyllis, foliolis obovatis cuspidatis umbellulam subsuperantibus, jugis elevatis argutis subalatis, valleculis lœvibus 1-vittatis. 2 in editioribus montibus. — Fl. fr. 4. p. 348. B. angulosum L. B. repens et B. obtusatum Lapeyr. ex cl. Benth. — J. Bauh. hist. 3. p. 199. f. 1. (v. v.)
£. caricifolium, foliis linearibus angustioribus, involucro 1-3-phyllo caduco. — Inter lapides et saxa Alpium et Pyrenæorum. — B. caricifolium Fl. fr. 4. p. 348. an Wild? Vix varietas. (v. v.)
11. B. JUNCEUM (L. sp. 342.) caule substriato ramoso, foliis linearibus acuminatis, involucellis 5-phyllis umbellulâ subbrevioribus, involucris 2-5-phyllis, foliolis linearilanceolatis acuminatis, fructibus globosis, jugis tenuibus argutis subalatis, valleculis lœvibus, vittis 3 aut o. ① in margine arborum et sepibus Galliae austr., orientalis, propè Parisios ex Thuil., in Arvernianâ ex Del., Andegaviâ ex Bast. — Fl. fr. 4. p. 351. — Moris. s. 9. t. 12. n. 3. (v. v.)
12. B. GERARDI (Murr. syst. 274.) caule lœvi ramoso flexuoso, foliis linearibus acuminatis sessilibus, involucellis umbellulam superantibus involucrisque foliolis 5 linearilanceolatis inæqualibus, fructu cylindrico, jugis tenuibus acutiusculis subelevatis, valleculis lœvibus 3-vittatis. ① in sterilibus provinciarum mediterranearum. — Fl. fr. 4. p. 351. — Ger. gallop. t. 9. (v. v.)



†† *Involucellis umbellulis brevioribus.*

13. *B. FALCATUM* (L. sp. 341.) caule substriato flexuoso folioso ramoso, ramis erectis, foliis lanceolatis nervosis mucronulatis utrinque attenuatis basi amplexicaulibus, inferioribus petiolatis, superioribus linearibus, involucro foliolis 3-5 inæqualibus lanceolatis linearibus, involucellis foliolis 5-6 lanceolato-linearibus acuminatis umbellulâ brevioribus, jugis elevatis subalatis, valleculis lœvibus 3-vittatis. ♀ in lapidosis aridis, ad sepes et inter dumeta. — Fl. fr. 4. p. 347. — Lob. ic. 456. f. 1. (v. v.)

B. petiolare (DC.) foliis radicalibus ovalibus longè petiolatis. — *B. petiolare* Lapeyr. (v. v.)

14. *B. RIGIDUM* (L. sp. 342.) caule stricto substriato ramoso ramis divaricatis, foliis inferioribus lanceolatis acutis nervosis in petiolum basi amplexicaulem coartatis, superioribus lineari-lanceolatis sessilibus, involucellis umbellulâ multò minoribus involucrisque minimis 5-phylis, foliolis linearibus acutis, jugis elevatis subalatis, valleculis lœvibus 1-vittatis. ♀ in lapidosis aridis Galloprov., Occitanie. — Fl. fr. 4. p. 349. — Lob. ic. t. 456. f. 2. (v. s.)

Sect. III. TENORIA Spreng. in Rœm. et Schult. VI. p. XXXIV.

Juga elevata subelevatave, valleculæ lœves 1-vittatæ, involucella umbellulis breviora. — Species suffruticosæ.

15. *B. FRUTICESCENS* (L. amæn. 4. p. 269.) suffrutescens, caule tortuoso ramoso ramis erectis strictis, foliis linearibus rigidis convolutis acuminatis, involucellis umbellulâ brevioribus involucrisque 5-phylis, foliolis brevibus reflexis linearibus acutis, fructibus glaucis, jugis vix elevatis, valleculis lœvibus. ♂ in agro Ruscinonensi inter Narbonam et Perpignanum reperiit Ph. Thomas. — Cav. ic. 2. t. 106. — Barr. ic. t. 1255. (v. s.)

16. *B. SPINOSUM* (L. supp. p. 178.) suffrutescens, caule recto lœvi folioso ramoso, ramis tortuosis divaricatis patulis subnudis, foliis linearibus subcoriaceis basi dilatatis amplexicaulibus, involucris involucellisque minimis, jugis subelevatis, valleculis lœvibus. ♂ in Corsicâ reperiit Ph. Thomas. — Gou. ill. p. 8. t. 2. f. 3. (v. s.)

17. *B. FRUTICOSUM* (L. sp. 343.) suffrutescens, caule stricto ramoso, foliis lanceolato-obovatis venosis mucronulatis, involucris involucellisque umbellulâ duplò brevioribus polyphyllis, foliolis caducis lanceolato-obovatis obtusiusculis, jugis elevatis subalatis, valleculis lœvinsculis 1-vittatis. ♂ in provinciis mediterraneis. — Fl. fr. 4. p. 345. — Moris. s. 9. t. 6. n. 1. Vittæ tenuissimæ. (v. v.)

Subtrib. II. SESELINEÆ SECTIFOLIÆ.

Subdiv. I. SESELINEÆ SOLIDÆ, id est semine pericarpio calyceque in unum coadunatis.

† *Multivittatae.*

XXVI. BRIGNOLIA Bertol. amæn. ital. p. 97. — Sii sp. L.

Calycis margo 5-dentatus; petala subrotunda integra involuta lacinulâ latâ retusâ; fructus subteres a latere subcompressus lineari-elongatus; carpella jugis 5 filiformibus obtusis æqualibus, lateralibus marginantibus; valleculæ 1-3-vittatæ; semen subsemiteres. — Involucrum et involucellum polyphyllum, commissura 4-6-vittata.

1. *B. PASTINACÆFOLIA* (Bertol. I. c.) foliis bipinnatis, foliolis ovatis basi obliquis serratis serraturis mucronatis, superioribus decurrentibus, involucello involucellisque polyphyllis, foliolis setaceis, carpellis glaberrimis. ♀ in arvis circa Bonifacio. — Sium Siculum L. sp. 362. Fl. fr. 5. p. 507. — Zanon. hist. 78. t. 30. Fl. aurei. (v. s.)

XXVII. ATHAMANTA Koch umb. p. 105. — Athamante sp. L.

Calycis margo 5-dentatus; petala obovata emarginata cum lacinulâ inflexâ, brevissimè unguiculata; fructus in collum attenuatus sectione transversali subteres vel a latere parum compressus; carpella jugis 5 filiformibus apteris æqualibus, lateralibus marginantibus; valleculæ 2-3-vittatæ; semen subsemiteres.—Invol. et involucellum polyphyllum.

1. A. MACEDONICA (Spreng. in Rœm. et Schult. vi. p. 491.) caule pubescente ramosissimo, foliis glabriusculis 2-pinnatis superioribus pinnatis, foliolis rhomboeo-ovatis incisis crenatis, involucro involucellisque polyphyllis, foliolis linearibus hirsutissimis, fructu hispido. (2) in pratis sterilioribus circâ Nicaeum ex All. et in hortis sæpè cultus.—Bubon Macedonicum Fl. fr. 4. p. 298. — Lob. ic. t. 703. f. 1. Semen vittis 10-12 undique obtectum, juga tenuissima setacea. (v. v. c.)

2. A. CRETENSIS (L. sp. 352.) caule hirto tereti sublævi, foliis hirsutis 3-pinnatis, foliolis 3-5-lobris linear-lanceolatis acutis, involucro caduco involucellisque polyphyllis, foliolis seariosis linearibus aristatis, fructu villosissimo. (2) in montibus editioribus. — Fl. fr. 4. p. 318. — Cam. epit. 536. ic. Juga planiuscula latiuscula, valleculæ 2-3-vittatæ, commissura 6-vittata. (v. v.)

f. decipiens, foliis glabriusculis, foliolis linearibus. — In rupestribus montium Delph. et Galloprov.—A. Matthioli Fl. fr. 4. p. 318. non Wulf. nec Jacq. A. rupestris Vill. non Scop. (v. s.)

XXVIII. CONOPODIUM Koch umb. p. 118. — Bunii sp. DC.

Calycis margo obsoletus; petala obovata emarginata vel subemarginata cum lacinulâ inflexâ; fructus a latere compressus linear-oblongus, stylopodio conico immarginato stylisque rectis coronatus; carpella jugis 5 æqualibus filiformibus obtusis, multivittata; semen semitereticonvexum anticè planiusculum. — Involucrum et involucellum oligophyllum; carpophorum (axis fructûs) liberum apice bifidum.

1. C. DENUDATUM (Koch l. c.) radice bulbosa, canle erecto simplici, foliis 2-pinnatis, foliolis linearibus integris, involucellarum foliolis linearibus, jugis tenuissimis, valleculis 2-3-vittatis. (2) in pratis montosis Delph., Lugd., Arvernæ, Cebenn., Pyren., Burdigalæ (Des Moul.), Andegaviae (Bast.), Aureliæ, Bellovaci ex cl. Graves. — Bunium denudatum Fl. fr. 4. p. 325. (v. v.)


XXIX. PIMPINELLA L. gen. n. 366.

Calycis margo obsoletus; petala obovata emarginata cum lacinulâ inflexâ; fructus a latere compressus ovatus, stylopodio pulvinato stylisque reflexis coronatus; carpella jugis 5 filiformibus æqualibus, lateralibus marginantibus; valleculæ multivittatae; semen gibbo-convexum anticè planiusculum. — Invol. et involucell. o; carpophorum liberum bifidum.

Sect. I. TRAGOSELINUM Mœnch. meth. p. 99.

Fructus glabri.

1. P. MAGNA (L. mant. p. 219.) caule erecto sulcato glabro, foliis pinnatis, radicalium foliolis inciso-dentatis lobatisve impari trilobo, jugo inferiore pedicellato, superiorum foliolis pinnatifidis laciñis linearibus. (2) in locis incultis et ad oras sylvarum. — Fl. fr. 4. p. 281. — Barr. ic. 243. (v. v.)
2. P. DISSECTA (Retz obs. 3. p. 30. t. 2.) caule erecto striato simplici glabro, foliis pinnatis, foliolis pinnatifidis sessilibus, segmentis sublinearibus acutis. (2) in sabulosis aridis passim. — Fl. fr. 4. p. 282. An præced. var? (v. v.)



3. **P. SAXIFRAGA** (L. sp. 378.) caule erecto striato infernè puberulo, foliis pinnatis, foliolis sessilibus infernè puberulis, radicalium ovatis grossè dentatis, superiorum lanceolatis linearibusve incisis. ♀ in pascuis siccis. — Fl. fr. 4. p. 281. Jacq. aust. t. 395. Koch umb. f. 55 et 56. (v. v.)

Sect. II. TRAGIUM Spræng. umb. prod. p. 26.

Fructus villosi.

4. **P. PEGREGINA** (L. sp. 378.) caule erecto lœviuscule, foliis pinnatis, radicalium petiolo pubescente, foliolis crenatis obtusis inferioribus ovatis subpedicellatis summo cordato cuneatove, superiorum foliolis linearibus lanceolatis incisis acutis, umbellis 15-20-radiatis, fructibus hispidis. (I) (2) in sepibus et agris Corsicæ, Niceæ, Galloprov., Occitanie. — Fl. fr. 5. p. 502. P. hispida Lois. not. 48. Fl. fr. 5. p. 502. — Moris. hist. 2. s. 9. t. 9. n. 13. (v. v.)
5. **P. TRAGIUM** (Vill. dauph. 2. p. 606.) caulis erectis diffusis lœviusculis, foliis tenuissimè puberulis pinnatis, foliolis pinnatifidis segmentis inciso-dentatis acutiusculis, umbellis 4-7-radiatis, fructibus velutino-incanis. ♀ in siccis lapidosis Galloprovinciæ, Delph. austral., Occitanie et Pyren. orientalium. — Fl. fr. 5. p. 501. P. canescens Lois. not. t. 4. — Col. phyt. 75. (v. v.)

XXX. SIUM Koch umb. 117. — Sii sp. L.

Calycis margo 5-dentatus, subindè obsoletus; petala obovata emarginata cum lacinulâ inflexâ; fructus a latere compressus vel contractus et subdidymus, stylopodio margine depresso stylisque reflexis coronatus; carpella jugis quinque æqualibus filiformibus obtusiusculis, multivittata; semen subteres. — Involucrum varium, involucellum polyphyllum; carpophorum bipartitum.

* *Jugis lateralibus marginantibus; valleculis 3-4-vittatis vittis superficialibus; semine tereti-convexo anticè planiusculo.*

1. **S. SISARUM** (L. sp. 361.) caule erecto, foliis pinnatis superioribus ternatis, foliolis ovato-lanceolatis linear-lanceolatisque serratis acuminatis, involuero caduceo involucellisque polyphyllis, foliolis æqualibus linear-lanceolatis, commissurâ 4-vittata. ♀ in hortis colitur. — Fl. fr. 4. p. 301. — Lob. ic. 710. f. 1. (v. v. c.)
2. **S. LATIFOLIUM** (L. sp. 361.) foliis pinnatis, foliolis oblongo-lanceolatis æquilater argutè serratis mucronatis, involuero inæquali involucellisque polyphyllis, foliolis linearibus acuminatis, commissurâ 6-vittata. ♀ ad sepes et in paludosis. — Fl. fr. 4. p. 299. — Lob. ic. 208. (v. v.)
- * * *Jugis lateralibus paulò antè marginem carpelli positis; seminibus teretibus multivittatis et pericarpio corticoso aretè adnato tectis.*
3. **S. ANGUSTIFOLIUM** (L. sp. 1672.) foliis pinnatis, foliolis lanceolatis inæquilater lobatis serratisque acutis, umbellis pedunculatis oppositifoliis, involuero involucellisque polyphyllis, foliolis linear-lanceolatis acutis. ♀ in rivulis fossisque. — Fl. fr. 4. p. 299. (v. v.)

XXXI. EULIGUSTICUM Tourn. 171. L. gen. n. 346.

Calycis margo 5-dentatus vel obsoletus; petala obovata aut obovato-oblonga in lacinulam inflexam coarctata brevissimè unguiculata; fructus sectione transversali subteres vel a latere parum compressus; carpella jugis 5 argutis suba'atis æqualibus, lateralibus marginantibus; valleculæ multivittatae; semen subsemiteres. — Involucrum varium, involucellum polyphyllum.

Sect. I. EULIGUSTICUM.

Petala acutè emarginata brevissimè unguiculata,

* *Calycis margine minute 5-dentato; involucro universali polyphyllo.*

1. *L. FERULACEUM* (All. ped. t. 60. f. 1.) caule tereti folioso sulcato apice ramoso, foliis 2-3-pinnatis, foliolis pinnatifidis laciniis linearibus subcarnosis, involueri foliolis pinnatifidis laciniis linearibus. \mathcal{U} in Jurasso suprà Gex, Alpibus Delphin., Galloprovine., et Pyrenæis editioribus ex Lapeyr. — Fl. fr. 4. p. 308. (v. s.)
2. *L. SIMPLEX* (All. ped. t. 71. f. 2.) caule nudo simplici striato, foliis pinnatis, foliolis multifidis laciniis acutis linearibus, involucri foliolis pinnatifidis, laciniis linearibus. \mathcal{U} in pascuis Alpinis Delph., Pyren. — *Lasertium simplex* L. mant. 56. Fl. fr. 4. p. 314. — Vill. dauph. 2. t. 14. *Juga alata*. (v. v.)

* * *Calycis margine obsoleto; involucro nullo aut 1-phyllo.*

3. *L. PYRENAICUM* (Gou. ill. t. 7. f. 4.) caule striato folioso, foliis tripinnatis, foliolis pinnatifidis laciniis linear-lanceolatis mucronatis, involucro 1-phyllo linearis brevi caduco. \mathcal{U} in siccis petrosis Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 309. — Seg. ver. 41. t. 13. Koch umb. f. 46 et 47. (v. s.)

Sect. II. *SILAUS* Koch umb. p. 105.

Petala subintegra basi truncata sessilia.

4. *L. SILAUS* (Duby mss.) caule erecto striato, foliis 3-2-pinnatis, foliolis 3-5-lobis lanceolatis acutis, involucro nullo aut raro 1-2-phyllo, involucellis polyphyllis, foliolis indivisis linearibus acuminatis. \mathcal{U} in pratis. — *Pucedanum Silaus* L. sp. 354. Fl. fr. 4. p. 337. — Lob. ic. 738. f. 1. (v. v.)

XXXII. MEUM Jacq. Gærtn. fruct. 1. p. 106. t. 23. Koch umb. p. 103. — Athamantæ et Phellandrii sp. L.


Calycis margo obsoletus; petala integra ovato-elliptica basi apiceque acuta; fructus sectione transversali a latere subcompressus; carpella acuta jugis 5 prominulis carinatis æqualibus, lateralibus marginantibus; valleculæ multivittatae; semen subsemiteres. — Involucrum oligophyllum aut nullum; involucellum polyphyllum; vittæ commissurales 6-8.

1. *M. MUTELLINA* (Gærtn. fruct. 1. p. 106. t. 23.) caule simplici lœvi subnudo, foliis 2-pinnatis, foliolis 2-pinnatifidis laciniis linear-lanceolatis, involucro caduco, involucellorum foliolis lanceolatis acuminatis, carpellis lanceolatis utrinque acutis. \mathcal{U} in pascuis editioribus Vogesorum, Alpium, Montis-Aurei. — *Ligusticum Mutellina* Fl. fr. 4. p. 310. All. ped. t. 60. f. 2. — Cam. epit. p. 8. ic. (v. s.)
2. *M. TENUIFOLIUM* (Duby mss.) caule simplici subnudo lœvi, foliis radicalibus decompositis, caulinis 5-fidis, foliolis linear-filiformibus, involucri foliolis 1-2 involucellorum 5-8 linear-lanceolatis acutis. \mathcal{U} in fissuris rupium editiorum Pyrenæorum. — *Ligusticum tenuifolium* DC. fl. fr. 4. p. 309. L. *splendens* Lapeyr. *Wallrothia splendens* Spreng. in Rœm. et Schult. 6. p. 557. (v. s.)
3. *M. ATHAMANTICUM* (Moris, hist. 2. s. 9. t. 2. n. 2.) caule simplici subnudo striato, foliis decompositis, foliolis capillaribus, involucri foliolis 3-5, involucellorum foliolis 10-12 basi lanceolato-linearibus apice subulato-acuminatis, carpellis lanceolatis angustis utrinque acutis. \mathcal{U} in pascuis montium editiorum. — Jacq. aust. t. 303. *Ligusticum Meum* Fl. fr. 4. p. 310. (v. v.)

XXXIII. TROCHISCANTHES Koch umb. p. 103.

Calycis margo 5-dentatus; petala spathulato-obovata subintegra cum lacinulâ triangulari inflexâ, longè unguiculata; fructus a latere subcompressus; carpella jugis quinque argutis subalatis æqualibus, lateralibus marginantibus; valleculæ multivittatae; semen subsemiteres. — Involucrum nullum, involucellum 3-5-phylum.





1. *T. NODIFLORUS* (Koch l. c.) caule tereti-striato, foliis ter aut quater ternatis, foliolis lanceolato-ovatis acutis grossè dentatis, ramis verticillato-paniculatis bracteatis, bracteis linearis-lanceolatis integerrimis. ♀ in sylvis umbrosis montosis Delph. et Galloprovinciæ superioris. — Imperatoria nodiflora Fl. fr. 4. p. 287. Lig. nodifl. Vill. 2. t. 13. (v. s.)

† † *Paucivittatæ.*

XXXIV. MOLOPOSPERMUM Koch umb. p. 108. — Ligustici sp. L.

Calyx quinquedentatus foliolosus; petala lanceolata integra longè acuminata acumine ascendentem; fructus sectione transversali a latere parum compressus; carpella jugis 5 aut abortu 3 argutis membranaceo-alatis æqualibus, lateralibus marginantibus; valleculæ 1-vittatæ; semen semiteres. — Involucrum universale et partiale polyphyllum.

1. *M. PELOPONNESIACUM* (Koch l. c.) foliis multiplici-pinnatis, foliolis pinnatis incisis acuminatis, involucris involucellisque polyphyllis, foliolis lanceolatis acuminatis, carpellis lanceolatis utrinquè attenuatis. ♀ in Alp. Delph., Gallo-prov., Cebenn., Pyren. orient. — Ligusticum Peloponnesiacum L. sp. 360. Fl. fr. 4. p. 307. — Cam. epit. 514. ic. (v. v. DC.)

XXXV. ÆGOPODIUM L. gen. n. 368.

Calycis margo obsoletus; petala obovata emarginata cum lacinulâ inflexâ; fructus a latere compressus oblongus stylis reflexis coronatus; carpella jugis 5 filiformibus, lateralibus marginantibus; valleculæ evittatæ; semen tereti-convexum, anticè planiusculum. — Invol. et involucellum nullum. Genus habitu et valleculis evittatis à Caro diversum sed tamen nimium affine.

1. *Æ. PODAGRARIA* (L. sp. 379.) caule profundè striato, foliis 2-ternatis ternatis, foliolis lanceolato-ovatis acuminatis. ♀ ad sepes, in hortis et pomariis. — Fl. fr. 4. p. 280. — Lob. ic. t. 700. f. 2. (v. v.)

XXXVI. CARUM L. gen. n. 365.

Calycis margo obsoletus; petala regularia obovata emarginata cum lacinulâ inflexâ; fructus a latere compressus oblongus, stylis reflexis coronatus; carpella jugis 5 filiformibus æqualibus, lateralibus marginantibus; commissura plana; valleculæ 1-vittatæ; semen tereti-convexum, anticè planiusculum. — Invol. et involucellum varium; carpophorum apice furcatum liberum.

* *Involucro 1-phyllo aut nullo.*

1. *C. CARVI* (L. sp. 378.) caule erecto ramoso, foliis 2-pinnatis, foliolis decussatis pinnatifidis, laciinis linearibus acutis, fructu oblongo-globoso. (2) in pratis montosis. — Seseli Carvi Fl. fr. 4. p. 285. — Cam. epit. 516. ic. (v. v.)

** *Involucro et involucello polyphyllo.*

2. *C. BULBOCASTANUM* (Koch umb. p. 121.) radice tuberosâ, caule erecto striato, foliis 2-3-pinnatis, foliolis 2-3-lobatis laciinis linearibus acutis, involucri involucellarumque foliolis linearibus brevibus acutis, fructibus elongato-oblongis, carpellis sectione verticali sublinearibus. ♀ in pascuis subhumidis Galliæ orientalis, mediae, Pyrenæorum ex Lapeyr., Burdigalæ ex Laterr. — Bunium Bulbocastanum L. sp. 349. Fl. fr. 4. p. 325. — Lob. ic. 745. f. 1. (v. v. DC.)

3. *C. VERTICILLATUM* (Koch umb. 122.) radice fasciculatâ, caule erecto substriato, foliis pinnatis, foliolis multifido-capillaceis subverticillatis, involucris involucellisque brevibus linearis-lanceolatis, fructu oblongo, carpellis

linearibus. 2^o in pratis humidis passim. — *Sium verticillatum* Lam. enc. 1. p. 407. DC. fl. fr. 4. p. 302. — Dalech. lugd. 718. ic. (v. v.)

XXXVII. DREPANOPHYLLUM Mœnch. supp. 2. Hoffm. umb. 1. p. 109. — Sii sp. L.

Calycis margo 5-dentatus; petala obovata curvata sinu lato emarginata cum lacinulâ inflexâ, fructus teres elongato-oblongus stylis reflexis coronatus; carpella jugis 5 filiformibus æqualibus, lateralibus marginantibus; valleculæ 1-vittatæ vittis filiformibus; semen tereti-convexum, anticè planiusculum. — Involucrum polyphyllum, involucellum subdimidiatum, foliolis interioribus brevissimis.

1. **D. FALCARIA** (Mœnch. 1. c.) caule striato, foliis pinnatis, foliolis linearibus argutè serratis decurrentibus. 2^o in arvis et ad sepes passim. — D. agreste Hoffm. *Sium Falcaria* L. sp. 362. Fl. fr. 4. p. 301. — Lob. ic. 2. t. 24. f. 1. (v. v.)

XXXVIII. PETROSELINUM Hoffm. umb. 1. p. 78. — Apii sp. L.

Calycis margo obsoletus; petala subrotunda incurvata integra vix emarginata, in lacinulam inflexam coarctata; fructus ovatus a latere contractus subdidymus; carpella jugis quinque filiformibus æqualibus, lateralibus marginantibus; valleculæ 1-vittatæ; semen gibbo-convexum anticè planiusculum. — Involucrum oligophyllum, involucellum polyphyllum; carpophorum bipartitum.

1. **P. SATIVUM** (Hoffm. 1. c.) foliis inferioribus 2-pinnatis, foliolis ovatis incisis dentatis, caulinis linearibus integriseulis, umbellis pedunculatis, involucris 1-3-phyllis, involucellis polyphyllis foliolis setaceis. 2^o in umbrosis Galloprovinciæ, in hortis cultum. — *Apium Petroselinum* L. sp. 379. Fl. fr. 4. p. 339. — Black. t. 172. a. J. Bauh. hist. 3. part. 2. p. 99. ic. et 97. f. 2. (v. v. c.)
2. **P. SEGETUM** (Koch umb. p. 128.) foliis omnibus pinnatis, foliolis lanceo-lato-ovatis incisis serratis, umbellis longè pedunculatis 2-3-radiatis, invol. 2-phyllis, involucellis 4-6-phyllis foliolis lanceolatis brevissimis, fructu ovato-globoso, stylis brevissimis. 1^o in agris subhumidis et ad sepes Galliae mediae et occidentalis. — *Sium segetum* Fl. fr. 4. p. 303. *Sison segetum* L. Jacq. vind. t. 134. (v. s.)


XXXIX. APIUM Hoffm. umb. 1. p. 75. — Apii sp. L.


Calycis margo obsoletus; petala subrotunda integrâ cum apiculo arce involuto; fructus subrotundus a latere contractus didymus; carpella jugis 5 filiformibus æqualibus, lateralibus marginantibus; valleculæ univittatæ, exteriore sæpè 2-3-vittatæ; semen gibbo-convexum anticè planiusculum. — Invol. involucellumque nullum; carpophorum indivisum.

3. **A. GRAVEOLENS** (L. sp. 379.) foliis pinnatis ternatisve, foliolis cuneiformibus incisis apice dentatis, umbellis subsessilibus pedunculatisve, stylis in fructu incurvis. 2^o in paludibus et ad rivulos, in hortis cultum. — Fl. fr. 4. p. 339. — Cam. epit. 727. ic. (v. v. c.)

XL. ÆTHUSA L. gen. n. 355.

Calycis margo obsoletus; petala obovata emarginata cum lacinulâ inflexâ; fructus ovato-globosus; carpella jugis 5 elevatis crassis acutè carinatis, lateralibus marginantibus et paulò latioribus, carinâ suba-









latâ cinctis; valleculæ evittatæ; semen semiglobosum. — Involucrum nullum aut 1-phyllo, involucellum triphyllum.

1. *A. CYNAPIUM* (L. sp. 367.) caule ramoso tereti lœvi, foliis 2-pinnatis, foliolis pinnatifidis laciniis linearibus indivisis incisisve, invol. o aut 1-phyllo caduco, involucellis 3-phyllis foliolis linearis-subulatis. (1) in cultis frequens. — Fl. fr. 4. p. 293. — J. Bauh. hist. 3. p. 2. p. 180. ic. (v. v.)

XLI. *TRINIA Hoffm. umb. 1. p. 92.* — *Pimpinellæ sp. L.*

Dioica vel dioico-polygama. Calycis margo obsoletus; petala masculæ plantæ lanceolata in lacinulam involutam coarctata subemarginata, fæmineæ vel hermaphroditæ ovata breviter apiculata apiculo inflexo; fructus a latere compressus ovatus stylis reflexis coronatus; carpella jugis 5 filiformibus prominulis æqualibus, lateralibus marginantibus; valleculæ evittatæ vel obsoletè vittatæ, juga vero vittata; semen gibbo-convexum anticè planiusculum. — Involucrum varium; carpophorum planissimum membranaceum hispidum.

1. *T. GLABERRIMA* (Hoffm. 1. c.) radice fusiformi, caulis diffusis lœviusculis, foliis pinnatis foliolis multifidis laciniis linearibus, umbellis numerosis simplicibus compositisque, involucro nullo aut 1-phyllo. (2) inter saxa montosa Galliae orientalis australisqne, Andegaviae ex Bast. — *Pimpinella dioica* L. mant. 357. Fl. fr. 4. p. 282. — Clus. hist. 2. p. 200. f. 1. (v. v.)

XLI. *SISON Koch umb. 123.* — *Sisonis sp. L.*

Calycis margo obsoletus; petala subrotunda curvata profundè emarginata cum lacinulâ inflexâ; fructus a latere compressus ovato-globosus, stylis brevissimis inclinatis coronatus; carpella jugis 5 filiformibus æqualibus, lateralibus marginantibus; valleculæ univittatæ vittis abbreviatis clavulatis; semen gibbo-convexum anticè planiusculum. — Involucrum universale et partiale oligophyllum; carpophorum bipartitum.

1. *S. AMOMUM* (L. sp. 362.) caule substriato, foliis inferioribus pinnatis foliolis ovato-lanceolatis inciso-dentatis incisisve serrulatis, superioribus pinnatifidis laciniis linearibus integerrimis, umbellis lateralibus terminalibusque pauciradiatis. (2) ad sepes et in glareosis passim. — *Sium Amomum* Roth. Fl. fr. 4. p. 304. — Barr. ic. t. 1190. (v. s.)

XLIII. *AMMI Tourn. t. 159. L. gen. n. 334.*

Calycis margo obsoletus; petala obovata cum lacinulâ inflexâ emarginato-biloba, lobis inæqualibus irregularia; fructus a latere compressus ovato-oblongus stylis reflexis coronatus; carpella jugis 5 filiformibus æqualibus, lateralibus marginantibus; valleculæ 1-vittatæ; semen tereti-convexum anticè planiusculum. — Involucrum involucellumque polyphyllum; carpophorum liberum bipartitum.

1. *A. MAJUS* (L. sp. 349.) caule glauco striato, foliis inferioribus pinnatis 2-pinnatis, foliolis lanceolatis argutè serrulatis acutis, superioribus multifidis laciniis lanceolato-linearibus argutè serratis, involucris dissectis laciniis linearis-capillaris, involucellarum foliolis linearis-lanceolatis aristato-acuminatis. (1) in arvis passim. — Fl. fr. 4. p. 326. — Lob. ic. t. 721. f. 1. (v. v.)

2. *A. GLAUCIFOLIUM* (L. sp. 349.) caule substriato, foliis pinnatis, foliolis omnibus multifidis laciniis linearibus integris acuminatis, involucris dissectis laciniis linearis-capillaceis, involucellarum foliolis linearis-subulatis.

- (1) in arvis passim. — Fl. fr. 4. p. 326. — J. Bauh. 3. p. 2. p. 53. An prioris var? (v. v. DC.)
3. A. VISNAGA (Lam. dict. 1. p. 132.) caule valde folioso striato, foliis 2-3-pinnatis, foliolis omnibus multifidis, laciinis linearibus integris acutis, umbellâ maturatione contractâ, radiis in receptaculum subcarnosum coailitis, involucris dissectis laciinis linearis filiformibus, involucellorum foliolis basi coalitis linearis-subulatis umbellulam superantibus. (1) in pascuis provinc. austr. occidentaliumque usque ad Andegaviam ex Bast. — Fl. fr. 4. p. 327. — Lob. ic. 726. f. 1. (v. s.)

XLIV. CNIDIUM Hoffm. umb. gen. 1. p. 157.

Calycis margo obsoletus; petala obovata emarginata cum lacinula inflexâ; fructus sectione transversali subteres; carpella jugis 5 aequalibus alatis alâ submembranaceâ, lateralibus marginantibus; valleculæ 1-vittatæ; semen semiteres. — Involucrum varium, involucellum polyphyllum; commissura 2-vittata.

1. C. MONNIERI (Spreng. umb. prod. p. 39.) caule subsulcato tereti, foliis pinnatis, foliolis pinnatifidis, laciinis linearibus, involucris involucellisque polyphyllis, foliolis linearis-setaceis, carpellis ovatis. (1) in provinciis australibus. — Koch umb. f. 48. Selinum Monnierii L. Fl. fr. 4. p. 321. Jacq. vind. t. 62. (v. v. c.)

XLV. SESELI L. gen. n. 360.

Calycis margo 5-dentatus; petala obovata in lacinulam inflexam coarctata emarginata vel subintegra; fructus ovatus vel oblongus sectione transversali subteres, stylis reflexis coronatus; carpella jugis 5 prominulis filiformibus vel elevatis crassis corticosis, lateralibus marginantibus et sèpè paulò latioribus; valleculæ univittatae, semen subsemiteres. — Involucrum varium, involucellum polyphyllum; valleculæ exteriores 1-rariùs 2-vittatae; commissura 2-aut rariùs 4-vittata.

Sect. I. LIBANOTIS Lam. fl. fr. 3. p. 427.

Involucrum universale polyphyllum.


1. S. LIBANOTIS (Koch umb. p. 111.) caule glabro striato sulcatove, foliis radicalibus 2-pinnatis, caulinis pinnatis foliolis pinnatifidis laciinis incisis lobis acutis lanceolatis, involucris involucellisque polyphyllis foliolis setaceis, carpellis ovalibus hirtis. ♀ ad sylvas in montanis. — Athamanta Libanotis L. sp. 351. Fl. fr. 4. p. 317. Koch umb. f. 49 et 50. — Liban. montana All. ped. t. 62. (v. v.)

β. pubescens (DC. fl. fr. 4. p. 317.) caule foliisque pubescentibus. — In saxosis apricis Pyren. et Sequanæ propè Rothomagum. — Athamanta pubescens Retz obs. 3. p. 28. Fl. fr. 5. p. 511. (v. s.)

Sect. II. HIPPOMARATHRUM.

Involucrum universale nullum vel oligophyllum.

2. S. TORTUOSUM (L. sp. 373.) caule rigido tortuoso divaricato ramosissimo tereti, foliis glaucis 3-pinnatis, foliolis lanceolato-linearibus acutis, involucro nullo, involucellorum foliolis linearis-lanceolatis acuminatis, floribus subsessilibus congestis, carpellis subhirtis. ♀ inter saxa Galliæ australis. — Fl. fr. 4. p. 285. — J. Bauh. hist. 3. p. 2. t. 16. f. 1. (v. s.)
3. S. HIPPOMARATHRUM (L. sp. 373) caule laeviusculo, foliis 2-3-pinnatis, foliolis linearibus angustis acutis, involucro subnullo, involucellis foliolis connatis 1-phyllo, floribus subsessilibus congestis, carpellis glabris ovalibus.





- U* in Alsatiæ collibus aridis ex Schauenb. — Fl. fr. 4. p. 283 et 5. p. 502. Jacq. aust. t. 143. — Crantz austr. p. 205. t. 5. f. 1 et 2. (v. s. c.)
4. *S. ANNUUM* (L. sp. 373.) caule substriato, foliorum 2-3-pinnatorum vaginis emarginatis, foliolis linearibus angustis aenatis, invol. nullo, involucellis polyphyllis foliolis lanceolatis acutis umbellulis longioribus, carpellis glabris. *U*? ad rupes et in pratis siccis passim. — Fl. fr. 4. p. 283. Jacq. aust. t. 55. *Selinum dimidiatum* Fl. fr. 4. p. 323. (v. s.)
5. *S. MONTANUM* (L. sp. 372.) caule substriato, foliorum 3-pinnatorum vaginis integris, foliolis linearibus angustis glaucis mucronulatis, superioribus 1-phyllis, involuci 1-3-phyllo caduci involucellorumque polyphyll. foliolis lineari-subulatis, carpellis glaucis ellipticis. *U* in montosis aridis. — Fl. fr. 4. p. 284. *S. glaucum* L. — Vaill. bot. t. 5. f. 2. (v. s.)
6. *S. ELATUM* (L. sp. 375.) caule elongato læviusculo ramoso, geniculis callosis, foliis pinnatis 2-pinnatis, foliolis angustis linearibus, invol. o, involucellis polyphyllis, foliolis lineari-subulatis, carpellis glabris ovalibus. *U* in montosis et ad oras sylvarum Monspelii, Delphin. ex Will., Aureliae ex Dub., Andegaviæ ex Bast. — Fl. fr. 4. p. 285. Gou. ill. 16. t. 8. (v. s.)

XLVI. PTYCHOTIS Koch umb. p. 124.

Calyx 5-dentatus; petala obovata bifido-emarginata, medio plicâ transversali notata lacinulam emittente; fructus a latere compressus ovatus vel oblongus stylis reflexis coronatus; carpella jugis 5 filiformibus æqualibus, lateralibus marginantibus; valleculæ 1-vittatæ; semen tereti vel gibbo-convexum anticè planiusculum. — Involucrum nullum, involucellum polyphyllum. Genus vix à Seseli sezungendum.

1. *P. HETEROPHYLLA* (Koch l. c.) caule ramosissimo striato divaricato, foliis radicalibus pinnatis, foliolis ovatis pinnatifidis lacinia inciso-dentatis, caulinis duplicato-ternatis foliolis linearibus angustissimis, invol. nullo aut 1-phyllo foliolo lineari setaceo, involucellis foliolis 1-3 lineari-setaceis, fructu oblongo, carpellis glaberrimis. (2) in lapidosis provinc. austral. — *Seseli Saxifragum* L. sp. 374. Fl. fr. 5. p. 503. *Æthusa Bunius* Murr. syst. veg. 246. Fl. fr. 4. p. 293. *Juga vittata*? (v. v.)

- P. VERTICILLATA* (Duby mss.) caule erecto aut diffuso læviusculo, foliis pinnatis segmentis multipartitis lobis setaceis in foliis radicalibus brevioribus, invol. o, involucellis polyphyllis foliolis setaceis flores subæquantibus, fructu ovato, carpellis glaberrimis. (2) in Corsicâ. — *Seseli verticillatum* Desf. atl. 1. p. 260. Fl. fr. 5. p. 504. *Ses. ammoides* L? sp. 373 certò non. Jacq. vind. t. 52. — Dalech. hist. 695. f. 2. (v. s.)

XLVII. HELOSCIADIUM Koch umb. p. 125. — Sii et Sisonis sp. L.

Calycis margo 5-dentatus subindè obsoletus; petala ovata integra acuta vel obtusiuscula et apiculata apice recto vel inflexo; fructus a latere compressus ovatus vel oblongus; carpella jugis 5 filiformibus prominulis æqualibus, lateralibus marginantibus; valleculæ 1-vittatæ; semen gibbo-vel tereti-convexum anticè planiusculum. — Involucrum varium, carpophorum integrum liberum.

1. *H. BULBOSUM* (Koch l. c.) caule procumbente gracili, foliis pinnatis, foliolis profundiè tripartitis subverticillatis, lacinia linearibus, umbellis longè pedunculatis multiradiatis, invol. involucellisque sub 5-phyllis foliolis lanceolatis. (1) in stagnis circè Aquas Tarbellicas (Dax.) — *Sium intermedium* DC. fl. fr. 4. p. 302. (v. s.)
2. *H. INUNDATUM* (Koch l. c.) caule repente fistuloso, fol. inferioribus multi-partito-capillaceis superioribus pinnatis, foliolis cuneatis incisis lanceolatis, umbellis pedunculatis 2-3-radiatis, involucris nullis, involucellis polyphyllis

- foliolis linear-lanceolatis brevibus, fructibus ovatis, stylis brevissimis inclinatis. (1) in fossis et paludibus passim. — Sium inundatum Fl. fr. 4. p. 303. Sison inundatum L. — Pluck. t. 61. f. 3. (v. v.)
3. H. REPENS (Koch l. c.) caule repente striato fistuloso, foliis pinnatis foliolis dentatis incisis indivisisque, umbellis pedunculatis oppositifoliis, involucellis umbellulam subaequantibus involucrisque sub-6-phyllo foliolis linear-lanceolatis, fructibus globosis, stylis reflexis. ♀ in paludosis et inundatis turfosis Galliae occident., mediæ, borealis orientalisque. — Sium repens Fl. fr. 4. p. 300. Jacq. aust. 3. t. 260. (v. v. DC.)
4. H. NODIFLORUM (Koch l. c.) caule procumbente striato fistuloso, foliis pinnatis, foliolis lanceolatis serratis, umbellis oppositifoliis subsessilibus, involucro 1-2-phyllo, involucellis umbellulam subaequantibus foliolis lanceolatis, fructibus ovato-globosis, stylis reflexis. ♀ in rivulis et ad margines fluviorum. — Sium nodiflorum L. sp. 361. Fl. fr. 4. p. 299. — Moris. s. 9. t. 5. n. 7. (v. v.)

β. giganteum (Des Moulins) caule 2-3-pedali, foliorum radicalium foliolis ovatis crenato-dentatis 2-pollicaribus. — Propè Burdigalam observavit cl. Des Moul. (v. s.)

XLVIII. FENICULUM All. ped. 2. p. 25. Gærtn. fruct. 1. p. 105. t. 23. f. 5. — Anethi sp. L.

Calycis margo obsoletus; petala subrotunda integra involuta lacinulâ subquadratâ retusâ; fructus sectione transversali subteres; carpella jugis 5 prominulis obtusè carinatis, lateralibus marginantibus et paulò latioribus; valleculæ univittatæ; semen subsemiteres. — Involucrum involucellumque nullum.

1. **F. OFFICINALE** (All. ped. n. 1359.) caule tereti ramoso striato lucido, foliis decompositis, lacinias capillaceis, carpellis oblongo-ellipticis. (2) in lapidosis aridis. — **Anethum Feniculum** L. sp. 377. Fl. fr. 4. p. 340. — Moris. s. 9. t. 2. n. 1. (v. v.)

XLIX. OENANTHE Lam. fl. fr. 3. p. 432. DC. fl. fr. 4. p. 295. — Oenanthe et Phellandrium L.

Calycis margo 5-dentatus; petala obovata emarginata cum lacinulâ inflexâ; fructus sectione transversali subteres, stylis erectis coronatus; carpella jugis 5 convexiusculis obtusis, lateralibus marginantibus et paulò latioribus; valleculæ 1-vittatæ; semen tereti-convexum. — Invol. varium, involucellum polyphyllum. Flores radii'pedicellati abortu steriles, disci sessiles vel brevissimè pedicellati fertiles; carpophorum nullum.

1. **OE. PHELLANDRIUM** (Lam. fl. fr. 3. p. 432.) caule fistuloso striato, foliis 3-pinnatis, foliolis decompositis lacinias divaricatis linearibus abbreviatis, invol. o., involucellis polyphyllis foliolis linear-setaceis acuminatis umbellulâ brevioribus, fructu ovato-elongato. ♀ in stagnis et fossis aquosis. — Fl. fr. 4. p. 295. Phellandrium aquaticum L. — Lob. ic. 735. f. 1. (v. v.)
2. **OE. FISTULOSA** (L. sp. 365.) radice repente, caule fistuloso striato lucido, foliis radicalibus decompositis lacinias linearibus abbreviatis, caulinis pinnatis, foliolis pinnatifidis indivisisque lacinias lanceolatis acentis, involuero nullo aut foliolo unico linear-lanceolato umbellam superante, involucellis polyphyllis foliolis linear-lanceolatis umbellulam subsuperantibus. ♀ in paludosis frequens. — Fl. fr. 4. p. 295. Cam. epit. p. 611. fig. ext. Juga connata pericarpium crassè corticosum reddunt. (v. v.)
3. **OE. RIMPINELLOIDES** (L. sp. 365. non Poll.) radicum tuberculis oblongis, caule firmo sulcato, foliis radicalibus 2-pinnatis, foliolis pinnatifidis lacinias



integris aut unidentatis lanceolatis acuminatis, caulinis pinnatis foliis linearibus integris elongatis, involucellis umbellulam subæquantibus involucrisque polyphyllis, foliolis linearis-setaceis. \mathcal{U} in pratis paludosis Galliæ mediæ, occidentalis australisque. — Fl. fr. 4. p. 297. — J. Bauh. hist. 3. p. 2. p. 191. f. 2. (v. v.)

4. OE. CHÆROPHYLLOIDES (Pourr. act. tol. 3. p. 323.) radicum fibris apicem versus tuberosis, caule sulcato, foliis radicalibus 2-pinnatis, foliolis ovato-cuneatis pinnatifidis laciiniis mucronulatis, caulinis pinnatis 2-pinnatis, foliolis linearibus integris elongatis acuminatis, involucellis umbellulam subsuperantibus involucrisque polyphyllis foliolis linearis-setaceis, fructibus cylindrico-elongatis. \mathcal{U} circâ Narbonam, Valletriam, Andegaviam. — Fl. fr. 5. p. 507. — Cam. epit. 610. f. iii. OE. pimpinelloides β . Fl. fr. 4. p. 297. An satis à praecedente distincta? (v. s.)
5. OE. LACHENALII (Gmel. bad. 1. p. 678.) radicum fibris cylindraceis, caule sublævi, foliis radicalibus pinnatis, foliolis ovalibus obovatisse sæpè 3-lobis, caulinis pinnatis 2-pinnatis foliolis linearibus subacutis, involucri 4-6-phyllo involucellorum polyphyll. foliolis linearibus umbellulâ brevioribus. \mathcal{U} in Alsatiâ. — OE. Rhenana Fl. fr. 5. p. 506. Folia radicalia sæpè plantâ florente desunt. (v. s.)
6. OE. APPROXIMATA (Mer. par. 115.) radicum fibris cylindraceis, caule sublævi, foliis radicalibus pinnatis, foliolis obtusè trilobis, caulinorum lobis linearibus, involucro nullo, involucellis polyphyllis foliolis linearis-lanceolatis acutis umbellulam subæquantibus. \mathcal{U} in humidis circâ Parisios. — Fl. fr. 5. p. 507. (v. s.)
7. OE. PEUCEDANIFOLIA (Pol. pal. 1. p. 289. t. 2. f. 3.) tuberibus radicalibus ellipticis, caule sulcato, foliis pinnatis 2-pinnatis, foliolis omnibus linearibus acutis, involucro subnullo, involucellis polyphyllis foliolis linearis-lanceolatis acutis umbellulâ duplò brevioribus, fructibus cylindricis. \mathcal{U} in fossis et paludibus Galliæ orientalis, mediæ et boreali-orientalis. — Fl. fr. 4. p. 297. — Dalech. lugd. 773. f. 2. (v. v. DC.)
8. OE. GLOBULOSA (L. sp. 365.) radice fusiformi ramosâ, caule vix striato, foliis pinnatis foliolis pinnatifidis radicalium laciiniis lanceolatis subobtusis, caulinorum laciiniis linearibus acutis, invol. o, involucellis polyphyllis foliolis linearis-setaceis umbellulam subsuperantibus, fructibus ovato-globosis. \mathcal{U} in stagnis provinciarum australiorum. — Fl. fr. 4. p. 296. Gou. ill. t. 9. (v. s.)
9. OE. CROCATA (L. sp. 365.) caule striato, foliorum 2-3-pinnatorum foliolis omnibus cuneatis, caulinorum ovatis grossè dentatis incisive, superiorum lanceolatis, involucris involucellisque polyphyllis foliolis linearis-setaceis. \mathcal{U} in aquosis et ad ripas fluviorum Galliæ præsertim mediæ et occidentalis. — Fl. fr. 4. p. 298. — Moris. s. 9. t. 7. n. 2. (v. v.)
10. OE. APIFOLIA (Brot. lusit. 1. p. 420.) caule sulcato, foliis radicalibus 2-pinnatis, foliolis pianatis laciiniis ovato-cuneatis incisis dentatis, caulinis pinnatis foliolis cuneatis pinnatifidis laciiniis linearibus, invol. nullo, involucellis polyphyllis foliolis linearis-setaceis umbellulâ duplò brevioribus, fructibus elongato-cylindricis. \mathcal{U} ad aquas Corsicæ. (v. s.)

L. CICUTA L. gen. n. 354.

Calycis margo 5-dentatus foliolosus; petala obovata emarginata cum lacinulâ inflexâ; fructus subrotundus a latere contractus didymus; carpella jugis 5 planiusculis æqualibus lateralibus marginantibus; valleculæ 1-vittatæ; vittæ (in sicco carpello) jugis elevatores; semen teres. — Involucrum oligophyllum aut nullum, involucellum polyphyllum; carpophorum 2-partitum.

1. C. VIROSA (L. sp. 368.) caule fistuloso sulcato, foliis 2-pinnatis pinnatis simplicibus foliolis 3-5-lobis, laciiniis linearis-lanceolatis inciso-dentatis,

nimbellis oppositifoliis, involacellis polyphyllis foliolis setaceis. ♀ ad stagna et fossas aquosas. — Koch nmb. f. 53 et 54. Cientaria aquatica Lam. DC. fl. fr. 4. p. 294. — Lob. ic. t. 208. f. 2. (v. v.)

Subdiv. II. SESELINEÆ NUCLEATÆ, id est semine libero nec pericarpio nisi latere commissurali adnato.

LI. CRITHMUM *Tourn.* t. 165. *L. gen. n.* 340.

Calycis margo obsoletus; petala subrotunda integra involuta lacinulâ obovatâ; fructus sectione transversali subteres; carpella jugis 5 elevatis argutis subalatis, lateralibus paulo latioribus marginantibus; semen semiteres liberum vittis copiosis undique tectum. — Involucrum et involucellum polyphyllum; pericarpium spongiosum.

1. *C. MARITIMUM* (L. sp. 354.) foliolis lanceolatis carnosis. ♀ inter saxa maritima. — Fl. fr. 4. p. 317. — Lob. ic. 392. f. 2. (v. v.)

Trib. X. SCANDICINEÆ. *Koch umb.* p. 130.


Fructus a latere evidenter compressus vel contractus, linearieelongatus, ut plurimum rostratus. Carpella paucijugata, jugis primariis quinque filiformibus subindè subalatis, lateralibus marginantibus, omnibus æqualibus, secundariis nullis; vel jugis oblitteratis lævigata et apice tantum jugata. Semen tereti-convexum, anticè profunde sulcatum vel margine involutum et ideo carpella campylosperma.

Sect. 1. SCANDICINEÆ SOLIDÆ EROSTRATÆ.

LII. CHÆROPHYLLUM *L. gen. n.* 358.

Calycis margo obsoletus; petala obovata emarginata cum lacinulâ inflexâ; fructus a latere compressus vel contractus; carpellæ jugis quinque obtusis 4-æqualibus lateralibus marginantibus; commissura sulco profundo exarata; valleculæ univittatæ; semen tereti-convexum sectione transversali semilunare. — Involucrum nullum vel oligophyllum, involucellum polyphyllum; carpophorum bifidum.

1. *C. HIRSUTUM* (L. sp. 371.) caule striato petiolis nervisque hirsutis, foliis 2-pinnatis pinnatisve, foliolis pinnatifidis lacinii lanceolatis incisis, invol. nullo aut 1-2-phyllo, involucelli polyphylli foliolis lanceolatis membranaceis ciliatis acuminatis, jugis obtusis depressis, stylis longissimis suberectis. ♀ in humidis montium. — Fl. fr. 4. p. 289. Jacq. austr. t. 148. (v. v.)
2. *C. AUREUM* (L. sp. 370.) caule striato, foliis 3-2-pinnatis, foliolis lanceolato-elongatis incisis serratisque summis confluentibus, radicalium petiolis nervisque hirsutis, involucro nullo aut 1-phyllo, involucellis polyphyllis foliolis hirsutis lanceolato-linearibus aristato-acuminatis, jugis obtusis subelevatis, stylis divergentibus. ♀ in umbrosis montium. — Fl. fr. 4. p. 289. — Lob. ic. 734. f. 2. (v. v.)
3. *C. TEMULUM* (L. sp. 370.) caule lævinuscculo hirto, geniculis tumidiuncis, foliis pubescentibus inferioribus 2-pinnatis superioribus pinnatis, foliolis ovatis lanceolatisve crenatis incisis, summis confluentibus, invol. o ant 1-phyllo, involucellis polyphyllis foliolis hirsutis linear-i-lanceolatis acutis, stylis semidivergentibus brevibus. ♀ in locis incultis et sepibus. — Koch nmb. f. 63. Fl. fr. 4. p. 290. — Tabern. ic. 94. (v. v.)





4. *C. BULBOSUM* (L. sp. 370.) caule sub nodis inflato basi hirto cæterum glabro fistuloso, foliis 3-2-pinnatis, foliolis pinnatifidis laciniis linear-lanceolatis integerrimis, involucro nullo, involucellis polyphyllis foliolis linearibus acuminatis, stylis brevibus recurvis. (2) in Alsatiæ dumetis ruderatisque ex J. Bauh.—Fl. fr. 5. p. 505. Koch umb. f. 61 et 62. — J. Bauh. hist. 3. p. 183. ic. (v. s. ex Germ.)
5. *C. NODOSUM* (Lam. enc. 1. p. 685.) caule hirto scabro geniculis tumidinculo, foliis inferioribus 2-pinnatis superioribus pinnatis, foliolis ovatis pinnatifidis incisive dentatis, umbellis 2-3-radiatis, invol. nullo, carpellis hirsutis, jugis obtusis valde depresso, stylis brevissimis erectis. (1) in sepibus et umbrosis circa Nicæam ex All., Parisios ex Lam., Andegaviam ex Bast.—Caucalis nodosa Fl. fr. 4. p. 334. An potius sequentis generis? (v. s. c.)

Sect. II. SCANDICINEÆ SOLIDÆ ROSTRATÆ.

LIII. *ANTHRISCUS* Pers. syn. 1. p. 320. Hoffm. umb. 1. p. 38. — Scandicis et Chærophylli sp. L.

Calycis margo obsoletus; petala obovata truncata vel emarginata cum lacinulâ inflexâ, sœpè brevissima; fructus a latere contractus rostratus sectione verticali lanceolatus; carpella subteretia ejugata rostro solum quinquejugato; semen tereti-convexum anticè profunde sulcatum. — Involucrum nullum, involucellum polyphyllum; carpophorum apice bifidum.

* *Carpellis laevibus.*

1. *A. SYLVESTRIS* (Hoffm. umb. gen. 1. p. 40.) caule sulcato ramoso, geniculis tumidis, foliis inferioribus 3-pinnatis, superioribus 2-pinnatis, foliolis lanceolatis incisis inciso-dentatis acutis, summis confluentibus, involucellis polyphyllis foliolis lanceolatis ciliatis, fructibus lucidis, stylis erectis subdivergentibus. 2. in pratis et ad sepes frequens. — Koch umb. f. 57 et 58. *Chærophyllum sylvestre* L. sp. 369. Fl. fr. 4. p. 288. — Dod. pempt. 701. (v. v.)
2. *A. TORQUATA* (Duby mss.) caule striato ramoso glabro, foliis 2-pinnatis, foliolis lanceolato-ovatis grossè subinciso-dentatis, involucellis polyphyllis foliolis ciliato-hirsutis lanceolatis acutis, summis confluentibus, petalis valdè inæqualibus exterioribus radiantibus, fructibus lucidis elongato-lanceolatis ciliorum minimorum seriè basi cinctis, stylis brevibus suberectis. (2) in Alpibus Galloprovincie propè Colmars detexit cl. DC. — Chærop. torquatum Fl. fr. 5. p. 505. *Myrrhis bulbosa* All. ped. n. 1373. excl. syn. (v. v. DC.)
3. *A. CICUTARIA* (Duby mss.) caule striato glabro, foliis inferioribus 2-pinnatis, superioribus pinnatis, foliolis elongato-lanceolatis incisis aut inciso-dentatis acutis, summis confluentibus, involucellis lanceolato-linearibus ciliatis acuminatis, petalis valdè inæqualibus exterioribus radiantibus, stylis divergentibus. 2. secus rivulos Alpium Delph. ex Vill. — *Chærophyllum Cicutaria* Vill. Fl. fr. 5. p. 506. Hujus generis, quantum videre licet per fructus nondum maturos. (v. s. ex Helv.)
4. *A. CEREFOLIUM* (Hoff. umb. 1. p. 41.) caule substriato glabro, foliis inferioribus 3-pinnatis, superioribus 2-pinnatis, foliolis ovatis inciso-pinnatifidis laciniis lanceolatis, umbellis lateralibus subsessilibus, involucellarum foliolis linear-lanceolatis acuminatis, fructibus elongato-linearibus, stylis brevibus erectis parallelis. (1) in hortis colitur. — *Chærophyllum sativum* Lam. fl. fr. 3. p. 438. DC. fl. fr. 4. p. 291. (v. v. c.)
- * * *Carpellis muricatis vel aculeolatis.*
5. *A. VULGARIS* (Pers. syn. 1. p. 320.) caule striato glabro, foliis 3-4-pinnatis, foliolis pinnatifidis laciniis obtusis mucronulatis brevissimè ciliatis, umbellis lateralibus sessilibus pedunculatisque, involucellarum foliolis linear-lanceolatis, fructibus aculeolatis oblongo-ovatis basi ciliorum seriè cinctis, sty-

lis brevissimis rectis. (I) ad sepes et in marginibus arborum. — Koch umb. f. 59 et 60. Caucalis scandicina Fl. dan. t. 863. Fl. fr. 4. p. 334. (v. v.)

LIV. SCANDIX L. gen. n. 357.

Calycis margo obsoletus; petala obovata truncata cum lacinulâ inflexâ; fructus a latere compressus longissimè rostratus; carpella jugis 5 obtusis æqualibus, lateralibus marginantibus; valleculæ evittatae vel obsoletè vittatae; semen tereti-convexum anticè profunde sulcatum. — Involucrum nullum vel oligophyllum, involucellum 5-7-phylum; carpophorum apice furcatum.

Sect. I. PECTEN.

Rostrum fructûs a dorso compressum.

1. S. PECTEN-VENERIS (L. sp. 368.) foliis pinnatis, foliolis multifidis laciinis linearibus acutis, umbellâ 2-3-radiatâ, invol. nullo aut umbellis folio superiore suffultis, involucellis erectis polyphyllis foliolis lanceolatis acuminatis, carpellis dorso rostrique margine brevissimè aculeolato-hispidis, stylis erectis parallelis. (I) inter segetes frequens. — Fl. fr. 4. p. 291. — Cam. epit. 304. ic. (v. v.)

Sect. II. WYLIA Hoffm. umb. I. p. 5.

Rostrum fructûs a latere compressum.

2. S. AUSTRALIS (L. sp. 369.) caulis gracilibus, foliis pinnatis foliolis multifidis laciinis capillaribus, umbellâ 2-3-radiatâ, involucro nullo, involucelli foliolis lanceolatis margine scariosis integris aut apice 2-3-fidis, carpellis attenuatis rostrique dorso aculeolato-hispidis, stylis erectis parallelis. (I) in aridis provinciis mediterranearum. — Fl. fr. 4. p. 292. — Moris. s. 9. t. 11. n. 4. (v. v.)

Sect. III. SCANDICINEÆ UTRICULOSÆ, id est pericarpio dorso inflato, antice semine adnato.

LV. MYRRHIS Scop. carn. ed. 2. sp. 207. Hoffm. umb. I. p. 27.

Calycis margo obsoletus; petala obovata emarginata cum lacinulâ inflexâ; fructus a latere compressus; semen involutum tectum pericarpio è membranâ duplice formato, externâ in juga quinque æqualia arguta acutè carinata intùs cava elevatâ, internâ arcte adnatâ; vittæ nullæ. — Involucrum nullum, involucellum polyphyllum; carpophorum apice fissum.

3. M. ODORATA (Scop. carn. n. 341.) caule striato, foliis pubescens 3-pinnatis, superioribus 2-pinnatis, foliolis pinnatifidis laciinis ovatis lanceolatis incisis, petiolis nervisque hirsutis, involucellarum foliolis lanceolato-linearibus membranaceis acuminatis. 2/4 in pratis montanis. — Chærophyllum odoratum Lam. DC. fl. fr. 4. p. 290. — Cam. epit. 898. ic. (v. v.)

Trib. XI. SMYRNEÆ Koch umb. p. 133.

Fructus a latere compressus vel contractus turgidus. Carpella campylosperma paucijugata jugis primariis quinque, lateralibus marginantibus vel ante marginem positis, secundariis nullis; vel jugis ferè oblitteratis sublævigata. Semen involutum vel sulco profundo exaratum, semilunare vel complicatum.

Sect. I. SMYRNEÆ SOLIDÆ MULTIVITTATÆ.

LVI. SMYRNIUM Koch l. c. — Smyrnii sp. L.

Calycis margo obsoletus; petala lanceolata vel elliptica integra acu-



minata acumine inflexo; fructus a latere contractus, carpellis reniformi-globosis didymus; juga 3 dorsalia prominula arguta, duo lateralia marginantia oblique rotundata; valleculæ multivittatæ; semen involutum. — Involucra varia; carpophorum bipartitum.

1. *S. OLOSATRUM* (L. sp. 376.) caule striato, foliis 2-ternatis ternatisque, foliolis rotundo-ovatis basi cuneatis crenato-dentatis. ♀ in pascuis humidis umbrosis Gallæ australis, Aginni ex St.-Am., Burdigalæ ex Des Monlins, Andegaviae ex Bast., Parisiorum ex Mer. — Fl. fr. 4. p. 340. — Lob. ic. t. 708. f. 2. (v. v. DC.)
2. *S. PERFOLIATUS* (L. sp. 376.) radice tuberosâ, caule erecto sulcato in parte superiore 2-alat., foliis inferioribus ternatis foliolis rotundo-ovatis crenatis, superioribus simplicibus basi cordatis amplexicaulibus rotundo-ovatis crenatis integrisve. ♀ in sylvis Corsicæ et Galloprovincie propè Telenem. — Fl. fr. 5. p. 513. *S. Dioscoridis Spr.* Koch umb. f. 38 et 39. — Dod. pent. 698. f. 2. Moris. n. 9. t. 4. n. 7. (v. s.)

Sect. II. SMYRNEÆ SOLIDÆ PAUCIVITTATÆ VEL EVIT-TATÆ.

LVII. CONIUM L. gen. n. 336.

Calycis margo obsoletus; petala obovata emarginata cum lacinulâ inflexâ; fructus a latere compressus ovatus; carpella jugis 5 prominulis undulato-crenulatis æqualibus, lateralibus marginantibus; valleculæ multistriatae evittaæ; semen sulco profundo angusto incisum. — Involucrum oligophyllum; involucellum triphyllum dimidiatum; carpophorum apice bifidum.

1. *C. MACULATUM* (L. sp. 349.) caule erecto fistuloso ramoso maculato, foliis 3-2-pinnatis, foliolis lanceolatis pinnatifidis incisive summis confluentibus. (2) ad sepes humida. — *Cicuta major* Lam. DC. fl. fr. 4. p. 324. — Moris. s. 9. t. 6. n. 9. (v. v.)

LVIII. ECHINOPHORA Tourn. inst. t. 423. L. gen. n. 329.

Calycis margo 5-dentatus; petala obovata emarginata cum lacinulâ inflexâ, vel exteriora majora bifida; flores radii masculi longè pedicellati; fæmineus centralis solitarius; fructus ovatus subteres receptaculo cavo inclusus breviter rostratus rostro emerso; carpella jugis quinque depressis undulato-striatis æqualibus; valleculæ univittatae, vittis membranâ arachnoideâ tectis. — Involucrum involucellumque polyphyllum.

1. *E. SPINOSA* (L. sp. 344.) caule ramoso diffuso, foliis crassis coriaceis 2-pinnatis foliolis subulato-spinosis. ♀ in littoribus maris Mediterranei. — Fl. fr. 4. p. 352. — Lob. t. 710. f. 1. (v. v.)

Sect. III. SMYRNEÆ NUCLEATÆ MULTIVITTATÆ.

LIX. CACHRYS Koch umb. 130. — *Cachrydis* sp. L.

Calycis margo obsoletus; petala ovato-lanceolata integra acuminata acumine inflexo; fructus turgidus, sectione transversali subteres; carpella jugis 5 crassis obtusissimis æqualibus, lateralibus marginantibus; semen liberum vittis copiosis tectum involutum. — Involucrum involucellumque oligophyllum; pericarpium crassum suberosum.

1. *C. LÆVIGATA* (Lam. diet. 1. p. 256.) foliis supra-decompositis glabris, laci-nis setaceis brevibus, involuci involucorumque foliolis linearis-setaceis. ♀ in rupestribus maritimis provinc. mediter. — Fl. fr. 4. p. 344. *C. Morisonii* All. — Moris. umb. t. 3. n. 1. (v. v. DC.)

Sect. IV. SMYRNEÆ UTRICULOSÆ.

LX. PLEUROSPERMUM Hoffm. umb. p. 9.

Calycis margo 5-dentatus; petala obovata integra; fructus a latere compressus ovatus; pericarpium carpellorum è membranâ duplice formatum, externâ (seu epicarpo) in juga 5 alata cava inflatâ, internâ (endocarpo) arcte adnatâ et in juga 5 minora exterioribus opposita elevatâ; valleculæ endocarpii univittatae; semen semilunare. — Involucrum involucellumque polyphyllum.

1. P. AUSTRIACUM (Hoffm. I. c.) caule erecto striato fistuloso, foliis ternatis pinnatisque foliolis pinnatifidis, lacinias lanceolatis incisis dentatis basi decurrentibus, involucris polyphyllis foliolis incisis. ♀ ad aquas iux montanis Galloprov., Delph. ex Vill. — Ligusticum Austriacum L. sp. 360. Fl. fr. 4. p. 307. L. Gmelini Vill. dauph. 2. t. 13. bis. — Clus. hist. 2. p. 193. f. 1. (v. s.)

Subord. III. UMBELLIFERÆ IMPERFECTÆ.

Trib. XII. SANICULEÆ Koch umb. 138.

Fructus sectione transversali subteres. Carpella jugis quinque primariis æqualibus, secundariis nullis vel jugis obliteratis tecta squamis paleiformibus aculeisve. Semen sectione transversali semiteres, antice planiusculum. Umbellulæ fasciculatæ vel capitatae, vel tota umbella capitata.

Sect. I. SANICULEÆ UTRICULOSÆ.

LXI. ASTRANTIA Tourn. t. 166. L. gen. n. 327.

Calycis margo 5-dentatus foliolosus; petala erecta conniventia oblongo-obovata a medio infracta in lacinulam longitudine ferè petali; fructus a dorso subcompressus; carpella jugis quinque elevatis obtusis plicato-dentatis inflatis, in cavitate juga minora fistulosa inclientibus; vittæ nullæ; semen semiteres. — Involucrum varium, involucellum polyphyllum; carpophorum nullum.


1. A. MAJOR (L. sp. 339.) foliis radicalibus 5-lobis lobis trifidis acutis dentatis, involucris 3-fidis lacinias linear-lanceolatis setoso-seratis, involucellarum foliolis lanceolatis integris aut apice 3-dentatis umbellulam superantibus. ♀ in paucis montanis. — Fl. fr. 4. p. 353. Lam. ill. t. 191. f. 1. Koch umb. f. 42 et 43. (v. v.)
2. A. MINOR (L. sp. 340.) foliis radicalibus digitatis, foliolis septenis novenisve lanceolatis profundè dentatis, involucellarum foliolis lanceolatis integris acuminatis umbellulam subæquantibus. ♀ in paucis Alpium et Pyren. — Fl. fr. 4. p. 353. Lam. ill. t. 191. f. 2. (v. v.)

Sect. II. SANICULEÆ SOLIDÆ.

LXII. SANICULA Tourn. t. 173. L. gen. n. 326.

Calycis margo 5-dentatus foliolosus; petala erecta conniventia obovata emarginato-infracta in lacinulam longitudine petali; fructus sectione transversali teres subglobosum; carpella aculeis uncinatis dense tecta ejugata multivittata; semen semiglobosum. — Involucrum involucellumque polyphyllum; carpophorum nullum.

3. S. EUROPEA (L. sp. 339.) caule nudo, foliis palmatis 3-5-lobis lobis cuneatis 3-fidis dentatis, floribus sessilibus. ♀ in sylvis et sepibus. — Fl. fr. 4. p. 354. — Cam. epit. 763. ic. (v. v.)



-Eunophytium

LXIII. ERYNGIUM *Tourn. t. 173. L. gen. 324.*

Calycis margo quinquedentatus foliolosus; petala erecta conniventia oblongo-ovata emarginato-infracta in lacinulam longitudine petali; fructus sectione transversali subteres obovatum; carpella squamis paleiformibus testa evittata; semen subsemiteres. — Involucrum polyphyllum; flores paleis intermixti in capitulum collecti, carpophorum nullum.

1. *E. CAMPESTRE* (L. sp. 337.) caule ramosissimo, foliis spinosis, radicalibus bipinnatis foliolis decurrentibus ovatis varie contortis, involueri capitulum longe superantis foliolis linearibus spinosis. ♀ in incultis. — Fl. fr. 4. p. 355. — Fuchs. hist. 297. ic. (v. v.)
2. *E. BOURGATI* (Gou. ill. p. 7. t. 3.) caule stricto, foliis radicalibus orbiculatis ternatis foliolis pinnatifidis laciniosque incisis divaricatis spinosis, involueri capitulum conrox superantis foliolis lanceolato-linearibus spinosis. ♀ in herbosis Pyrenaorum. — Fl. fr. 4. p. 355. Caulis amethystinus. (v. v.)
3. *E. SPINA-ALBA* (Vill. dauph. 2. t. 17.) foliis omnibus digitatis, involuti capitulum ovatum maximum superantis foliolis linearibus pinnatifidis. ♀ in lapidosis aridis montium Galloprovinciarum et Delph. — Fl. fr. 4. p. 356. — Dalech. logd. p. 1462. f. 1. (v. s.)
4. *E. ALPINUM* (L. sp. 337.) foliis radicalibus profundè cordatis lanceolatis serratis, superioribus 5-3-lobatis, involueri capitulum oblongo-ovatum superantis foliolis lineaibus pinnatifido-spinosis. ♀ in pascuis Jurassi et Alpium Delph. et Gallopro. — Fl. fr. 4. p. 356. — Lob. ic. 2. p. 23. f. 2. (v. s.)
5. *E. MARITIMUM* (L. sp. 337.) foliis radicalibus subrotundis plicatis grosse dentato-spinosis, superioribus incisis, involueri capitulum ovatum superantis foliolis ovatis acuminatis spinosis. ♀ in arenosis maritimis. — Fl. fr. 4. p. 355. — Cam. epit. 448. ic. (v. v.)
6. *E. ALBUM* (L. sp. 336.) foliis radicalibus elliptico-cordatis crenatis superioribus 5-6-lobatis, involueri capitulum rotundum superantis foliolis lanceolato-linearibus spinosis. ♀ in Alpibus Galloprov. Italiæ vicinis. — Fl. fr. 4. p. 357. — Clus. his. 2. p. 158. f. 1. (v. s. c.)
7. *E. DICHOTOMUM* (Def. atl. 1. t. 55.) caule ramoso dichotomo, foliis radicalibus oblongis cordatis crenatis, superioribus 3-5-lobatis, involueri capitulum rotundum longe superantis foliolis linearibus acuminatis simplicibus tricuspidatisque. ♀ Monspeii ex seminibus cum lanis Barbariae allatum. — Fl. fr. 5. p. 515. (v. s.)

Trib. XIII. *HYDROCOTYLINEÆ* *Spreng. in Röm. et Sch. 6. p. xxxii. Koch umb. p. 141.*

Fructus a latere evidenter compressus. Carpella jugis primariis 5 subinde obsoletis, secundariis nullis. Semen antice planiusculum. Umbellæ simplices vel imperfectæ floribus capitatis vel verticillatis. Petala patentia integra acuta apice recto vel subinflexo.

LXIV. HYDROCOTYLE *Tourn. t. 173. L. gen. n. 325.*

Calycis margo obsoletus, petala ovata integra acuta apice recto, fructus a latere plano-compressus biscutatus; carpella jugis 5 filiformibus carinali et lateralibus saepè obsoletioribus, intermediis duobus arcuatis, evittata; semen carinato-compressum.

1. *H. VULGARIS* (L. sp. 338.) foliis peltatis orbiculatis crenatis, umbellâ 5-8-florâ. ♀ in paludibus. — Fl. fr. 4. p. 358. Koch umb. f. 64 et 65. — Lob. ic. 387. f. 1. (v. v.)

Ordo LI. CAPRIFOLIACEÆ Juss. gen. 210. excl. gen. *Lorantheum*.

Calyx 1-sepalus ovario adhærens sæpè basi bibracteatus, limbo integro aut diviso. Corolla regularis nunc 1-petala 4-5-fida; nunc 4-5-petala petalis basi latioribus. Stamina corollæ lobis numero æqualia, et iisdem alterna, in monopetalis collæ, in polypetalis calyci inserta. Stylus o aut 1; stigma 1-3. Bacca aut capsula limbo calycino sæpius coronata uni-aut multilocularis, loculis 1-∞-spermis. Sem. spermodermis ossea. Embryo rectus in apice albuminis carnosus; radicula supera. — Frutices foliis oppositis alternisve exstipulatis, toribus sæpius corymbosis.

Trib. I. HEDERACEÆ. — Hederaceæ Ach. Rich. bot. med. p. 449.

Calyx ebracteatus. Corolla polypetala. Stylus 1. Stigma 1. Drupa aut bacca loculis 1-spermis.

I. HEDERA Tourn. t. 384. L. gen. n. 28.

Calyx 5-dentatus; pet. 5; stam. 5; antheræ basi bifurcatæ; bacca 5-locularis, sepimentis in maturitate oblitteratis.

1. H. HELIX (L. sp. 292.) foliis quinquangularibus 5-lobisque, floralibus ovatis, umbellâ erectâ. ♂ in sylvis, ad sepes et antiquos murs. — Fl. fr. 4. p. 278. Lam. ill. t. 145. (v. v.)

II. CORNUS Tourn. inst. t. 410. L. gen. t. 149.

Calyx 4-dentatus; petala 4; stam. 4; drupa non coronata fæta nuce 2-loculari.

1. C. MAS (L. sp. 171.) arborea, umbellis involucrum æquantibus antè folia nascentibus. ♂ in nemoribus et ad sepes. — Fl. 4. p. 277. Lam. ill. t. 74. f. 1. (v. v.)

2. C. SANGUINEA (L. sp. 171.) arborea, ramis erectis, foliis pennis, cymis depresso-depressis. ♂ ad sepes et in sylvis. — Fl. fr. 4. p. 278. — Lob. ic. 1. p. 169. f. 2. (v. v.)

Trib. II. SAMBUCINEÆ A. Rich. in dict. class. 3. p. 173.

Calyx parvus bracteis cinctus. Stylus o. Stigmata 3. Cor. 1-petala. Bacca 1-locularis 1-3 sperma.


III. SAMBUCUS Tourn. inst. t. 376. L. gen. n. 372.


Calyx 5-sidus; cor. rotata 5-loba; stam. 5; bacca 3-sperma.

1. S. EBULUS (L. sp. 385.) cymis 3-partitis, foliorum foliolis 7-9 oblongo-lanceolatis, stipulis foliaceis, caule herbaceo. ♀ ad margines viarum et fossarum humidorum. — Fl. fr. 4. p. 276. Blackw. t. 488. (v. v.)

2. S. NIGRA (L. sp. 385.) cymis 5-partitis, fol. foliolis 5-7 ovali-lanceolatis, caule arboreo. ♂ ad sepes in solo subhumido. — Fl. fr. 4. p. 276. fl. dan. t. 545. (v. v.)

3. S. RACEMOSA (L. sp. 386.) racemis compositis ovatis, fol. foliolis 5, caule arboreo. ♂ in montosis provinciarum orientalium borealiumque. Fl. fr. 4. p. 277. Jacq. rar. 1. t. 59. (v. v.)





IV. VIBURNUM L. gen. n. 370.

Calyx 5-fidus; corolla campanulata 5-loba; stam. 5; bacca trisperma.

§. I. TINUS Tourn. inst. t. 377.

Bacca coronata.

1. V. TINUS (L. sp. 383.) foliis integerrimis ovatis ramificationibus venarum subtus villosoglandulosis. ♂ in lapidosis et umbrosis Galliae australis. — Fl. fr. 4. p. 274. — Clus. hist. 1. p. 49. n. 1. II et III. (v. v.)

§. 2. VIBURNASTRUM. — Viburnum et Opulus Tourn.

Bacca nuda.

2. V. LANTANA (L. sp. 384.) foliis cordatis serratis venosis subtus tomentosis. ♂ in dumetis id sepes. — Fl. fr. 4. p. 275. — Camer. epit. 122. ic. (v. v.)
3. V. OPULUS (L. sp. 384.) foliis glabris 3-lobis acuminato-dentatis, petiolis glandulosis. ♂ in nemoribus ad sepes. — Fl. fr. 4. p. 275. — Camer. epit. 977. ic. (v. v.)

Trib. III. CAPRIFOLIEÆ A. Rich. in dict. cl. l. c.

Calyx bracteis cinctus; stylus 1; stigma trilobum; corolla monopetala; bacca 2-4-locularis, loculis 2-∞-spermis.

V. LONICERA L. gen. n. 233.

Calyx 5-dentatus urceolatus; corolla tubulosa campanulata vel infundibuliformis 5-fida subinæqualis; stam. 5; bacca 2-3-locularis, loculis polyspermis.

Sect. I. CAPRIFOLIUM Linn. l. c.

Baccæ solitariæ; cor. tubulosa longa ringens.

1. L. BALEARICA (DC. fl. fr. 5. p. 499.) floribus verticillatis sessilibus terminalibus, corollis extus subglabris, foliis lanceolatis acuminatis persistentibus subtus glaucis, summis connato-perfoliatis. ♂ in agro Ruscinonensi usque ad Narbonam, Cousicâ (herb. DC.) et circâ Olbias et Massiliam reperi. (v. v. D.)
2. L. ETRUSCA (Santiviagg. 1. p. 113. t. 1.) floribus in capitula 3 pedicellata aggregatis, cor. extus pubescentibus, foliis subtus pubescentibus obovatis obtusissimis distinctis, summis subperfoliatis. ♂ frequens in sepibus et dumetis provinc. australiorum. — Fl. fr. 5. p. 499. (v. v. DC.)
3. L. CAPRIFOLIUM (L. sp. 246.) floribus verticillatis sessilibus terminalibus, cor. tubo extus pilosuscule, foliis glabris ovatis, summis connato-perfoliatis. ♂ ad sepes et vineas in Gallia australi. — Fl. fr. 4. p. 270. Lam. ill. t. 150. f. 1. (v. v.)
4. L. PERICYLLEMENUM (L. sp. 247.) floribus capitatis terminalibus, foliis omniibus distinctis. ♂ ad sepes et in nemoribus. — Fl. fr. 4. p. 270. Black. t. 25. (v. v.)

Sect. II. XYLOSTEUM Linn. l. c.

Baccæ geminæ aut connatæ; corolla infundibuliformis aut campanulata; pendunculi biflori.

* Baccæ distinctis.

5. L. XYLOSTEUM (L. sp. 248.) foliis ovatis acuminatis integerrimis pubescens, in umbrosis et sepibus. — Fl. fr. 4. p. 271. Duham. arb. 2. t. 54. (v. v.)
6. L. NIGRA (L. sp. 24.) bracteis calycinis subulatis calyce multo brevioribus, foliis ellipticis glabris integerrimis. ♂ in montibus Pyren. edit. ex cl. Benth.,

Arverniae, Galloprovinciæ, Delphinatûs, Jurassi. — Fl. fr. 4. p. 271. Jacq. austr. t. 214. (v. v.)

7. L. PYRENAICA (L. sp. 248.) foliis oblongo - obovatis glabris bracteis cal. lanceolatis calyce 2-3-plöve longioribus, floribus subregularibus. ♂ in montibus Galloprovinciæ? et Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 272. Duham. ed. 2. 1. p. 53. t. 15. (v. v. DC.)

*** *Baccis coadunatis.*

8. L. ALPIGENA (L. sp. 248.) ovariis liberis, baccis coadunatis, foliis ovato-lanceolatis acuminatis subhirsutis. ♂ in montibus. — Fl. fr. 4. p. 272. Duham. ed. 2. p. 54. t. 16. (v. v.)

9. L. CÆRULEA (L. sp. 249.) ovariis baccisque coadunatis, foliis ovatis obtusiculis, junioribus pubescentibus, antiquioribus glabris. ♂ in sylvis editioribus montium Galliæ ferè totius. — Fl. fr. 4. p. 272. Duham. ed. 2. 1. p. 54. t. 17. (v. v.)

VI. LINNÆA Gron. L. gen. 774.

Cal. 5-fidus, basi cinctus caliculo persistente 4-partito; cor. campanulata 5-loba; stam. 4, 2 breviora; bacca sicca ovata 3-locularis, loculis 2-spermis.

1. L. BOREALIS (L. sp. 880.) ♂ in Alsatiâ?, Cebennis ex Gotian? — Fl. fr. 4. p. 269. fl. lapp. t. 12. f. 4. Dubia civis. (v. s. ex Helv.)
-

Ordo LII. LORANTHEÆ Juss. et Rich. ann. mus. 12. p. 292.


Calyx ovario adhærens 1-sepalus sæpè basi bibracteatus limbo subintegro. Corolla nunc 1-petala plus minusve divisa, nunc polypetala petalis basi latioribus. Stamina corollæ lobis numero æqualia aut rariùs dupla illisque opposita. Stylus 1 aut nullus. Stigma 1. Bacca aut Capsula 1-locularis. Spermadermis membranacea. Semina albumine carnosò in parte superiori dehiscente impleta. Embryo cylindricus albumine longior. Radicula exserta infrà apicem coartata claviformis supera. — Frutices plerumque parasitici monodi, foliis oppositis rariùs alternis exstipulatis, floribus terminalibus axillariibus solitariis corymbosis aut spicatis.

I. VISCUM Tourn. 580. L. gen. n. 1105.

Dioicum. Calyx margine integro vix prominulo; petala 4 parva basi latiore juncta. *Masc.* Antheræ sessiles mediis petalis insertæ. *Fem.* Ovarium apice marginatum; stylus minimus, stigma capitatum, bacca parva non coronata 1-sperma.

1. V. ALBUM (L. sp. 1451.) foliis lanceolatis obtusis, caule dichotomo, spicis axillaribus. ♂ in truncis et ramis malorum, quercuum, ulmorum, pinorum, etc. — Fl. fr. 4. p. 273. ann. mus. t. 12. t. 27. (v. v.)

2. V. OXYCEDRI (DC. fl. fr. 4. p. 274.) aphyllum ramosum erectum carnosum hinc indè vaginulis obtectum. — In ramis Juniperi Oxycedri circa Narbonam reperiit Broussonet, sed ex eo in Galliâ nuspiam repertum. — Lob. ic. 2. p. 222. f. 2. (v. s. ex Hispan.)



Ordo LIII. RUBIACEÆ Juss. gen. 196.

Calyx monosepalus ovario adhærens, 4-5-rariūs 6-lobus. Corolla 1-petala regularis summo calycis tubo inserta, 4-5-rariūs 6-loba. Stamina corollæ inserta cum ejus lobis alterna, iisdem numero æqualia. Ovarium simplex. Stylus 1. Stigmata ovarii loculis numero æqualia. Fructus (in nostris) 2-locularis 2-spermus. Embryo rectus in albumine corneo; radicula infera; cotyledones foliaceæ. — Rubiaceæ nostræ herbæ radicibus rubescensibus, foliis integris verticillatis; floribus parvis rotatis aut tubulosis.

I. RUBIA L. gen. n. 127.

Corolla campanulato-patens 4-5-loba; stam. 4-5; baccæ 2 glabræ subrotundæ.

1. R. TINCTORUM (L. sp. 158.) foliis annuis quaternis senisve ovato-lanceolatis lanceolatis acutis subpetiolatis, corollæ lobis oblongis apice subcallosis, caule scaberrino. ♀ in arenosis Monspelii, Andegaviae, etc.; colitur in Galloprovinciam, Alsatiâ, etc. — Fl. fr. 4. p. 267. Mill. dict. n° 1. t. 1. (v. v.)
2. R. PEREGRINA (L. sp. 158.) foliis perennantibus 4-6-nis lanceolatis acutis sessilibus, superioribus sèpiùs obcordatis, corollæ lobis mucronato-aristatis, caule scabro. ♀ in Gallia australi et occidentali. — Fl. fr. 4. p. 267. — Moris. s. 9. t. 21. n. 2. (v. v.)
3. R. LUCIDA (L. syst. nat. 12. p. 732.) foliis perennantibus quaternis lanceolatis lucidis, inferioribus sèpiùs obcordatis mucronatis, corollæ lobis lanceolatis aristatis caule lèviusculo. ♀ circâ Parisios? in Galloprovinciam, Occitaniâ, agro Ruscinonensi. — Fl. fr. 4. p. 268. (v. v. DC.)
4. R. REQUIENII (Duby mss.) foliis perennantibus senis octonisve linearibus angustis acuminatis sessilibus, corollæ lobis ovali-lanceolatis aristatis, caule scabro. ♀ in Corsicâ circâ Bonifacio reperiit cl. Requier. (v. s.)

II. VAILLANTIA Tourn. a. g. 1706. t. 3. L. gen. 1151.

Corolla campanulata 3-4-fida, fructus florum ternorum calycibus demùm basi coadunatis et limbo dilatatis tricornis.

1. V. MURALIS (L. sp. 1490.) glabra, foliis quaternis, floribus ternis polygamis, centrali fertili 4-fido, lateralibus sterilibus 3-fidis. (1) ad rupes et muros in regione Olearum. — Fl. fr. 4. p. 266. 5. p. 499. — Mich. gen. p. 13. t. 7. (v. v.)

III. GALIUM Scop. ed. 2. 1. p. 99. All. — Galii et Valantiæ sp. L.

Corolla rotata aut campanulata 4-fida; fructus calyce non coronatus.

§. 1. Fructu glabro non tuberculoso.

* Floribus luteis.

1. G. CRUCIATA (Scop. carn. 1. p. 100.) foliis quaternis trinerviis hirsutis subaeutis, floribus polygamis 4-fidis, pedunculis diphyllis. ♀ ad sepes et vias. — Fl. fr. 4. p. 250. — Lob. ic. t. 804. f. 2. (v. v.)
2. G. VERNUM (Scop. carn. ed. 2. n. 144.) foliis quaternis subrigidis trinerviis ciliatis obtusissimis, floribus polygamis 4-fidis, pedunculis dichotom

aphyllis. ♂ in montosis umbrosis Pyrenæorum, Occitaniae et circâ Dax. — Fl. fr. 4. p. 350.

α. *Bauhini*, foliis ovatis confertis, floribus luteis. — Scop. l. c. t. 2. G. *Bauhini* Röm. et Sch. 3. p. 218. *Vaillantia crebrifolia* St.-Am. ag. p. 424. (v. v.)

β. *Halleri*, fol. lanceolatis distantibus, flor. pallidioribus. — G. *Halleri* Röm. et Sch. 3. p. 218. (v. s.)

3. G. *ARENARIUM* (Lois. fl. 85.) foliis suboctonis oblongis crassiſculis glabris margine subrevolutis, pedicellis trifidis, caule ramosissimo prostrato. ♀ in arenis maritimis à Bayona ad Venetam Armoraciæ. — Fl. fr. 5. p. 495. G. *megalospermum*. β Fl. fr. 4. p. 249. (v. v.)

4. G. *VERUM* (L. sp. 155.) foliis suboctonis linearibus sulcatis, ramis floriferis brevibus, caule in parte superiori erecto. ♀ in pratis, ad spes et vias. — Fl. fr. 4. p. 248. — Cam. epit. 368. ie. (v. v.)

** *Floribus rubris.*

5. G. *PURPUREUM* (L. sp. 156.) fol. 6-10-nis linear-setaceis, floribus subterminalibus, pedunculis brevissimis, pedicellis sub-1-floris. ♀ in Galloprovinciâ et circâ Nicæam. — G. *rubrum* Fl. fr. 4. p. 251. — J. Bauh. hist. 3. p. 721. f. 2. (v. v. in Italiâ.)

6. G. *RUBRUM* (L. sp. 156.) fol. 6-8-nis inferioribus lanceolatis, superioribus linear-lanceolatis linearibusve, pedunculis ramosis capillaribus folio longioribus, pedicellis multifloris. ♀ circâ Nicæam. — G. *purpureum* Fl. fr. 4. p. 251. — Clus. hist. 2. p. 175. f. 1. (v. v. DC.)

β. *pilosum*, caule basi piloso. — G. *purpureum* β Fl. fr. 5. p. 446. Circâ Mimatem reperiit Prost. (v. s.)

*** *Floribus albis.*

G. *CAMPESTRE* (Schousb. ex Wild. hort. ber. 1. p. 152.) foliis glaberrimis, infimis quaternis ovatis acutis, superioribus senis linear-ellipticis acuminate, caule decumbente tetragono. — In Corsicæ montibus reperiit Ph. Thomas — Flores siccii lutei, an vivi ochroleuci? (v. s.)

8. G. *DIVARICATUM* (Lam. dict. 2. p. 580.) foliis subseptenis linearibus mucronatis (oculo armato) hispido-ciliatis, caule superne ramis capillaribus dichotomis et divaricatis pauciculato. (I) in arenosis et lapidosis provinciarum australiorum. — Fl. fr. 4. p. 259. ic. rar. t. 24. G. *tenui* Vill. 2. p. 322. t. 7. An à sequente satis diversum? (v. s.)

9. G. *ANGLICUM* (Huds. ang. 69.) foliis subsenis linearilanceolatis mucronatis margine cauleque scabris, floribus paniculatis terminalibus, pedunculis 2-aut 3-fidis. (I) in siccis lapidosis vel arenosis. — Fl. fr. 4. p. 258. — Ray syn. t. 9. f. 1. (v. v.)

10. G. *PYRENATICUM* (Lin. fil. sup. 121.) foliis senis linearibus acutissimis erectis nitidulis basi tumidis, floribus axillaris solitariis foliis brevioribus. ♀ in Pyrenæis præsertim orientalibus. — Fl. fr. 4. p. 260. Cou. ill. 5. t. 1. f. 4. (v. v.)


11. G. *PUMILUM* (Lam. dict. 2. p. 580.) foliis subseptenis linearibus subtus bisulcatis lœvibus acutissimis basi tumidis, floribus subterminalibus subumbellatis foliis longioribus. ♀ in saxosis Pyrenæorum præsertim centralium, montis Ventosi, montium Lugduni et Delphinatûs. — Fl. fr. 4. p. 260. Lam. ill. t. 60. f. 2.


α. *hypnoides*, pedunculis 2-3 floris. — G. *hypnoides* Vill. 2. p. 323. (v. v.)


β. *cespitosum*, ped. 1-floris. — G. *cespitosum* Lam. ill. 1369. (v. v.)


γ. *pubescens*. — Circâ Vallem-clausam et Massiliam. — G. *pusillum* L. sp. 154. (v. s.)

12. G. *LÆVE* (Thuil. fl. par. ed. 2. p. 77.) foliis subseptenis planis linearilanceolatis margine lœvibus mucronatis glabris, floribus subumbellatis, caulinibus gla-









- bris diffusis ascendentibus. ♀ in pascuis montosis et sylvis siccis. — Fl. fr. 4. p. 256. (v. v.)
13. G. SUPINUM. (Lam. fl. fr. 3. p. 379.) foliis subsenis linear-lanceolatis mucronatis subasperis, caulis prostratis ramosissimis, paniculâ 3-fidâ 3-chotomâ. ♀ in aridis et lapidosis. — Fl. fr. 4. p. 259. — Juss. ac. par. 1714. t. 15. f. 2. An satis distincta sp? (v. s.)
14. G. MUCRONATUM (Lam. dict. 2. p. 581.) foliis suboctonis scabris mucronatis, superioribus linearibus, inferioribus ovato-lanceolatis, pedunculis ramosis, pedicellis patulis, paniculâ divaricatâ, corollæ lobis acuminato-setaceis, caule ascendentè infernè hirtò supernè glabro. ♀ in Pyrenæis, Delphinatû. — Fl. fr. 4. p. 258. G. obliquum Vill. dauph. 2. t. 8. Valdè var. sequentis affine. (v. s.)
15. G. BOCCONI (All. ped. 24.) foliis senis octonis denisive asperis mucronatis, inferioribus pubescentibus, pedunculis sub-3-chotomis, caulis 4-gonis prostratis. ♀ In montosis et umbrosis. — Fl. fr. 4. p. 257.
- a.* nitidulum, floribus majoribus, pedicellis erectis, paniculâ coarctatâ. — G. nitidulum Thuil. ed. 2. 1. p. 76. Circà Parisios, Stampas, in Arvernæ montibus et Pyrenæis. (v. s.)
- b.* micranthum, flor. minimis, pedicellis patulis, paniculâ divaricatâ. In Galloprovinciâ et circâ Nicæam, in Pyrenæis reperi. — Bocc. mus. p. 145. t. 101 (v. v. D.)
16. G. GLAUCUM (L. sp. 156.) foliis senis octonis subtus glancis linearibus submucronatis margine revolutis scabris glabris, floribus subcorymbosis, pedunculis dichotonis pedicellis erectis, paniculâ coarctatâ, caule lœvi glabro subteret ascendente. ♀ in lapidosis umbrosis Delphinatû, Galloprovinciæ, Occitanie, agri Rasicnonensis. — Fl. fr. 4. p. 252. G. campauulatum Vill. dauph. 2. p. 326. t. 7. (v. v.)
17. G. TENUIFOLIUM (All. ped. 23.) foliis senis linearibus rigidis sulcatis acutissimis luciis retrosum scabris, floribus paniculatis pedicellis 3-chotomis, caule sublignoso ramoso rigido 4-gono lœvi. ♀ in provinciis australibus usquè ad Lugdunum. — Fl. fr. 4. p. 256. (v. v.)
18. G. LINIFOLIUM (Lam. dict. 2. p. 578.) foliis lanceolato-linearibus glaberrimis subtus glaucis acuminatis margine lœvibus inferioribus octonis, pedunculis paniculatis capillaris, caule tereti. ♀ in umbrosis Delphinatû, Galloprovinciæ et Corsicæ (Th. Thomas.) — Fl. fr. 4. p. 252. G. atrovirens Lapeyr. ex Benth. — Barr. ic. t. 356 et 583. (v. v.)
19. G. SYLVATICUM (L. sp. 155.) foliis ellipticis mucronatis lœvibus subtus scabris inferioribus octonis, pedunculis capillaris, caule lœvi ramosissimo tereti. ♀ in Alsatiâ, Delphinatû, agro Andegaviensi, Parisiensi. — Fl. fr. 4. p. 252. (v. v.)
20. G. ERECTUM (Huds. ang. 68.) foliis senis octonis linear-lanceolatis margine aculeato-serrulatis mucronatis, paniculâ 3-chotomis, corollæ lobis acutis, caule lœviusculo flaccido. ♀ in pratis humidis montosis Pyrenæorum, Galloprovinciæ, Delphinatû. — Fl. fr. 4. p. 255. eng. bot. t. 2067. An satis distincta sp? (v. v. DC.)
21. G. MOLLUGO (L. sp. 155.) foliis octonis ovatis lanceolatis subtus subserratis patentissimis mucronatis, corollæ lobis acutis, caule flaccido anguloso ramoso, ramis patentibus. ♀ ad sepes et vias humidas frequens. — Fl. fr. 4. p. 254. Bull. herb. t. 283. (v. v.)
- f.* aristatum, corollis acutiusculis. — G. aristatum L. sp. 152. Fl. fr. 4. p. 255. — Bar. ic. 356. Pro ipso G. Mollugine habet cl. Requier in herb. DC. (v. s.)
22. G. PALUSTRE (L. sp. 153.) foliis quaternis senis obtusis inæqualibus glabris, inferioribus obovatis, superioribus lanceolatis, caule diffuso 4-gono lœviusculo. ♀ in humidis. — Fl. fr. 4. p. 254. fl. dan. t. 423. (v. v.)


- β. constrictum*, foliis linearibus. — G. constrictum Chaub in S. Am. fl. ag. bouq. t. 2. (v. s.)
23. G. ULIGINOSUM (L. sp. 153.) foliis senis lanceolatis retrorsum serrato-acuteatis mucronatis rigidis, caulis angulis aculeato-scabris. \mathcal{U} in turfosis paludosis circâ Hunningam, Parisios et in Arverniâ. — Fl. fr. 4. p. 259. eng. bot. t. 1972. An à priori satis distinctum? (v. s.)
24. G. VILLARSI (Req. in Guer. vacu. ed. 2. p. 250.) foliis senis linearibus glabris subacutis, caule ramosissimo procumbente, corollis obtusis, fructibus grossis sphæricis. \mathcal{U} in saxosis Delphinatûs, montis Ventosi et Pyrenæorum. — Fl. fr. 5. p. 497. G. megalospermum Vill. 2. p. 319. non All. G. cometerhizon La Peyr. ab. supp. 23. (v. s.)
25. G. SAXATILE (L. sp. 154.) foliis senis obovatis obtusis cilatis, caule ramosissimo procumbente. \mathcal{U} in saxosis editiorum Pyrenæorum et Delphinatûs. — Fl. fr. 4. p. 261. — Juss. acad. par. 1714. t. 15. f. 1. (v. r.)

§. 2. *Fructu glabro tuberculoso.*

26. G. HARCYNICUM (Weig. obs. p. 25.) foliis quaternis seniis lanceolato-obovatis acuminatis, caule procumbente, ramis confertis elongatis, pedunculis multifloris. \mathcal{U} in montosis. — Fl. fr. 4. p. 261. ic. rar. t. 25. (v. s.)
27. G. SPURIUM (L. sp. 154.) foliis senis lanceolatis carinatis scabris retrorsum acuteatis, pedunculis multifloris, fructiferis vix recurvis olio longioribus. (1) in locis cultis frequens. — Fl. fr. 4. p. 262. (v. v.)
28. G. TRICORNE (With. brit. ed. 2. p. 153.) foliis suboctonis lanceolatis margine retrorsum acuteatis, pedunculis folio brevioribus triflois, fructibus grossis nutantibus. (1) in arvis et locis cultis frequens. — Fl. fr. 4. p. 262. — Vill. bot. 14. n. 2. t. 1. f. 3. aa. (v. v.)
29. G. SACCHARATUM (All. ped. 39.) foliis subseptenis linear-lanceolatis margine antrosüm acuteo-scabris, floribus polygamis, pedunculis apice 3-floris, fructibus in pedunculo communi breviter pedunculatis. (1) in locis cultis. — Fl. fr. 4. p. 262. — Vaill. bot. p. 14. t. 4. f. 3. b. (v. v.)

§. 3. *Fructu hispido.*

30. G. MURALE (All. ped. t. 77. f. 1.) foliis inferioribus senis subreflexis, mediis quaternis, summis binis linearibus patulis, floribus verticillatis subsessilibus, fructibus linear-ovoideis reflexis. (1) ad muros et in serilibus Galliæ australioris. — Fl. fr. 4. p. 264. G. minimum Röm. et Schulz. (v. v. DC.)
31. G. VERTICILLATUM (Lam. dict. 2. p. 585.) foliis lancedatis pubescentibus reflexis, inferioribus senis, mediis quaternis, summis oppositis, floribus verticillatis sessilibus, fructibus globosis erectis. (1) in Galloprovinciâ circâ Arelatem, Vallem-clausam, Salun et ad radices montis Ventosi, in Occitanâ et agro Ruscinonensi ex Benth. — Fl. fr. 5. p. 498. Lois. not. 33. t. 2. G. verticilliflorum Pourr. (v. s.)
32. G. LITIGIOSUM (DC. fl. fr. 4. p. 263.) foliis quaternis seniis linearibus erectis acuminatis glabris, pedunculis divaricatis capillaris sub 3-chotomis. (1) in locis siccis, ad muros et vias provinciarum australiorum. — Ic. rar. t. 26. G. Parisiense L. sp. 157. (v. v.)
33. G. SETACEUM (Lam. dict. 2. p. 584.) foliis subsenii linear-setaceis erectis obtusiusculis (oculo armato) hispidulis, caule erecto filiformi apice ramoso, fructu subgloboso hispidissimo. (1) in aridis Galloprovinciæ australis. — Fl. fr. 5. p. 498. G. capillare Cav. ic. t. 191. f. 1. (v. s.)
34. G. MARITIMUM (L. mant. 38.) foliis verticillatis lanceolato-ovatis villosis senis quaternis et binis, pedunculis unifloris, caule basi repente hirto, geniculis glabris aut villosis. \mathcal{U} in agro Ruscinonensi, Monspeliensi, Nicæensi? — Fl. fr. 4. p. 263. — Barr. ic. t. 81. (v. v.)
35. G. APARINE (L. sp. 157.) foliis octonis lanceolatis carinis scabris retrorsum



aculeatis, fructuum pilis uncinatis. (I) in arvis, ad sepes et vineas. — Bull. herb. t. 315.

a. vulgaris, caule ramoso, geniculis villosis. — Fl. fr. 4. p. 263. (v. v.)

β. Vaillantii, caule simpliciusculo, geniculis subvillosis. — G. Vaillantii Fl. fr. 4. p. 263. — Vaill. bot. n. 1. t. 4. f. 4. (v. v.)

36. *G. BOREALE* (DC. fl. fr. 5. p. 498.) foliis quaternis lanceolatis trinerviis glabris obtusis, caule erecto, fructibus subsquamosis. $\frac{1}{2}$ in montosis et lapidosis, ad sepes et in humidis.

α. glabrum, fructibus glabris. — G. rubioides β Fl. fr. 4. p. 253. G. orbibracteatum Chamb. in S.-Am. fl. ag. t. 1. (v. v.)

β. scabrum, fructibus subscabris. — Fl. Dan. t. 1024. (v. s.)

γ. hispidum, fructibus hispidis. — G. boreale L. sp. 156. Fl. fr. 4. p. 265. (v. s.)

37. *G. BARRELIERI* (Salzm. in bot. zeit. 1821. p. 107.) foliis quaternis ovatis 3-nerviis cauleque erecto hirsutis, paniculâ ramosissimâ, fruct. hispidis. $\frac{1}{2}$ in Corsicæ collibus umbrosis. — Barr. ic. 324. (v. s.)

38. *G. ROTUNDIFOLIUM* (L. sp. 156.) foliis quaternis subrotundo-ovatis trinerviis hispido - ciliatis, caule decumbente glabro, fructibus hispidis. $\frac{1}{2}$ in sylvis umbrosis montium. — Fl. fr. 4. p. 266. — Barr. ic. 323. (v. v.)

IV. ASPERULA L. gen. n. 121.

Corolla infundibuliformis 3-vel sæpius 4-fida; baccæ 2 siccæ calycis limbo non coronatae.

1. *A. LÆVIGATA* (L. mant. 38.) foliis quaternis ellipticis uninerviis lævibus, fructibus scabris. $\frac{1}{2}$ in montibus Lugdunensibus? circâ Narbonam et Argentoratum? et in Corsicâ. — Fl. fr. 4. p. 246. Facies Galii rotundifolii sed corolla infundibuliformis et fructus glabri. (v. s.)

2. *A. TAURINA* (L. sp. 150.) foliis quaternis ovato-lanceolatis trinerviis, floribus polygamis fasciculatis vel verticillatis terminalibus. $\frac{1}{2}$ in montosis et umbrosis Delphinatûs, Monspelii. — Fl. fr. 4. p. 245. — Lob. ic. t. 800. f. 1. (v. v. c.)

3. *A. ODORATA* (L. sp. 150.) foliis octonis lanceolatis, florum fasciculis pedunculatis, fructibus hirsutis. $\frac{1}{2}$ in sylvis et umbrosis. — Fl. fr. 4. p. 245. — Lob. ic. t. 801. f. 1. (v. v.)

4. *A. HIRTA* (Ram. bull. phil. n. 41. p. 131. t. 9. f. 1. 2. 3.) foliis senis hirtis acutis internodio longioribus, floribus terminalibus aggregatis sessilibus bracteas superantibus. $\frac{1}{2}$ in saxosis editiorum Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 244. Fructus glabi. (v. v.)

5. *A. CYNANCHICA* (L. sp. 151.) foliis quaternis, infimis sæpius lanceolato-ovatis, mediis linearibus, superioribus oppositis, floribus 4-fidis, paniculâ contractâ. $\frac{1}{2}$ in collibus lapidosis et pratis aridis. — Fl. fr. 4. p. 246. 5. p. 495. Admodum in decumbentiâ variabilis. (v. v.)

6. *A. TINTORIA* (L. sp. 150.) foliis omnibus linearibus, inferioribus senis, intermediis quaternis, superioribus oppositis, floribus umbellatis distinctius petiolatis sæpius 3-fidis, paniculâ laxiusculâ. $\frac{1}{2}$ in collibus aridis et lapidosis. — Fl. fr. 4. p. 245. — Tab. ic. t. 733. f. 1. Praecedenti nimium affinis. (v. v.)

7. *A. ARVENSIS* (L. sp. 150.) foliis senis vel octonis obtusis glabris, floribus terminalibus sessilibus aggregatis, bracteis ciliatis. (I) in arvis. — Fl. fr. 4. p. 245. — Lob. ic. t. 801. f. 2. (v. v.)

V. SHERARDIA Gærtn. t. p. 110. t. 24. DC. fl. fr. 4. p. 243.

Corolla infundibuliformis 4-fida; fructus calycinis dentibus persistentibus et accretis coronatus.

1. *S. ARVENSIS* (L. sp. 149.) foliis senis acutis hispidis, floribus sessilibus terminalibus umbellatis, bracteis glabris. (I) in arvis. — Fl. fr. 4. p. 243. Lam. ill. t. 61. (v. v.)

VI. CRUCIANELLA L. gen. n. 126.

Corolla infundibuliformis, tubo gracili, limbo brevi 4-5-fido; calycis laciniæ 2 oppositæ profunda; fructus calyce non coronatus.

1. C. MARITIMA (L. sp. 158.) procumbens suffruticosa, foliis quaternis mucronatis, floribus oppositis 5-fidis. ♂ in sabulosis maritimis Galloprovinciae et Occitanie. — Fl. fr. 4. p. 248. — Barr. ic. t. 355. (v. v.)
 2. C. LATIFOLIA (L. sp. 158.) procumbens, foliis quaternis lanceolatis, floribus spicatis. (I) in siccis et sterilibus Nicæe, Galloprovinciae, Occitanie. — Fl. fr. 4. p. 247. — Barr. ic. t. 520 et 549. (v. v.)
 3. C. MONSPELIACA (L. sp. 158.) ramis procumbentibus erective, foliis acutis, caulinis quaternis ovatis, rameis quinque linearibus, floribus spicatis. (I) in sabulosis circâ Nicæam, Massiliam, Monspelium, Montem-Albanum, Viennam. — Fl. fr. 4. p. 247. An à præcedente diversa? (v. s.)
 4. C. ANGUSTIFOLIA (L. sp. 157.) erecta, foliis senis linearibus, floribus spicatis. (I) in siccis arenosis et lapidosis Galliae australis. — Fl. fr. 4. p. 247. — Barr. ic. t. 550. (v. v.)
-


Ordo LIV. VALERIANEÆ DC. fl. fr. ed. 3. t. 4. p. 232.
Duf. val. mon. 56.

Calyx 1-sepalus ovario adhærens, limbo nunc papposo intus revoluto, nunc dentato erecto. Corolla 1-petala tubulosa, apici ovarii inserta, 3-5-loba, interdùm inæqualis aut calcarata. Stamina 1-5 tubo corollæ inserta; Stylus 1. Stigmata 1-3. Capsula non dehiscens 1-3-locularis, ioculis 1-spermis, 2 sœpissimè abortivis. Albumen o; Embryo rectus; radicula supera. — Herbæ oppositifoliæ, floribus corymbosis, paniculatis aut subcapitatis.

I. VALERIANELLA Tourn. inst. 1. p. 132. Duf. val. p. 56.

Corolla regularis 5-loba ecalcarata; stam. 3; capsula 3-locularis, limbo calycis recto nec involuto coronata.

1. V. OLITORIA (Mœnch. meth. 493.) caule debili, foliis lanceolatis integerimis, capsulâ nudâ globoso-compressâ. (I) in cultis ad vineas et agros. — Fl. fr. 4. p. 240. — Moris. 3. s. 7. t. 16. n. 36. (v. v.)
2. V. CARINATA (Lois. not. 149.) caule debili, foliis oblongis integris, capsulâ oblongâ glabratâ edentulâ rimoso-carinatâ. (I) inter segetes. — Fl. fr. 5. p. 492. Duf. val. t. 2. Præcedentis varietas? (v. v.)
3. V. PUMILA (DC. fl. fr. 4. p. 242.) caule glabriusculo, foliis inferioribus dentatis, summis linearibus multifidis, bracteis ciliatis, capsula turgidâ glabratâ lœvi breviter 3-dentatâ. (I) in Occitanie et Galloprovincia. — Fl. fr. 5. p. 494. — Moris. 3. s. 7. t. 16. n. 37. (v. v. DC.)
4. V. DENTATA (DC. fl. fr. 4. p. 241.) caule glabro, foliis inferioribus lanceolatis integris, superioribus irregulariter basi dentatis, bracteis glabris, capsulâ glabra ovatâ dentibus 3-5 inæqualibus uno aliis longiore coronatâ. (I) inter segetes. — Duf. val. t. 3. n. 5. — Moris. 3. s. 7. t. 16. n. 32. (v. v. DC.)
5. V. AURICULA (DC. fl. fr. 5. p. 492.) caule erecto glabro, foliis inferioribus lan-





- ceolatis integris, superioribus irregulariter basi dentatis, bracteis glabris, capsulâ oblongâ glabrâ dente unico erecto acuto basi concavo coronatâ. (I) Monspelii. — Hanc valdè suspicor tantum varietatem præcedentis esse. (v. s.)
6. *V. MIXTA* (Duf. val. 58 t. 3. f. 6.) caule anguloso, foliis integris, bracteis subciliatis, capsulâ minimâ ovatâ villosâ 3-4-denticulatâ. (I) in arvis Andegaviae, Occitaniae et Galloprovinciae. — Fl. fr. 5. p. 492. — Moris. 3. s. 7. t. 16. n. 35. (v. s.)
 7. *V. ERIOCARPA* (Desv. journ. 2. p. 314. ic.) caule angulato, foliis inferioribus oblongo-spathulatis, summis linearibus, bracteis glabris, capsulâ ovatâ angulosâ hirtâ irregulariter 6-dentatâ. (I) inter segetes ex Aureliâ usque ad Galloprovinciam. — Fl. fr. 5. p. 493. Duf. val. t. 3. n. 4. — Moris. 3. s. 7. t. 16. n. 33. Staturâ admodum variabilis; fclia intermedia aliquando basi-dentata. (v. s.)
 8. *V. ECHINATA* (DC. fl. fr. 4. p. 242.) caule glabro, foliis dentatis, capsulâ linearî 3-dentatâ, dente extimo majore recurvato. (I) in arvis Galliae australis, in Limaniâ Arverniæ. — Duf. val. t. 3. f. 10. — Moris. 3. s. 7. t. 16. n. 28. (v. s.)
 9. *V. HAMATA* (DC. fl. fr. 5. p. 494.) foliis linearibus, bracteis ciliatis, capsulâ pubescente obovatâ angulatâ, limbo 6-dentato dentibus linearî-subulatis hamatis. (I) Andegaviae. (v. s.)
 10. *V. DISCOIDEA* (Löis. not. 148.) caule glabro, foliis integris dentatisve, capsulâ villosâ coronatâ limbo patente 6-12-radiato, dentibus lanceolatis setaceo-hamatis. (I) inter segetes Galloprovinciae, Occitaniae. — Fl. fr. 5. p. 493. Duf. val. t. 3. f. 3. — Moris. 3. s. 7. t. 16. n. 29. In speciminibus examini subjectis, capsula semper 6-dentata. An notæ characteristicæ satis constantes ad hanc speciem à sequenti rite sejungendum? (v. s.)
 11. *V. CORONATA* (DC. fl. fr. 4. p. 241.) caule pubescente, foliis dentatis lobatisve, superioribus 3-5-partitis, capsulâ villosâ limbo campanulato 6-10-radiato, dentibus setaceo-hamatis. (I) in arvis ex Aureliâ ad Nicæam. — Duf. val. p. 60. t. 3. f. 2. — Moris. 3. s. 7. t. 16. n. 30. (v. s.)
 12. *V. VESICARIA* (Mœnch. meth. 493.) caule subviloso, foliis dentatis, superioribus lobatis, capsulâ ovatâ villosâ limbo calycis vesicario coronatâ. (I) circâ Nions in Delphinatû et Bourbonne-les-Bains ex Vill., propè Beauvais (el. Graves). — Fl. fr. 4. p. 241. Duf. val. t. 3. f. 9. — Boerh. lugd. 1. t. 75. (v. s.)

II. FEDIA Mœnch. meth. p. 486. Duf. val. p. 54.

Corolla irregularis, vix 2-labiata ecalcarata; stamina 2; capsula 3-locularis, limbo calycis recto nec involuto coronata.

1. *F. CORNUCOPLIA* (Gertn. fruct. 2. t. 86. f. 3.) foliis ovato-obtusis sessilibus subintegris. (I) circâ Nicæam ex All. — Fl. fr. 4. p. 240. — Moris. 3. s. 7. t. 16. n. 27. (v. s. ex. Ital.)

III. CENTRANTHUS DC. fl. fr. 4. p. 238. — Valerianæ sp. L.

Corolla 5-loba regularis calcarea; stamen 1; capsula 1-locularis limbo calycis in pappum plumosum evolutu coronata.

1. *C. LATIFOLIUS* (Duf. val. p. 38.) foliis ovato-lanceolatis. 2/ in lapidosis et maritimis Galliae australis. — *C. ruber* Fl. fr. 4. p. 239. — Moris. 3. s. 7. t. 14. n. 15. Variat floribus albis rubrisve. (v. v.)
2. *C. ANGSTIFOLIUS* (DC. fl. fr. 4. p. 239.) foliis linearibus. 2/ in saxosis montium Galliae orientalis australisque. — Moris. 3. s. 7. t. 14. n. 16. (v. v.)
3. *C. CALCITRAPA* (Duf. val. 39.) foliis superioribus pinnatifidis. (I) in saxosis Galliae australis. — Fl. fr. 5. p. 492. *Valeriana Calcitrapa* Fl. fr. 4. p. 238. — Clus. hist. 2. p. 54. f. 2. (v. v.)

IV. VALERIANA Neck. et. t. p. 123. DC. fl. fr. 4. 233.

Corolla 5-loba regularis ecalcarata ; stamina 3; cætera ut in Centranthro.

1. *V. OFFICINALIS* (L. sp. 45.) caule sulcato, foliis omnibus pinnatis, pinnis dentatis. ♀ in humidis et sylvis. — Fl. fr. 4. p. 233. — Lob. ic. t. 715. f. 1. (v. v.)
2. *V. PHU* (L. sp. 45.) caule glabro erecto, foliis radicalibus ovatis lanceolatis petiolatis integris obtusis, caulinis pinnatis, lobis inæqualibus lanceolatis acutis. ♀ in montibus Alsatiæ? circa Aginnum ex St.-An. et Burdigalam ex Later. — Fl. fr. 4. p. 234. — Lob. ic. t. 714. f. 2. (v. v. c.)
3. *V. TRIPTERIS* (L. sp. 45.) caule glabro erecto, foliis petiolaris obtusis fæqualiter crenato-sinuatis dentatisve, radicalibus cordatis, caulinis ternatis ovato-oblongis, foliolis lateralibus lanceolatis. ♀ in montibus et Alpibus. — Fl. fr. 4. p. 234. — Moris. 3. s. 7. t. 14. n. 10. (v. s.)
4. *V. PYRENAICA* (L. sp. 46.) caule striato, foliis cordatis inæqualiter dentatis, inferioribus simplicibus, superioribus ternatis pinnatisque, foliolo terminali maximo. ♀ in umbrosis Pyrenæorum et montium Velañorū propè Charentsac ex Arnaud. — Fl. fr. 4. p. 234. (v. v.)
5. *V. dioica* (L. sp. 44.) caule glabro erecto, foliis obtusis, radicalibus spathulato-ovatis integris subcordatis petiolatis, caulinis pinnatifidis lobis inæqualibus, floribus dioicis. ♀ in paludosis et pratis humidis. — Fl. fr. 4. p. 238. — Lob. ic. t. 715. f. 2. (v. v.)
6. *V. TUBEROSA* (L. sp. 46.) caule glabro erecto, foliis radicalibus lanceolato-oblongis in petiolum subdecurrentibus integris obtusis, caulinis summisque pinnatifidis, lobis linearibus. ♀ in montosis Galliæ australis. — Fl. fr. 4. p. 235. — Moris. 3. s. 7. t. 15. n. 20 et 21. (v. v. DC.)
7. *V. GLOBULARIÆFOLIA* (DC. fl. fr. 4. p. 236.) caule glabro subprocumbente, foliis radicalibus ovatis petiolatis integris obtusis, infimis caulinisque pinnatifidis lobis oblongo-linearibus, summis linearibus. ♀ in saxosis editiorum Pyrenæorum. — *V. heterophylla* Lois. gall. 21. t. 2. *V. glauca* Lapeyr. abr. 19. (v. v.)
8. *V. MONTANA* (L. sp. 45.) caule erecto, foliis oblongis subdentatis, imis obtusis, summis acutis, floribus paniculatis. ♀ in montibus. — Fl. fr. 4. p. 235. — Moris. 3. s. 7. t. 15. n. 11. (v. v.)
9. *V. SALIUNCA* (All. ped. n. 9. t. 10. f. 2.) foliis spathulato-oblongis integris obtusis glaberrimis, caulinis lanceolato-linearibus, floribus umbellato-capitatis. ♀ in saxosis Alpium et Delphinatū. — Fl. fr. 5. p. 492. *V. supina* Fl. fr. 4. p. 237. (v. v. in Helvetiâ.)
10. *V. SAXATILIS* (L. sp. 46.) caule recto, foliis indivisis, radicalibus ellipticis trinerviis ciliatis subdentatis petiolatis, caulinis linearilanceolatis sessilibus. ♀ circâ Nicæam ex All., in Pyrenæis ex Lapeyr. — Fl. fr. 4. p. 237. — Moris. 3. s. 7. t. 14. n. 14. (v. v. D. in Italiâ.)
11. *V. CELTICA* (L. sp. 46.) caule glabro ascendente, foliis integerrimis obtusis, radicalibus cuneato-oblongis, caulinis linearibus, floribus verticillato-racemosis. ♀ in saxosis Alpium Delphinatū. — Fl. fr. 4. p. 236. Jacq. coll. 1. p. 24. t. 1. (v. s. ex Helv.)

lubricate n. v.

+ overvur
+ yfretkis

**Ordo LV. DIPSACEÆ Juss. gen. 194. excl. Allionia et s. 2.
Coulter mem. sur les Dips. in mem. soc. gen. t. 2. 1. pars p. 13.**

Calyx (internus) adhærens, limbus pappiformis varie divisus. Corolla 1-petala tubulosa supera calyci inserta, limbo obliquo 4-5-fido; aestivatione cochleari. Stamina definita saepissimè 4-5 distincta corollæ adnata, nervisque ejusdem alternantia. Stylus 1. Ovarium 1-loculare, ovulo unico ex apice loculi pendulo. Akenium limbo calycis accreto coronatum. Embryonis recti albumineque carnoso tecti radicula supera. Involucellum (calyx externus) 1-phyllum saepissimè 4-8-foveolatum, fructum arctè cingens. — Herbæ aut suffrutices, foliis oppositis verticillatis. Flores in receptaculo communi aggregati, involucro polyphyllo cincti.

I. SCABIOSA Coul. l. c. p. 33. — Scabiosæ sp. L.

Calycis limbus setis 5 hinc indè abortientibus munitus; corolla 4-sæpius 5-loba; involucellum 8-foveolatum sæpius subcylindricum.

Sect. I. ASTEROCEPHALUS Coul. l. c.

Involucelli basis teres nec plicata.

1. S. GRAMINIFOLIA (L. sp. 145.) involucelli basi elongatæ foveolis linearibus æqualibus, coronæ (1) patulæ involucelli basi vix æquali, nervis 24, calycis limbi pedunculati setis coronæ æqualibus, foliis linearibus integrerrimis holosericeis. 2/4 in montibus Galloprovinciæ, Delphinatus. — Fl. fr. 4. p. 232. — Moris. 3. s. 6. t. 15. n. 36. Fl. cœrulecentes. (v. v. D. in Italiam.)
2. S. STELLATA (L. sp. 144.) involucelli basi elongatæ foveolis obovatis æqualibus, coronæ patulæ basi duplò longioris nervis 40, calycis limbi pedunculati setis discum versus incrassatis coronæ æqualibus at ratione pedicelli exsertis, foliis dissectis. (1) in maritimis Occitanie, Galloprovinciæ, Niceæ. — Fl. fr. 4. p. 231. — Clas. hist. 2. p. 1. ic. 1. (v. v.)
£. simplex, caulinus subuniflorus, foliis sæpius pinnatifidis. — S. simplex Fl. fr. 4. p. 231. Desf. atl. t. 39. f. 1. (v. s.)
3. S. MONSPELIENSIS (Jacq. misc. 2. p. 320.) involucelli basi vix elongatæ foveolis linearibus apertis æquali, coronæ basi duplò longioris nervis 32-36, calycis limbi pedunculati setis longè exsertis, foliis dissectis. (1) circè Monspelium, Arelatene, etc. — Jacq. ic. rar. t. 24. Coul. dips. 34. S. stellata γ. Fl. fr. 5. p. 491. (v. s.)
4. S. UCRANICA (L. sp. 144.) involucelli basi hemisphæricæ foveolis ovato-linearibus æquali, coronæ nervis 20-24, calycis limbi in coronæ subsessilis setis longè exsertis, foliis radicalibus pinnatifidis, caulinis linearibus integrerrimis basi ciliatis. 2/4 circè Fontainebleau. — Fl. fr. 4. p. 230. 5. p. 490. S. Gmelini St.-Hil. bull. phil. n. 61. p. 149. t. 3. Fl. ochrolenci. (v. v. c.)

Sect. II. VIDUA Coul. l. c.

Involucelli basis rotundata plicata.

5. S. ATROPURPUREA (L. sp. 144.) capitulis ovatis, calycis longè pedunculati pedunculo coronæ duplò longiore, setis patulis exsertis involucello duplò longioribus, involuci foliolis linear-lanceolatis flores subæquantibus, foliis lanceolato-ovatis indivisis dentatis pinnatifidisque lobo terminali maximo dentato. (1) in hortis culta. — Fl. fr. 4. p. 231. — Moris. 3. s. 6. t. 14. n. 26. (v. v.)

(1) Pars involucelli foveolis superior dilatata sæpius membranacea (limbus calycis externi).

6. *S. MARITIMA* (L. amæn. 4. p. 304.) capitulis globosis, calycis pedunculati pedunculo coronam vix æquante, setis erectis exsertis involucello 3ò longioribus, involueri foliis linearibus floribus 2ò brevioribus, foliis integris pinnatifidisque, radicalibus dentatis, superioribus integerrimis linearibus. ♀? in provinciis australioribus. — Fl. fr. 5. p. 490. Nondum pro certo habere possum hanc speciem ut vult Cl. Coulter, à præcedente non diversam esse. (v. v.)

Sect. III. SUCCISA Coult. l. c.

Involucelli basis nulla à tubo distingueda.

7. *S. LUCIDA* (Vill. dauph. 2. p. 293.) foliis radicalibus lanceolato-ovatis obtusis crenatis, caulinis superioribusque glabris pinnatifidis lobis linearibus acutissimis, caule sub-1-floro prostrato, involucre flores superante, coronâ tubo 3ò breviore nervis 20-24, calycis setis nigris flores subæquantibus coronâ vero 4-5-plöve longioribus. ♀ in montibus Delphinatū et Galloprovinciae. — Fl. fr. 4. p. 228. — W. et K. hung. 2. t. 138 et 157. *S. columbaria* & Coult. 38. (v. v. D. in Helv.)

8. *S. COLUMBARIA* (L. sp. 143.) foliis radicalibus lanceolatis acutis dentatis, caulinis superioribusque pubescentibus bipinnatifidis lobis acutis, caule multifloro erecto, involucre floribus breviore, coronâ tubo dimidiò breviore, nervis 20, calycis setis corollâ 3-6-plö minoribus coronâ vero subduplicite longioribus. ♀ in siccis montosis. — Fl. fr. 4. p. 228. *S. giamuntia* L. sp. 143. Fl. fr. 5. p. 488. — Cam. ep. p. 711. ic. (v. v.)

♂. *ochroleuca*, floribus ochroleucis, setis coronâ 3ò longioribus. — In provinciis australioribus. — *S. ochroleuca* L. sp. 146. Fl. fr. 4. p. 230. (v. s.)

9. *S. PYRENAICA* (All. ped. t. 25. f. 2.) foliis radicalibus spathulatis obtusissimis inæqualiter crenatis tomentosis, superioribus pinnatifidis lobis lanceolatis dentatis inæqualibus, capitulis erectis, involuci foliolis lanceolatis, coronâ tubo 3ò breviore, nervis 20, setis corollâ sub-3ò minoribus coronâ vero 4ò longioribus. ♀ in lapidosis montium Galloprovinciæ, Delphinatū, Occitaniæ et Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 229. *S. columbaria* ♂. Coult. 38. Planta vix pedalis. (v. v.)

♂. *mollissima*, cano - tomentosa, foliis superioribus decompositis lobis linearibus integris. — Circè Nicæam. — *S. mollissima* Fl. fr. 5. p. 490. (v. s.)

10. *S. HOLOSERICEA* (Bert. dec. 3. p. 49.) cano-tomentosa, foliis inferioribus lanceolatis obtusis crenatis, superioribus pinnatifidis lobis lanceolatis acutis lateribus integris, capitulis nutantibus solitariis, involueri foliolis linearibus, coronâ tubo hirsuto 3ò breviore, nervis 20. ♀ in Pyrenæis. — Fl. fr. 5. p. 489. *S. columbaria* ♂. Coult. 39. Culturâ perstat. Planta 2-4-pedalis. (v. v. DC.)


11. *S. SUAVEOLENS* (Desf. cat. h. par. p. 110.) foliis radicalibus integerrimis ovato-elougatis, caulinis pinnatifidis lobis linearibus longis, caulinis strictissimis, involucelli tubo subcylindrico, coronâ brevissimâ nervis 16, calycis setis patulis brevibus vix exsertis. ♀ in siccis Fontisbleaudi et Andegaviæ (Bastard.) — Fl. fr. 4. p. 229. — Tabern. ic. 160 et 161. (v. s.)

12. *S. URCEOLATA* (Desf. atl. 1. p. 122.) foliis pinnatifidis, involueri foliolis coalitis, coronâ obsoletâ, calycis setis abortientibus. ♀ in Corsicâ. — Bocc. sic. t. 52. (v. s.)

13. *S. SUCCISA* (L. sp. 142.) foliis integris, involueri foliolis 2-3 serratis, flosculis æqualibus, coronâ perbrevi undulatâ, setis exsertis conniventibus. ♀ in sylvis et collibus aridis. — Fl. fr. 4. p. 226. — Cam. epit. 397. ic. Moris. 3. s. 6. t. 13. n. 7. (v. v.)

II. KNAUTIA Coult. l. c. — Knautiæ et Scabiosæ sp. L.

Corolla 4-loba; calycis limbus subcyathiformis; involucellum compressum 4-foveolatum semen arcte cingens, stipite brevi munitum.



1. *K. SYLVATICA* (Duby mss.) foliis in petiolas alatos basi dilatatos connatosque coarctatis, omnibus indivisis lanceolatis, radicalibus integris, caulinis crenatis, superioribus dentatis, invol. foliolis subbacutis, coronæ dentibus minimis, calycis ciliis 8 aristatis. ♀ in sylvaticis montanis. — *K. arvensis* γ et δ Coult. dips. 29. *S. sylvatica* L. sp. 142. Fl. fr. 4. p. 227. *S. integrifolia* L. sp. 142. non fl. fr. — Clus. hist. 2. p. 2. f. 3. (v. v.)

β. *longifolia*, foliis glaberrimis. — In Jurasso. — *S. longifolia* W. et K. hung. 1. t. 5. Fl. fr. 5. p. 488. (v. s.)

2. *K. ARVENTIS* (Coul. dips. 29.) foliis sessilibus, radicalibus inæqualiter pinnatifidis lobis lanceolatis, caulinis pinnatifidis lobis linearibus, superioribus integris linear-lanceolatis, involucri foliolis obtusis, coronæ dentibus minimis, calycis ciliis 8-10 aristatis. ♀ ad vias, prata et agros. — *Sc. arvensis* L. sp. 142. Fl. fr. 4. p. 226. Fl. dan. t. 447. (v. v.)

β. *collina*, foliorum radicalium lobis dentatis lobatisve. — *Sc. collina* Req. in Guèr. vaucl. ed. 2. p. 248. Fl. fr. 5. p. 487. (v. v. DC.)

3. *K. HYBRIDA* (Coul. dips. 30.) foliis radicalibus petiolatis inæqualiter pinnatifidis lobis obovatis rariū subintegris, caulinis sessilibus lobis lanceolatis, superioribus integris, involucri foliolis acuminatis, coronæ dentibus 12-15 perbrevis, calycis ciliis 20-24 obsoletis. (I) in Occitania, Galloprovinciæ et circā Nicæam. — *S. hybrida* All. auct. p. 9. Fl. fr. 4. p. 227. *S. integrifolia* Fl. fr. 4. p. 227. non L. Savi fl. pis. 1. t. 2. f. 1. Flores rosei. (v. v.)

III. CEPHALARIA Schrad. cat. sem. gott. 1814. Coul. l. c. — Scabiosæ sp. L.

Involucrum imbricatum bracteis brevius; corolla 4-loba; stigma longitudinale; calycis limbus subcyathiformis discoideusve; involucellum tetraëdrum 8-foveolatum interdum compressum.

1. *C. SYRIACA* (Schrad. l. c.) coronæ dentibus 8-4 aristatis, 4 iis alternantibus perbrevis, bracteis aristatis, corollulis æqualibus, foliis lanceolatis integris dentatisve. (I) inter segetes propè Nemausim. — Coul. dips. 25. *Sc. Syriaca* L. sp. 141. Fl. fr. 5. p. 487. Fl. pallidè cærulei. (v. s.)

2. *C. LEUCANTHA* (Schrad. l. c.) coronæ membranacea, bracteis exterioribus obtusis, interioribus vix acutis, foliis pinnatifidis. ♀ in montosis Galliæ mediterraneæ. — *S. leucantha* L. sp. 142. Fl. fr. 4. p. 225. Fl. Inteo-albidi. (v. v.)

3. *C. CENTAUROIDES* (Röm. et Schult. syst. 3. p. 49.) coronæ dentibus 4-8 obsoletisve, bracteis muticis, exterioribus obtusis, interioribus acuminatis, foliis pinnatifidis. ♀ in Alpibus Galloprovinciæ. — *S. centauroides* Lam. ill. 1312. Fl. fr. 4. p. 224. Flores flavi. (v. s.)

4. *C. ALPINA* (Schrad. l. c.) involucelli coronæ dentibus 6-8 aristatis subæqualibus, bracteis acuminatis pilosis corollulis subæqualibus, foliis pinnatis, foliolis lanceolatis serratis. ♀ in alpibus et montibus. — Coul. dips. 24. *Sc. Alpina* L. sp. 141. Fl. fr. 4. p. 224. — Lob. ic. t. 537. f. 2. Flores flavi. (v. v.)

IV. DIPSACUS L. gen. n. 114. Coul. dips. p. 21.

Calycis limbus subcyathiformis, involucellum 4-edrum 8-foveolatum; receptaculum paleaceum, paleis spinosis; stigma longitudinale; involucri foliola bracteas superantia.

1. *D. PILOSUS* (L. hort. ups. 25.) capitulo globoso piloso, bracteis rectis, involucri foliolis deflexis bracteas vix superantibus, foliis petiolatis appendiculatis. (2) ad sepes et fossas humidas. — Fl. fr. 4. p. 223. Lam. ill. t. 56. f. 2. (v. v.)


2. *D. LACINIATUS* (L. sp. 141.) capitulo ovato-cylindrico, bracteis rectis, involucri foliolis linear-lanceolatis rigidis capitulo sub 20 brevioribus, foliis sinuato-laciniatis. (2) ad vias et sepes rariū occurrat. — Fl. fr. 4. p. 222. — Moris. t. 3. s. 7. t. 36. n. 4. *D. sylvestris* γ Coult. dips. 22. (v. v.)


3. *D. FEROX* (Lois. fl. 719. t. 3.) capitulo ovato, bracteis rectis, involucri foliolis

- triquetris patulis rigidis capitulum superantibus, caule foliisque aculeis horridis.* (2) in maritimis Corsieæ. — Fl. fr. 5. p. 487. (v. s.)
4. D. *SYLVESTRIS* (Mill. dict. n. 2.) capitulo ovato-cylindrico, bracteis rectis, involucri foliolis linearibus incurvis capitulo longioribus, foliis connatis integris dentatis. (2) ad vias et sepes. — Fl. fr. 4. p. 222. Fl. dan. t. 965. — Moris. t. 3. s. 7. t. 36. n. 3. (v. v.)
5. D. *FULLONUM* (Mill. dict. n. 1.) capitulo cylindrico, bracteis recurvis, involucri foliolis lanceolatis rigidis capitulo brevioribus, foliis connatis integris subcoriaceis. (2) in agris passim cultus et provinciarum australium probabiliiter indigenus. — Fl. fr. 4. p. 222. — Lob. ic. 2. t. 17. f. 2. Moris. l. c. n. 1. (v. v.)

Ordo LVI. COMPOSITÆ *Adans. fam. 2. p. 103. DC. fl. fr. 4. p. 1. Cass. dict. sc. nat. 10. p. 131.* — *Synanthereæ Rich.*

Calyx ovario adhærens, tubo nunc ovarii longitudini æquali et tunc *pappus* (seu calycis limbus abortivus) *sessilis*, nunc ovario longiore et tunc *pappus stipitatus* dicitur, limbo nunc vix ullo et tunc *pappus nullus* nunc integro nunc 5-dentato aut 5-lobo et tunc *pappus integer 5-dentatus 5-lobusve* dicitur, nunc saepius evadente in pilos membranaceos innumeros nunc simplices et tunc *pappus pilosus*, nunc basi coalitos apice liberos et tunc *pappus ramosus*, nunc lateraliter barbato-plumosos et tunc *pappus plumosus* nuncupatur. Corolla summo calycis tubo inserta, constans petalis 5 basi plus minùsve inter se coalitis, nervos semper 2 simplicissimos marginales ad apicem confluentes et interdum tertium centrale gerentibus, per aestivationem valvatis, limbo vario in corollis stamineis naturali, in fæmineis neutrīsve plus minùsve deformato, nempè in prioribus (stamineis) seu *regulari* nempè lobis 5 æqualibus, seu *subregulari*, seu *labiato* lobis extùs 3 intùs 2 in labia dispositis, seu *ringenti* lobis extùs 4 intùs 1 in labia duo dispositis, seu *obringenti* lobis extùs 1, intùs 4 in labia 2 dispositis, seu *palmato* lobo interno ad basin usque fissō cœteris vix ad medium divisis, seu tandem fissō lobo interiore brevissimo ad basin usque fissō, cœteris ad apicem usque ferè coalitis; in posterioribus fæmineis neutrīsve (seu *ligulato*) nempè extùs in ligulam producto, seu *obligulato* nempè intùs in ligulam producto, seu *biligulato* nempè utrinquè in ligulam producto, seu *tubuloso* nempè limbo angusto et tubum simulantē, seu *ampliato* nempè limbo ad basin in faucem latam dilatato. Stamina 5 cum corollâ inserta, cum ejus lobis alterna et tubo basi coalita, filamentis medio articulatis; antheræ oblongæ linearesve inter se in tubum coalitæ 4-valves valvis externis immobilibus, internis rimâ longitudinali dehiscenti-





bus semper ad apicem appendicem *terminalem*, sæpius ad basin appendices 2 *basilares* gerentibus. Ovarium 1 1-spermum supernè foveam nectariferam inter styli et corollæ staminumve basin gerens. Stylus 1 in floribus androgynis teres cum apice nectarii articulatus, supernè divisus in ramulos 2 sæpius liberos interdùm subadglutinatos, intùs stigmatosos extùs pilis pappulosis *collectores* dictis et pollen etenim colligentibus instructos; in femineis collectores nulos sed stigmatosas glandulas gerens, in masculis stigmatosas glandulas abortivas nullasque gerens sed collectores servans, in neutris rarissimis nec stigmata nec collectores gerens. Fructus a calycis tubo cum pericarpio proprio conflatus, unilocularis, evalvis, indehiscens, monospermus, sæpius sessilis, rariùs pedicellatus ovario nempè suprà basin calycis elevato stipitem tunc formante, tunc apice in collum post anthesin imprimis excrescens (pappi stipitem) attenuato, nunc in collum non attenuato, pappo nempè sessili. Placenta subcarnosa ad basin ovarii sita. Semen erectum. Albumen o. Embryo radiculâ subtereti inferâ. — Herbæ aut frutices. Flores aggregati in capitulos ramos caulemve terminantes, olim flores compositi dictos nunc seu *capitula*, seu *anthodia*, seu *calathides* nuncupatos. Cujusque capituli *receptaculum* seu pars pedunculi terminalis et plus minùsve dilatata, nunc membranaceum nunc carnosum, plus minùsve areolatum, flores gerens sæpius plurimos rarissimè solitarios. Circà receptaculum est *involucrum* seu *Periclinium* constans squamis foliolisve plurimis nunc sæpius liberis, nunc rariùs inter se coalitis, nunc uniseriatis nunc 2-∞-seriatis, seriebus internis sæpius longioribus, externâ (in biseriatis) interdùm brevissimâ et tunc involucrum *calyculatum*. Super receptaculum et inter flores appendices nullæ aut variae nempè squamellæ pili aut paleolæ. Cujusque capituli flores sunt inter se aut uniformes aut difformes.

Subordo I. CORYMBIFERÆ *Vaill.* *Juss. gen. 177.*

Flores flosculosi aut radiati; receptaculum membranaceum aut vix carnosum; stigma super stylum non articulatum.

† SEMINA PAPPOSA, (excl. Bellide) PAPPO PLUS MINUS PILOSO.

I. EUPATORIUM *Tourn. t. 259. L. gen. 935.*

Involucrum cylindraceum, squamis imbricatis ovali-oblongis; flosculi pauci tubulosi hermaphroditi; receptaculum nudum; pappus pilosus.

I. E. CANNABINUM (L. sp. 1173.) foliis oppositis petiolatis 3-partitis, laciinis lanceolatis serratis, intermediâ longiore. ♂ in aquaticis et fossis humidis. — Fl. fr. 4. p. 129. — Lob. ic. t. 528. f. 2. (v. v.)

Æ. indivisum, foliis superioribus indivisis.—Ray. syn. p. 180. — Moris. 3.
s. 7. t. 13. n. 1. (v. s.)

II. CACALIA L. gen. 933.

Involucrum simplex oblongum, squamis linear-lanceolatis, basi subcalyculatum; flosculi omnes tubulosi hermaphroditi; receptaculum nudum; pappus pilosus.

1. *C. PETASITES* (Lam. dict. 1. p. 131.) caule herbaceo, foliis subtus incanis dentatis, radicalibus cordatis, inferioribus petiolatis, mediis acuminatis basi appendiculatis, superioribus sessilibus lanceolatis, corymbis fastigiatis, involucris pancifloris. \mathcal{U} in Vogesis, Jurasso, Alpibus, monte-Aureo, et Pyrenæis. — Jacq. austr. t. 235. Fl. fr. 4. p. 127. excl. var. *Æ. C. albifrons* L. Adenostyles albida Cass. (v. s.)
2. *C. ALPINA* (Jacq. austr. t. 234.) caule herbaceo, foliis omnibus petiolatis cordatis dentatis glabris, superioribus acutis, corymbis fastigiatis, involucris paucifloris. \mathcal{U} in saxosis humidis et umbrosis montium. — Fl. fr. 4. p. 127. *C. alpina* β L. sp. 1170. Adenostyles viridis Cass.—Lob. ic. t. 592. f. 1. (v. v.)
3. *C. LEUCOPHYLLA* (W. sp. 3. p. 1736.) caule herbaceo, foliis petiolatis utrinque tomentosis dentatis, inferioribus cordatis acuminatis, superioribus lanceolatis, floribus corymbosis, involucris 15-20-floris. \mathcal{U} in petrosis montium Delphinatūs, Galloprovinciæ. — Fl. fr. 4. p. 128. *C. tomentosa* Vill. dauph. 3. p. 171. Adenostyles candidissima Cass. (v. v. DC.)

III. TUSSILAGO L. gen. 952.

Involucrum simplex, squamis margine membranaceis; flores flosculosi vel radiati; flosculi nunc omnes hermaphroditi, nunc feminei fertiles in radio, hermaphroditi in centro; pappus pilosus; receptaculum nudum.

Sect. I. FARFARA DC. fl. fr. 4. p. 157.

Flores radiati, scapi uniflori.

1. *T. FARFARA* (L. sp. 1214.) scapo unifloro subnudo bracteato, foliis cordatis angulatis dentatis subtus pubescentibus. \mathcal{U} in argillosis subhumidis apricis. — Fl. fr. p. 4. p. 157. — Camer. epit. 590-591. ic. (v. v.)

Sect. II. TUSSILAGO DC. l. c.


Flores flosculosi, caules uniflori basi foliosi.


2. *T. ALPINA* (L. sp. 1213.) caule unifloro subnudo, foliis reniformibus dentatis glabris. \mathcal{U} in pascuis editiorum montium. — Fl. fr. 4. p. 158. Lam. illust. t. 674. f. 7. Homogyne Alpina Cass. (v. v.)

Sect. III. PETASITES DC. l. c.

Flores flosculosi, scapi multiflori.

3. *T. PETASITES* (Hop. tasch. 1803. p. 35.) thyrso oblongo, foliis oblongo-cordatis inæqualiter denticulatis subtus pubescentibus, lobis approximatis. \mathcal{U} in humidis secūs torrentes et fossas. — Fl. fr. 4. p. 158. Lam. ill. t. 674. f. 1. (v. v.)
4. *T. ALBA* (L. sp. 1214.) thyrso fastigiato, foliis orbiculato-cordatis duplicato-argutè dentatis subtus villoso-pubescentibus. \mathcal{U} in humidis montanis Vogesorum, Jurassi, Burgundiæ, montis-Aurei. — Fl. fr. 4. p. 159. Fl. dan. t. 524. (v. v.)
5. *T. NIVEA* (Hop. tasch. 1803. p. 48.) thyrso oblongo, foliis oblongo-cordatis inæqualiter dentatis subtus densè albo-tomentosis, lobis divaricatis. \mathcal{U} secūs rivos in Alpibus editioribus Delphinatūs, Galloprov., et summis Pyrenæis propè Benasque ex cl. Benth. — Fl. fr. 4. p. 159. — Moris. s. 7. t. 10. n. 4. (v. s.)
6. *T. FRAGRANS* (Vill. act. soc. hist. nat. par. 1. t. 12.) thyrso fastigiato, floribus radiatis, foliis subrotundo-cordatis æqualiter denticulatis subtus pubescentibus.





tibus. \mathcal{U} in Pyren. oriental. ex Lois. Pourr. et Lapeyr. sed tamen dubia civis.
— Fl. fr. 5. p. 472. Nardosmia denticulata Cass. (v. v. c.)

IV. CINERARIA L. gen. 957.

Involucrum simplex polyphyllum æquale; receptaculum nudum; flores radiati; pappus pilosus.

1. C. CAMPESTRIS (Retz obs. 1. p. 30.) floribus umbellatis, caule simplici, foliis tomentosis, radicalibus ovato-spathulatis subcrenulatis in petiolam coarctatis, caulinis sessilibus lanceolatis, superioribus integerrimis. \mathcal{U} in collibus frondosis Parisiorum, Neustriæ, in Arverniæ montibus, Pyrenæis. — Fl. fr. 4. p. 169. — Clus. hist. 2. p. 22. f. 2. Fl. lutei. (v. v. DC.)

β . integrifolia, pauciflora, foliis superioribus basi integerrimis. — C. integrifolia Jacq. aust. t. 179. Fl. fr. 4. p. 170. (v. s. ex Helv.)

2. C. AURANTIACA (W. sp. 3. p. 2081.) floribus subternis terminalibus, caule simplici, foliis sessilibus lanato-tomentosis, radicalibus ovatis obsolete crenatis, caulinis lanceolatis integerrimis, involucris sphacelatis. \mathcal{U} in pratis siccis et editoribus Alpium. — Fl. fr. 4. p. 170. C. Alpina All. ped. t. 38. f. 2. non W. Fl. aurantiaci. (v. v.)

3. C. LONGIFOLIA (Jacq. aust. t. 181.) floribus umbellato-corymbosis, caule simplici, foliis radicalibus petiolatis spathulatis dentatis, caulinis oblongo-lanceolatis. (2) in pascuis montanis irrigatis Delphinatûs, Galloprovinc., Pyren. orient. — Fl. fr. 4. p. 171. Fl. lutei. (v. s.)

4. C. SIBIRICA (L. sp. 1242.) racemo simplici folioso, foliis petiolatis glabris cordatis subcrenulatis, petiolo basi dilatato, caule simplici. \mathcal{U} in paludosis montanis Pyrenæorum, Arverniæ, Ruthenensis (Rouergue) et Ligericini tractus (cl. Prost.). — Fl. fr. 4. p. 168. — Amm. ruth. t. 24. (v. s.)

5. C. CORDIFOLIA (Gou. ill. p. 69.) paniculâ pauciflorâ, caule simplici, foliis omnibus petiolatis cordatis duplicato-dentatis, petiolis basi subdentatis. \mathcal{U} in Pyrenæis ex Lapeyr. — Fl. fr. 4. p. 171. — C. Bauh. prod. p. 69, f. 2. Dubia civis. (v. v. D. in Helv.)

6. C. ALPINA (W. sp. 3. p. 2084.) floribus subcorymbosis, caule simplici, foliis sessilibus subamplexicaulibus pinnatifidis, laciniis inæqualibus, lateralibus dentatis cuneatis, terminali inciso-dentatâ. \mathcal{U} in Pyrenæis ex Lapeyr. — Jacq. aust. t. 177. (v. v. D. in Helv.)

7. C. PALUSTRIS (L. sp. 1243.) floribus corymbosis, foliis lato-lanceolatis dentato-sinuatis amplexicaulibus, caule villoso. \mathcal{U} in arenosis aquosis et paludosis propè St.-Omer, Beauvais loco dicto St.-Germer (cl. Graves) et circa Burdigalam ex Laterrade. — Fl. fr. 4. p. 169. — Lob. ic. t. 347. f. 2. (v. v. DC.)

8. C. MARITIMA (L. sp. 1244.) floribus paniculatis, involueris tomentosis, foliis pinnatifidis subtus cano-tomentosis, laciniis obtusis subtrilobis, caule suffrutescente. \mathcal{U} in saxosis Galliæ Mediterraneæ et etiam in Delphinatu propè Digne. — Fl. fr. 4. p. 172. — Lob. ic. t. 227. f. 2. (v. v.)

V. SENECIO L. gen. 953.

Involucrum calyculatum, foliolis apice sphacelatis; flores nunc flosculosi, nunc radiati; receptaculum nudum; pappus pilosus, mollis.

§. I. *Floribus radiatis, radio patente, foliis pinnatifidis.*

1. S[?] LEUCOPHYLLUS (DC. cat. 144.) foliis utrinque lanatis niveis pinnatifido-lyratis, laciniis ovato-oblongis obtusis inferioribus distantibus mediis subincisis superioribus subcoalitis, floribus corymbosis confertis. \mathcal{U} in editoribus Pyrenæorum orientalium et montis Mesin. — Fl. fr. 5. p. 473. S. incanus? Lapeyr. abr. S. palmatus Lap. suppl. An potius Cinerariæ species? (v. v.)

2. S. INCANUS (L. sp. 1219.) foliis utrinque tomentosis niveis pinnatifidis, laciniis linear-i-cuneatis obtusis subdentatis, corymbo coarctato. \mathcal{U} in Alpibus Delphinatûs. — Fl. fr. 4. p. 162. — Barr. ic. t. 262. f. 1. (v. v. in Helv.)


3. *S. ARTEMISIAEFOLIUS* (Pers. enc. 2. p. 435.) foliis pinnato-multifidis, pinnis linearie-subulatis subincisis, involucris cylindricis demum longitudinaliter sulcatis, floribus corymbosis terminalibus. ♂ circa Parisios, Aureliam et in montosis Galliae mediæ, australis et orientalis. — Fl. fr. 5. p. 472. *S. tenuifolius* Fl. fr. 4. p. 164. excl. syn. Jacq. Hoffm. et Huds. (v. v.)
5. *S. ABROTANIFOLIUS* (L. sp. 1219.) foliis pinnatifido - multifidis linearibus nudis acutis, caule supernè subnudo subbifloro, squamis lanceolatis. ♀ in Alpibus Galloprovinciæ ex Ger. — Fl. fr. 4. p. 164. — Clus. hist. 1. p. 334. f. 1. (v. s. ex Austrâ.)
4. *S. JACOBÆ* (L. sp. 1219.) foliis radicalibus lyrato-pinnatifidis, canulinis pinnatifidis glabris lobis divaricatis linearie-lanceolatis subpinnatis, caule erecto, involucri subcylindrici squamis lanceolato-ovatis. ♀ in pratis, petrosis et ad vias frequens. — Fl. fr. 4. p. 163. — Fuchs. hist. 742. ic. (v. v.)
6. *S. AQUATICUS* (Huds. angl. 366.) foliis lyratis serratis glabris, inferioribus obovatis integris, involucro hemisphaerico, ligulis ellipticis. ♀ in paludibus et aquaticis. — Fl. fr. 4. p. 163. excl. syn. Clus. Fl. dan. t. 784. *S. Jacobæ* varietas? (v. v.)
7. *S. ERUCÆFOLIUS* (Huds. angl. 366. non L?) foliis pinnatifidis subhirtis, lobis lanceolatis dentatis, terminali inciso-dentato, caule erecto, involucri squamis lanceolato-ovatis. ♀ in montosis dumetosis. — Fl. fr. 4. p. 164. (v. v.)
fl. tenuifolius, laciniis angustioribus.—In Delphinatû.—*S. tenuifolius* Jacq. austr. 3. t. 278. non Fl. fr. — Barr. ic. t. 153. (v. s.)
8. *S. SQUALIDUS* (L. sp. 1218.) foliis semiamplexicaulibus pinnatifidis, laciniis linearibus subdentatis distantibus, caule erecto, involucri squamis linearibus lucidis glaberrimis. (1) in arvis, vineis, ad muros et vias Galliae mediterraneæ. — Fl. fr. 4. p. 162. *S. Gallicus* Vill. Dauph. 3. p. 230. DC. syn. gall. p. 283. — Barr. ic. t. 262. f. 2. (v. v.)
9. *S. CRASSIFOLIUS* (W. sp. 3. p. 1982.) foliis carnosis amplexicaulibus indivisis partitisve crenatis, pedunculis squamosis, involucri squamis linearibus laxis glaberrimis. (1) ex maritimis Massiliæ misit cl. Solier. — Fl. fr. 5. p. 472. — Barr. ic. 261. (v. s.)


§. 2. *Floribus radiatis, radio revoluto.*

10. *S. SYLVATICUS* (L. sp. 1217.) foliis radicalibus indivisis dentatis, superioribus pinnatifidis lobis denticulatis, involucri cylindrici squamis sublaevibus. (1) L. (2) Vill. in sylvis submontanis. — Fl. fr. 4. p. 161. — Dill. elth. t. 258. f. 327. (v. v.)
11. *S. VISCOSUS* (L. sp. 1217.) foliis pinnatifidis viscidis, involucri hemisphaerici squamis laxis hirsutis. (1) ad oras sylvarum in montosis. — Fl. fr. 4. p. 168. — Dill. elth. t. 258. f. 336. (v. v.)
12. *S. HUMILIS* (Desf. atl. 2. p. 271. t. 233.) caule procumbente, foliis subspathulatis obtusis duplicito-dentatis, floribus axillaribus terminalibusque sub-solitariis, squamis glabris. (1) in paludosis maritimis Corsicæ (Ph. Thomas). (v. s.)
13. *S. FÆNICULACEUS* (Ten. fl. nap. t. 78.) foliis radicalibus petiolatis ovatis inciso - dentatis, superioribus subamplexicaulibus pinnatifidis lobis ovato-lanceolatis crenato-dentatis, floribus corymbosis, squamis lucidis glabris. (1) in valle Asco Corsicæ reperiit Ph. Thomas. Folia fæniculum redolent ex Reyn. in h. DC. (v. s.)
14. *S. LIVIDUS* (L. sp. 1216.) caule recto simplici, foliis sinuato-dentatis, inferioribus ovatis petiolatis, superioribus oblongis amplexicaulibus, floribus subcorymbosis, squamis lucidis glabris. (1) in maritimis Corsicæ, Galloprovinciæ. — Fl. fr. 5. p. 472. *S. nebrodensis* Fl. fr. 4. p. 162. excl. syn. (v. s.)

§. 3. *Floribus radiatis, radio patente, foliis indivisis.*

15. *S. PALUDOSUS* (L. sp. 1220.) foliis semi-amplexicaulibus lanceolatis argute





serratis subtus adpresso villosis, corymbo terminali divaricato, caule stricto sublanato. $\frac{1}{2}$ secus fluvios et stagna in arundinetis. — Fl. fr. 4. p. 166. — Dalech. lugd. 1037. f. 2. (v. s.)

16. S. TOURNEFORTII (Lapeyr. abr. pyr. 516.) foliis oblongis utrinquè attenuatis subcrassis utrinquè glabris, dentibus semi-lunatis, corymbo paucifloro. $\frac{1}{2}$ in Pyrenæis editoribus. — S. persicæfolius Fl. fr. 4. p. 166. non L. Ram. bull. phil. n. 43. t. 11. f. 3. (v. v.)

17. S. DORIA (L. sp. 1221.) squamis involueri exterioribus patulis, foliis sub-decurrentibus oblongo-lanceolatis glaucescentibus glabris serratis, corymbo multifloro. $\frac{1}{2}$ secus rivos in Galliâ australi. — Fl. fr. 4. p. 167. Jacq. aust. t. 185. (v. v. DC.)

18. S. CACALIASTER (Lam. fl. fr. 2. p. 132.) foliis lanceolatis argutè serratis, inferioribus decurrentibus, involueri squamis interioribus linear-lanceolatis, floribus (ochroleucis) corymbosis sæpius flosculosia. $\frac{1}{2}$ in Vogesis et montibus Arvernæ. — Fl. fr. 5. p. 474. Cacalia Sarracenica L. sp. 1169. Fl. fr. 4. p. 128. (v. s.)

19. S. SARRACENICUS (L. sp. 1221.) foliis lanceolatis basi cuneatis argutè serratis subsessilibus glabriusculis, involueri squamis linear-spathulatis, corymbo coartato. $\frac{1}{2}$ in humidis umbrosis Alpium, Jurassi, agri Suessionensis et Fonsensis (le Forez). — Fl. fr. 4. p. 167. — Fuchs. hist. 728. ic. (v. v.)

20. S. NEMORENSIS (L. sp. 1221.) foliis sessilibus ovato-lanceolatis serratis margine ciliatis subtus tenuissimè pubescentibus, corymbo terminali folioso laxo. $\frac{1}{2}$ in montibus Galliæ australis, in Pyrenæis orientalibus. — Fl. fr. 4. p. 167. — Pluck. t. 235. f. 1. (v. s.)

21. S. DORONICUM (L. sp. 1222.) caule indiviso subtomentoso, foliis crassiusculis serratis, caulinis sessilibus, radicalibus petiolatis ovatis orbiculatisve subtus villosis. $\frac{1}{2}$ in pascuis subhumidis Alpium, Pyren., Cebennarum. — Fl. fr. 4. p. 168. — Clus. hist. 2. p. 17. f. 1. (v. v.)

β . *Barrelieri*, caule multifloro. — In Pyrenæis orient. — S. Barrelieri Gouill. 68? — Barr. ic. 146. 801. (v. v.)

γ . *tomentosus*, foliis subtus tomentosis. — Lepicaune tomentosa Lapeyr. abr. ex autopsiâ cl. Arnott. (v. s.)

§. 4. *Floribus flosculosis.*

22. S. VULGARIS (L. sp. 1216.) foliis amplexicaulibus piannatifidis dentatis, floribus corymboso-coartatis. (I) in cultis frequens. — Fl. fr. 4. p. 161. Gærtn. fruct. 2. t. 166. f. 3. (v. v.)

VI. DORONICUM L. gen. n. 959.

Involuci squamæ duplicitis ordinis æquales; flores radiati ligulis femineis; flosculorum semina pappo simplici coronata, ligularum nuda; receptaculum nudum.

1. D. PARADIANCHES (L. sp. 1247.) foliis denticulatis, radicalibus cordatis longè petiolatis, mediis spathulato-cordatis, summis subrotundo-cordatis, caule hirsuto subsimplici. $\frac{1}{2}$ in sylvis montanis. — Fl. fr. 4. p. 173. — Cam. epit. 823. ic. (v. v.)

2. D. SCORPIOIDES (W. sp. 3. p. 2114.) foliis remotè denticulatis, superioribus oblongis amplexicanibus, inferioribus ovatis petiolatis, petiolis alatis auriculatis, radicalibus ovatis subcordatis petiolatis, caule subglabro. $\frac{1}{2}$ in sylvis montanis Alpium, Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 174. — Clus. hist. 2. p. 16. (v. v.)

3. D. PLANTAGINEUM (L. sp. 1247.) foliis ovali-oblongis, inferioribus longè petiolatis, petiolis nudis, superioribus sessilibus amplexicaulibus, caule simplici. $\frac{1}{2}$ in Vogesis, Parisis, Sinemuri, secùs Gardinem (Gardon). — Fl. fr. 4. p. 174. — Dalech. hist. 1202. f. 2. (v. v. DC.)

4. D. AUSTRIACUM (Jacq. austr. t. 130.) foliis denticulatis, summis lanceolatis-

amplexicaulibus, inferioribus spathulato-ovatis, radicalibus cordatis petiolatis. \mathcal{L} in Pyrenæis, montibus Ligerulæ (*Lozère*), Arverniæ, monte Pilato ex cl. Balbis, et ad ripas Druentiæ ex Lois.—Fl. fr. 5. p. 475.—Clus. hist. 2. p. 19. ic. (v. s.)

VII. ARNICA L. gen. n. 958.

Involucri squamæ duplicitis ordinis æquales; flores radiati, ligulis femineis filamentis 5 sterilibus donatis; semina omnia pappo coronata; receptaculum nudum.

1. A. CORSICA (Lois. gall. 576. t. 20.) caule erecto supernè ramoso, foliis amplexicaulibus lanceolato-oblongis argutè denticulatis, floribus subcorymbosis. \mathcal{L} in Corsicâ ad rupes aquis fluentibus madidas. — Fl. fr. 5. p. 475. *Doronicum Corsicum* Poir. euc. supp. 2. p. 517. Dor. Austriaco valdè similis. (v. s.)
2. A. DORONICUM (Jacq. aust. t. 82.) foliis remotè dentatis hirsutis, radicalibus petiolatis oblongis basi angustatis, caulinis alternis oblongo-lanceolatis obtusis. \mathcal{L} in petrosis Alpium editiorum Delphinatûs et Pyren. centr. ex cl. Benth. — Fl. fr. 4. p. 175. *Grammarthron biligulatum* Cass. — Clus. hist. 2. p. 17. f. 1. (v. v. DC.)
3. A. SCORPIOIDES (L. sp. 1246.) foliis dentatis dentibus acuminatis, radicalibus petiolatis elliptico-subrotundis, caulinis alternis oblongis acutis. \mathcal{L} in montibus Delphinatûs, Arverniæ, Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 176. *Grammarthron scorpioides* Cass. — Lob. ic. t. 649. f. 1. (v. v.)
4. A. MONTANA (L. sp. 1245.) foliis oppositis ovatis integris. \mathcal{L} in pascuis montanis. — Fl. fr. 4. p. 175. — Clus. hist. 2. p. 18. f. 1. (v. v.)
 f. *angustifolia*, foliis angustioribus, floribus sæpè cernuis. — In ericetis circâ Dax. — *Cineraria cernua* Thore land. 344. (v. v.)

VIII. CHRYSOCOMA L. gen. n. 939.

Involucrum imbricatum hemisphæricum vel ovatum squamis linearibus; receptaculum alveolatum; flosculi omnes hermaphroditi tubulosi; pappus pilosus, ciliatus.

1. C. LINOSYRIS (L. sp. 1178.) herbacea, foliis linearibus glabris, involucris laxis, corollis sub-5-lobis. \mathcal{L} in argillosis apricis Galliæ mediæ, orientalis, australis occidentalisque. — Fl. fr. 4. p. 141. — Lob. ic. 409. f. 1. (v. v.)
2. C. SAXATILIS (DC. fl. fr. 5. p. 468.) herbacea, foliis lanceolato-linearibus glutinosis pilosis, involuci multiseriati squamis exterioribus apice reflexis, corollis vix 5-dentatis. \mathcal{L} in rupestribus circâ Massiliam et Telonem in Occitanâ et agro Ruscinonensi ex cl. Benth.—*Inula saxatilis* Fl. fr. 4. p. 154. *Erigeron glutinosum* L. mant. 112. *Chiliadenus camphoratus* Cass. — Barr. ic. 158. (v. s.)

IX. ASTER L. gen. n. 954.

Involucrum imbricatum, squamis exterioribus patulis; receptaculum nudum; flores radiati, ligulis femineis fertilibus discoloribus oblongis; pappus pilosus.

1. A. ALPINUS (L. sp. 1226.) caule unifloro, foliis integerrimis radicalibus lanceolato-spathulatis, caulinis lanceolatis, invol. squamis subæqualibus lanceolatis obtusiusculis. \mathcal{L} in pascuis editiorum montium. — Fl. fr. 4. p. 144. — Clus. hist. 2. p. 15. f. 2. (v. v.)
2. A. AMELLUS (L. sp. 1226. non W.) caule corymboso, foliis oblongo-lanceolatis integris scabris, inferioribus obtusis, superioribus acutis, involucris subsquarrosois, squamis obtusis, interioribus membranaceis apice coloratis. \mathcal{L} in Jurassi, Delph., Galloprov., Occit., Pyren. or. collibus, circâ Aginnum et Corisopilum (Quimper.) — Fl. fr. 4. p. 145. 5. p. 469. — Clus. hist. 2. p. 16. f. 1. (v. v.)

other authors

- A. van der Waerden


- N. Bourbaki - Bourbaki


mathematics


- algebraic geometry

- differential topology

- functional analysis







3. *A. PYRENÆUS* (Desf. cat. par. 102.) caule hirsuto simplici suprà corymboso, foliis oblongo-lanceolatis subscabris subamplexicaulibus apice 4-5-dentatis, invol. squamis linearis acuminatis hirsutis. $\frac{1}{2}$ in Pyrenæorum monte Esquierri. — Fl. fr. 4. p. 146. (v. s. c.)
4. *A. SALIGNUS* (W. sp. 3. p. 2040.) caule erecto glabro paniculato - corymboso, foliis linearis lanceolatis acuminatis sessilibus integris glaberrimis impunctatis, inferioribus lanceolatis apice serratis, invol. squamis linearis lanceolatis, interioribus acutissimis. $\frac{1}{2}$ in pratis humidis Argentorati, Mimatis. — Fl. fr. 5. p. 470. (v. s.)
5. *A. ACRIS* (L. sp. 1228.) caule subglabro corymboso, foliis linearis lanceolatis basi sub 3-nerviis punctatis acutis, ramis foliosis, invol. squamis linearis lanceolatis acutis. $\frac{1}{2}$ ad sepes et in herbosis Galliæ mediterraneæ. — Fl. fr. 4. p. 146. — Garid. aix. t. 11. (v. s.)
6. *A. TRIPOLIUM* (L. sp. 1226.) caule glabro corymboso, foliis caulinis linearis lanceolatis carnosis triplinerviis, inferioribus apice subserratis, invol. squamis laxis lanceolatis obtusis. $\frac{1}{2}$ in stagnosis maritimis et in salsis Lotharingiæ. — Fl. fr. 4. p. 145. — Gm. sib. 2. t. 80. f. 2. (v. v.)
7. *A. ANNUUS* (L. sp. 1229.) caule subglabro superne ramoso, foliis pilosusculis, inferioribus subovatis serratis, superioribus lanceolatis, involucris hemisphaericis squamis subæqualibus linearis - lanceolatis acutis stri-gosis. (1) secus Isaram ex Will., Rhenum ex Sch. — Fl. fr. 4. p. 146. Fl. dan. t. 486. Diplopappus dubius Cass. (v. s. ex Valesiâ.)
8. *A. CHINENSIS* (L. sp. 1232.) caule hispido, ramis unifloris, foliis ovatis grossè dentatis petiolatis, caulinis sessilibus lanceolato-acuminatis integris, involucri squamis maximis ciliatis. (1) ex Chinâ ortus, in hortis cultus. — Fl. fr. 4. p. 147. — Dill. elt. t. 34. f. 38. (v. v.)

X. ERIGERON L. gen. 951.

Involucrum oblongum imbricatum; receptaculum nudum; flores radiati, ligulis semineis paucis discoloribus linearibus angustissimis; pappus pilosus.

1. *E. CANADENSE* (L. sp. 1210.) caule hirto, floribus paniculatis, foliis lanceolatis ciliatis. (1) in lapidosis et sylvis. — Fl. fr. 4. p. 144. — Moris. s. 7. t. 20. n. 29. (v. v.)
2. *E. ACRE* (L. sp. 1211.) caule multifloro, foliis radicalibus obtusis, caulinis acutis, involucris squamis linearibus acutissimis, pappo rufescente seminibus duplo longiore. $\frac{1}{2}$ in sterilibus et apricis frequens. — Fl. fr. 4. p. 142. *E. murale* Lapeyr. supp. — Col. ecphr. t. 26. f. 2. (v. v.)
3. *E. ALPINUM* (Lam. fl. fr. 2. p. 140.) caule paucifloro, foliis subtus villosis, caulinis subobtusis, invol. squamis lanceolatis acutis, pappo rufescente seminis longitudine. $\frac{1}{2}$ in montosis frequens. — Fl. fr. 4. p. 142. (v. v.)
β. uniflorum, caule 1-floro, foliis subglabris. — In editioribus. — *E. uniflorum* L. sp. 1211. (v. v.)
4. *E. VILLARSSI* (Bell. act. tur. 5. p. 244. t. 9.) caule paniculato, foliis lanceolatis viscosis trinerviis scabris subdentatis sessilibus, squamis linearis lanceolatis acutissimis, radio disco breviore. $\frac{1}{2}$ in editioribus Delphin., Galloprov., Pyren. — Fl. fr. 4. p. 143. (v. s.)

XI. SOLIDAGO L. gen. 955.

Involucrum imbricatum; receptaculum nudum; flores radiati, ligulis concoloribus subquinis; pappus pilosus.

1. *S. GRAVEOLENS* (Lam. fl. fr. 2. p. 145.) pubescenti-viscosa, foliis sublinearibus integerrimis, ramis lateralibus multifloris. (1) in arvis subhumidis Galliæ australis et occidentalis. — Fl. fr. 4. p. 156. *Erigeron graveolens* L. sp. 1210. *Inula graveolens* Desf. Cass. — Barr. ic. t. 370. (v. v.)

2. *S. MINUTA* (L. sp. 1235.) caule simplicissimo, foliis lanceolatis acutis serratis glabris, pedunculis unifloris flore duplò longioribus. ♀ in Pyrenæis. — Fl. fr. 4. p. 156. — Herm. par. t. 245. (v. s.)
3. *S. VIRGA-AUREA* (L. sp. 1235.) canle supernè ramoso et pubescente, foliis caulinis lanceolatis utrinquè attenuatis serratis, inferioribus ellipticis pilosiusculis, racemis erectis, pedicellis flore brevioribus. ♀ in petrosis sylvarum. — Fl. fr. 4. p. 156. Fl. dan. t. 668. (v. v.)

β. *ericetorum*, foliis subintegris linear-lanceolatis. ♀ in sabulosis propè Dax. — *S. minuta* Thore non L. nec Vill. (v. v.)

XII. BELLIDIASTRUM Cass. dict. sc. nat. — Mich. gen. t. 29.

Involucrum 1-seriatum, squamis linearibus acutis; flores radiati, in disco hermaphroditi, in radio feminei, receptaculum conicum nudum; semina striata spinulosa.

1. *B. MICHELII* (Cass. in dict. sc. nat. 4. supp. p. 70.) scapo unifloro nudo, radio discolore, foliis petiolatis obovatis repandis. ♀ in sylvis montosis Galloprovinciæ, Delphinatūs. — *Doronicum Bellidiastrum* L. sp. 1247. Fl. fr. 4. p. 176. — Cam. epit. 654. ic. (v. v.)

XIII. BELLIS Tourn. t. 280. L. gen. n. 962.

Involucrum hemisphericum polyphyllum simplex, squamis lanceolatis; flores radiati; receptaculum nudum conicum; semina nuda.

1. *B. ANNUA* (L. sp. 1249.) caule subsimplici subfolioso, foliis ovali-spathulatis obtusis apice crenulatis, invol. squamis subobtusis glabriusculis apice ciliatis. (I) in pratis et collibus Galliæ mediterraneæ et Corsicæ. — Fl. fr. 4. p. 186. (v. v.)
2. *B. SYLVESTRIS* (Cyr. rar. 2. p. 22. t. 4.) scapo longo nudo unifloro, foliis oblongo-lanceolatis subacutis remotè denticulatis velutino-pubescentibus trinerviis, invol. squamis lanceolatis acutis hirtis. ♀ circè Telouem, Massiliam, Avenionem, in Occitanâ et agro Ruscin. ex Benth. — Fl. fr. 5. p. 478. — Dod. pempt. 265. f. 1. (v. s.)
3. *B. PERENNIS* (L. sp. 1248.) scapo subnudo unifloro, foliis spathulato-obovatis crenato-dentatis pubescentibus venosis, squamis lanceolato-ovatis obtusis hirtis. ♀ in graminosis ad vias. — Fl. fr. 4. p. 185. Lam. ill. t. 677. (v. v.)

XIV. BELLIUM L. gen. pl. ed. Schr. p. 561. DC. fl. fr. 4. p. 923.

Involucrum simplex polyphyllum, squamis linear-spathulatis; receptaculum nudum conicum; flores radiati, flosculi 4-dentati tetrandri; semina paleis membranaceis 4-8 in pilos desinentibus coronata.


1. *B. BELLIDIOIDES* (L. mant. 285.) caule stolonifero, foliis spathulatis integris, scapis nudis filiformibus foliis triplò longioribus, seminibus paleis 4-8 coronatis. (I) in rupestribus maritimis Corsicæ. — Fl. fr. 4. p. 923 non Desf.; 5. p. 475. — Bocc. mns. p. 149. t. 107. (v. s.)
2. *B. NIVALE* (Req. in ann. sc. nat. 5. p. 383.) caule nudo, foliis spathulatis integris, scapis nudis villosis foliis vix duplò longioribus, seminibus paleis 4 coronatis. (I) in editioribus montibus Corsicæ. An satis à priore distincta? (v. s. in spec. non satis perfectis.)


XV. CONYZA L. gen. 950. DC. fl. fr. 4. p. 189.

Involucrum subrotundatum imbricatum; receptaculum nudum; flosculi omnes tubulosi, in centro hermaphroditi 5-dentati, in radio feminini steriles graciles 3-dentati; pappus pilosus ciliatus.

§. I. Involucro sub 1-seriato.

1. *C. AMBIGUA* (DC. fl. fr. 5. p. 468.) caule erecto ramoso piloso striato, foliis omnibus linearibus scabris planis hinc indè dentatis, capitulis paniculatis.





(1) in pratis circâ Nemausim, Monspelium, Narbonem (Pourr.) cum Eri-
gerone canadense. — Erigeron crispum Pourr. chl. n. 470. (v. v. DC.)

§. 2. *Involucro multiserrato.*

2. C. SICULA (W. sp. 3. p. 1931) caule erecto lœvi ramoso, foliis inferioribus lanceolatis, superioribus linearibus integerrimis margine revolutis, capitulis paniculatis. (1) in fossis humidis et stagnis maritimis prov. mediterranearum. — Fl. fr. 4. p. 139. Dimorphantes Sicula Cass. — Magn. bot. monsp. t. 76. (v. s.)
3. C. SQUARROSA (L. sp. 1205.) caule erecto ramoso, foliis ovali-lanceolatis pubescentibus, inferioribus dentatis in petiolatum attenuatis, capitulis corymbosis. (2) ad sepes et oras sylvarum in siccis. — Fl. fr. 4. p. 139. Lam. ill. t. 697. f. 1. (v. v.)
4. C. SAXATILIS (L. sp. 1206.) caule suffruticoso prostrato, ramis cano-tomentosis, foliis linearibus margine revolutis subdentatis, pedunculis longissimis 1-floris. (3) ad muros et inter saxa maritima Corsicae, agri Ruscinoneusis et circâ Nicaeam, Olbiacum. — Fl. fr. 4. p. 140. Phagnalon subdentatum Cass. — Barr. ic. t. 426. (v. v.)
5. C. SORDIDA (L. mant. 466.) caule suffruticoso prostrato, ramis cano-tomentosis, foliis linearibus integerrimis margine revolutis, pedunculis longis trifloris. (4) ad muros et saxa Gallie mediterraneæ, propè Nannetes? ex Bon. — Fl. fr. 4. p. 140. Phagnalon tricephalum Cass. — Barr. ic. t. 277 et 368. (v. v.)

XVI. ENULA L. gen. 956.

Involucrum imbricatum; receptaculum nudum; flores radiati ligulis concoloribus; antheræ saepius basi bisetosæ; pappus nunc pilosus simplex, nunc duplex, exterior membranaceus.

Sect. I. CORVISARTIA. Mer. fl. par. ed. 2. t. 2. p. 261.

Squamæ exteriores obovatæ, inter. spatulatae coloratæ, pappus simplex.

1. I. HELENIUM (L. sp. 1236.) foliis amplexicaulibus subdentatis ovatis rugosis subtus tomentosis. (5) circâ Parisios, in Neustriâ, Pyrenæis ex Lapeyr. — Fl. fr. 4. p. 148. Corvisartia Helenium Mer. fl. par. l. c. — Lob. ic. t. 574. f. 2. (v. s.)

Sect. II. ENULA.

Squamæ lineares lanceolatæ acutæ.

* *Pappo simplici.*

2. I. CRITHMOIDES (L. sp. 1240.) foliis linearibus carnosis 5-cuspidatis, inv. squamis linear-lanceolatis, seminibus hirtis. (6) in paludosis maritimis ex Nicaeâ ad Cherbourg usque (cl. de Breb.). — Fl. fr. 4. p. 154. Limbara tricuspidis Cass. — Lob. ic. t. 395. f. 2. (v. v.)
3. I. TUBEROSA (Lam. dict. 3. p. 260.) caule suffruticoso, ramis unifloris, foliis linearibus raro dentatis margine subhirsutis, involuci squamis linearibus, seminibus hirtis. (7) in siccis et maritimis Occitanie et in Cebennis. — Fl. fr. 4. p. 153. — Lob. ic. t. 350. f. 3. (v. v.)
4. I. BRITANICA (L. sp. 1237.) caule corymboso villosa, foliis amplexicaulibus lanceolatis basi serratis subtus pilosis, involuci squamis linearibus seminibus hirsutis. (8) secùs vias et fossas passim. — Fl. fr. 4. p. 149. — Moris. s. 7. t. 19. n. 8. Britanica. Dalech. hist. 1082. (v. v.)
5. I. BIFRONS (L. sp. 1236.) foliis ovato-oblongis decurrentibus dentatis apice integerrimis, floribus corymbosis confertis, squamis linearibus ciliatis, seminibus glabris. (9) in montosis provinc. austral. — Fl. fr. 4. p. 155. — Garid. aix. t. 23. (v. v.)
6. I. SQUARROSA (L. sp. 1240.) foliis ovalibus rigidis tenuissimè serrulatis lucidis scabris reticulato-venosis, invol. squamis glabris exterioribus lanceolato-ovatis reflexis, seminibus glaberrimis. (10) in provinciis australibus. — Fl. fr. 4. p. 150. I. Bubonium Jacq. Vill. Lapeyr. — Pluckn. t. 16. f. 1. (v. v.)


- β. Germanica*, foliis ovato-oblongis.—In Delphinatu (h. DC.) et Santoniā (Des Moulins.) — I. Germanica. L. Fl. fr. 4. p. 150. — Moris. s. 7. t. 19. n. 16. (v. s.)
7. I. VAILLANTII (Vill. dauph. 2. p. 216.) caule paniculato, foliis ovato-lanceolatis obsoletè serratis subtus tomentosis, floribus subcorymbosis terminalibus, squamis exterioribus lanceolatis, interioribus linearibus ciliatis seminibusque glabris. ♀ secùs rivos et oras sylvarum Delphinatū. — Fl. fr. 4. p. 152. — Hall. helv. n. 73. t. 2. (v. v. DC.)
8. I. SALICINA (L. sp. 1238.) foliis lanceolatis recurvis glaberrimis lucidis tenuissimè serrato-scabris, ramis angulatis glabriusculis, floribus inferioribus altioribus, squamis ciliatis exterioribus lanceolatis, seminibus glabris. ♀ in pratis montosis.— Fl. fr. 4. p. 151. — Clus. hist. 2. p. 15. f. 1. Folia sæpè subamplexicaulia. (v. v.)
9. I. HIRTA (L. sp. 1239.) caule villoso subramoso, foliis lanceolato-oblongis integris rigidis hirtis, floribus paucis corymbosis, squamis exterioribus interiores superantibus, seminibus glabris. ♀ in pratis montosis et circà Parisios.— Fl. fr. 4. p. 151. — Clus. hist. 2. p. 14. f. 2. (v. s.)
10. I. HELENIOIDES (DC. fl. fr. 5. p. 470.) foliis amplexicaulibus ovato-oblongis subhirsutis, radicalibus in petiolum angustatis subdentatis, floribus 3-4 corymbosis amplis, involucri hirsutissimi squamis externis lanceolatis foliaceis patulis. ♀ secùs agros Pyrenæorum orient. (v. v.)
11. I. SUAVEOLENS (Ait. kew. 3. p. 224.) caule multifloro, foliis caulinis oblongis sessilibus subtus pilosis, radicalibus ellipticis subdentatis in petiolum longè angustatis, invol. squamis hirtis externis oblongis laxis, seminibus breviter pubescentibus. ♀ in asperis Galloprovinciæ.— Fl. fr. 5. p. 471. I. oculus Christi Fl. fr. 4. p. 148. excl. syn. (v. s.)
12. I. MONTANA (L. sp. 1241.) caule unifloro, foliis lanceolatis hirsutis integerimis, involucri hirsuti squamis exterioribus oblongo-lanceolatis obtusis, interioribus linearibus acutis, seminibus hirtis. ♀ in sterilibus montium provinc. austral. — Fl. fr. 4. p. 154. — Lob. ic. t. 350. f. 2. (v. v.)

** *Pappo duplii.*

13. I. ODORA (L. sp. 1236.) caule paucifloro, foliis amplexicaulibus dentatis hirsutis, radicalibus petiolatis ovatis, caulinis sessilibus lanceolatis, superioribus basi auriculatis, pappo exteriori cupulari membranaceo 10-dentato. ♀ in Corsicâ, Galloprov. et agro Ruscinonensi inter Collioure et Bagnols.— Fl. fr. 4. p. 148. — Barr. ic. t. 1145. (v. s.)
14. I. VIScosa (Desf. atl. 2. p. 274.) hirsuto-viscosa, caule superne ramoso, foliis lanceolatis subserratis, pedunculis lateralibus unifloris foliosis, invol. squamis linearis-lanceolatis glabris, pappo externo brevissimo patulo. ♀ in locis incultis, ad sepes et margines agrorum Galliæ australis. — Fl. fr. 4. p. 153. — Clus. hist. 2. p. 20. f. 1. (v. v.)
15. I. DYSENTERICA (L. sp. 1237.) caule pubescente paniculato, ramis lateralibus apice longioribus patulis, foliis amplexicaulibus cordato-oblongis nudis serratis subtus pilosis, invol. squamis setaceis, pappo externo brevi cupulari subintegro. ♀ in fossis et humidis. — Fl. fr. 4. p. 149. *Pulicaria dysenterica* Cass. — Fuchs. hist. 436. ic. (v. v.)
16. I. PULICARIA (L. sp. 1238.) caule erecto paniculato, foliis amplexicaulibus oblongis undulatis villosis, pedunculis unifloris oppositifoliis, floribus subglobosis, radio minutissimo, inv. squamis linearibus, pappo externo profundè dentato subpiloso. (I) in fossis humidis secùs vias. — Fl. fr. 4. p. 150. *Pulicaria vulgaris* Cass. — Blackw. t. 103. (v. v.)

XVII. GNAPHALIUM Lam. DC. fl. fr. 4. p. 133.

Involucrum imbricatum, squamis margine sæpius coloratis, recep-



newspaper receive

taculum nudum; flosculi omnes tubulosi, alii hermaphroditi, alteri feminini; pappus pilosus aut apice dentatus.

Sect. I. GNAPHALON. — *Filago Gærtn. non L.*

Flosculi exteriores feminine fertiles, pappus capillaris.

1. **G. LUTEO-ALBUM** (L. sp. 1196.) caule herbaceo simplici erecto, foliis semi-amplexicaulibus linear-i-lanceolatis subrepandis utrinquè pubescentibus, inferioribus obtusis, superioribus acutis, corymbo glomerato. (1) in humidis. — Fl. fr. 4. p. 133. — Barr. ic. t. 367. (v. v.)
2. **G. SYLVATICUM** (L. sp. 1200.) caule herbaceo simplicissimo erecto tomentoso, foliis lanceolatis utrinquè attenuatis et lanatis, floribus terminalibus axillaribus sessilibus spicatis. 2/4 in sylvis. — Fl. fr. 4. p. 134.
 - a. fuscum*, squamis fuscis, foliis lanceolatis. — G. fuscum Fl. dan. t. 251. (v. v.)
 - f. rectum*, foliis caulinis linear-i-lanceolatis. — G. rectum Sm. fl. brit. 1. p. 870. Fl. dan. t. 1229. (v. v.)
3. **G. SUPINUM** (L. syst. veg. 623.) caule herbaceo simplici procumbente aut minimo, foliis linearibus acutis tomentosis, floribus capitatis. 2/4 in pratis frigidioribus inter saxa et secùs torrentes editiorum montium. — Fl. fr. 4. p. 133. — Bocc. mus. t. 85. (v. v.)
4. **G. ULIGINOSUM** (L. sp. 1201.) caule herbaceo ramoso diffuso lanato, foliis linear-i-lanceolatis utrinquè angustatis tomentosis, floribus terminalibus congestis foliis brevioribus, squamis lanceolatis vix acutis. (1) in paludibus et arvis humidis. — Fl. fr. 4. p. 135. G. minimum Lapeyr. non Smith (teste cl. Arnott.) — Lob. ic. t. 481. (v. v.)
5. **G. ARVENSE** (Lam. dict. 2. p. 759.) caule herbaceo erecto paniculato, foliis oblongo-lanceolatis lanuginosis, floribus congestis lateralibus terminalibusque cano-tomentosis. (1) in campis sabulosis. — Fl. fr. 4. p. 136. (v. v.)
6. **G. GALLICUM** (Lam. l. c.) caule herbaceo erecto subdichotomo, foliis linearibus acuminatis canescensibus, floribus confertis axillaribus terminalibusque foliis semper brevioribus, squamis lanceolatis subobtusis. (1) in arvis sabulosis. — Fl. fr. 4. p. 136. Logfia subulata Cass. (v. v.)
7. **G. GERMANICUM** (Lam. l. c.) caule herbaceo dichotomo, foliis lanceolatis tomentosis acutis, floribus globoso-capitatis axillaribus terminalibusque, squamis lucidis ovato-lanceolatis acuminatis. (1) ad vias fossas et margines agrorum. — Fl. fr. 4. p. 135. Gifola vulgaris Cass. — Lob. ic. t. 480. f. 2. (v. v.)
 - f. pyramidatum*, foliis spathulatis. — G. pyramidatum W. sp. 3. p. 1895. Fl. fr. 5. p. 468. (v. s.)
 - f. lanuginosum*, caulis parte superiore foliis floribusque laxe lanuginosis. (v. s.)
8. **G. MONTANUM** (W. sp. 3. p. 1896.) caule herbaceo erecto subdichotomo, foliis linear-i-lanceolatis adpressis tomentosis, floribus confertis axillaribus terminalibusque folia subsuperantibus, squamis linearibus acutis. (2) in scieci montanis ad margines sylvarum. — Fl. fr. 4. p. 136. Logfia lanceolata Cass. (v. v.)
9. **G. MINIMUM** (Lob. ic. t. 481. f. 2.) caule herbaceo diffuso ramoso, foliis lanceolatis acutis planis canescensibus, floribus conicis subconfertis lateralibus terminalibusque, squamis subobtusis. (1) in agro Borbonio et Aurelianensi. — Fl. fr. 4. p. 137. Logfia brevifolia Cass. (v. s.)

Sect. II. ANTENNARIA *Gærtn. fruct. 2. p. 411. t. 167.*

Flosculi alii hermaphroditi, alii sterile; flosculorum sterili pappus clavatus.

10. **G. DIOICUM** (L. sp. 1199.) sarmentis procumbentibus, caule simplicissimo, foliis radicalibus spathulatis, corymbo coarctato, floribus dioicis, squamis interioribus elongatis obtusis coloratis. 2/4 in pratis montosis nudis. — Fl. fr. 4. p. 137. — Lob. ic. t. 483. f. 2. (v. v.)

11. *G. ALPINUM* (L. sp. 1199.) sarmentis nullis, caule simplicissimo, foliis radicalibus lanceolatis, floribus terminalibus aggregatis sessilibus, squamis interioribus elongatis acutis membranaceis. ♀ in pascuis apricis Alpium editiorum. — Fl. fr. 4. p. 138. Fl. dan. t. 332. (v. v.)
12. *G. LEONTOPODIUM* (Jacq. aust. t. 86.) caule herbaceo simplicissimo, foliis linear-lanceolatis subtus tomentosis, floribus terminalibus sessilibus aggregatis, bracteis lanceolatis lanatis radiato-patentibus, involucris villosis. (I) in Alpibus et Pyrenæis. — Fl. fr. 4. p. 138. *Leontopodium Alpinum* Cass. (v. v.)

XVIII. *ELYCHRYSUM* Gærtn. 2. t. 166. f. 7. DC. fl. fr. 4. p. 130.

Involucrum imbricatum, squamis inæqualibus obtusis scariosis sæpius coloratis; flosculi omnes tubulosi et hermaphroditi; receptaculum nudum; pappus pilosus vel subplumosus.

§. 1. *Involucri squamis albis.*

1. *E. FRIGIDUM* (W. sp. 3. p. 1098.) herbaceum ramosum procumbens, foliis quadrifariam imbricatis oblongis obtusis incanis, ramis unifloris, floribus sessilibus. ♀ in editioribus montibus Corsicæ. — Fl. fr. 4. p. 131. Gn. helidiflorum Viv. fragm. p. 16. t. 19. (v. s.)

§. 2. *Involucri squamis flavis.*

2. *E. STÆCHAS* (DC. fl. fr. 4. p. 132.) fruticosum, foliis linearibus, corymbo composito, squamis ovatis obtusis. ♂ in collibus aridis et arenosis Galliæ australis et in prov. occidentalibus ad Nannetes usque. — Gn. Stæchas L. sp. 1193. — Barr. ic. t. 278. 409. 410. (v. v.)
3. *E. ANGUSTIFOLIUM* (DC. fl. fr. 5. p. 467.) fruticosum, foliis linearibus, corymbo plures composito, involucris oblongis, squamis ovato-spathulatis obtusissimis. ♂ in Corsicæ, Cebennarum, Ruscinonensis agri locis aridis. — Gn. angustifolium Lam. dict. 2. p. 746. — Barr. ic. t. 1125. (v. v.)
4. *E. ARENARIUM* (DC. fl. fr. 4. p. 132.) herbaceum, foliis incanis tomentosis obtusis, radicalibus spathulato-lanceolatis, caulinis linear-lanceolatis, corymbo composito. ♀ in arenosis Alsatiæ, Aureliæ, Lugduni, Burdigalæ ex Laterr., etc. — Gn. arenarium L. sp. 1195. — Barr. ic. t. 74. (v. s.)

++ SEMINA NUDA AUT ARISTATA.

XIX. *FILAGO* L. gen. 995.

Involucrum polyphyllum imbricatum, squamis ovalibus aristato-subulatis; flosculi tubulosi in disco masculi quadrifidi, in radio feminei fertiles, stigmatibus duobus; receptaculum oblongum in radio paleaceum in disco nudum; semina nuda compressa.

1. *F. PYGMÆA* (L. sp. 1311.) involuci squamis foliaceis lucidis glabris. (I) in maritimis et stagnis exsiccatis Corsicæ et Galliæ mediterraneæ. — *Micropus pygmæus* Fl. fr. 4. p. 199. *Evax umbellata* Gærtn. 2. t. 165. f. 3. — Barr. ic. t. 127. n. iv. Hæc sola species omnibus gaudet caracteribus a Linnaeo huic generi assignatis. (v. v.)

XX. *MICROPUS* L. gen. 996.

Involucrum 5-9-phylum squamis laxis, flosculi tubulosi, in disco hermaphroditi steriles 5-dentati pentandri, stigmatibus simplicibus, in radio feminei fertiles stigmatibus duobus; receptaculum conico-subulatum, in radio paleaceum, in disco nudum; semina nuda compressa involuci foliolis involuta.

1. *M. SUPINUS* (L. sp. 1313.) foliis oppositis obovato-cuneatis, involucro in cano coriaceo echinato. (I) in maritimis Galloprov., agri Nicæensis. — Fl. fr. 4. p. 200. Lam. ill. t. 694. f. 1. (v. s. ex Hisp.)





2. *M. ERECTUS* (L. sp. 1313.) foliis alternis ovato-lanceolatis, floribus lanuginosis, involucro inermi. (I) in campis sterilibus, imprimis australibus. — Fl. fr. 4. p. 199. — Clus. hist. 1. p. 339. f. 3. Barr. ic. t. 296. Caules sèpè decumbentes. (v. v.)

XXI. CARPESIUM L. gen. 948.

Involucrum hemisphæricum imbricatum squamis exterioribus patulis; flores flosculosi, flosculis in disco hermaphroditis 5-lobis, in radio femineis fertilibus 5-dentatis; receptaculum nudum; semina nuda.

1. *C. CERNUUM* (L. sp. 1208.) floribus terminalibus solitariis cernuis. 2^f in humidis et umbrosis Delph. ex Vill., Galloprov. ex Ger., Pyren. orientalium ex Lapeyr. — Fl. fr. 4. p. 187. Lam. ill. t. 696. f. 1. (v. s. ex Pedemontio.)

XXII. BUPHTHALMUM L. gen. 977.

Involucrum imbricatum; flores radiati, flosculis hermaphroditis, ligulis femineis fertilibus; receptaculum paleaceum; semina pappo membranaceo obsoleto coronata, ligularum lateribus membranacea.

§. 1. *Involucro foliaceo bracteiformi.*

1. *B. SPINOSUM* (L. sp. 1274.) foliis alternis oblongo-lanceolatis amplexicaulis integrermis hirsutis, involucris foliosis mucronatis. (I) ad margines agrorum in Galliâ mediterraneâ, circâ Aginum ex S.-Am. Burdigalam ex Laterr. — Fl. fr. 4. p. 217. — Clus. hist. 2. p. 13. f. 1. (v. v.)

2. *B. AQUATICUM* (L. sp. 1274.) involucris obtusè foliosis sessilibus axillaribus, foliis oblongis obtusis alternis subintegerimis, caule dichotomo. (I) secùs aquas Occitaniae, Galloprov., Niceæ. — Fl. fr. 4. p. 217. — Barr. ic. t. 552. (v. v.)

3. *B. MARITIMUM* (L. sp. 1274.) involucris obtusè foliosis pedunculatis, foliis alternis spatulatis, caule herbaceo. 2^f in maritimis Niceæ, Massiliae. — Fl. fr. 4. p. 217. — Barr. ic. t. 1151. (v. v.)

§. 2. *Involucro brevi subsquamoso.*

4. *B. SALICIFOLIUM* (L. sp. 1275.) foliis alternis oblongo-lanceolatis subserratis, involucris nudis. 2^f ad radices montium Arverniæ et Galliæ australis. — Fl. fr. 4. p. 218. — Clus. hist. 2. p. 13. f. 3. (v. v.)

XXIII. CHRYSANTHEMUM L. gen. 966. — Chrysanthemum et Pyrethrum Gærtn. carp. 2. p. 420 et 430. DC. fl. fr. 4. p. 177 et 181.

Involucrum hemisphæricum imbricatum squamis margine scariosis; flores radiati; receptaculum nudum; semina nuda aut membranâ brevi coronata.

Sect. 1. LEUCANTHEMUM.

Discus flavus, ligulæ discolores.

§. 1. *Involucro 1-seriato.*


1. *C? PERPUSILLUM* (Lois. not. t. 6. f. 3.) caule pusillo subramoso stolonifero, foliis pinnatifidis, lobis 3-7 rotundis obtusis integerimis, pedicellis axillaribus flore multoties longioribus. (I) in insulis Sanguinariis propè Ajaccio Corsicæ et Lavezzi propè Bonifacio. — Fl. fr. 5. p. 477. (v. s.)


§. 2. *Involucro multiseriato.*

* *Receptaculo convexo.*

2. *C. TOMENTOSUM* (Lois. gall. 580. t. 18.) foliis palmatifidis tomentosis lobis obtusis, involucri squamis ovatis hirsutis, caule ascendentे simplici uni-

- floro. \mathcal{U} in editioribus montibus Corsicæ. — Pyrethrum tomentosum Fl. fr. 5. p. 477. P. minimum Fl. fr. 4. p. 924. (v. s.)
3. C. ALPINUM (L. sp. 1253.) foliis inferioribus pinnatifido-dentatis, summis linearibus integerrimis, involucri squamis lanceolatis glabris, caule 1-floro. \mathcal{U} in lapidosis Alpium et Pyrenæorum. — Pyr. Alpinum Fl. fr. 4. p. 182. — Clus. hist. 1. p. 335. f. 2. (v. v.)
- $\beta.$ pubescens, caule foliisque pubescentibus, squamis ciliatis. — C. minimum Vill. dauph. 3. p. 202. (v. v.)
4. C. HALLERI (Sut. helv. 2. p. 193.) foliis caulinis lanceolatis profundè tenuissimè dentatis, radicalibus pinnatifidis, squamis lanceolatis glabris, caule 1-floro. \mathcal{U} in lapidosis Alpium Delphinatus, Galloprovinciæ. — Pyr. Halleri W. Fl. fr. 4. p. 182. — Barr. ic. t. 458. f. 2. (v. v.)
5. C. CERATOPHYLLOIDES (All. ped. t. 37. f. 1.) foliis pinnato-multifidis, pinnis linearibus acutis, caule erecto unifloro. \mathcal{U} in editioribus Delphinatus et Pyrenæorum orientalium. — Fl. fr. 4. p. 179. (v. v. DC.)
6. C. MONSPELIENSE (L. sp. 1252.) foliis imis palmato-multifidis, laciinis linearibus pinnatifidis, caule erecto unifloro. \mathcal{U} in Corsicæ et Occitaniae locis montosis. — Fl. fr. 4. p. 180. Jacq. obs. t. 93. (v. s.)
7. C. GRAMINIFOLIUM (L. sp. 1252.) foliis linearibus subintegris aut tenuissimè inciso-dentatis, caule simplicissimo unifloro. \mathcal{U} in collibus Galliæ australis. — Fl. fr. 4. p. 179. — Magn. hort. monsp. t. 31. (v. s.)
8. C. LEUCANTHEMUM (L. sp. 1251.) foliis amplexicaulibus lanceolatis serratis basi inciso-dentatis piunatifidisve, radicalibus spathulatis in petiolatum basi decurrentibus, caule erecto. \mathcal{U} in pratis frequens. — Fl. fr. 4. p. 178. — Moris. 3. s. 6. t. 8. n. 2. (v. v.)
- $\beta.$ montanum, foliis superioribus linear-lanceolatis. — C. montanum L. sp. 1252. All. ped. t. 37. f. 2. — Moris. l. c. n. 9. Semina membranâ prominulâ dentatâ sèpè coronantur. (v. v.)
9. C. MAXIMUM (Ram. bull. phil. n. 42. p. 140.) foliis carnosò-fragilibus inferioribus spathulatis subintegris, mediis amplexicaulibus lanceolato-dentatis, summis linearibus integris, caule simplici unifloro. \mathcal{U} in Pyrenæis propè Valletriam in monte dicto Pic de Lhéris. — Fl. fr. 4. p. 178. — Dodart ic. t. 65. Flos duplò major quâm in præcedente. (v. s.)
- ** Recept. hemisphærico, semine 4-gono.
10. C. PARTHENIUM (Sm. brit. 2. p. 900.) foliis petiolatis compositis planis, pinnis ovatis incisis, pedunculis ramosis corymbosis, caule erecto, involucro pubescente squamis linear-spathulatis. (2) \mathcal{U} in incultis et lapidosis. — Pyr. Parthenium Fl. fr. 4. p. 183. Matricaria Parthenium Bull. herb. t. 203. (v. v.)
11. C. CORYMBOSUM (L. sp. 1251.) foliis pinnatifidis, pinnis lanceolatis pinnatifidis argutè serratis, summis confluentibus, pedunculis corymbosis, squamis lanceolato-ovatis. \mathcal{U} in montosis Galliæ mediæ, orientalis, australis occidentalisque. — P. corymbosum Fl. fr. 4. p. 183. — Clus. hist. 1. p. 338. f. 1. Barr. ic. 781. 782. 785. 786. (v. v.)
- *** Recept. conico, semine 3-gono.
12. C. INODORUM (L. sp. 1253.) foliis sessilibus bipinnatifidis, pinnis linearifiliformibus bi-vel-tripartitis, caule ramoso patulo, seminibus membranulâ brevissimâ truncatâ coronatis. (1) in agris, ad vias. — Pyr. inodorum Fl. fr. 4. p. 184. — Fuchs. hist. 144 ic. (v. v.)
13. C. MARITIMUM (Pers. enc. 2. p. 462.) foliis bipinnatifidis, pinnis linearibus brevibus carnosis glabris trifidis, caule diffuso ramoso, seminibus membranâ brevissimâ obsolete 4-dentatâ coronatis. \mathcal{U} in arenosis maritimis ex Abbatis-villâ ad Nannetes. — Pyr. maritimum Sm. engl. bot. t. 970. Fl. fr. 5. p. 477. — Matricaria maritima L. sp. 1256. (v. v. DC.)





Sect. II. CHRYSANTHOS.

Ligulæ disco concolores.

14. C. SEGETUM (L. sp. 1254.) foliis amplexicaulibus supernè laciniatis, inferne profunde dentato-serratis. (I) in arvis. — Fl. fr. 4. p. 181. — Clus. hist. 1. p. 334. f. 2. (v. v.)
15. C. MYCONIS (L. sp. 1254.) foliis ligulatis obtusis serratis, seminibus teretibus membranâ coriacea tubuloso-ligulata coronatis. (I) in Corsicâ, Galloprovinciâ et circâ Nicæam. — Fl. fr. 4. p. 180. — Moris. 3. s. 6. t. 4. n. 1. bis. (v. s.)
16. C. CORONARIUM (L. sp. 1254.) foliis bipinnatifidis acutis extrorsum latioribus, seminibus nudis alatis coronæ 3-dentatis disci dente 1 acuto terminatis. (I) in hortis culta, et circâ Niceam ex All. indigena. — Fl. fr. 4. p. 181. — Clus. hist. 1. p. 335. f. 1. (v. v.)

XXIV. MATRICARIA Tourn. t. 231. L. gen. 967.

Involucrum hemisphæricum imbricatum squamis obtusis, flores radiati; receptaculum nudum conicum; semina nuda.

1. M. CHAMOMILLA (L. sp. 1256.) foliis bipinnatifidis, laciñis capillaribus, in volucro subplanō, squamis obtusiusculis. (I) in hortis et cultis. — Fl. fr. 4. p. 184. — Lob. ic. 770. f. 1. (v. v.)
2. M. SUAVEOLENS (L. sp. 1456.) foliis triplicato-pinnatifidis laciñis tenuissimis, involuci squamis subacute obtusisve. (I) circâ Narbonam, Abbavillam, in Arverniâ. — Fl. fr. 4. p. 185. Flores dimidiò minores quam in præcedente, a quâ tamen non satis distineta. (v. s.)

XXV. ANTHEMIS L. gen. 970.

Involucrum hemisphæricum squamis subæqualibus margine scariosis imbricatum; flores radiati, flosculis hermaphroditis, ligulis lanceolatis femineis fertilibus; receptaculum conicum paleaceum; semina cylindrica aut 3-gona non marginata, nuda aut membranulâ coronata.

§. 1. Disco luteo, radio discolore.

* Seminibus nudis.

1. A. ALTISSIMA (L. mant. 474.) caule erecto ramoso, foliis bipinnatifidis, laciñis lanceolatis acutis subdentalis dentibus inferioribus subreflexis, paleis lanceolatis cuspidatis. (I) in campis Galliæ australis. — Fl. fr. 4. p. 203. — J. Bauh. hist. 3. p. 120. f. 1. (v. v.)
f. tomentosa, laciñis obtusis. Circâ Prades agri Ruscinonensis reperiit Ph. Thomas. (v. s.)
2. A. PEREGRINA (W. sp. 3. p. 2182.) caule erecto ramoso fastigiato, ramis subunifloris, lateralibus apice longioribus, foliis bipinnatis, pinnis linearibus acutis integris, involuci squamis membranaceis. (I) in arenosis Druentiæ propè Avenionem. Corsicâ (cl. Soleiro). — Fl. fr. 5. p. 482. (v. v. DC.)
3. A. COTULA (L. sp. 1261.) foliis bipinnatis glabris puberulivis, pinnis subulatis tripartitis, paleis linear-setaceis acutis, seminibus tuberculosis. (I) in incultis et arvis. — Fl. fr. 4. p. 206. Maruta fatida Cass. (v. v.)
4. A. MIXTA (L. sp. 1260.) caule ramoso, foliis sessilibus semipinnatifidis, laciñis dentatis, paleis lanceolatis duris acutis, seminibus lœvibus. (I) in campis Galliæ occidentalis, australis, orientalisque. — Fl. fr. 4. p. 204. Ormenis bicolor Cass. — Moris. 3. s. 6. t. 12. n. 15. (v. v.)
5. A. INCRASSATA (Lois. not. 120.) caule ramoso patulo, foliis pinnatifidis pubescentibus, laciñulis inferioribus integris acutis, superioribus longioribus pinnatim incisis, pedunculis demùm incrassatis, paleis acutis, seminibus 4-gonis apice umbilicatis. (I)? in arenosis et lapidosis Narbonæ, Arelatis, Niçæe. — Fl. fr. 5. p. 482. A. nicæensis W. sp. 3. p. 2182. (v. v.)

6. A. *FUSCATA* (Brot. phyt. 1. n. 15.) caule diffuso, foliis bipinnatis lineariformibus tripartitis, squamis oblongis paleisque obovatis obtusis margine fuscis. (1) circâ Telonem et Nicæam. — Fl. fr. 5. p. 482. (v. s.)
7. A. *NOVEMLA* (L. sp. 1260.) caule basi ramoso decumbente, foliis bipinnatis, pinnis tripartitis linearis-subulatis subvillosis, paleis mollibus lanceolatis obtusis. ♀ in pascuis siccis. — Fl. fr. 4. p. 205. — Lob. ic. t. 776. f. 2. (v. v.)
* * *Seminibus membranâ brevi coronatis.*
8. A. *ARVENTIS* (L. sp. 1261.) foliis bipinnatis pinnis linearis-lanceolatis pubescentibus acutis, paleis lanceolatis acuminatis, seminibus membranulâ truncatâ coronatis. (2) in arvis. — Fl. fr. 4. p. 206. (v. v.)
9. A. *MONTANA* (L. sp. 1261.) caule ascendentē, foliis piunatis pubescentibus, pinnis linearibus, terminali trifidâ, pedunculis elongatis nudis tomentosis, paleis lanceolatis acutis, seminibus membranulâ inæqualiter truncatâ coronatis. ♀ in Pyrenæis, Cebennis, montibus Arvernianis, Galloprovinciæ. — Fl. fr. 5. p. 483. A. saxatilis DC. syn. fl. gall. 291. (v. v.)
10. A. *MARITIMA* (L. sp. 1259.) caule herbaceo, foliis piunatis carnosis subtus punctatis, lacinis in foliis superioribus lanceolatis, in foliis inferioribus incisis apice dilatatis, seminibus membranulâ brevissimâ denticulatâ coronatis. ♀ in arenosis secùs Mediterraneum. — Fl. fr. 4. p. 204. (v. v.)

§. 2. *Radio concolore luteo.*

11. A. *TINCTORIA* (L. sp. 1263.) foliis subtus pubescentibus tripinnatifidis serratis, caule erecto ramoso, seminibus membranâ integerrimâ coronatis. ♀ in Galliâ mediâ et orientali. — Fl. fr. 4. p. 208. — Barr. ic. t. 465. (v. s.)


XXVI. ANACYCLUS Pers. enc. 2. p. 464. DC. fl. fr. 5. p. 480.


Involucrum hemisphæricum imbricatum squamis ovato-lanceolatis lanceolatis; flosculi omnes tubulosi aut radiati in disco hermaphroditæ, in radio feminei fertiles; receptaculum conicum paleaceum; semina compressa margine membranacea nuda.

1. A. *CLAVATUS* (Pers. enc. 2. p. 465.) caule erectiusculo, foliis subglabris, pediculis subflore incrassatis, floribus radiatis, invol. squamis acutis, paleis glaberrimis spathulatis mucronatis. (1) Narbonæ. — Fl. fr. 5. p. 481. Anthemis clavata Desf. atl. 2. p. 287. Ligulæ albescentes. (v. s.)
2. A. *TOMENTOSUS* (DC. fl. fr. 5. p. 481.) caule demisso, foliis villosis, pediculis cylindraceis, floribus radiatis, invol. squamis subacentis, paleis cuneatis trapezoideis acutis pilis coronatis. (1) circâ Monspelium, Narbouam. — Anthemis biaristata Fl. fr. 4. p. 214. Ligulæ albescentes. (v. v.)
3. A. *VALENTINUS* (L. sp. 1258.) foliis villosis, floribus flosculosis radiatis, flosculorum lacinis inæqualibus, duabus aristatis erectis, invol. squamis subacute, paleis lanceolato-spathulatis subacute pilis coronatis. (1) circâ Cassonam, Perpignanum, Nicæam. — Fl. fr. 4. p. 202. Lam. ill. t. 700. f. 1. (v. v.)
4. A. *RADIATUS* (Lois. gall. 583.) foliis villosis, floribus radiatis, flosculorum lacinis inæqualibus, 2 aristatis, inv. squamis obtusis, paleis spathulatis mucronatis glaberrimis. (1) in provinciis mediterraneis. — Fl. fr. 5. p. 481. Anthemis Valentina L. sp. 1262. Fl. fr. 4. p. 208. Ligulæ latæ flavæ. (v. v.)
5. A. *PURPURASCENS* (Pers. enc. 2. p. 465.) caule foliisque subglabris, floribus radiatis, flosculorum lacinis inæqualibus, inv. squamis obtusis, paleis glaberrimis. (1) in provinciis mediterraneis. — Fl. fr. 5. p. 481. Ligulæ flavæ subtus purpureæ. Præced. var.? (v. s.)

XXVII. ACHILLEA L. gen. 971.

Involucrum ovatum imbricatum; flores radiati, flosculis hermaphroditis, ligulis brevibus femineis paucioribus; receptaculum planum angustum paleaceum; semina nuda.





§. 1. *Floribus luteis.*

1. A. **TOMENTOSA** (L. sp. 1264.) foliis bipinnatifidis villosis, pinnis confertissimis, laciniis linear-lanceolatis integerrimis, corymbo composito. ♀ in sterilibus Delphinatūs, Galloprov. — Fl. fr. 4. p. 210. — Clas. hist. 1. p. 330. f. 2. (v. v.)
2. A. **AGERATUM** (L. sp. 1264.) foliis oblongis obtusis serratis in petiolum attenuatis fasciculatis, corymbo composito coaretato. ♀ in petrosis subhumidis Galliæ australis. — Fl. fr. 4. p. 209. — Lob. ic. t. 489. f. 2. (v. v.)

§. 2. *Florum radius albis.*

3. A. **HERBA-ROTA** (All. ped. t. 9. f. 3.) foliis cuneiformibus basi attenuatis serratis cauleque glabris. ♀ in editissimis Alpibus Delphinatūs. — Fl. fr. 4. p. 210. (v. v. in Helv.)
4. A. **PTRAMICA** (L. sp. 1266.) foliis linearibus acuminatis æqualiter argente serratis glabris. ♀ in pratis subudis. — Fl. fr. 4. p. 211. — Clas. 2. p. 12. f. 1. (v. v.)
f. *pubescens*, foliis glanduloso-pubescentibus. In Pyrenæis. (v. v.)
5. A. **CLAVENNAE** (L. sp. 1266.) foliis tomentoso-incanis subpinnatifidis laciniis lanceolatis obtusis terminali 3-dentatâ, inferioribus petiolatis, corymbo simplici subumbellato. ♀ in Cebennis ex Lois. — Jacq. austr. t. 76. (v. v. D. in Alp. Italicis.)
6. A. **MOSCHATA** (Jacq. austr. app. t. 33.) foliis pectinato-pinnatis glabris, pinnis linearibus obtusiusculis integerrimis punctatis. ♀ inter lapides et saxa Alpium Delphinatūs. — Fl. fr. 4. p. 213. (v. v. D. in Helv.)
7. A. **ATRATA** (L. sp. 1267.) foliis pectinato-pinnatis glabris, pinnis linearibus acuminatis subtripartitis, cyma simplici, pedunculis pubescentibus, caule simplicissimo. ♀ in Pyrenæis ex Lapeyr. et alpibus Delphinatūs? ex Vill. — Fl. fr. 4. p. 214. — Clas. hist. 1. p. 336. f. 2. (v. v. in Helv.)
8. A. **NANA** (L. sp. 1267.) foliis pinnatis villosis, pinnis dentatis linearibus, radicalibus petiolatis bipinnatis, caule simplicissimo, corymbo simplici compacto. ♀ in saxosis editiorum Alpium Delphinatūs, Cebennarum, Pyren. Orientalium. — Fl. fr. 4. p. 213. All. ped. t. 9. f. 2. (v. v.)
9. A. **CHAMÆMELIFOLIA** (Pourr. act. toul. 3. p. 305.) foliis pectinato - pinnatifidis glabris, pinnis linearibus integerrimis, corymbo composito subnudo coarcato. ♀ in Pyrenæis oriental. propè Villefranche et Olette. — Fl. fr. 4. p. 212. (v. v. DC.)
f. *capillata*, corymbo subsimplici. — A. capillata Lapeyr.
10. A. **MACROPHYLEX** (L. sp. 1265.) foliis pinnatis glabris, pinnis lanceolatis inciso-serratis extimis confluentibus, corymbo composito. ♀ in sylvis montosis et lapidosis Alpium Delphinatūs ex Ray et Vill. — Fl. fr. 4. p. 212. — Barr. ic. t. 991. (v. v. in Sabaudia.)
11. A. **DENTIFERA** (DC. fl. fr. 5. p. 285.) caule piloso, foliis pinnatifidis rachi alatâ serrato-incisâ, laciniis inciso-serratis oblongis, superioribus pilosis, floribus fastigiatis corymbosis, invol. cylindrici ovati squamis hirtis. ♀ in Alpibus Galloprovinciae. — Moris. s. 6. t. 11. n. 5 et 14. (v. s.)
12. A. **COMPACTA** (Lam. dict. 1. p. 27.) foliis bipinnatifidis laciniis lanceolatis inciso-serratis, rachi foliaceâ integrâ, corymbis fastigiato-compositis, involucri ovato-globosi squamis hirtis. ♀ in sylvis montosis Delphinatūs? Juras. — Fl. fr. 4. p. 215, excl. syn. All. et Wild. An satis à sequente distincta? (v. s.)
13. A. **TANACETIFOLIA** (All. ped. n. 666.) foliis bipinnatifidis sparse pilosis, rachi integrâ, laciniis linearibus integris serratisve, corymbo composito pauculo, invol. globosi squamis lucidis hirtis. ♀ in sylvis pratisque montosis Alpium Delph., Galloprov., Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 214. (v. v.)
14. A. **LIGUSTICA** (All. ped. t. 53. f. 2.) foliis bipinnatifidis breviter pubescenti-

- bus, laciniis linearibus inciso-serratis, rachi alatâ integerrimâ, corymbo composito fastigiato, invol. ovati squamis breviter pubescentibus. ♀ in colibus Niceæ, Corsicæ. — Fl. fr. 4. p. 215. (v. s.)
15. A. *ODORATA* (L. sp. 1268.) foliis radicalibus petiolatis subtus pilosis bipinnatis, pinnulis linearibus obtusis integris, caulinis pinnatifidis, corymbo simplici. ♀ in asperis apricis secùs agros in Pyren. Orient. et Alpibus Delphinatûs. — Fl. fr. 5. p. 486. — Barr. ic. t. 992. (v. v. DC.)
16. A. *MILLEFOLIUM* (L. sp. 1125.) foliis subtriplicato-pinnatifidis, rachi integerrimâ, laciniis linearibus subacuminatis minimis, summis confluentibus, involuero glabro. ♀ ad vias et in arvis frequens. — Fl. fr. 4. p. 215. Fl. dan. t. 737. (v. v.)
17. A. *SETACEA* (Waldst et Kit. hung. t. 80.) foliis subtriplicato-pinnatifidis, laciniis linear-setaceis mucronatis confertissimis pilosis integris, rachi integrâ angustissimâ, involuero subhирto. ♀ in Pyren. Orient. et Galloprovinciâ propè Avenionem. — Fl. fr. 5. p. 485. (v. v.)
18. A. *NOBILIS* (L. sp. 1268.) foliis caulinis bipinnatifidis, laciniis linearibus subdentatis, rachi alatâ dentatâ, radicalibus triplicato-pinnatifidis, corymbo composito fastigiato densissimo, involuero hirto. ♀ in campis siccis et collibus Galliæ orientalis, mediæ australisque. — Fl. fr. 4. p. 216. (v. v.)

XXVIII. ARTEMISIA L. gen. 945.

Involucrum ovatum aut rotundatum imbricatum; flosculi omnes tubulosi, in disco hermaphrodoti 5-dentati, in radio graciles pauciores integri feminei fertiles; semina nuda; receptaculum nudum aut pilosum.

Sect. I. ABSINTHIUM Hall. helv.

Receptaculum hirsutum.


1. A. *ABSINTHIUM* (L. sp. 1188.) foliis incanis, radicalibus triplicato-pinnatifidis obtusiasculis, superioribus pinnatifidis acutis, laciniis lanceolatis, floribus indivisis, floribus globosis pedunculatis nutantibus. ♀ in lapidosis incultis et montosis. — Fl. fr. 4. p. 189. — Cam. epit. 452. ic. (v. v.)
2. A. *ARBORESCENS* (L. sp. 1188.) foliis tripinnatifidis sericeis, foliolis linearibus, floribus globosis, ramulis floriferis simplicibus. ♂ Olbiæ et in Corsicâ (Req.). — Fl. fr. 4. p. 190. — Lob. ic. t. 753. f. 1. (v. s.)
3. A. *CORYMBOSA* (Lam. dict. 1. p. 265.) suffruticosa, foliis palmato-multifidis, lobis linearibus 3-vel-4-partitis, floribus globosis pedunculatis nutantibus, involuero pubescente. ♂ in apricis demissiorum montium Delphin., Gallo-prov., Niceæ, et agri Ligericini. — Fl. fr. 4. p. 190. — Lob. ic. t. 769. f. 1. Flores paniculati nec minime corymbosi. (v. s.)
4. A. *GLACIALIS* (L. sp. 1187.) caule herbaceo simplicissimo, foliis omnibus palmato-multifidis candidis sericeis, capitulis terminalibus glomeratis sessilibus globosis 40-floris, invol. squamis lanceolato-ovatis margine atratis. ♀ in editissimis Alpibus Delphinatûs. — Fl. fr. 4. p. 191. All. ped. t. 8. f. 3. (v. v.)
5. A. *MUTELLINA* (Vill. dauph. 3. p. 244. t. 35.) caule herbaceo simplicissimo, foliis omnibus palmato-multifidis albido-sericeis, capitulis subovatis 14-floris, inferioribus pedunculatis, summis sessilibus, invol. squamis linear-lanceolatis margine fuscis. ♂ in saxosis editioribus Alpium, montium Arverniæ et Pyrenaorum. — Fl. fr. 5. p. 478. A. rupestris Fl. fr. 4. p. 191. non L. (v. v. D. in Helv.)


Sect. II. DRACUNCULUS.

Receptaculum nudum.

* *Floribus subglobosis.*

6. A. *SPICATA* (L. syst. 744.) caule herbaceo simplicissimo, foliis cano-sericeis, radicalibus palmato-multifidis, caulinis pinnatifidis, summis linearibus inte-





gerrimis obtusis, floribus axillaribus, infimis pedunculatis. ♀ in summis Alpibus et Pyrenæis. — Fl. fr. 4. p. 192. — Barr. ic. t. 462. Magna cum præcedente affinitas. (v. v.)

7. A. CHAMÆMELIFOLIA (Vill. dauph. 3. p. 250. t. 35.) caule erecto basi ramoso glabro, foliis subglabris, inferioribus tripinnatis, superioribus bipinnatis, foliolis linearibus acutis, floribus paniculatis pedunculatis nutantibus. ♀ in apricis humilioribus montium Delphinatūs. — Fl. fr. 4. p. 193. (v. s.)
8. A. MARITIMA (L. sp. 1186.) caule herbaceo ramoso ascendente, ramulis cernuis, foliis niveo-tomentosis multifidis, laciñiis planis linearibus, rameis simplicibus linearibus, floribus oblongis tomentosis sessilibus. ♀ in maritimis. — Fl. fr. 4. p. 196. Wood. med. bot. t. 122. (v. v.)
9. A. CAMPESTRIS (L. sp. 1185.) caule procumbente ramoso virgato, foliis caulinis setaceis pinnatis glabris, radicalibus pinnatis laciñiis trifidis, floribus subovatis pedunculatis. ♀ in campestribus lapidosis siccis. — Fl. fr. 4. p. 194. A. procera Lapeyr. ex cl. Benth. Oligosporus campestris Cass. — Cam. epit. 939. ic. (v. v.)
10. A. CRITHMIFOLIA (L. sp. 1186.) caule ascendente, foliis carnosis obtusis, caulinis pinnatis pinnis simplicibus bifidis linearibus, floralibus indivisis, radicalibus lobis lineari-lanceolatis sæpè sericeis, floribus oblongis pedunculatis erectis. ♀ in arenosis maritimis circà Telonem et ex Bayonnâ ad Nannetes. — Fl. fr. 4. p. 478. An præcedentis var.? (v. v.)
11. A. TANACETIFOLIA (L. sp. 1188.) caule simplicissimo herbaceo, foliis bipinnatifidis subpubescentibus, laciñiis lineari-lanceolatis acuminatis integerimis, racemo nudo terminali, floribus subrotundis nutantibus, squamis ovatis obtusis margine scariosis. ♀ in Alpibus Delphinatūs. — Fl. fr. 4. p. 193. All. ped. t. 10. f. 3 et t. 70. f. 2. (v. s.)
12. A. DRAGUNCULUS (L. sp. 1189.) foliis glabris lanceolatis utrinquè attenuatis, floribus subrotundis pedunculatis erectis. ♀ E. Sibiriâ orta, in hortis culta, in Lotharingia spontanea? — Fl. fr. 4. p. 195. Oligosporus condimentarius Cass. — Gm. sib. t. 1. t. 59 et t. 60. f. 1. (v. s. c.)
* * *Floribus ovatis vel cylindricis.*
13. A. CÆRULESCENS (L. sp. 1189.) caule suffruticoso ramoso, foliis incanis lanceolatis, superioribus integerrimis, inferioribus 2-aut 3-partitis, floribus oblongis paniculatis nutantibus. ♂ in maritimis circà Nicæam ex All. — Fl. fr. 4. p. 195. — Lob. ic. t. 765. f. 2. (v. s.)
β. Corsica, foliis præsertim inferioribus subglabris. — In Corsicâ. (v. s.)
14. A. VULGARIS (L. sp. 1188.) caule herbaceo, foliis pinnatifido-incisis subtus tomentosis suprà atro-viridibus, floralibus indivisis lineari-lanceolatis, floribus subsessilibus oblongis erectis, involucris tomentosis. ♀ ad vias in incultis. — Fl. fr. 4. p. 195. — Lob. ic. t. 764. f. 2. (v. v.)
15. A. ARAGONENSIS (Lam. dict. 1. p. 269.) caule erecto basi fruticoso lanato, foliis sericeis bipinnatifido-palmatis, floralibus simplicibus, floribus ovatis paniculatis sessilibus tomentosis. ♂ in Navarrâ ad limites Hispaniæ in declivibus apricis. — Fl. fr. 5. p. 499. — Barr. ic. t. 447. (v. s. ex Hisp.)
16. A. GALLICA (W. sp. 3. p. 1834.) caule erecto ramoso tomentoso, ramis erectis, foliis incanis bipinnatis tripinnatisve laciñiis linearibus obtusis, caulinis pinnatis, summis linearibus, capitulis oblongis subsessilibus erectis sub 3-floris. ♀ in maritimis Niceæ, Occitaniæ, agri Ruscinonensis, Vindeensis (Vendée) et circà Nannetes. — Fl. fr. 4. p. 197. (v. v.)
β. congesta, ramis abbreviatis, floribus congestis. — Circà Massiliam reperiit amic. Solier. An species? (v. s.)
17. A. ABROTANUM (L. sp. 1185.) frutescens, caule stricto, foliis inferioribus bipinnatis, superioribus pinnatis capillaceis, involucris pubescentibus hemisphaericis. ♂ in Galliâ australi? in hortis odoris gratiâ culta. — Fl. fr. 4. p. 197. — Moris. s. 6. t. 2. n. 2. (v. v. c.)

18. *A. PANICULATA* (Lam. dict. 1, p. 265.) frutescens, caule ramoso patente, foliis omnibus bipinnatis capillaceis, involucris glabris hemisphaericis. ♂ in Galliā australi Lam., ex Occitanī et agro Ruscinonensi, Pyren. editioribus? ex Lapeyr. — Fl. fr. 4. p. 198. — Lob. ic. 768. f. 2. (v. s. c.)

XXIX. *COTULA L. gen. n.* 968.

Involucrum pauciseriatum squamis imbricatis obtusis margine scariosis; flosculi omnes tubulosi, in disco hermaphroditi 4-dentati, in radio feminine fertiles; receptaculum conicum nudum; semina ovato-compressa nuda.

1. *C. AUREA* (L. sp. 1257.) foliis bipinnatifidis, laciis simplicibus incisisve capillaribus. (1) in provinciis Australioribus. — *Anacyclus aureus* L. mant. 287. Fl. fr. 4. p. 202. *Marcelia aurea* Cass. (v. s.)

XXX. *LONAS Gærtn. carp. 2. t. 165. Juss. ann. mus. 8. p. 173.*

Involucrum ovato-rotundum imbricatum squamis ovatis; receptaculum conico-subulatum paleaceum; flosculi omnes fertiles tubulosi androgyni; semina pappo membranaceo oblique truncato denticulato coronata.

1. *L. INODORA* (Gærtn. 2. t. 165. f. 5.) (1) in Galliā australi ex Pers., in agro Ruscinonensi ex Lapeyr. Fl. fr. 5. p. 480. — *Athanasia annua* L. (v. v. c.)

XXXI. *TANACETUM Tourn. t. 261. L. gen. 944.*

Involucrum hemisphaericum imbricatum; flores flosculosi; flosculi in centro hermaphroditi 5-lobi, in radio feminine fertiles 3-lobi; receptaculum nudum; semina pappo membranaceo integro coronata.

1. *T. vulgare* (L. sp. 1148.) foliis bipinnatifidis incisis serratis, (2) in ruderatis ad muros. — Fl. fr. 4. p. 189. — *Fuchs. hist. 46. ic. (v. v.)*

XXXII. *SANTOLINA Tourn. t. 260. L. gen. 942.*

Involucrum hemisphaericum imbricatum; flosculi omnes tubulosi hermaphroditi; receptaculum paleaceum; semina nuda.

1. *S. ROSMARINIFOLIA* (L. sp. 1180. a.) pedunculis unifloris, foliis linearibus, inferioribus subpubescentibus margine tuberculatis, superioribus planis integrerrimis glabris, ramis involucrisque glabris. ♂ in Galliā australi. — Fl. fr. 4. p. 201. — Moris. s. 6. t. 3. n. 22. (v. v.)
2. *S. VIRIDIS* (W. sp. 3. p. 1798.) pedunculis unifloris, foliis subcylindricis glabris quadrifariam dentatis, dentibus subulatis rectis, ramis involucrisque glabris. ♀ in Galliā australi circā Narbonam. — Fl. fr. 4. p. 200. (v. s.)
3. *S. SQUARROSA* (W. sp. 3. p. 1798.) pedunculis unifloris, foliis glabris quadrifariam dentatis dentibus subulatis patentibus, ramis tomentosis, involucris glabris. ♀ in asperis Occitaniae Narbonensis, et agri Ruscinonensis. — Fl. fr. 5. p. 479. — Moris. s. 6. t. 3. n. 17. *Sequentis varietas?* (v. v. DC.)
4. *S. INCANA* (Lam. ill. t. 671. f. 3.) pedunculis unifloris, foliis sub 4-gonis incanis quadrifariam dentatis dentibus obtusis, ramis tomentosis, involucris pubescentibus. ♂ in collibus agri Ruscinonensis, Occitaniae circā Narbonam, Nemanum, et Galloprovinciæ circā Massiliam (Solier). — Fl. fr. 4. p. 200. — Moris. l. c. n. 12. (v. s.)

XXXIII. *DIOTIS Desf. atl. DC. fl. fr. 4. p. 201.*

Involucrum hemisphaericum imbricatum; flosculi omnes tubulosi hermaphroditi 5-dentati medio coarctati, basi dilatati in appendices 2 ovarium cingentes; receptaculum convexus paleaceum; semina nuda.

for reaction mixture -

$$w = 2.0 \times 10^{-3} \text{ g, } 10^{-3} \text{ mol}$$



1. **D. CANDIDISSIMA** (Desf. atl. 2. p. 251.) pedunculis corymbosis, foliis oblongis obtusis crenatis dense lanatis. ♀ in arenosis maritimis à Niceâ ad Nannetes. — Fl. fr. l. c. — Gærtn. fruct. 2. t. 165. f. 2. (v. v.)

XXXIV. RALSAMITA Vaill. DC. fl. fr. 4. p. 187.

Involucrum patens imbricatum; flosculi omnes tubulosi hermaphroditæ 5-dentati; receptaculum nudum; semina incompletâ membranâ coronata.

1. **B. MAJOR** (Desf. act. soc. hist. nat. 1. p. 3.) caule subherbaceo, foliis ellipticis crenato-dentatis, inferioribus petiolatis, superioribus sessilibus basi auriculatis, floribus corymbosis. ♀ in Gallia australi. — Fl. fr. 4. p. 187. — Dalech. hist. 678. ic. (v. s.)
2. **B. VIRGATA** (Desf. l. c. 1. p. 2.) caule herbaceo basi ramoso ramis unifloris, foliis caulinis sessilibus linearibus acutis dentato-serratis, radicalibus spathulatis obtusis crenato-dentatis. ♀ in aridis agri Nicaënsis. — Fl. fr. 4. p. 188. Chrysanth. discoideum All. ped. t. 11. f. 1. (v. v. DC.)
3. **B. AGERATIFOLIA** (Desf. l. c. 1. p. 2.) caule suffruticoso basi simplici supernè ramoso, foliis oblongo-spathulatis argutè profundeque serratis dentibus mucronatis. ♂ in Corsicâ. — Moris. s. 6. t. 9. n. 16. (v. s.)
4. **B. ANNUA** (DC. fl. fr. 4. p. 187.) caule herbaceo supernè ramoso corymboso, foliis radicalibus bipinnatifidis, caulinis confertis pinnatifidis pubescentibus, pinnis linearibus acutis mucronatis. ♂ in sabulosis incultis circâ Avenionem, Vindomagum, Arelatem, Nicaëam. — Tanacetum annum L. sp. 1183. — Clus. hist. 1. p. 336. f. 1. (v. s.)
5. **B? AUDIBERTII** (Req. in ann. sc. nat. t. 5. p. 382.) foliis bipinnatifidis pubescentibus laciniis lineari-lanceolatis incisis acutis; floribus paucis subcorymbosis. ♀ in editiori sylvâ Valdoniello Corsicæ (Req. Soleir.). (v. s. nondum florentem.)

XXXV. AMBROSIA Tourn. t. 252. L. gen. 1057.

Monoica. *Masc.* Involucrum monophyllum; receptaculum nudum; flosculi tubulosi. *Fem.* Perigonium nullum; involucrum 1-phylum 1-florum extùs muricatum, intùs 1-loculare; semen involucro indurato obiectum.

1. **A. MARITIMA** (L. sp. 1401.) foliis bipinnatis obtusis subtùs canis, terminalibus solitariis, caule divaricato, ramis villosis. ♂ in arenosis maritimis circâ Nicaëam. — Fl. fr. 3. p. 326. — Barr. ic. f. 1144. (v. s.)

XXXVI. XANTHIUM L. gen. n. 1056.

Monoicum. *Masc.* Involucrum polyphyllum multiflorum; receptaculum paleaceum; flosculi tubulosi. *Fem.* Invol. 1-phylum flores omnino involvens extùs muricatum, intùs in loculos 2 unifloros divisum; perigonium o; semina involucro indurato clauso obiecta.

1. **X. MACROCARPUM** (DC. fl. fr. 5. p. 356.) caule inermi, foliis basi cuneatis subcordatis trinerviis, fructibus oblongis, aculeis conicis incurvis uncinatis, terminalibus corniformibus intùs uncinatis. ♂ in vineis Occitaniae inferioris. — X. orientale L. sp. 1400. excl. syn. Gærtn. 2. t. 164. f. 9. (v. v.)
2. **X. STRUMARIUM** (L. sp. 1400.) caule inermi, foliis cordatis 3-nerviis, fructibus ovatis, aculeis linearibus rectis apice breviter hamatis, terminalibus corniformibus rectis. ♂ ad sepes et vias Galliæ mediæ, occidentalis australisque. — Fl. fr. 3. p. 326. — Lob. ic. t. 588. t. 2. (v. v.)
3. **X. SPINOSUM** (L. sp. 1400.) spinis ternatis, foliis trilobis. ♂ ad agros et vias Galliæ mediterraneæ, circâ Aginnum ex St.-Aman, Burdigalam ex Laterr., Parisios ex Mér. — Fl. fr. 3. p. 327. Lam. ill. t. 765. f. 4. (v. v.)

XXXVII. HELIANTHUS L. gen. 979.

Involucrum imbricatum, foliolis patulis vel reflexis; receptaculum latum paleaceum; flores radiati, flosculis hermaphroditis in medio ventricosis, ligulis sterilibus; semina aristis 2 mollibus et caducis coronata.

1. *H. ANNUUS* (L. sp. 1276.) foliis omnibus cordatis trinervatis hirtis, pedunculis incrassatis, floribus cernuis. (I) è Peruvia ortus, in hortis cultus. — Fl. fr. 4. p. 220. Mill. ill. ic. (v. v.)
2. *H. TUBEROSUS* (L. sp. 1277.) foliis triplinerviis scabris acuminatis, inferioribus cordato-ovatis, superioribus ovatis in petiolum decurrentibus, squamis involueri ciliatis. (I) è Brasiliæ ortus, in hortis cultus. — Fl. fr. 4. p. 220. Jacq. hort. vind. t. 161. (v. v.)
3. *H. MULTIFLORUS* (L. sp. 1277.) foliis triplinerviis scabris, inferioribus cordatis, superioribus ovatis acutis, involueri squamis lanceolatis vix ciliatis. (I) è Virginiam ortus, in hortis cultus. — Fl. fr. 4. p. 220. — Pluck. t. 159. f. 2. (v. v.)

XXXVIII. BIDENS Tourn. 262. L. gen. 932.

Involucrum calyculatum foliolis exterioribus longioribus patulis; receptaculum planum paleaceum; flores plerumque flosculosi, flosculis omnibus hermaphroditis raro radiatis, ligulis nunc femineis, nunc hermaphroditis; semina 2-5 aristis persistentibus coronata.

1. *B. TRIPARTITA* (L. sp. 1165.) floribus flosculosis bracteatis, bracteis flore majoribus, foliis tripartitis, foliolis lanceolatis dentatis. (I) in fossis et aquaticis frequens. — Fl. fr. 4. p. 219. — Blackw. t. 519. (v. v.)
2. *B. CERNUA* (L. sp. 1165.) floribus terminalibus subnutantibus, bracteis lanceolatis integris, foliis subconnatis ovato-lanceolatis serratis. (I) in fossis humidis, ad fontes. — Fl. fr. 4. p. 219. — Tab. ic. 117. Variat radiata et flosculosa. (v. v.)

XXXIX. TAGETES Tourn. t. 278. L. gen. 964.

Involucrum polyphyllum simplex squamis coalitis; receptaculum nudum; flores radiati; semina aristis 5 coronata.

1. *T. PATULA* (L. sp. 1249.) caule patulo, foliis pinnato-multifidis, lacinias lanceolatis, ciliato-serratis pedunculis unifloris subincrassatis, involucris laevibus. (I) ex Mexico orta, in hortis culta. — Fl. fr. 4. p. 172. — Dill. elth. t. 279. f. 361. (v. v.)
2. *T. ERECTA* (L. sp. 1249.) caule erecto, foliis pinnato-multifidis, foliolis lanceolatis ciliato-serratis, pedunculis unifloris ventricoso-incrassatis, involucris angulatis. (I) cum priori. — DC. syn. gall. p. 285. — Col. ephr. 2. t. 46. f. 1. (v. v.)

XL. CALENDULA L. gen. 990.

Involucrum polyphyllum simplex æquale; flores radiati; flosculi in disco masculi, in radio hermaphroditæ; ligulæ femineæ fertiles; semina nuda membranacea irregularia curvata.

1. *C. ARvensis* (L. sp. 1303.) seminibus cymbiformibus muricatis incurvatis, exterioribus lanceolato-subulatis dorso muricatis. (I) in vineis et arvis. — Fl. fr. 4. p. 177. — Moris. s. 6. t. 4. n. 6. (v. v.)
2. *C. OFFICINALIS* (L. sp. 1304.) seminibus omnibus cymbiformibus muricatis incurvatis. (I) in arvis Galliae australis. — Fl. fr. 4. p. 177. — Blackw. t. 106. (v. v.)

Trib. II. CYNAROCEPHALÆ.

Corollæ omnes tubulosæ, receptaculum paleaceum; stigma



cum apice styli articulatum. — Folia alterna sæpius spinosa; genitalia ex irritatione sæpius contractilia.

† PAPPO NULLO.

XL. ECHINOPS L. gen. 999. DC. mem. comp. p. 19.

Involucra uniflora numerosa polyphylla squamis linearibus acutisimis, basi setis obtecta, aggregata super receptaculum nudum globosum in capitulum sphæricum basi squamis reflexis minimis cinctum; corollulae 5-dentatae; semina pentagona pappo piloso brevissimo coronata.

1. E. SPHÆROCEPHALUS (L. sp. 1314.) caule ramoso, foliis pinnatifidis supernè pubescentibus subtus incano-lanuginosis, setis involucri dimidium superantibus. ♀ in sterilibus et in cultis provinciarum australiorum. — Fl. fr. 4. p. 75. — Lob. ic. 2. t. 8. f. 2. (v. v.)
2. E. RITRO (L. sp. 1314.) caule subsimplici corymboso, foliis pinnatifidis supra glabris subtus tomentosis, setis involucro subtriplo brevioribus. ♀ in collibus sterilibus Galliæ australis. — Fl. fr. 4. p. 71. — Lob. ic. 2. t. 8. f. 1. — Gouan ill. 74. (v. v.)

XLII. CARTHAMUS DC. mem. comp. p. 20. — Carthami sp. L.

Involucrum foliaceum imbricatum subspinatum; flosculi numerosi omnes hermaphroditi tubulosi 5-dentati; staminum filamenta glabra; receptaculi paleæ longitudinaliter dissectæ et setacea; semina glabra lævia.

1. C. TINTORIUS (L. sp. 1162.) caule glaberrimo, foliis ovatis integris spinosodentatis, pappo nullo. ♀ in Galliâ australi culta, circâ Nicæam disseminata ex All. — Fl. fr. 4. p. 72. Lam. ill. t. 661. f. 3. (v. v.)

†† PAPPO PILOSO AUT PLUMOSO.

XLIII. CARDUNELLUS DC. mem. comp. p. 20.

Involucrum foliaceum imbricatum subspinatum; flosculi numerosi, omnes hermaphroditi tubulosi 5-dentati; staminum filamenta pilis hispida; receptaculi paleæ longitudinaliter dissectæ et setacea; semina lævia, pappus pilosus. — Flores cœrulei.

1. C. MITISSIMUS (DC. fl. fr. 4. p. 73.) foliis inermibus, radicalibus lanceolatis serratis, caulinis pinnatifidis, involuci subcylindracei squamis subaventiis integris inermibus, caule brevi 1-floro. ♀ in Galliâ mediâ, occidentali et australi. — Carthamus mitissimus L. sp. 1164. (v. v.)
2. C. MONSPELIENSIMUM (All. ped. n. 563.) foliis spinosis, radicalibus obovatis serratis, caulinis pinnatifidis, invol. ovati squamis exterioribus trinerviis margine et apice spinosis, caule brevi 1-floro. ♀ in montosis aridis Galliæ australis. — Fl. fr. 4. p. 73. — Lob. ic. 2. p. 20. f. 1. (v. v.)
3. C. CÆRULEUS (DC. mss.) caule elongato subunifloro, foliis spinosis lanceolatis inciso-dentatis sessilibus amplexicaulibus. ♀ in Corsicâ reperiit Ph. Thomas. — Carthamus cœruleus L. sp. 1163. — Moris. s. 7. t. 34. n. 19. (v. s.)
4. C. TINGITANUS (DC. mss.) caule elongato subunifloro, foliis spinosis, radicalibus pinnatifidis laciniis linearis lanceolatis dentatis, superioribus amplexicaulibus basi subauriculatis linearis lanceolatis inciso-dentatis. ♀ in collibus circâ Bonifacio reperiit Soleiro. — Carthamus tingitanus L. sp. 1163. An notæ characteristicæ hanc speciem à præcedente secernentes, satis constantes? (v. s.)

XLIV. ARCTIUM *Dalech.* *Lugd.* 1307. f. 1. *Lam.* *DC. mem. comp.* p. 21.

Involucrum imbricatum squamis acutis vix spinosis; receptaculum favosum alveolorum marginibus dentatis; semina laevia prismatica; pappus persistens rigidus pilosus pilis spiraliter contortis.

1. A. **LANUGINOSUM** (*Lam.* ill. t. 664.) foliis petiolatis subrotundo-ovatis subcordatis crenato-dentatis inermibus tomentosis. ♀ in locis schistosis et apri-cis Alpium Delphin. et Galloprovinciae. — Fl. fr. 4. p. 75. — Moris. s. 7. t. 32. n. 4. (v. v. DC.)

XLV. LAPPA *Tourn.* *inst.* 450. t. 156. *DC. mem. comp.* p. 20.

Involucrum imbricatum squamis desinentibus in spinam mollem apice hamatam; receptaculum paleaceum; pappus brevis persistens pilis rigidis inaequalibus.

1. L. **TOMENTOSA** (*Lam.* dict. 1. p. 377.) involucris arachnoideo-tomentosis. (2) ad vias et in ruderatis. — Fl. fr. 4. p. 77. — Mill. ic. t. 139. (v. v.)
2. L. **GLABRA** (*Lam.* dict. 1. p. 377.) involucris glabris. (2) ad vias et in nemoribus. — J. Bauh. *hist.* 3. p. 570. f. 1.
 - α. *minor* (DC. mss.) floribus minoribus racemosis. — L. *minor* Fl. fr. 4. p. 77. eng. bot. t. 1228. (v. v.)
 - β. *major* (DC. mss.) floribus majoribus solitariis. — L. *major* Fl. fr. 4. p. 77. — Dod. *pempt.* 58. f. 1. (v. v.)

XLVI. ONOPORDUM *L.* *gen.* 927. *DC. mem. comp.* p. 20.


Involucrum imbricatum squamis pungentibus; receptaculum favosum; semina compressa tetragona transverse sulcata; pappus caducus pilosus, pilis basi annulatim connexis.


§. 1. *Caulescentia, foliis decurrentibus.*

1. O. **ARABICUM** (*L.* sp. 1159. excl. Barr. syn.) involuci squamis adpressis ovato-lanceolatis breviter spinosis glabris, foliis pinnatifido-sinuatis dentato-spinosis tomentosis. (2) Monspelii, in aridis. — Fl. fr. 5. p. 456. — Pluck. *alm.* t. 154. f. 5. (v. v.)
2. O. **ACANTHUM** (*L.* sp. 1158.) involuci squamis patentissimis linearisubnatis flosculis brevioribus, foliis tomentosis sinuatis dentato-spinosis, ramis multifloris. (2) ad margines viarum. — Fl. fr. 4. p. 74. — Lob. ic. 2. p. 1. f. 1. (v. v.)
3. O. **VIRENS** (DC. fl. fr. 5. p. 456.) involuci squamis viscidulis arachnoideo-pubescentibus plano-concavis rectis patentissimis, foliis vix pubescentibus sinuatis dentato-spinosis, summis elongatis apice subintegris, caule pubescente ramoso. (2) Monspelii in aridis. — Barr. ic. t. 501. (v. v.)
4. O. **ILLYRICUM** (*L.* sp. 1148.) invol. squamis basi latis apice angustis exteriорibus recurvo-reflexis, interioribus patentibus, foliis tomentosis sinuatis dentato-spinosis, summis brevissimis, caule tomentoso subsimplici. ♀ in siccis et sterilibus Galliae australis. — Fl. fr. 4. p. 74. — Gærtn. *fruct.* t. 161. f. 1. (v. v.)

§. 2. *Acaulia, foliis subradicalibus.*

5. O. **PYRENAICUM** (DC. fl. fr. 5. p. 457.) involucris plurimis ovatis subsessilibus, squamis lanceolatis spinosis suberectis, foliis petiolatis pinnatifidis dentato-spinosis tomentosis subtus candidissimis. ♀ in Pyrenæis. — O. acaule. Fl. fr. 4. p. 75. non L. (v. v.)





XLVII. SILYBUM Vaill. acad. 1718. DC. mem. compos. p. 21.

Involucrum imbricatum squamis basi foliaceis arcte adpressis apice appendiculatis patulis spinescentibus; receptaculum paleaceum; pappus piloso-paleaceus deciduus, pilis basi in annulum connatis.

1. S. MARIANUM (Gærtn. fruct. 2. p. 378. t. 162. f. 2.) foliis amplexicaulinibus hastato-pinnatifidis albo-maculatis glabris. (1) ad margines viarum et in locis incultis. — *Carduus Mariannus*. Fl. fr. 4. p. 78. — Lob. ic. p. 7. f. 2. (v. v.)

XLVIII. CARDUUS Gærtn. 2. p. 377. t. 162. DC. mem. comp. p. 21. — Cardui sp. L.

Involucrum imbricatum, squamis simplicibus apice spinosis; receptaculi paleae longitudinaliter dissectæ in setas lineares; pappus caducus pilosus pilis basi in annulum connatis.

1. C. NUTANS (L. sp. 1150.) foliis decurrentibus lanceolatis sinuatis spinosis, floribus solitariis cernuis, involuci squamis patentibus lanceolatis spinosis. (2) in ruderatis. — Fl. fr. 4. p. 80. — Moris. s. 7. t. 31. n. 6. (v. v.)
 2. C. NIGRESCENS (Vill. dauph. 3. t. 20.) foliis decurrentibus lanceolatis sinuato-pinnatifidis spinosis, floribus solitariis cernuis, involuci squamis patentireflexis linearibus breviter spinosis. (2) in asperis Delph., Galloprov., Occitanie. — Fl. fr. 5. p. 458. (v. v. DC.)
 3. C. ARENARIUS (Desf. atl. 2. t. 222.) foliis decurrentibus oblongis sinuato-pinnatifidis margine spinosis utrinquè tomentosis, capitulis paucis aggregatis breviter pedunculatis terminalibus, involuci squamis linearibus apice subulatis vix spinosis, caule simplici. (2) in asperis Galloprovinciæ superioris. — Fl. fr. 5. p. 457. — Barr. ic. 417. (v. s.)
 4. C. CARLINOIDES (Gou. ill. p. 62. t. 23.) foliis decurrentibus pinnatifidis spinosissimis utrinquè tomentosis, floribus glomeratis, invol. squamis linearilanceolatis exterioribus spinosis, interioribus mollibus apice subsuccariosis. 2 in Pyrenæorum glareosis. — Fl. fr. 4. p. 83. (v. v.)
 5. C. PODACANTHUS (DC. fl. fr. 4. p. 80.) foliis decurrentibus lanceolatis pinnatifidis spinosis, floribus congestis, pedunculis brevibus alato-spinosissimis, invol. squamis linearilanceolatis subulatis subpatentibus pungentibus. 2 in Delphinatū montosis. — *C. aurosicus Chaix* in Vill. dauph. 3. t. 20. (v. s.)
 6. C. CRISPUS (L. sp. 1150.) foliis decurrentibus oblongis sinuatis margine breviter spinosis, floribus aggregatis terminalibus, invol. squamis linearilanceolatis patulis exterioribus subulato-pungentibus, interioribus mollibus apice scariosis. (2) in arvis, cultis, ad sepes provinc. orientalium. — Fl. fr. 4. p. 79. — Loes. pruss. t. 5. (v. v.)
 7. C. ACANTHOIDES (L. sp. 1150.) foliis decurrentibus sinuato-pinnatifidis margine spinosis, floribus solitariis congestive erectis, involuci squamis linearibus laxis subulatis, exterioribus subpungentibus, interioribus mollibus. (1) in arvis incultis. — Fl. fr. 4. p. 79. Vix à praecedente distinctus. (v. v.)
 8. C. LEUCOGRAPHUS (L. sp. 1149.) foliis decurrentibus sinuato-dentatis breviter spinosis subtus arachnoideo-tomentosis, pedunculis longis unifloris tomentosis nudis, involuci squamis linearilanceolatis subspinosis arachnoideis erectis. (1) in sterilibus Corsicæ et Galliæ australis. — Fl. fr. 4. p. 78. All. ped. t. 73. *Tyrimnus leucographus* Cass. (v. s.)
 9. C. TENUIFLORUS (Sm. Fl. brit. 849.) foliis decurrentibus sinuatis subtus tomentosis, capitulis ovato-cylindraceis subaggregatis, involuci squamis lanceolatis laxiusculis, exterioribus spinosis, interioribus mollibus acutis. (1) (2) in locis incultis, ad muros.
- a. *acanthifolius* (DC. mss.) alis caulinis latis, capitulis aggregatis sessiliibus, foliis immaculatis. In Galliâ australi. 2 *C. tenuiflorus* eng. bot. t. 412. Fl. fr. 4. p. 79. — Moris. s. 7. t. 31. n. 13. (v. v.)


- β. Arabicus* (DC. mss.) alis caulinis latis, floribus aggregatis, foliis albis venis notatis.—In Galliâ australi.—C. Arabicus Jacq. ic. rar. t. 166. (v. s.)
- γ. pycnocephalus* (DC. mss.) alis caulinis angustis, floribus aggregatis subsessilibus.—In Corsicâ et Galliâ australi.—C. pycnocephalus Jacq. vind. t. 44. non L.—Moris. s. 7. t. 3o. f. 9. n. 17. (v. v. DC.)
- δ. elongatus* (DC. mss.) alis caulinis angustis valde interruptis, pedunculis elongatis nudis uni-aut paucifloris.—In Galliâ meridionali.—G. pycnocephalus Fl. fr. 4. p. 79. (v. v.)
10. C. DEFLOTRATIS (L. sp. 1152.) foliis decurrentibus oblongis sinuatis spinososerratis glabris subtus glaucis, pedunculis longissimis unifloris tomentosis, squamis erectis linearibus acutis, ♀ in lapidosis herbosis montium Galliæ australis orientalisque.—Fl. fr. 4. p. 81. Jacq. aust. t. 89.—Hall. helv. t. 4. f. 2. (v. v.)
11. C. ARGEMONE (Lam. dict. 1. p. 700.) foliis semi-decurrentibus oblongolanceolatis semi-pinnatifidis spinoso-serratis glabris subtus glaucis, pedunculis breviusculis 1-floris tomentosis, invol. squamis linearis-subulatis arachnoideo-tomentosis, exterioribus subspinosis, interioribus mollibus vix acutis. ♀ in Pyrenæis.—Fl. fr. 4. p. 83. Nimum præcedenti affinis. (v. s.)
12. C. MEDIUS (Gouan ill. p. 62. t. 24.) foliis semi-decurrentibus oblongo-lanceolatis semi-pinnatifidis spinosis serratis subtus glaucis laciniis trilobis, pedunculis paucis longissimis tomentosis unifloris, invol. squamis linearis-subulatis subglabris, exterioribus subspinosis, interioribus mollibus acutis. ♀ in Pyrenæorum pratis montanis et humidiusculis.—Fl. fr. 4. p. 82. A præcedenta non satis distinctus. (v. v.)
13. C. CARLINÆFOLIUS (Lam. dict. 1. p. 700.) foliis decurrentibus lanceolatis pinnatifidis glabris subtus glaucis rigido-spinosis, pedunculis tomentosis unifloris erectis, invol. squamis glaucis linearis-lanceolatis exterioribus subulato-pungentibus, interioribus molliusculis. ♀ in Pyrenæis et Alpibus Galloprovinciæ.—Fl. fr. 4. p. 82. (v. v.)
14. C. PERSONATA (Jacq. aust. t. 348.) foliis caulinis semidecurrentibus oblongis indivisis spinoso-dentatis subtus villosis, radicalibus basi pinnatifidis, floribus subsessilibus congestis, invol. squamis linearis-subulatis subinermibus. Ⓣ in pascuis humidis montosis.—Fl. fr. 4. p. 84.—Gærtn. fruct. 2. t. 16o. f. 1. (v. v.)


XLIX. SERRATULA DC. mem. comp. p. 21.

Involucrum imbricatum squamis inermibus acutis; receptaculi paleæ longitudinaliter dissectæ in setas lineares; pappus persistens pilis rigidis inæqualibus.

* *Foliis subtus glabris.*

1. S. TINCTORTA (L. sp. 1144.) foliis subpinnatifidis argutè serratis, laciniis inferioribus minoribus terminali maximâ, flosculis omnibus æqualibus. ♀ in nemoribus et pratis umbrosis.—Fl. fr. 4. p. 85. Fl. dan. t. 28t. (v. v.)
- β. *indivisa*, foliis omnibus indivisis. (v. v.)
- γ. *incisa*, foliis omnibus incisis laciniis subæqualibus.—Fl. fr. 5. p. 458.
S. coronata Fl. fr. 4. p. 85. excl. desc.—Bocc. mus. t. 37. (v. s.)
2. S. HETEROPHYLLA (Desf. cat. p. 93.) foliis inferioribus longè petiolatis ovatis grossè serratis, superioribus basi pinnatifido-incisis, caule simplici unifloro apice nudo. ♀ in montibus Delphinatûs ex Vill.—Fl. fr. 4. p. 86.—Vill. dauph. 3. p. 23. t. 19. Klasea heterophylla Cass. (v. s. c.)
3. S. NUDICAULIS (DC. fl. fr. 4. p. 86.) foliis subradicalibus integris ovalibus aut oblongis, caulinis paucis linearibus sessilibus integris ant vix inciso-dentatis, caule 1-floro subnudo. ♀ in montibus Galloprovinciæ, Vapinci.—Centaurea nudicaulis L.—Ger. galloprov. t. 5. (v. s.)





* * *Foliis subtus albo-tomentosis.*

4. S. HUMILIS (Desf. atl. t. 220.) foliis pinnatifidis laciniis oblongis acutis costam non attingentibus, caule 1-floro foliis breviore subnudo, involuci squamis laxis glabriusculis. ♀ in Cebennis inter Campestre et Salbouz, in Pyrenæis ad collum Benasque. — Fl. fr. 5. p. 458. *Carduus mollis* Lapeyr. non L. (v. s.)
5. S. CYNAROIDES (DC. fl. fr. 4. p. 87.) foliis amplis ovatis, inferioribus ad costam ferè pinnatifidis laciniis dentatis, mediis ad medium usque incisis, summis dentatis, involuci squamis margine scariosis ovato-lanceolatis. ♀ in Pyrenæis. — *Cnicus centauroides* L. *Stemmacantha centauroides* Cass. — Moris. s. 7. t. 25. n. 2 bis. (v. v. DC.)

L. SAUSSUREA DC. mem. comp. p. 22.

Involucrum imbricatum squamis inermibus; flosculi omnes hermaphroditæ; receptaculum paleaceum; pappus duplicitis ordinis, pili externi breves denticulati persistentes, interni longi plumosi.

1. S. ALPINA (DC. l. c. p. 42.) foliis subtus villosis subdentatis, radicalibus ovato-lanceolatis, floribus terminalibus subumbellatis. ♀ in editioribus Alpibus et Pyrenæis. — Fl. fr. 5. p. 466. — Pluck. t. 154. f. 3. (v. v. in Helv.)
2. S. DISCOLOR (DC. l. c. p. 43.) foliis subtus niveo-tomentosis dentatis, radicalibus ovatis subcordatis, caulinis ovato-lanceolatis, floribus terminalibus subumbellatis. ♀ rarer, in Alpibus Delphinatūs. — Fl. fr. 5. p. 466. — Hall. helv. t. 6. (v. s.)

II. CIRSIUM *Tourn.* t. 255. DC. mem. comp. p. 23. — *Cirsium*, *Onotrophe*, *Notobasis*, *Eriolepis*, *Picnomon*, *Lamyra*, Cass.

Involucrum obovatum imbricatum squamis apice spinosis; flosculi omnes hermaphroditæ aequales; receptaculi paleæ in laciniis setiformes partitæ; stylus simplex, pappi pili plumosi aequales basi in annulum conferruminati.

Sect 1. ERYSITHALES DC. mss.

Flores ochroleuci, folia sessilia.

1. C. GLUTINOSUM (Lam. fl. fr. 2. p. 27.) foliis amplexicaulibus pinnatifidis glabris ciliatis, pedunculis apice cernuis, involuci glutinosi squamis lanceolatis inermibus breviter mucronatis patulis. ♀ in Alpium, Jurassi, montium Arverniæ nemoribus undis. — Fl. fr. 5. p. 464. C. erysithales Jacq. obs. t. 17. An satis à sequente distinctum? (v. v. DC.)
2. C. OCHROLEUCUM (All. ped. n. 546.) foliis amplexicaulibus pinnatifidis glabris ciliatis, pedunculis erectis brevibus albo-lanatis, involuci (non glutinosi) squamis lanceolatis suberectis mucronatis, exterioribus subspinosis. ♀ in Alpibus. — Fl. fr. 5. p. 464. — Dalech. lugd. 1094. ic. (v. v.)
3. C. ERUCAGINEUM (DC. fl. fr. 4. p. 115.) foliis amplexicaulibus pinnatifidis apice elongatis subtus villosis, laciniis incisis apice spinescentibus, floribus congestis terminalibus sessilibus, involuci glabri squamis lanceolatis acuminatis inermibus adpressis. ♀ in pratis frigidis Delphinatūs et Jurassi. — Fl. fr. l. c. excl. syn. Vill. (v. s.)
4. C. TATARICUM (All. ped. n. 550.) foliis amplexicaulibus glabris ciliato-spinulosis inferioribus pinnatifidis laciniis inciso-bifidis dentatis, superioribus indivisis lanceolatis, floribus solitariis foliis oblongo-linearibus stipatis, invol. glabri squamis exterioribus lanceolatis mucronato-spinosis, interioribus linearie-lanceolatis acuminatis inermibus. ♀ in valibus locisque humidis Alpium Delphinatūs. — Fl. fr. 4. p. 114. *Carduus tataricus* Jacq. austr. t. 90. (v. s.)
5. C. OLERACEUM (All. ped. n. 544.) foliis amplexicaulibus cordatis ciliato-spi-

- nosis, caulinis pinnatifidis, superioribus ovatis acutis, summis flores sessiles aggregatos cingentibus et superantibus, involuci squamis lanceolato-acuminatis exterioribus spinosis. ♀ in pratis paludosis. — Fl. fr. 4. p. 114. *Cnicus oleraceus* L. *Onotrophe oleracea* Cass. — Lob. ic. 2. t. 11. f. 1. (v. v.)
6. *C. RUFESCENS* (Ram. in DC. fl. fr. 4. p. 114.) foliis amplexicaulibus ovato-oblongis subcordatis sinuato-dentatis ciliato-spinosis, floralibus sublinearibus, floribus congestis subracemosis cauleque pilos rufescentes gerentibus, involuci squamis exterioribus ciliatis, internis linearibus subinermibus. ♀ in Pyrenæis editioribus inter rupes. — *C. carniolicum* Scop. carn. t. 54. (v. s.)
7. *C. SPINOSISSIMUM* (Scop. carn. n. 1006.) foliis amplexicaulibus pinnatifidis dentatis spinosis pubescentibus, caule simplici, floralibus terminalibus sessilibus congestis bracteatis, involuci squamis lanceolatis spinosissimis. ♀ in Alpium et Jurassi pratis uidis propè nives. — Fl. fr. 4. p. 113. — Hall. helv. t. 5. (v. v. in Helv.)
8. *C. GLABRUM* (DC. fl. fr. 5. p. 463.) foliis pinnatifidis dentatis spinosis glabris, floralibus terminalibus pedicellatis congestis, bracteis angustis spinosissimis florem vix superantibus, invol. squamis acuminatis, exterioribus spinosis, interioribus subinermibus. ♀ in Pyrenæis editioribus secùs torrentes. — *Cnicus spinosissimus* Lapeyr. (v. v. DC.)

Sect. II. ACARNA DC. MSS.


Folia decurrentia supernè non setoso-scabra, flores purpurei aut variantes albi.


9. *C. PALUSTRE* (Scop. carn. n. 1004.) foliis decurrentibus lanceolatis sinuato-pinnatifidis margine spinosis, floralibus racemoso-gloemeratis, involuci squamis adpressis, exterioribus ovato-lanceolatis mucronato-spinosis, interioribus linearibus acuminatis. ♀ in stagnis pratisque umbrosis. — Fl. fr. 4. p. 111. eng. bot. t. 974. *Onotrophe palustris* Cass. (v. v.)
10. *C. PRATENSE* (DC. fl. fr. 4. p. 113.) foliis breviter decurrentibus sinuatis dentatis inæqualiter setoso-ciliatis utrinquè glabris, pedunculis foliolosis subtomentosis, involuci squamis exterioribus ovato-lanceolatis mucronato-spinosis, interioribus lanceolatis acuminatis inermibus apice patulis. ♀ in humidis Galliæ australis ex Lam. et Pyrenæorum. — Moris. s. 7. t. 29. n. 8. (v. s.)
11. *C. MONSPESSULANUM* (All. ped. n. 556.) foliis longè decurrentibus oblongo-lanceolatis inæqualiter setoso-ciliatis utrinquè glabris, inferioribus sinuato-crenatis, superioribus integris, pedunculis subnudis tomentosis multifloris, involuci squamis exterioribus ovato-lanceolatis mucronatis, interioribus linear-lanceolatis acuminatis inermibus erectis. ♀ in pratis humidis Delph., Galliæ australis, Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 112. — Lob. ic. t. 581. f. 2. (v. v.)
12. *C. PYRENAICUM* (DC. fl. fr. 4. p. 112.) foliis longè decurrentibus oblongo-lanceolatis subtùs arachnoideo-villosis canescensibus sinuatis ciliato-spinosis, invol. squamis exterioribus ovato-lanceolatis mucronatis, interioribus linear-lanceolatis acuminatis inermibus erectis. ♀ in Pyren. orientalium pratis. — *An varietas præcedentis ut vult cl. Bentham?* (v. s.)
13. *C. ACARNA* (DC. fl. fr. p. 111.) foliis decurrentibus lanceolatis lanato-canis dentatis spinosis, superioribus flores aggregatos subsessiles circumdantibus, involuci squamis exterioribus spinâ pinnatâ terminatis. ♀ in petrosis et sterilibus Galliæ mediterraneæ. — *Cnicus Acarna* L. sp. 1158. *Picnomon Acarna* Cass. — Clus. hist. 2. p. 155. f. 1. (v. v.)

Sect. III. EPITRACHYS DC. MSS.

Folia supernè scabra subtùs tomentosa pinnatifida sessilia aut decurrentia, flores purpurei aut variantes albi.

14. *C. ITALICUM* (DC. mss.) foliis decurrentibus in alam brevem obtusam spinosis subtùs arachnoideo tomentosis supernè setoso-scabris, floralibus flores





- sessiles circumdantibus, involuci ovati glabrique squamis lanceolatis adpressis in spinam productis. (2) in Corsicâ (Soleiroli). — Dod. pempt. 738. f. 2. (v. s.)
15. *C. LANCEOLATUM* (Scop. carn. n. 1007.) foliis spinosis decurrentibus in alam lobato-spinosam subtus arachnoideo-tomentosis supernè setoso-scabris, involuci ovati subarachnoidei squamis lanceolatis setaceo-acuminatis, exterioribus spinosis patentibus. (2) ad vias et pagos. — Fl. fr. 4. p. 111. Eriolepis lanceolata Cass. — J. Bauh. hist. 3. p. 58. f. 1. (v. v.)
16. *C. FEROX* (DC. fl. fr. 4. p. 120.) caule arachnoideo, foliis subdecurrentibus spinosis subtus cano-tomentosis supernè spinoso-scabris, floralibus flores cingentibus, involuci subglabri ovati crassi squamis lanceolatis subulato-spinosis subpatulis. (2) in montosis et collibus Galliæ australis. — Cnicus ferox All. ped. t. 50. — Lob. ic. 2. t. 10. f. 1. (v. v.)
17. *C. ERIOPHORUM* (Scop. carn. n. 1008.) foliis sessilibus supernè ciliato-scabris subtus niveo-tomentosis, laciiniis geminatis spinosis, involuci crassi globosi lanuginosissimi squamis lanceolatis apice linearibus spinosis patentibus. 2f in montosis Pyren., Gallia australis orientalisque. — Fl. fr. 4. p. 120. Eriolepis lanigera Cass. — Clus. hist. 2. p. 154. ic. (v. v.)
18. *C. ECHINATUM* (DC. fl. fr. 5. p. 465.) foliis sessilibus hispidis subtus lanatis, laciiniis bilobis divaricatis spinosis, involuci ovati crassi globosi lanati bracteati squamis lanceolatis subulato-spinosis basi adpressis. (2) in insulâ Sanctæ Luciæ propè Narbonam (Requier). — Carduus echinatus Desf. atl. 2. p. 247. (v. s.)

Sect. IV. CHAMELEON DC. mss.

Folia sessilia supernè non setoso-scabra, flores purpurei aut variantes albi.

19. *C. CASABONEÆ* (DC. fl. fr. 4. p. 121.) foliis sessilibus lanceolatis subtus tomentosis supernè glaberrimis margine spinas ternatas gerentibus, floribus axillaribus sessilibus, involuci squamis exterioribus in spinam longam productis. (2) in Corsicâ et insulis Stæchadum. — Carduus Casaboneæ L. Lamya triacantha Cass. — Barr. ic. t. 1211. (v. s.)
20. *C. SYRIACUM* (Gærtn. fruct. 2. p. 383 t. 163. f. 2.) foliis amplexicaulibus oblongis inciso-dentatis spinosis albo-venosis, floribus subsessilibus terminaulibus axillaribusve bracteatis bracteis pinnatifido-spinosis, involuci squamis oblongo-lanceolatis adpressis acuminato-spinosis. (1) in Corsicâ. Notobasis Syriaca Cass. — Moris. s. 7. t. 30. n. 5. (v. s.)
21. *C. ARVENSE* (Lam. fl. fr. 2. p. 26.) foliis sessilibus oblongis sinuato-pinnatifidis undulatis spinosis subtus glabriusculis tomentosisve, caule subglabro multifloro, involuci squamis adpressis exterioribus ovato-lanceolatis mucronatis vix spinosis, interioribus lanceolatis inermibus. 2f in vineis et arvis frequens. — Fl. fr. 4. p. 119. Serratula arvensis L. sp. 1149. — Moris. s. 7. t. 82. n. 14. (v. v.)
22. *C. ACAULE* (All. ped. n. 558.) caulinis brevissimis subnudis subunifloris, foliis subradicalibus pinnatifidis dentatis ciliato spinosis, involuci squamis lanceolatis glabris mucronatis subinermibus. 2f in herbosis et siccis. — Fl. fr. 4. p. 119. Onotrophe acaulis Cass. — Lob. ic. 2. t. 5. f. 1. (v. v.)
23. *C. BULBOSUM* (DC. fl. fr. 4. p. 118.) foliis amplexicaulibus pinnatifidis ciliato-spinosis, laciiniis bilobis basi sursum dentatis, caule subbifloro, involuci squamis mucronatis subinermibus apice patulis, radice tuberculosa. 2f in humidis herbosis. — Lob. ic. 2. t. 10. f. 2. (v. v.)
24. *C. ANGLICUM* (Lob. ic. t. 583. f. 1.) foliis lanceolatis sinuato-dentatis ciliato-spinosis subtus lanuginosis, inferioribus subincisis subpetiolatis, caulinis sessilibus semi amplexicaulibus, flore solitario terminali, involuci squamis linearis lanceolatis acuminatis subinermibus. 2f in Galliæ occidentalis, mediae et australis pratis paludosis. — Fl. fr. 4. p. 119. — Dalech. lugd. 584. f. 1. (v. v. DC.)

$\beta.$ *multiflorum*. Fl. fr. 5. p. 465. In agro Aurelianensi et Andegaviensi.
(v. s.)

25. C. TRICEPHALODES (DC. fl. fr. 4. p. 116.) foliis amplexicaulibus nudis glabris setoso-ciliatis pinnatifidis, caulinorum laciniis linear-lanceolatis oblongis, pedunculis longis tomentosis, floribus 3-5 aggregatis, involuci squamis adpressis ovato-lanceolatis acuminatis inermibus. \mathcal{Y} in pascuis Jurassi, Alpium, montis Aurei, Pyrenæorum. — *Carduus rivularis* Jacq. aust. t. 91. — All. ped. t. 35 et 36. (v. v.)
26. C. SALISBURGENSE (Duby mss.) foliis amplexicaulibus scabris setoso-ciliatis glabris integris sinuato-dentatis, inferioribus ovalibus, superioribus linear-lanceolatis, pedunculis longis tomentosis 1-2-floris, involuci squamis adpressis lanceolatis inermibus. \mathcal{Y} in Pyrenæorum et Jurassi pratis uidis. — *Cnicus Salisburgensis* W. sp. 2. p. 1675. *Cirsium tricephalodes* γ Fl. fr. 5. p. 464. Præcedentis forsitan varietas? (v. s.)
27. C. AMBIGUUM (All. auct. p. 10.) foliis amplexicaulibus subtus albido-tomentosis supernè glabris subscabris margine setoso-ciliatis, radicalibus petiolatis integris dentatis, caulinis sessilibus pinnatifidis laciniis dentatis aut bifidis, flore longè pedunculato subsolitario, involuci squamis lanceolatis adpressis subinermibus. \mathcal{Y} in pratis Alpium sèpiùs commixtum cum C. heterophyllum et tricephalode quorum videtur mera proles hybrida. — Fl. fr. 4. p. 116. (v. s.)
 $\beta.$ *Antarcticum*, floribus 2-3 aggregatis. — *Carduus antarcticus* Vill. dauph. 3. t. 19.
28. C. HETEROPHYLLUM (DC. fl. fr. 4. p. 117.) foliis amplexicaulibus lanceolatis integris aut apice incisis subtus niveo-tomentosis supernè glabris margine setoso-ciliatis, pedunculis unifloris tomentosis, involuci squamis glaberrimis adpressis inermibus, exterioribus ovato-lanceolatis mucronatis, interioribus linearibus acuminatis. \mathcal{Y} in pratis humidis secùs vias montanas, in Alpibus, Pyrenæis. — *Carduus polymorphus* Lapeyr. act. tol. 1. t. 19 et 20.
 $\alpha.$ *helenioides*, foliis omnibus integris. — *C. helenioides* All. ped. t. 13. (v. v.)
 $\beta.$ *incisum*, foliis inferioribus incisis. — *C. heterophyllum* All. ped. t. 34. (v. s.)
29. C. STELLATUM (All. ped. n. 560.) foliis sessilibus lanceolatis integerrimis subtus tomentosis spinis 2-3 axillaribus basi cum foliis margine confluentibus instructis, floribus subsessilibus, involuci squamis lanceolatis subulato-spinosis patentibus. (1) circà Nicæam ex All. — Fl. fr. 4. p. 121. *Lamyra stipulacea* Cass. — Barr. ic. t. 418. (v. s.)


LII. CYNARA Juss. gen. 173. DC. mem. comp. p. 23.

Involucrum maximum ventricosum, squamis numerosis basi carnosis apice spinescentibus integris; receptaculi magni carnosí paleæ longitudinaliter dissectæ in laciniæ setiformes; pappus longus plu-mosus.

1. C. CARDUNCULUS (L. sp. 1159.) foliis spinosis omnibus pinnatifidis, involuci squamis ovatis. \mathcal{Y} α *sylvestris* Monspelii et in Corsicâ ex Viv.; β *hortensis*, in hortis culta. — Fl. fr. 4. p. 108. — Tab. ic. 696. (v. v.)
2. C. SCOLYMUS (L. sp. 1159.) foliis subspinosis pinnatifidis indivisiisque, involuci squamis ovatis. \mathcal{Y} in hortis culta. — Fl. fr. 4. p. 108. — Clus. hist. 2. p. 153. f. 3. Prioris forsitan varietas? (v. v.)
3. C. HUMILIS (L. sp. 1159.) foliis pinnatifidis spinosis subtus tomentosis, involuci squamis subulatis. \mathcal{Y} in Corsicâ ex cl. Viviani. — Pluck. alm. 85. t. 181. f. 2. (v. s. ex Hispaniâ.)

LIII. LEUZEA DC. fl. fr. 4. p. 109. mem. comp. p. 22.

Involucrum magnum imbricatum squamis scariosis inermibus, exte-





rioribus rotundatis laceris, internis longioribus acutis integris; flosculi omnes hermaphroditi; stigma 1; receptaculi paleæ longitudinaliter dissectæ in lacinias setiformes; semina tuberculosa; pappus longus pilis plumosis æqualibus.

- i.** *L. CONIFERA* (DC. l. c.) foliis tomentosis radicalibus lanceolatis, caulinis pinnatifidis, 2 in sterilibus Corsicæ et Galliæ mediterraneæ. — *Centaurea conifera* L. — Barr. ic. t. 138. (v. v.)

LIV. GALACTITES Mœnch. meth. 558. DC. fl. fr. 4. p. 110.

Involucrum obovatum squamis numerosis lanceolato-subulatis spinosis; flosculi disci hermaphroditi, marginales neutri majores; receptaculi paleæ paucæ caducæ; stylus simplex; pappus longus plumosus.

- i.** *G. TOMENTOSA* (Mœnch. meth. 558.) foliis decurrentibus sinuatissimis spinosis subtus tomentosis. 2 in Corsicâ et in sterilibus Galliæ mediterraneæ, circâ Tolosam ex Lapeyr., Aginnum ex St.-Am. Burdigalam ex Des Moul. — Fl. fr. l. c. DC. mem. comp. t. 5. (v. v.)

LV. RHAPONTICUM Lam. fl. fr. DC. mem. comp. p. 21.

Involucrum magnum imbricatum squamis scariosis rotundatis inermibus; receptaculi paleæ longitudinaliter in setas lineares dissectæ; pappus persistens pilis rigidis inæqualibus.

- i.** *R. SCARIOSUM* (Lam. fl. fr. 2. p. 38.) foliis ovato-oblongis basi subcordatis denticulatis subtus subtomentosis. 2 in Alpibus Delphinatûs, Galloprovincie. — DC. mem. comp. p. 32. *Serratula Rhaponticum* Fl. fr. 4. p. 87. — Moris. s. 7. t. 25. n. 7. (v. s.)

LVI. CENTAUREA L. gen. 984. DC. fl. fr. 4. p. 88.

Involucrum imbricatum squamis foliaceis scariosisve; flosculi disci hermaphroditi, radii neutri majores; receptaculi paleæ laciniatae; semina hylo laterali receptaculo adfixa; pappus pilosus.

Sect. I. CRUPINA DC. mem. comp. p. 23.

Invol. squamæ integræ lanceolato-acuminatæ, pappus setoso-paleaceus.

- i.** *C. CRUPINA* (L. sp. 1285.) involucris inermibus, foliis pinnatis scabris pinnulis serrulatis linearibus acutis. (1) in sterilibus et collibus Galloprov., Occitaniæ, circâ Mimatem, Burdigalam ex Later. — Fl. fr. 4. p. 89. — Barr. ic. t. 1136. (v. v.)

Sect. II. CENTAURIUM DC. l. c. p. 24.

Involuci squamæ inermes sæpius marcescentes saltem in margine.

- 2.** *C. AMARA* (L. sp. 1292.) involuci glaberrimi lucidi squamis scariosis obtusis integris fimbriatisve, exterioribus ovatis, interioribus lanceolatis apice spathulatis, foliis tomentosis pubescens lanceolatis, caulinis decumbentibus. 2 in collibus aridis Galliæ australis. — Fl. fr. 4. p. 90. — Lob. ic. t. 548. f. 2. (v. v.)

β. linearifolia DC. foliis linearibus utrinquè tomentosis. — Fl. fr. 5. p. 459. (v. v.)

γ. nana, vix pollicaris, foliis linearibus pubescens. — Circâ Monspe- lium reperiit de Chesnel. (v. s.)

- 3.** *C. ALBA* (L. sp. 1293.) involuci glabri lucidi squamis scariosis mucronatis serrulatis, exterioribus ovatis, interioribus lanceolatis apice spathulatis, foliis infimis pinnatifidis lobis linearibus distantibus, mediis basi dentatis, summis integris, caule erecto. (2) in Occitaniâ ex Gou? et Pyrenæis orienta-

libus ex Lapeyr. — Fl. fr. 5. p. 460. — Tab. ic. 153. f. 1. (v. s. ex Hispaniâ ?)

Sect. III. CYANUS DC. l. c.

Involucri squamæ inermes pinnatifido-ciliatæ, pappus pilosus.

4. C. JACEA (L. sp. 1293.) involueri basi pubescens squamis ovatis apice spathulatis scarioso - ciliatis, foliis lanceolatis integerrimis radicalibus subdentatis, ramis angulatis, pappo subnullo. ♀ ad oras sylvarum et in pratis ubique. — Fl. fr. 4. p. 91. (v. v.)
5. C. MUTABILIS (St.-Amans mem. mus. 1. p. 477. t. 24.) involueri globosi squamis pubescentibus exterioribus ovatis apice linearis - spathulatis longè ciliatis acuminatis, internis lanceolatis apice globoso-spathulatis subintegris, foliis tomentosis, radicalibus obsoletè lyratis vel indivisis, caulinis integris. ♀ circà Aginnum. (v. s.)
6. C. NIGRESCENS (W. sp. 3. p. 2288.) involueri squamis exterioribus ovatis scarioso-ciliatis, internis lanceolatis apice spathulatis integris lacerisve, foliis radicalibus obsoletè pinnatifidis, mediis basi subdentatis, superioribus integris. ♀ circà Parisios, Bellovacum ex D. Graves. et in Pyrenæis. — Fl. fr. 5. p. 460. (v. v. c.)
7. C. NIGRA (L. sp. 1288.) involueri squamis exterioribus erecto-plumosis, flosculis æqualibus, foliis lanceolatis radicalibus subpinnatifidis, caulinis indivisis serratis. ♀ in Galliâ boreali, mediâ et occidentali. — Fl. fr. 4. p. 91. Fl. dan. t. 996. — Gærtn. 2. t. 161. f. 4. Squamæ nigræ. (v. v.)
8. C. PECTINATA (L. sp. 1287.) involueri squamis recurvato-plumosis, foliis mucronato-serratis, caulinis inferioribus sinuato-pinnatifidis, superioribus et ramis indivisis. ♀ in saxosis montosis Galliæ australis. — Fl. fr. 4. p. 93. (v. v.)
9. C. PHRYGIA (L. sp. 1287.) involueri squamis recurvato-plumosis, foliis oblongis pubescentibus indivisis scabris mucronato-serrulatis. ♀ in pascuis editiorum montium. — Fl. fr. 4. p. 92. Fl. dan. t. 520. (v. v.)
10. C. UNIFLORA (L. mant. 148.) involueri sqnamis recurvato-plumosis, foliis lanceolatis subdentatis tomentosis, caule unifloro. ♀ in pratis montosis Delph., Galloprov., Occitanie? — Fl. fr. 4. p. 93. — Bocc. mus. p. 20. t. 2. (v. v. DC.)
11. C. CYANUS (L. sp. 1289.) involueri squamis ciliatis exterioribus ovatis interioribus lanceolatis, foliis linearibus sessilibus integerrimis subtus lanato-tomentosis, infimis basi pinnatifidis. (1) inter segetes frequens. — Fl. fr. 4. p. 95. Bull. herb. t. 221. (v. v.)
12. C. MONTANA (L. sp. 1289.) involueri squamis ovatis margine ciliatis, foliis lanceolato-acuminatis decurrentibus tomentosis integerrimis aut basi sinuato-dentatis. ♀ in pascuis montium. — Fl. fr. 4. p. 94. C. seusana Vill. — Lob. ic. 548. f. 1. (v. v.)
13. C. PULLATA (L. sp. 1288.) involueri squamis lanceolatis apice ciliatis, bracteis lanceolatis involucratis, foliis petiolatis basi amplexicaulibus lyratis breviter hispidis. (1) ad sepes in Galliâ australi. — Fl. fr. 4. p. 94. — Lob. ic. t. 542. f. 2. (v. v. DC.)
14. C. INTYBACEA (Lam. dict. 1. p. 671.) involueri glaberrimi globosi squamis striatis apice ciliatis ovatis, foliis subrigidis lanceolato-linearibus basi lacinatis pinnatifidisve, laciuiis acutis simplicibus, terminali dentata, caule 1-floro, ♀ circà Massiliam et Narbonam. — Fl. fr. 4. p. 98. C. leucantha Pourr. ex cl. Benth. — Barr. ic. 1229. (v. s.)
15. C. MACULOSA (Lam. dict. 1. p. 669.) involueri globosi squamis striatis exterioribus ovatis laxiseulis longè ciliatis acutis, interioribus lanceolatis obtusis, foliis inferioribus bipinnatifidis, superioribus pinnatifidis, caule subcorymboso. (2) in agro Ruscinonensi, Cebennensi, Ruthenico, Arvernico et circà Turones. — Fl. fr. 4. p. 96. C. cærulescens Lapeyr. C. corymbosa Pourr. ex cl. Benth. — Gm. sib. 2. t. 44. f. 1. 2. (v. v.)



Æ. nana, caule 3-floro vix pollicari. — Circà Massiliam reperiit cl. Solier. (v. s.)

16. *C. PANICULATA* (L. sp. 1289.) involuci ovoidei squamis ciliatis ovatis adpressis striatis acutis, foliis inferioribus bipinnatifidis, superioribus pinnatifidis, caule paniculato. (2) in arvis et sterilibus Galliae australis, Pyrenæorum, Arvernæ, Delphinatûs. — Fl. fr. 4. p. 97. — Moris. s. 7. t. 28. n. 15. (v. v.)

17. *C. SCABIOSA* (L. sp. 1291.) involuci pubescens squamis ovatis ciliatis, foliis pinnatifidis scabriusculis, laciniis lanceolatis acutis basi inciso-dentatis pinnatifidis. (2) ad marginem agrorum et sylvarum. — Fl. fr. 4. p. 97. — Moris. s. 7. t. 28. n. 10. (v. v.)

Sect. iv. CROCODYLIUM DC. l. c.

Involuci squamæ in spinam simplicem desinentes, pappus pilosus.

18. *C. SALMANTICA* (L. sp. 1299.) involuci globosi glabri squamis ovatis in setulam subspinosa desinentibus, foliis lanceolatis serratis radicalibus lyratis, caule divaricato. (2) in arvis et pascuis maritimis Galloprovinciæ, Monspelii, Carcassonæ, agri Ruscinonensis. — Fl. fr. 4. p. 106. — Clus. hist. 2. p. 9. f. 1. (v. v.)

Æ. inermis, squamis inermibus. (v. s.)

Sect. v. CALCITRAPA DC. l. c.

Involuci squamæ nunc pinnato-spinosæ nunc palmato-spinosæ, pappus pilosus.

19. *C. COLLINA* (L. sp. 1298.) involuci glabri squamis exterioribus ovatis acuminatis ciliato-spinosis, interioribus ciliatis lanceolatis obtusis, foliis caulinis pinnatifidis, radicalibus bipinnatifidis, laciniis lanceolatis acutissimis. (2) in provinciis australibus. — Fl. fr. 4. p. 115. — Clus. hist. 2. p. 8. f. 2. (v. v.)

20. *C. CENTAUROIDES* (L. sp. 1298.) involuci glabri squamis exterioribus ovatis acuminatis, interioribus obtusis, foliis lyrato-pinnatis subintegris, laciniis lanceolato-ovatis mucronatis, terminali maximâ dentatâ. (2) Monspelii secùs rivos. — Fl. fr. 4. p. 105. — Col. ephr. 1. t. 35. Præcedentis var? (v. s.)

21. *C. NAPIFOLIA* (L. sp. 1295.) involuci globosi glabri vix basi pubescens squamis adpressis ovatis apice transversè appendiculo linearis palmato-spinoso erecto spathulatis, foliis radicalibus lyratis obtusis, caulinis oblongis decurrentibus, caule erecto ramoso. (1) in Corsicâ circâ Ajaccio. — Fl. fr. 5. p. 461. — Pluck. t. 94. f. 2. (v. s.)

22. *C. ASPERA* (L. sp. 1296.) involuci glabri squamis exterioribus palmato-spinosis, spinâ 3-5-cuspidatâ, foliis lanceolatis sessilibus sinuato-dentatis scabriusculis. (2) in arvis et sterilibus à Nicæâ ad Nigri Monasterii insulam. — Fl. fr. 4. p. 98. (v. v.)

23. *C. SPHÆROCEPHALA* (L. sp. 1295.) involuci globosi arachnoidei squamis ovatis apice palmato-spinosis, spinâ 5-cuspidatâ reflexâ, foliis lanceolatis pinnatifidis laciniis dentato-serratis, radicalibus petiolatis, superioribus amplexicaulibus, caule procumbente. (2) in Corsicâ. — *C. cæspitosa* Vahl. symb. 2. p. 93. — Moris. s. 7. t. 27. n. 9. (v. s.)

24. *C. SERIDIS* (L. sp. 1294.) involuci glaberrimi globosi squamis palmato-spinosis, spinâ 5-7-cuspidatâ reflexâ, foliis oblongis tomentosis amplexicaulibus decurrentibus basi subincisis dentatis dentibus acuminatis subspinosis. (2) in arvis circâ Nicæam ex All., Aquas Sextias ex Gér., Monspelium ex Gouan et in Delphinatû ex Vill. — Fl. fr. 4. p. 99. — Pluck. t. 38. f. 1. (v. s. c.)

25. *C. SONCHIFOLIA* (L. sp. 1294.) involuci glaberrimi globosi squamis palmato-spinosis, foliis oblongis tomentosis amplexicaulibus semi-decurrentibus repando-dentatis dentibus subspinosis, superioribus integerrimis. (1)? secùs stagna et rivos in Galloprovinciâ ex Gér., agro Nicæensi ex All. — Fl.

fr. 4. p. 99. — Pluck. t. 39. f. 1, 94. f. 1. An à præced. satis distincta? (v. s. c.)

26. C. MYACANTHA (DC. fl. fr. 4. p. 101.) involucri glabri squamis apice cornue spinoso-dentatis, foliis sessilibus linear-i-oblongis subtomentosis dentato-serratis vel basi subblaciatis, caule ramoso glabro, pappis subnullis. (2) Parisiis circà Vincennes et Versailles. — Ic. rar. t. 23. (v. s.)
27. C. APULA (Lam. dict. 1. p. 674.) involucri globosi basi tomentosi squamis ovatis apice palmato-spinosis, spinis patulis 5, mediâ duplicato-spinosâ, capitulis axillaribus terminalibusque, foliis lanceolatis integerrimis semi-decurrentibus radicalibus lyratis obtusis. (1) Circà Narbonam, Monspelium, Arelatem, Nicæam et in Corsicâ. — Fl. fr. 4. p. 104. — Col. ephr. 1. p. 31. ic. (v. s.)
28. C. MELITENSIS (L. sp. 1297.) involucri squamis subpalmato-spinosis spinis rectis, capitulis subgeminatis sessilibus, foliis oblongis subincanis profundè dentatis pinnatifidise, lacinias distantibus acutiusculis. (1) in Galliâ australiori, Monspelii. — Fl. fr. 4. p. 104. (v. s.)
29. C. SOLSTITIALIS (L. sp. 1297.) involucri globosi tomentosi squamis exterioribus subpalmato-spirosis spinis rectis, foliis canescentibus linear-i-lanceolatis decurrentibus integerrimis, radicalibus lyratis. (1) in siccis Galliæ australis; sœpè cum seminibus Medicaginis in provinciis borealibus seritur, sed non permanet. — Fl. fr. 4. p. 103. — Moris. s. 7. t. 34. n. 9. (v. v.)
30. C. DIFFUSA (Lam. dict. 1. p. 676.) involucri squamis lanceolatis ciliato-spinosis spinâ terminali longâ robustiore floribus breviore, foliis radicalibus bipinnatifidis, caulinis linearibus integris, caule ramosissimo. (2) Monspelii, ex lanis barbaris seta? — Fl. fr. 5. p. 462. (v. v.)
31. C. POUZINI (DC. cat. monsp. 91.) involucri squamis rotundo-ovatis adpressis apice patente corneo pinnatim 5-7-spinoso, flosculis fertilibus breviter papposis, sterilibus nudis, foliis oblongis inferioribus pinnatifidis, superioribus rarer serratis, caule erecto ramosissimo. (2) secùs vias Monspelii, Narbonæ, agri Ruscin. ex Benth. — Fl. fr. 5. p. 462. (v. v.)
32. C. CALCITRAPA (L. sp. 1297.) involucri glaberrimi squamis exterioribus ovato-rotundis apice spinosis spinâ mediâ robustâ longissimâ flores superante intimis spathulatis scariosis integris, foliis pinnatifidis linearibus dentatis, radicalibus lyratis, caule ramosissimo striato piloso, pappo nullo. (1) in sterilibus petrosis ad vias. — Fl. fr. 4. p. 100. — Clus. hist. 2. p. 7. f. 3. (v. v.)
fl. autunnalis (DC.) foliis inferioribus 2-pinnatifidis, floralibus pinnatifidis, lacinias linearibus dentatis, caule hirsuto. (1) secùs vias Monspelii, Lugduni. — Fl. fr. 5. p. 462. (v. v. DC.)
33. C. CALCITRAPOIDES (L. sp. 1297.) involucri glabri squamis exterioribus ovato-rotundis apice spinosis spinâ mediâ longissimâ, intimis spathulatis scariosis integris, foliis linear-i-oblongis integris vel subdentatis, caule altissimo, seminibus papposis. (1) in Delph., Galloprov. et circà Nemausim. — Fl. fr. 4. p. 100. (v. s.)


Sect. vi. CNICUS DC. l. c. non L.


Involucrum squamis apice spinosis, involucratum foliolis magnis, apice spinosis, pappus duplex, semina apice margine crenato onusta. — An genus distinctum?

34. C. BENEDICTA (L. sp. 1296.) involucri squamis lanceolatis linearibus sublanatis apice duplicato-spinosis, foliis semi-decurrentibus dentato-spinosis. (1) in cultis circà Montem-Albauum ex Monspelium ex Benth. Gat. Aquas-Sextias ex Ger. et Massiliam (Solier). — Fl. fr. 4. p. 100. — Gærtner. fruct. t. 162. f. 5. (v. s.)

LVII. KENTROPHYLLUM Neck. DC. mem. comp. p. 24.

Involucrum ventricosum imbricatum squamis interioribus cartilagineis apice ciliato-spinosis, exterioribus foliaceis pinnatifidis bracteas





æmulantibus; flosculi disci hermaphroditæ, radii neutri majores; semina tetragona hylo laterali receptaculo adfixa; pappus paleaceo-pilosus.

1. *K. LANATUM* (DC. mss.) foliis inferioribus pinnatifidis dentatis, summis amplexicaulibus pinnatifido-dentatis spinosis, caule lanuginoso. (1) in sterilibus ad vias. — *Centaurea lanata* Fl. fr. p. 4. p. 102. — Lob. ic. 2. t. 13. f. 1. (v. v.)

LVIII. CARLINA Tourn. t. 285. L. gen. 410. DC. mem. comp. 23.

Involucrum squamis exterioribus sinuato-spinosis basi conniventibus apice divaricatis, interioribus sæpè simplicibus acutis, intimis multò longioribus scariosis ligulæformibus coloratis et radium mentientibus; receptaculi paleæ in laciniis setiformes fissæ; pappus plumbosus.

1. *C. ACANTHIFOLIA* (All. ped. t. 51.) acaulis, foliis longè petiolatis pinnatifidis tomentosis, laciñiis dentato-angulosis spinosis, involucri squamis spinosis spiculis ramosis. ♀ in collibus et submontanis siccis Delphin., Galloprov., Occitaniae superioris, Arverniae. — Fl. fr. 4. p. 123 excl. var. (v. s.)
2. *C. CYNARA* (Pourret ex DC. fl. fr. 1. c.) acaulis, foliis pinnatifidis sessilibus subtus tomentosis supernè subglabris, involucri squamis spinosis spinis sub-simplicibus. ♀ in Pyrenæis. — *C. acanthifolia* ♂ Fl. fr. 4. p. 123. Radii intensius flavi quam in specie præcedente. (v. v. DC.)
3. *C. CHAMELEON* (Vill. dauph. 3. p. 31.) caule simplici unifloro, foliis pinnatifidis glaberrimis, laciñiis inciso-dentatis spinosis, invol. squamis spinosis spinis ramosis. ♀ in pascuis submontanis siccis et sterilibus. — *C. acaulis* L. sp. 1160. *C. subacaulis* DC. fl. fr. 4. p. 122.
 - a. *acaulis*, Lob. ic. 2. t. 4. f. 1. (v. v.)
 - ♂. *caulescens*, Lob. ic. 2. t. 4. f. 2. (v. v.)
4. *C. LANATA* (L. sp. 1160.) caule uni-aut multifloro lanato, foliis lanceolatis sinuato-spinosis, involuci radio intimo purpurascente. (1) in siccis Galliae mediterraneæ. — Fl. fr. 4. p. 124. *Mitina lanata* Cass. — Garid. aix. p. 86. t. 21. (v. v.)
5. *C. VULGARIS* (L. sp. 1161.) caule uni-aut multifloro corymboso pubescenti-arachnoideo, foliis lanceolatis dentatis spinosis subtus pubescentibus, involuci squamis radiantibus albidi. (2) in siccis et petrosis. — Fl. fr. 4. p. 124. Gærtn. fruct. 2. t. 163. f. 1. (v. v.)
6. *C. CORYMBOSA* (L. sp. 1160.) caule multifloro corymboso glabriusculo, foliis lanceolatis sinuato-spinosis glabris, involuci squamis radiantibus luteis. (1) in sterilibus Galliae australis. — Fl. fr. 4. p. 124; 5. p. 467. *Mitina corymbosa* Cass. — Col. eph. t. 27. — Barr. ic. t. 594. (v. v.)

LIX. STÆHELINA L. gen. 938. DC. mem. comp. p. 37.

Involucrum cylindricum imbricatum squamis inermibus sæpius apice coloratis; flosculi omnes hermaphroditæ; antheræ basi caudatæ; stylus bifidus; receptaculum paleaceum; pappus ramosus.

1. *S. DUBIA* (L. sp. 1176.) foliis sessilibus linearibus denticulatis subtus tomentosis, involuci squamis interioribus elongatis apice coloratis. ♂ in sterilibus et siccis provinciarum australium usque ad Aginnum (St.-Am.). — Fl. fr. 4. p. 107. — Ger. galloprov. t. 6. — Barr. ic. t. 406. (v. v.)
2. *S. AREORESCENS* (L. syst. veg. 615.) foliis petiolatis ellipticis obtusis integrerimis subtus sericeo-tomentosis. ♂ in insulis Stæchadum ex Ger. — Fl. fr. 4. p. 107. — Alp. ex. 32. ic. (v. s. c.)

LX. ATRACTYLIS L. gen. 930. DC. mem. com. p. 20.

Involucrum ovatum connivens squamis integris acuminatis, cinctum

foliis longioribus pinnatifido-spinosis; flosculi omnes hermaphroditi, sæpius omnes tubulosi, interdum marginales ligulæformes; receptaculi paleæ in lacinias setiformes fissæ; pappus plumosus.

1. *A. CANCELLATA* (L. sp. 1162. excl. syn. Alp. et Moris.) caule tomentoso, foliis arachnoideo-tomentosis amplexicaulibus lanceolatis ciliato-spinosis, floribus bracteatis, bracteis erectis pinnatifido-spinosis. (I) in sterilibus petrosis apricis Monspelii, Niceæ. — Fl. fr. 4. p. 125. — Lam. ill. t. 662. f. 1. (v. v.)
2. *A. HUMILIS* (L. sp. 1162.) caule glabro, foliis sinuatis oblongo-lanceolatis dentato-spinosis spinis simplicibus vel geminatis, flore terminali, involucru squamis mucronatis glabris. (I) in saxosis circâ Narbonam. — Fl. fr. 4. p. 126. Lam. ill. t. 660. (v. s.)

LXI. XERANTHEMUM Gærtn. 2. p. 399. t. 165. DC. mem. comp. p. 21.

Involucrum imbricatum squamis inermibus scariosis, interioribus longioribus coloratis radium æmulantibus; flosculi disci hermaphroditi fertiles, radii feminei steriles pauci; receptaculum paleaceum; semina disci pappo 5-aristato coronata, radii nuda.

1. *X. ANNUUM* (L. sp. 1201. v. a.) involucri squamis externis scariosis glabris, interioribus lanceolatis obtusis patentibus. (I) in arvis et collibus siccis Galliæ mediae australis occidentalisque. — Fl. fr. 4. p. 130. — Clus. hist. 2. p. 11. f. 2. (v. v.)
2. *X. INAPERTUM* (W. sp. 3. p. 1902.) involucri squamis subacutis margine scariosis dorso tomentosis, interioribus lanceolatis acutis conniventibus. (I) in arvis collibusque aridis Galliæ mediæ, australis occidentalisque. — Fl. fr. 4. p. 130. — Moris. s. 6. t. 12. n. 1. (v. v.)

Subordo III. CICHORACEÆ Juss. gen. 168. — Lactuceæ Cass. dict. sc. nat. 20. p. 355.


Flosculi omnes ligulati et hermaphroditi; receptaculum vix carnosum. — Folia alterna; flores lutei rariū cœrulei sæpè metorici. Succus proprius in plurimis lacteus.


† **FRUCTUS COMPRESSUS AUT TETRAGONUS; PAPPUS ALBUS SQUAMOSO-PILOSUS.**

LXII. SCOLYMIUS Tourn. t. 273. L. gen. 922.

Involucrum imbricatum spinosum; receptaculum paleaceum; pappus nullus aut squamoso-pilosus.

1. *S. GRANDIFLORUS* (Desf. atl. 2. t. 218.) caule subsimplici villoso erecto, foliis decurrentibus villosis pinnatifidis spinoso-dentatis, inferioribus petiolatis, capitulis solitariis sessilibus, involucri squamis exterioribus obtusis, interioribus acutis spinulosis. (I) in agro Ruscinonensi circâ Collionre et Port-Vendres ex Lapeyr. Arnott et Benth. (v. s. ex Barbariæ.)
2. *S. MACULATUS* (L. sp. 1142.) caule ramoso, foliis decurrentibus glabris margine cartilagineis sinuato-pinnatifidis spinosis, foliis involucralibus pectinato-multifidis, invol. squamis omnibus acuminato-spinosis, seminibus nudis. (I) ad marginem agrorum in Galliâ australi. — Fl. fr. 4. p. 69. — Clus. hist. 2. p. 153. f. 1. (v. v.)
3. *S. HISPANICUS* (L. sp. 1143.) caule apice ramoso, foliis decurrentibus scabris margine non cartilagineis sinuato-pinnatifidis spinosis, inferioribus petiolatis, foliis involucralibus foliaceis dentato-spinosis, invol. squamis omnibus acuminato-spinulosis, seminibus paleis involutis. (I) ad margines agrorum in Galliâ à Niceâ ad Nannætes. — Fl. fr. 4. p. 69. — Clus. hist. 2. p. 153. f. 2. (v. v.)





LXIII. UROSPERMUM Juss. gen. 170.

Involucrum simplex 8-phylum squamis coalitis; receptaculum nudum; semina transversè sulcata; pappus plumosus stipitatus stipite cavo conico incurvo basi incrassato.

1. *U. DALECHAMPII* (Desf. cat. 90.) involucris pubescentibus inermibus, foliis runcinato-dentatis. ♀ secùs vineas et prata provinciarum austral.—Fl. fr. 4. p. 62. — Dalech. lugd. 569. f. 1. (v. v.)
2. *U. PICROIDES* (Desf. cat. 90.) involucris hispido-aculeatis, foliis runcinatis dentatis, caulinis auriculato-sagittatis. (I) ad margines viarum in Galliâ australi.—Fl. fr. 4. p. 63. — C. Bauh. prod. p. 60. f. 2. (v. v.)
♂. *asperum*, caule subunifloro, foliis superioribus subintegris. — *U. asperum*. Fl. fr. 4. p. 63. (v. s.)

LXIV. PICRIDIUM Desf. atl. 2. p. 221. DC. fl. fr. 4. p. 15.

Involucrum imbricatum basi tumidum squamis margine membranaceis; receptaculum nudum; semina tetragona subincurvata transversè tuberculata; pappus sessilis pilosus.

1. *P. VULGARE* (Desf. l. c.) pedunculis squamosis incrassatis, squamis cordiformibus, involuci squamis margine glabris. (I) in provinciis mediterraneis. — Fl. fr. 4. p. 16. *Sonchus picroides* Lam.—Lob. ic. t. 236. f. 2. (v. v.)
2. *P. ALBIDUM* (DC. fl. fr. 4. p. 16.) pedunculis subnndis, involuci squamis puberulis margine ciliatis. ♀ in montosis provinciarum australium. — *Crepis albida* Vill. dauph. 3. t. 33. *Paleya albida* Cass. (v. v.)

LXV. SONCHUS L. gen. 908.

Involucrum oblongum imbricatum basi ovatum; receptaculum nudum; semina longitudinaliter striata; pappus brevis sessilis pilosus.

§. 1. *Floribus cæruleis.*

1. *S. ALPINUS* (Fl. dan. t. 182.) pedunculis involucrisque hirsutis, floribus raccemosis bracteatis, foliis runcinatis basi sagittatis glabris subtus glancis. ♀ in sylvis umbrosis editiorum montium. — Fl. fr. 4. p. 14. — Cam. epit. 281. ic. (v. v.)
2. *S. PLUMIERI* (L. sp. 1117.) pedunculis bracteis involucrisque glabris, floribus paniculato-corymbosis, foliis runcinatis amplissimis. ♀ in umbrosis et saxosis editioribus Vogesorum, Alpium, Pyren., Arverniæ. — Fl. fr. 4. p. 15. (v. v. in Helv.)

§. 2. *Floribus luteis.*

3. *S. PALUSTRIS* (L. sp. 1116.) pedunculis involucrisque subumbellatis glandulosohispidis, foliis basi sagittatis lobis acutis, inferioribus runcinatis. ♀ in stagnorum et fossarum oris. — Fl. fr. 4. p. 14. — Pet. angl. t. 14. f. 7. (v. v.)
4. *S. ARVENTIS* (L. sp. 1116.) pedunculis involucrisque hispidis subumbellatis, foliis runcinatis basi cordatis dentato-ciliatis. ♀ in arvis. — Fl. fr. 4. p. 14. — Lob. ic. t. 237. f. 1. *Nimia* cum sequente affinitas. (v. v.)
5. *S. OLERACEUS* (L. sp. 1116.) pedunculis sub capitulo subtomentosis umbellatis, involucris glabris, foliis oblongo-lanceolatis amplexicaulibus margine ciliatis subsinuatis, inferioribus pinnatifidis. (I) — Fl. fr. 4. p. 13. *Lepicaune spinulosa* Lapeyr. abr. 480 ex cl. Arnott.
a. *lævis*, in cultis et hortis. — *S. lævis* Vill. — Cam. ep. 279. ic. (v. v.)
β. *asper*, in sterilibus. — *S. asper* Vill. Pluck. t. 61. f. 5. (v. v.)
6. *S. PECTINATUS* (DC. rapp. 2. p. 78.) pedunculis ramosis pilos glandulosos hinc indè gerentibus, foliis pectinato-pinnatifidis, inferiorum laciniis sub-

æqualibus integris aut basi appendiculatis, superiorum laciinis æqualibus linearibus integerrimis, involucris hispidis. \mathcal{L} in rupestribus circà Collioure. — Fl. fr. 5. p. 434. (v. v.)

7. S. TENERIMUS (L. sp. 1117.) pedunculis subhispidis umbellatis, foliis inferioribus subbipinnatifidis laciinis inæqualibus, superioribus pinnatifidis laciinis lanceolatis serratis basi inciso-dentatis, involucris basi tomentosis. (I) in maritimis Gallie mediterraneæ. — Fl. fr. 4. p. 13. — Pluck. t. 93. f. 3. (v. v.)

8. S. MARITIMUS (L. sp. 1116.) pedunculis subsolitariis terminalibus nudis, foliis lanceolatis amplexicaulibus indivisis retrorsum argutè dentatis. \mathcal{L} in maritimis à Nicæâ ad Rupellam et in stagnis subsalsis Delphinatûs. — Fl. fr. 4. p. 12. All. ped. t. 16. f. 2. (v. v.)

LXVI. LACTUCA Tourn. t. 267. L. gen. 909.

Involucrum oblongum imbricatum squamis margine membranaceis; receptaculum nudum; pappus stipitatus pilosus mollis fugax.

§. 1. Floribus luteis.

1. L. SAMIA (L. sp. 1118.) foliis rotundatis caulinis cordatis, caule corymboso. (I) patria ignota, in hortis culta. — Fl. fr. 4. p. 9. — Moris. s. 7. t. 2. n. 2. (v. v.)
2. L. LACINIATA (Roth. cat. 1. p. 90.) foliis obtusis glabris, inferioribus pinnatifidis laciiniatis, superioribus runcinatis, laciinis infimis stipularibus elongatis. (I) in Cenomania culta. — Fl. fr. 5. p. 433. — Lob. ic. 242. f. 1. (v. v. c.)
3. L. SYLVESTRIS (Lam. dict. 3. p. 406.) foliis sinuato - pinnatifidis amplexicaulibus verticalibus carinâ aculeatis apice acutis, floribus laxè panicleatis, caule aculeato. (I) ad margines viarum. — Fl. fr. 4. p. 10. Camer. epit. 300. ic. (v. v.)
4. L. VIROSA (L. sp. 1119.) foliis oblongis denticulatis amplexicaulibus horizontalibus carinâ subaculeatis, caule inermi. (2) ad sepes, muros et agros. — Fl. fr. 4. p. 10. — Moris. s. 7. t. 2. n. 16. Præcedentis var? (v. s.)
5. L. SALIGNA (L. sp. 1119.) foliis amplexicaulibus carinâ aculeatis glabrisve, radicalibus pinnatifidis laciinis linearibus acuminatis recurvis, caulinis linearibus integerrimis. (I) ad margines agrorum et vinearum. — Fl. fr. 4. p. 11. — Barr. ic. t. 136. (v. v.)

§. 2. Floribus cæruleis.

6. L. TENERIMA (Pourr. act. toul. 3. p. 322.) caule ramoso divaricato, foliis radicalibus pinnatifidis laciinis integris aut basi dentatis, caulinis linearibus integerrimis sagittatis, involucri squamis exterioribus linearibus, seminibus ovatis planis. \mathcal{L} in agro Narbonensi et Ruscinoensi circà Olette et Villefranche. — Fl. fr. 4. p. 11. (v. v.)
7. L. TENERUM (L. sp. 1120.) foliis pinnatifidis laciinis linearibus sursùm dentatis, summis linearibus sagittatis, involucri squamis exterioribus lanceolato-ovatis, seminibus linearì-lanceolatis utrinquè attenuatis sulcatis. \mathcal{L} ad vineas, in agris lapidosis et saxosis apricis. — Fl. fr. 4. p. 11. — Dalech. hist. 566. f. 2. (v. v.)
8. L. CICHORIIFOLIA (DC. fl. fr. 5. p. 434.) foliis radicalibus oblongis pectinato-dentatis, dentibus longis subretrorsis, floralibus integerrimis linearibus sagittatis, floribus corymbosis, pedicellis divaricatis. \mathcal{L} in Pyren. orientalibus. (v. s.)

LXVII. CHONDRIELLA Gærtn. fruct. 2. p. 362. t. 158. DC. fl. fr. 4. p. 8.

Involucrum squamis erectis linearibus, calyculatum squamis minimis aut nullis; receptaculum nudum; pappus stipitatus pilosus.





1. *C. MURALIS* (Lam. dict. 2. p. 78.) foliis lyrato - pinnatifidis dentatis, lobo terminali 5-angulari, involueri squamis 5-6, pappi stipite semine breviore. (I) ad vetustos muros. — Fl. fr. 4. p. 8. *Prenanthes muralis* L. *mycelis angulosa* Cass. — Clus. hist. 2. p. 146. f. 2. (v. v.)
2. *C. JUNCIFOLIA* (L. sp. 1120.) foliis radicalibus runcinatis, caulinis linearibus integris, involueri squamis 7-10, pappi stipite semine longiore. ♀ ad margines arborum. — Fl. fr. 4. p. 8. — Clus. hist. 2. p. 144. f. 2. (v. v.)

LXVIII. PRENANTHES *Vaill. L. gen. 911.*

Involucrum squamis margine imbricatis, calyculatum squamis inaequilibus ovatis; receptaculum nudum; pappus sessilis pilosus simplici serie; flosculi pauci.

§. 1. *Floribus purpurascensibus.*

1. *P. PURPUREA* (L. sp. 1121.) foliis oblongo - lanceolatis amplexicaulibus cordatis denticulatis subtus glaucis, caule ramoso. (I) in sylvis lapidosis montosis. — Fl. fr. 4. p. 6. Gærtn. fruct. 2. t. 57. f. 1. (v. v.)
2. *P. TENUIFOLIA* (L. sp. 1120.) foliis linearibus integerrimis amplexicaulibus, caule simplici. ♀ in sylvis Delphinatūs, Cebennarum. — Fl. fr. 4. p. 6. All. ped. t. 33. f. 2. (v. s.)

§. 2. *Floribus luteis.*

3. *P. VIMINEA* (L. sp. 1120.) foliis decurrentibus, inferioribus pinnatifidis extorsum dentatis, summis linearibus, caule ramoso divaricato viscoso, involueri squamis 5-6 lanceolatis. ♀ in lapidosis provinciarum austral., occidentaliaque. — Fl. fr. 4. p. 6. All. ped. t. 52. f. 2. *Phænixopus decurrens* Cass. (v. v.)
4. *P. PULCHRA* (DC. fl. fr. 4. p. 7.) foliis subscabris, radicalibus runcinatis, caulinis amplexicaulibus ovato-lanceolatis basi sagittatis, paniculæ corymbosâ divaricata nudâ, involueri squamis 15-20 lineari-lanceolatis, calyculi ovatis. (I) in cultis et vineis Galliae mediæ, occidentalis australisque. — *Crepis pulchra* L. *P. hieracifolia* Wild. *Phæcasium lampsanoides* Cass. — Moris. s. 7. t. 5. n. 13 et 37. (v. v.)
5. *P. BULBOSA* (DC. fl. fr. 4. p. 7.) foliis lanceolato-oblongis subdentatis glabris, scapo unifloro superne hirto, involueri glabri squamis 13-20 lanceolatis. ♀ in maritimis Galloprovinciæ, Occitanie, Armoraciæ. — *Leontodon bulbosum* L. *Hieracium bulbosum* Wild. *Ætheorhiza bulbosa* Cass. — Lob. ic. t. 230. f. 2. (v. v.)

† † FRUCTUS ELONGATUS AD APICEM PLUS MINUS ATTENUATUS;
PAPPUS ALBUS AUT NULLUS. — INVOLUCRUM UNISERIATUM.

I PAPPUS NULLUS.

LXIX. LAMPSANA *Tourn. t. 272. DC. fl. fr. 4. p. 3.*

Involucrum squamis lineari-lanceolatis, calyculatum; receptaculum nudum; semina pappo destituta caduca involueri foliolis minimè cincta.

1. *L. FÆTIDA* (Scop. carn. ed. 2. n. 989.) scapo unifloro, foliis runcinato-pinnatifidis, lacinia terminali rhomboideâ. ♀ in Pyrenæis ex Lapeyr. — Fl. fr. 4. p. 3. — Mich. gen. t. 28. (v. s. ex Helv.)
2. *L. COMMUNIS* (Lam. dict. 3. p. 414.) caule erecto striato ramoso, foliis ovatis petiolatis angulato-dentatis. (I) in cultis. — Fl. fr. 4. p. 4. — Lob. ic. t. 207. f. 1. (v. v.)
3. *L. MINIMA* (Lam. dict. 3. p. 414.) scapo 1-3-floro, pedunculis fistulosis clavato-incrassatis, foliis ovato-oblongis denticulatis. (I) in pascuis siccis et arenosis passim. — Fl. fr. 4. p. 3. *Arnoseris pusilla* Gærtn. 2. t. 157. f. 3. — Clus. hist. 2. p. 142. f. 2. (v. v.)

LXX. RHAGADIOLUS *Tourn. t. 272. DC. fl. fr. 4. p. 4.*

Involucrum calyculatum, squamis linearibus intus concavis, internis semina matura cingentibus; receptaculum nudum; semina non papposa sæpius inflexa vel contorta, matura non caduca.

1. R. EDULIS (Gærtn. fruct. 2. p. 354.) seminibus lævibus patentibus, foliis lyratis laciñiâ terminali rotundo-ovatâ maximâ. (I) in Galloprovinciâ, circâ Nemausim et Monspelium. — Fl. fr. 4. p. 5. (v. s.)
2. R. STELLATUS (Gærtn. fruct. 2. t. 157. f. 2.) seminibus lævibus patentibus, foliis caulinis lanceolatis subdentatis. (I) in arvis Galliæ australioris. — Fl. fr. 4. p. 4. — Lob. ic. t. 240. f. 2. (v. v.)

II PAPPUS PILOSUS.

LXXI. ZACINTHA *Gærtn. fruct. 2. p. 358. DC. fl. fr. 4. p. 48.*


Involucrum 8-phylum basi calyculatum demùm coriaceum sulcatum; receptaculum nudum, pappus pilosus subdentatus sessilis brevissimus.

1. Z. VERRUCOSA (Gærtn. fruct. 2. t. 157. f. 7.) (I) in sterilibus Corsicæ, Niceæ, Galloprovinciæ. — Fl. fr. 4. p. 48. — Moris. s. 7. t. 1. n. 4. (v. v.)

LXXII. BARKHAUSIA *Mœnch. meth. 537. DC. fl. fr. 4. p. 41. — Hostia, Barkhausia, Villemetia Cass.*

Involucrum calyculatum, maturum sulcato - costatum, squamis exterioribus laxis; receptaculum nudum; pappus pilosus stipitatus.

1. B. APARGIOIDES (Duby mss.) scapo subnudo paucifloro involucroque laxiusculo pilis nigris hispido, foliis radicalibus lanceolatis dentatis glabris. (2) in Pyrenæis. — Crepis apargioides W. sp. 3. p. 1594. Villemetia apargioides Cass. Semina longè stipitata. (v. s.)
2. B. ALPINA (DC. l. c.) foliis ovatis cordato-sagittatis amplexicaulibus denticulatis, pedunculis elongatis unifloris, involucris hispidis, squamis exterioribus membranaceis scariosis. (I) in pratis Alpinum Galloprovinciæ ex Gér. — Crepis Alpina L. sp. 1134. Gærtn. fruct. 2. t. 158. f. 8. (v. s. c.)
3. B. BELLIDIFOLIA (DC. fl. fr. 5. p. 449.) glabra subcarnosa multicaulis, foliis subintegris, radicalibus oblongo-spathulatis, caulinis oblongis basi auriculatis. (I) in Corsicæ locis incultis. — Crepis bellidifolia Lois. gall. t. 18. (v. s.)
4. B. SUFFRENIANA (DC. cat. monsp. 83.) caule erecto subsimplici basi hispido, foliis radicalibus oblongis basi angustatis sinuatis, caulinis paucis linearibus integris, pedicellis unifloris, involucris hispidulis, capitulis antè anthesin cernuis. (I) in aridis lapidosis Galloprovinciæ. (v. s.)
5. B. SETOSA (DC. fl. fr. 4. p. 44.) setis in caule pedunculis involucris nervis et oris foliorum sparsis, foliis inferioribus pinnatifido-dentatis laciñiâ terminali maximâ, caulinis dentatis, summis linearibus, involuci squamis exterioribus patulis. (2) in Corsicâ et circâ Avenionem. — Ic. rar. 1. t. 19. (v. s.)
6. B. RUBRA (Mœnch. meth. 537.) foliis radicalibus runcinato-lyratis laciñiâ anguloso-dentatis, caulinis amplexicaulibus lanceolatis, inferioribus pinnatifidis, involucris hispidis, squamis exterioribus scariosis. (I) secus vias Niceæ, Monspelii, Aginni ex St.-Amans. — Fl. fr. 4. p. 42. — C. Bauh. prod. 68. f. 2. Flores rubelli. (v. s.)
7. B. FÆTIDA (DC. fl. fr. 4. p. 42.) foliis acuminatis runcinato - pinnatifidis scabris sessilibus, summis lanceolatis basi profundè incisis, involucris ovatis pilosis angulatis. (I) in incultis. — Lob. ic. t. 226. f. 1. (v. v.)



8. B. TARAXACIFOLIA (DC. fl. fr. 4. p. 43.) foliis scabris, radicalibus lyrato-runcinatis obtusis, caulinis lanceolatis amplexicaulibus basi dentatis, involucris subtomentosis, squamis exterioribus margine submembranaceis. (2) in pratis lapidosis. — *Crepis biennis* Lapeyr. abr. p. 84. ex cl. Arnott. — Lob. ic. t. 239. f. 2. (v. v.)

$\ell.$ *præcox*, foliis superioribus basi dilatato-auriculatis. — *Crepis præcox* Balb. Misc. t. 9. (v. s.)

$\gamma.$ *intybacea*, foliis superioribus basi auriculatis, involucro glabro. — In Occitanâ. — B. *intybacea* DC. cat. 82. fl. fr. 5. p. 449. (v. s.)

9. B? LEONTODON (DC. fl. fr. 4. p. 43.) foliis glabris runcinatis dentatis, radicalibus obtusis aut brevissimè mucronatis, caulinis acuminatis, scapo nudo multifloro ascendentे, involueris subtomentosis, squamis exterioribus adpressis. (2) in Corsicâ (Ph. Thomas). — Seminis immaturi pappus sessilis, maturi subsessilis. An hujus generis? (v. s.)

LXXXIII. PTEROTHECA Cassini in *bull. phil.* 1821. p. 125. — *Genus novum?* DC. syn. gall. 261.

Involucrum subuniseriatum, squamis adpressis margine membranaceis; receptaculum planum, paleis longissimis filiformibus instratum; semina marginalia plerumque nuda, externâ facie striata internâ 3-5-alata, interna papposa striata apice in collum attenuata; pappus albus pilosus.

1. P. NEMAUSENSIS (Cass. l. c.) foliis runcinato-lyratis dentatis obtusis brevissimè mucronatis, scapo nudo multifloro, involueri squamis exterioribus lanceolatis. (1) in Galliâ mediterraneâ. — *Andryala Nemausensis* Vill. danph. 3. t. 26. Fl. fr. 4. p. 38. *Trichocrepis bifida* Visiani dalm. (v. v.)

LXXXIV. CREPIS Mœnch. meth. p. 534. DC. fl. fr. 4. p. 38.

Involucrum calyculatum laxum, fructigerum sæpè costatum; receptaculum nudum; pappus pilosus sessilis niveus.

1. C. DIFFUSA (DC. cat. monsp. 98.) foliis glabris subradicalibus remotè dentatis sinuatibus runcinatis, superioribus subintegris subsagittatis, caule basi ramoso diffuso multifloro, involucris pubescentibus, seminum costis laevibus. (1) in agris, ruderatis. — Fl. fr. 5. p. 448. C. *virens* $\alpha.$ et $\gamma.$ Fl. fr. 4. p. 39. Sequenti nimium affinis. (v. v.)

2. C. STRICTA (DC. cat. monsp. 99.) foliis glabris, radicalibus runcinato-pinnatifidis, caulinis paucissimis, inferioribus basi dentato-pinnatifidis, superioribus subintegris, caule erecto, corymbo laxo, involucris pubescentibus, seminum costis laevibus. (1) in Galliâ mediâ, australi et orientali passim. — Fl. fr. 5. p. 447. *Scop. carn.* t. 47. (v. v.)

3. C. VIRENS (Vill. danph. 3. p. 142.) foliis glabris lanceolato-runcinatis, superioribus lanceolatis basi dentatis sagittatis, floribus corymboso-paniculatis, involucris pubescentibus, seminum costis laevibus. (1) in pascuis ruderatisque. — Fl. fr. 4. p. 39. non L. (v. v.)

4. C. SCABRA (W. sp. 3. p. 1603.) foliis hispidis runcinatis, caulinis sessilibus basi dentato-auriculatis, ramis floralibus paniculato-corymbosis laevibus, caule suberecto striato, involueri squamis carinato-canaliculatis pubescentibus, seminum costis laevibus. (1) Niceæ, Narbonæ, in agro Andegaviensi. — Fl. fr. 5. p. 446. (v. s.)

5. C. BIENNIS (L. sp. 1136.) foliis hispidis runcinato-pinnatifidis, summis sessilibus lanceolatis dentatis, ramis floralibus paniculato-corymbosis scabris, caule elato recto sulcato, seminum costis laevibus. (2) in pratis. — Fl. fr. 4. p. 39. 5. p. 446. eng. bot. t. 149. (v. v.)

6. C. DROSEORIDES (L. sp. 1133.) foliis radicalibus lyrato-runcinatis, caulinis hastatis lanceolatis, inferioribus dentatis, caule erecto, involucris tomentosis, fructigeris subrotundo-ovatis angulosis. (I) in siccis secūs vias Alsatiæ. — Fl. fr. 4. p. 40. Ic. rar. t. 18. *Gatyna globulifera* Cass. (v. s.)
7. C. TECTORUM (L. sp. 1135. non fl. fr.) foliis glabris sinuato-pinnatifidis, superioribus sagittato-linearibus integris margine subrevolutis, seminum oblongo-attenuatorum costis scabris apice muricatis. (I) in campestribus Alsatiæ et probabiliter Galliæ totius. — Fl. fr. 5. p. 448. (v. s.)
8. C. LACHENALII (Gochn. diss. t. 3.) foliis glabris, radicalibus spathulato-lanceolatis dentatis, superioribus linearibus margine revolutis integerrimis, caule gracili-erecto paucifloro, seminum costis aspero-muricatis. (I) in arvis Alsatiæ. — Fl. fr. 5. p. 449. (v. s.)

LXXV. TARAXACUM Hall. helv. p. 23. Juss. gen. 169.

Involucrum duplex squamis exterioribus brevibus saepius patulis; receptaculum nudum; pappus stipitatus pilosus. — Scapi uniflori.

1. T. PALUSTRE (DC. fl. fr. 4. p. 45.) foliis lanceolatis sinnato-dentatis glabriusculis, involueri exterioris adpresso squamis ovatis subacuminatis. 2f in paludosis et pratis humidis. — *Hedypnois paludosa* Scop. carn. 2. t. 48. (v. v.)
2. T. OBOVATUM (DC. rapp. voy. 2. p. 83.) foliis obovatis obtusis vix retro-dentatis, involueri exterioris patuli squamis lanceolato-ovatis. 2f Monspeli et in Galloprovinciâ. — *Leontodon obovatus* W. hort. berol. t. 47. — J. Bauh. hist. 2. p. 1037. f. 2. (v. v. DC.)
3. T. LÆVIGATUM (DC. cat. monsp. 49.) foliis runcinato-pinnatifidis, laciiniis valde inæqualibus, majoribus reflexis basi subincisis, involueri exterioris patuli squamis lanceolatis. 2f in rupestribus apricis passim. — Fl. fr. 5. p. 450. — Barr. ic. t. 237. An à sequente satis distinctum. (v. v.)
4. T. DENS-LEONTIS (Desf. atl. 2. p. 228.) foliis runcinatis glabris, laciiniis lanceolatis dentatis, involueri exterioris reflexi squamis linearis-lanceolatis. 2f ubique in' pratis. — Fl. fr. 4. p. 45. *Leontodon Taraxacum* L. Bull. herb. t. 217. — Moris. s. 7. t. 8. n. 1. Tres præcedentes species ut hujusc varietates habent cl. St.-Amans et Benthem. (v. v.)

III PAPPUS PLUMOSUS.

LXXVI. HELMINTHIA Juss. gen. 170.


Involucrum duplex, interius squamis 8 æqualibus, exterius squamis 5 foliaceis laxis; semina transversim striata; pappus plumosus pedicellatus.

1. H. ECHIOIDES (Gærtn. fruct. 2. t. 159. f. 2.) involueri exterioris squamis latis ovato-cordatis subspinosis. (I) in arvis, ad vias. — Fl. fr. 4. p. 58. — Lob. ic. t. 577. f. 2. (v. v.)
f. *mollis*, involueri squamis subinermibus. — In pratis salsis circà Arelatem detexit cl. A. Richard. (v. s.)
2. H. SPINOSA (DC. fl. fr. 4. p. 58.) involueri exterioris squamis lanceolatis margine apiceque spinosis. — In Pyrenæis ex herb. Lemonnier. Ic. rar. t. 21. (v. s.)

LXXVII. PICRIS Juss. gen. 170.

Involucrum calyculatum, calyculi squamis linearis-lanceolatis; receptaculum nudum; semina transversè striata, pappus plumosus sessilis vel subsessilis.

1. P. HIERACIOIDES (L. sp. 1115.) caule scabro ramoso-divaricato, foliis asperis.





- mis lanceolatis dentatis, floribus corymbosis, seminibus lanceolatis striatis. ♀ in agris. — Fl. fr. 4. p. 57. Lam. ill. t. 648. f. 2. (v. v.)
2. P. PYRENAICA (L. sp. ed. 1. p. 792.) caule scabro ramoso-divaricato, pedunculis 1-floris, foliis asperis lanceolatis dentibus patentibus. ♀ in Pyrenæis. Fl. fr. 5. p. 454. P. tuberosa Lapeyr. Radix napiformis (Lap.). An satis à præcedente distincta? (v. s. imperf.)
3. P. PAUCIFLORA (W. sp. 3. p. 1557.) caule scabro subramoso, foliis asperrimis lanceolatis denticulatis, pedunculis elongatis incrassatis, seminibus linearie-longatis sulcato-echinatis apice attenuatis. (I) in arvis Galliae australis. — Fl. fr. 4. p. 57. Gærtn. 2. t. 159. f. 2. (v. v.)

††† FRUCTUS BREVIS, AD APICEM ATTENUATUS BASI TRUNCATUS;
PAPPUS NULLUS AUT PILOSUS.

LXXVIII. HIERACIUM L. gen. 913.

Involucrum imbricatum, receptaculum nudum aut rarius pilis sparsis semine brevioribus onustum; pappus sessilis pilosus saepius soridè rufescens.

§. 1. Leontodontoidæ DC. syn. gall. 258.

Foliis radicalibus subglabris nec glaucis nec coriaceis; scapis nudis uni aut paucifloris.

1. H. AUREUM (Vill. dauph. 3. t. 33.) scapo 1-floro subnudo, involucro hispido, foliis lanceolato-spathulatis runcinato-dentatis glabriusculis. ♀ in pascuis Alpium, Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 17. (v. v.)
2. H. PRÆMORSUM (L. sp. 1126.) scapo nudo racemoso, floribus superioribus primoribus, foliis ovatis vix denticulatis puberulis, radice præmorsâ. ♀ in pascuis Alsatiæ, Lotharingiæ. — Fl. fr. 4. p. 18. 5. p. 434. — Gm. sib. 2. t. 13. f. 2. (v. s.)
3. H. AURANTIAKUM (L. sp. 1126.) scapo basi folioso hispido, floribus corymbosis, pedunculis glomeratis, foliis oblongis acutiusculis piloso-hispidis. ♀ in Alpibus, Jurasso, Vogesis. — Fl. fr. 4. p. 18. Jacq. anst. t. 410. Fl. aurantiaci. (v. v.)
4. H. ALPINUM (L. sp. 1124.) scapo 1-floro subnudo villosi, involucro villossissimo, foliis lanceolatis integerrimis acutis villosi. ♀ in pascuis Alpium, montium Arverniæ, Cebennarum, Pyren. ex Lapeyr. — Fl. fr. 4. p. 19. eng. bot. t. 1120. — Moris. s. 7. t. 7. n. 5. (v. v.)
- ſ. glabratum (Ser. mss.) foliis glabris. — H. glabratum W. Fl. fr. 5. p. 435. (v. s.)

5. H. PUMILUM (W. sp. 3. p. 1562.) scapo unifloro piloso 2-3-folio, foliis villosis lanceolatis obtusis brevissimè mucronatis, superioribus integris, radicalibus remotè dentatis sessilibus. ♀ in Alpibus Delphinatûs (Ph. Thomas). — Fl. fr. 5. p. 435. (v. s.)

6. H. HALLERI (Vill. dauph. 3. p. 104.) scapo 1-2-floro subnudo involucro piloso, foliis caulinis linearibus brevissimis, radicalibus petiolatis subvillosis ovato-oblongis basi runcinato-dentatis. ♀ in Alpibus Delph. — Fl. fr. 4. p. 19. H. hybridum Vill. 3. t. 26. An à præcedente satis distinctum? (v. s.)

§. 2. Andryaloidea DC. l. c.

Plantæ subobtectæ pilis albis longis mollibus subtentè articulatis subplumosis.

7. H. SAXATILE (Vill. dauph. 3. t. 29.) scapo subnudo subunifloro villosi, involucro pubescente aut hirto, foliis obovatis villoso-lanatis integrisculis breviter mucronatis. ♀ in rupibus apricis Pyrenæorum et Alpium Delph. — Fl. fr. 4. p. 22. H. sericeum Lapeyr. abr. 477. (v. s.)

8. *H. ANDRYALOIDES* (Lam. dict. 2. p. 364.) caule erecto subsimplici tomentoso supernè nudo, foliis tomentosis, inferioribus ovali-oblongis basi runcinato-dentatis, supero linearis integro. ♀ in rupibus apricis Delphinatūs. — Fl. fr. 4. p. 22. Vill. dauph. 3. f. 29. (v. v.)

9. *H. LANATUM* (Vill. dauph. 3. p. 120.) caule erecto subramoso basi folioso lanato, floribus corymbosis longè pedunculatis, foliis ovatis lanatis subintegris, receptaculis subpilosis. ♀ in locis apricis montium imprimis australiorum. — Fl. fr. 4. p. 21. — Dill. elth. t. 150. f. 281. (v. s.)

β. *uniflorum*. (v. s.)

10. *H. ELONGATUM* (Lapeyr. abr. 476.) caule basi longè barbato erecto subsimplici foliisque laxè villosus, radicalibus oblongis basi attenuatis, canlinis basi cordatis amplexicaulibus, involucris villosis patulis. ♀ in asperis Pyrenæorum præsertim orientalium. — Fl. fr. 5. p. 436. (v. s.)

11. *H. VILLOSUM* (L. sp. 1130.) caule erecto subramoso foliisque villosus, radibus oblongo-lanceolatis dentatis, canlinis ovatis subamplexicaulibus subdentatis, involucris villosissimis patulis. ♀ in montanis. — Fl. fr. 4. p. 20. Jacq. aust. t. 87. (v. v.)

12. *H. FLEXUOSUM* (W. sp. 3. p. 1581.) caule erecto subramoso basi glabro, foliis glaucis inferioribus oblongo-lanceolatis glabris basi attenuatis, superioribus sessilibus subpilosis, involucris villosis. ♀ in Alpibus Delphinatūs. — Fl. fr. 5. p. 436. Præcedentis var? (v. s.)

§. 3. *Pilosellæ DC. l. c.*

Plantæ glaucescentes subcoriaceæ hirtæ aut ciliatae, pilis sparsis longis albis rigidulis.

13. *H. PIROSELLA* (L. sp. 1125.) scapo unifloro nudo, involucris pilosis, stolonibus repentibus, foliis integerrimis ovatis subtus tomentosis. ♀ in locis ari-dis. — Fl. fr. 4. p. 23.

α. *vulgaris* (DC.) foliis utrinquè viridibus, involueri breviter pilosi pilis atris. — Cam. epít. t. 708 et 709. (v. v.)

β. *incana* (DC.) foliis subtus incanis, involucro tomentoso.

γ. *Peleteriana* (Ser.) involucro pilosissimo. — *H. Peleterianum* Merat. Fl. fr. 5. p. 437. (v. s.)

14. *H. BREVISCAPUM* (DC. fl. fr. 5. p. 439.) scapo subnudo 2-4-floro foliis vix longiore basi barbato subvelutino, floribus confertis subsessilibus, involucris albo-villosis, foliis oblongo-linearibus subacutis utrinquè rufescenti-pilosis. ♀ in summis Pyrenæis orientalibus. — *H. pumilum* Lapeyr. nou W. Præcedentis forsitan varietas? (v. v.)

15. *H. AURICULA* (DC. fl. fr. 4. p. 24.) scapo subnudo 1-∞-floro, floribus corymbosis, stolonibus nullis aut reptantibus, foliis integerrimis oblongis subtus glabris. ♀ in sterilibus. — *H. Lactucella* Wallr. sch. crit. p. 403.

α. *pilosa*, foliorum limbis pilosis. — *H. Auricula* L. sp. 1126. (v. v.)


β. *dubia*, foliorum limbis subglabris. — *H. dubium* L. sp. 1125. Sm. eng. fl. 3. p. 357. (v. v.)


γ. *angustifolia*, foliis linear-lanceolatis. — In Pyrenæis. — *H. angustifolium* W. Vill. voy. t. 3. f. 4. Fl. fr. 5. p. 438. (v. v. in Helv.)

16. *H. CYMOSUM* (L. sp. 1126.) caule scapiformi oligophyllo foliisque hispidis, inferioribus oblongo-lanceolatis obtusis basi attenuatis, reliquis linear-lanceolatis acutis sessilibus, floribus umbellato-corymbosis confertis, pedicellis brevibus subtrifidis involucrisque rufescenti-hispidis. ♀ in siccis montosis Galloprovinciæ et Delphinatūs. — Fl. fr. 5. p. 440. Vill. voy. t. 4. f. 2. (v. v. DC.)

β. *collinum*, stolonosum, floribus submajoribus. — In Alsatiâ et Jurasso. — *H. collinum* Gochn. diss. p. 17. t. 1. Fl. fr. 5. p. 440. (v. v.)

17. *H. FALLAX* (W. enum. 822.) caule scapiformi stricto oligophyllo hispido,





floribus corymboso-paniculatis, pedunculis elongatis lâxis ramosis, pedicellis subconfertis, involuero pilis nigris hirto, foliis inferioribus lanceolato-spathulatis subpetiolatis pilosis acutis subintegris. ♀ ab Alsatiâ ad Delphinatum. — Fl. fr. 5. p. 442. Flores majores quam in specie sequente. (v. s.)

♂. *hybridum*, scapo panciflora uni-aut bis bifido. — H. *hybridum* Vill. voy. t. 2. f. 2. Fl. fr. 5. p. 442. (v. s.)

18. H. *PRÆALTUM* (Vill. voy. t. 2. f. 1.) caule scapiformi stricto oligophyllo glabro, floribus laxè corymbosis, pedunculis elongatis ramosis centrali brevissimo 1-floro, pedicellis laxis, involucris hirtis, foliis linear-lanceolatis acutis subglabris subintegris. ♀ in pratis siccis à Galloprovinciâ ad Alsatiam. — Fl. fr. 5. p. 441. H. *piloselloides* Fl. fr. 4. p. 25 non Vill. (v. v.)

19. H. *PILOSELLOIDES* (Vill. dauph. t. 27. non fl. fr.) caule scapiformi oligophyllo subglabro, floribus paucis laxè corymboso-paniculatis, pedunculis laxis subsimplicibus centrali 1-floro alis longiore, involucris hirtis, foliis lanceolatis acutis integris subglabris. ♀ in Alpibus Delphinatûs. — Fl. fr. 5. p. 441. — Vill. voy. t. 3. f. 3. Hanc suspicor nil nisi præcedentis varietatem esse. (v. v. DC.)

20. H. *STATICÆFOLIUM* (Vill. dauph. t. 27.) scapo oligophyllo glabro ramoso subtrifloro, pedunculis longis squamosis unifloris, foliis linear-lanceolatis subdentatis glabris. ♀ in Alpibus secùs torrentes. — Fl. fr. 4. p. 25. All. ped. t. 81. f. 2. (v. v.)

21. H. *GLAUCUM* (All. ped. t. 28. f. 3 et t. 81. f. 1.) caule erecto ramoso folioso infernè subpiloso, foliis lanceolatis sessilibus dentatis utrinquè attenuatis, ♀ secùs torrentes Alpium Delphin., Pyren. — Fl. fr. 4. p. 26. (v. v.)

♂. *decipiens*, caule basi glabro, foliis linear-lanceolatis. — H. *porrifolium* Fl. fr. 4. p. 26. non L. (v. s.)

§. 4. Pulmonariæ DC. l. c.

Caule folioso, involuero pilis nigris sæpiùs hirto.

22. H. *ALBIDUM* (Vill. dauph. 3. t. 31.) caule ramoso hispido, foliis linear-lanceolatis sessilibus semi-amplexicaulibus dentatis utrinquè attenuatis, pedunculis incrassatis, involucris laxis hispidis. ♀ in pasenis Vogesorum, Alpium Delphinatûs. — Fl. fr. 4. p. 32. All. ped. t. 29. f. 3. (v. s.)

23. H. *TUBULOSUM* (Lam. dict. 2. p. 367.) caule ramoso hispido-viscoso, foliis linear-lanceolatis profundè dentatis sessilibus basi attenuatis, involucris hispidis subviscosis, ligulis apice callosis canaliculato-tubulosi. ♀ in Alpibus Delphinensibus. — Fl. fr. 4. p. 32. (v. s. ex monte Ceniso.)


24. H. *MONTANUM* (Jacq. aust. t. 190.) caule simplici unifloro, foliis ovato-lanceolatis denticulatis sessilibus, receptaculo subpiloso. ♀ in pratis Alpium Delph. et Jurassi. — Fl. fr. 4. p. 29. — Vill. dauph. t. 23. — Bocc. mus. 148. t. 113. (v. v.)


25. H. *GRANDIFLORUM* (All. ped. t. 29. f. 2.) caule simplici ascendente sulcato piloso-viscoso, foliis lanceolatis incurvato-dentatis, radicalibus subpetiolatis, caulinis amplexicaulibus sagittato-hastatis subdentatis, involucris hispidis, pappo albissimo. ♀ in pasuis Alpium, montium Arverniæ, Mimatis et Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 33. (v. v.)

26. H. *AMPLEXICAULE* (L. sp. 1129.) caule ramoso, foliis ovato-cordatis amplexicaulibus basin versus dentatis, radicalibus subobtusis breviter mucronatis, pedunculis involucrisque hirsutis. ♀ in lapidosis Alpium Pyren., et montium Corbariensium. — Fl. fr. 4. p. 31. All. ped. t. 15. f. 1 et t. 30. f. 2. Lepicaune bal-samea Lapeyr. H. *humile* Lap. ex cl. Arnott. Catonia amplexicaulis Cass. (v. v.)

27. H. *OBOVATUM* (Lapeyr. abr. suppl. 129.) caule simplici 1-4-floro, foliis glaberrimis mucronatis, radicalibus lanceolato-spathulatis petiolatis integris denticulatis, superioribus cordato-lanceolatis amplexicaulibus, peduncu-

- lis involucroque hirsutis. \mathcal{U} in Pyrenæis demissioribus. — An prioris var? (v. s.)
28. *H. CERINTHOIDES* (L. sp. 1129.) caule simplici villoso, foliis pilosis denticulatis, radicalibus obovatis, caulinis oblongis semi-amplexicaulibus, involucris hirsutis. \mathcal{U} in Pyrenæis et Alp. Delphinatūs. — Fl. fr. 4. p. 27. Gon. ill. t. 22. f. 4. An satis distincta sp? (v. s.)
29. *H. BLATTARIOIDES* (L. sp. 1129.) caule simplici sulcato glabriusculo, foliis radicalibus oblongis basi profundè dentatis, caulinis lanceolatis hastato-sagittatis amplexicaulibus dentatis, involucris laxis pilosis. \mathcal{U} in pascuis lapidosis Pyrenæorum, Alpium et Jurassi. — Fl. fr. 4. p. 33. Crepis Austriaca All. ped. t. 30. f. 1. Catonia blattarioides Cass. (v. v.)
30. *H. LAMPSANOIDES* (Gou. ill. t. 21. f. 3.) caule simplici, foliis caulinis lyrat-runcinatis amplexicaulibus hirtis, floribus paniculatis, involucris hispidis. \mathcal{U} in sylvis et pratis Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 28. (v. s.)
31. *H. PRENANTHOIDES* (Vill. dauph. 3. p. 108.) caule subsimplici, foliis radicalibus ovato-lanceolatis petiolatis, caulinis lanceolato-cordatis amplexicaulibus denticulatis pubescentibus, mediis basi obtusè subappendiculatis, floribus racemoso-corymbosis. \mathcal{U} in apricis Alpiam, Jurassi et montium Arverniæ. — Fl. fr. 4. p. 24. *H. spicatum* All. ped. t. 27. f. 3. (v. v.)
32. *H. COMPOSITUM* (Lapeyr. abr. 476.) caule erecto villoso apice paniculatim ramoso, ramis bifidis ramosis 2- ∞ -floris, foliis denticulatis subtūs præsertim in nervo villosissimis, radicalibus ovatis, caulinis cordatis amplexicaulibus. \mathcal{U} in Pyrenæis orientalibus. — Fl. fr. 5. p. 444. (v. s.)
33. *H. SUCCISÆFOLIUM* (All. ped. n. 786.) caule simplici scabriusculo, foliis integris, caulinis lanceolatis semi-amplexicaulibus, radicalibus petiolatis oblongis obtusis scabris, floribus corymbosis. \mathcal{U} in Jurasso et Pyrenæis orientalibus. — Fl. fr. 4. p. 28. (v. v.)
34. *H. PALUDOSUM* (L. sp. 1129.) caule simplici, foliis glabris oblongis basi attenuatis runcinato-dentatis, caulinis amplexicaulibus, floribus paniculatis, involucris hispidis. \mathcal{U} in humidis sylvosis montanis. — Fl. fr. 4. p. 34. All. ped. t. 28. f. 2. et t. 31. f. 2. (v. v.)
35. *H. UMBELLATUM* (L. sp. 1131.) caule simplici, foliis linearibus subdentatis, floribus corymboso-umbellatis, involucro subglabro. \mathcal{U} in pascuis siccis. — Fl. fr. 4. p. 31. Clus. hist. 2. p. 140. ic. (v. v.)
36. *H. SABADUM* (L. sp. 1131.) caule simplici, foliis ovato-oblongis subglabris acutis sessilibus subamplexicaulibus basin versùs dentatis, floribus corymbosis, involucro subglabro. \mathcal{U} in nemoribus. — Fl. fr. 4. p. 31. *H. sylvaticum* Lapeyr. abr. 472. non Gou. ex. cl. Arnott. — Moris. s. 7. t. 5. n. 59. (v. v.)
37. *H. ERIOPHORUM* (S.-Am. bull. phil. n. 52. t. 2. f. 1.) radice præmorsâ, caulinis sulcatis erectis foliisque lanato-sericeis, foliis inferioribus lanceolatis dentatis acutis, involuci squamis basi sericeis apice subglabris, floribus conflatis. \mathcal{U} in arenosis agri Syrtiei propè la Tête. — Fl. fr. 4. p. 21. (v. v.)
38. *H. PROSTRATUM* (DC. rapp. voy. 78.) radice præmorsâ, caulinis sulcatis prostratis basi villosis apice pubescentibus, foliis inferioribus lanceolatis villoso-sericeis dentatis subobtusis, floribus laxis. \mathcal{U} in arenosis maritimis circa Bayonam. — Fl. fr. 5. p. 437. An prioris var? (v. v.)
39. *H. SYLVATICUM* (Gou. ill. 56.) caule simplici folioso, foliis mollibus oblongis villosis dentatis, inferioribus petiolatis ovatis, floribus paniculatis, involucro breviter hispido. \mathcal{U} in sylvis. — Fl. fr. 4. p. 30. — Lob. ic. 587. f. 1. (v. v.)
40. *H. MURORUM* (Lam. dict. 2. p. 365.) caule simplici subnudo, foliis mollibus subtūs villosis ovatis basi profundè dentatis, inferioribus petiolatis subcordatis, floribus paucis paniculatis, involucro hispido. \mathcal{U} ad muros et in sterilibus. — Fl. fr. 4. p. 30. — Barr. ic. 342. (v. v.)





- £. lanuginosum*, foliorum radicalium limbis petiolisque longis pilis albis undique vestitis. — In Pyren. orient. reperit Ph. Thomas. (v. s.)
41. H. JACQUINI (Vill. dauph. 3. t. 28.) caule erecto basi ramoso paucifloro, pedunculis involucrisque pilosis, foliis oblongis basi subpinnatifidis. $\frac{1}{2}$ in rupibus montanis Vogesorum, Delph., Galloprov., Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 35. (v. v.)
42. H. PRUNELLÆFOLIUM (Gou. ill. t. 22. f. 30.) caule procumbente basi ramoso paucifloro, pedunculis involucrisque tomentosis, foliis ovatis basi inæqualibus denticulatis petiolatis, petiolis dentatis. $\frac{1}{2}$ in lapidosis Alpium et Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 34. All. ped. t. 15. f. 2. Omalocline prunellæfolia Cass. (v. v.)

LXXIX. DREPANIA Juss. gen. 169.

Involucrum polyphyllum squamis interioribus erectis, exterioribus patulis subulatis; receptaculum favosum; semina centralia margine membranaceo coronata 2-10-aristata, marginalia pappo sessili piloso brevissimo squamuloso donata.

1. D. BARBATA (Desf. atl. 2. p. 232.) involueri foliolis externis interiora æquantibus, pappo 1-3-setoso. (1) in arenosis Galliæ australis. — Fl. fr. 4. p. 48. Moris. s. 7. t. 4. n. 32. Variat pedunculis simplicibus et proliferis, floribus flavis aut pallidioribus. (v. v.)
2. D. AMBIGUA (DC. mss.) involueri foliolis externis paucis interioribus multò brevioribus, pappo 5-10-setoso. (2) in Corsicâ. — Crepis ambigua Balb. diss. p. 4. t. 1. Fl. fr. 4. p. 40. Schmidia ambigua Cass. (v. s.)

LXXX. ANDRYALA L. gen. 915.

Involucrum imbricatum; receptaculum pilis semina superantibus onustum; pappus sessilis pilosus; in plurimis (Rothia Gærtn.) semina marginalia nuda.

1. A. INTEGRIFOLIA (L. sp. 1136.) caule erecto corymboso, foliis tomentosis sessilibus, inferioribus oblongis runcinatis, superioribus lanceolatis subdentatis, pedunculis glanduloso - villosis. (1) in sterilibus provinc. australiorum et occidentalium. — Fl. fr. 4. p. 36. — Dalech. lugd. 1116. f. 2. (v. v.)
2. A. SINUATA (L. sp. 1137.) caule erecto corymboso, foliis subtomentosis lanceolatis, inferioribus pinnatifidis, mediis sinuato-dentatis sessilibus, superioribus integerrimis. (1) in Galliâ australi. — Fl. fr. 5. p. 444. (v. s.)
3. A. LYRATA (Pourr. act. toul. 3. p. 308.) caulinibus subdiffusis, foliis adpressè velutinis, radicalibus lyratis, mediis basi subpinnatifidis, summis subintegris. $\frac{1}{2}$ in arenosis circâ Narbonam, Perpinianum. — Fl. fr. 5. p. 445. — Lob. ic. 231. f. 2. (v. v.)
4. A. INCANA (DC. fl. fr. 5. p. 445.) caulinibus erectis laxè paniculatis, foliis oblongo-linearibus subdentatis integris, caule involucrisque velutino-canis, flosculis omnibus papposis. $\frac{1}{2}$ secùs fluvium in arenosis vallium Plan et Gistan Pyrenæorum. — Crepis incana Lapeyr. abr. 483. Præcedentis var? (v. s. incompletam.)

††† FRUCTUS CYLINDRACEUS. PAPPUS PLUMOSUS AUT SQUAMOSUS.

LXXXI. ROBERTIA DC. fl. fr. 5. p. 453.

Involucrum simplici serie polyphyllum; receptaculum paleaceum; pappus sessilis plumosus.

1. R. TARAXACOIDES (DC. l. c.) glabra, foliis subruncinatis. $\frac{1}{2}$? in Corsicâ. — Seriola taraxacoides Lois. gall. t. 18. (v. s.)
2. hirta, involucro hirto. — In Corsicæ montibus. (v. s.)

LXXXII. SERIOLA L. gen. 917.

Involucrum simplex; receptaculum paleaceum; pappus stipitatus, pilis paucis basi membranaceis apice subplumosis.

1. S. ÆTHNENSIS (L. sp. 1139.) hispida, foliis obovatis integris dentatisve. (I) in Corsicâ, Niceæ. — Fl. fr. 4. p. 922. Lam. ill. t. 656. f. 1. (v. v.)

LXXXIII. GEROPOGON L. gen. 904.

Involucrum simplex; receptaculum paleaceum; pappus stipitatus, disci plumosus, radii 6-aristatus.

1. G. GLABRUM (L. sp. 1109.) foliis glabris, involucris simplicibus. (I) circâ Ni- cœam. — Fl. fr. 4. p. 66. Lam. ill. t. 646. (v. s.)

LXXXIV. HYPOCHÆRIS Vail. L. gen. 928.

Involucrum oblongum imbricatum; receptaculum paleaceum; pap- pus plumosus stipitatus aut in disco sessilis.

Sect. I. ACHYROPHORUS Scop. carn. ed. 2. vol. 2. p. 116.

Pappi omnes pedicellati.

1. H. HELVETICA (Jacq. ic. rar. t. 4.) caule simplici folioso subunifloro, foliis oblongo-lanceolatis dentatis, involucro villosissimo. ♀ in pascuis montosis Jurassi, Delphinatûs, Pyrenæorum. — H. uniflora Vill. dauph. 3. t. 23. Fl. fr. 4. p. 46. Porcellites Helvetica Cass. (v. v.)
2. H. MACULATA (L. sp. 1140.) caule subnudo, ramo solitario, foliis ovato-oblon- gis subdentatis sæpius maculatis, involucro glabro. ♀ in ericetis et collibus sterilibus. — Fl. fr. 4. p. 46. Fl. dan. t. 149. Porellites maculata Cass. (v. v.)
♂. *simplex*, caule unifloro. — Fl. fr. 5. p. 451. (v. v.)
3. H. RADICATA (L. sp. 1140.) caule ramoso nudo sublævi, foliis runcinatis obtu- sis scabris, pedunculis squamosis, involuci squamis dorso bispidis. ♀ ad vias et in pratis frequens. — Fl. fr. 4. p. 47. Porellites radicata Cass. — Lob. ic. t. 238. f. 1. (v. v.)
4. H. BALBISII (Lois. not. 124.) subglabra, radice exili, foliis radicalibus re- pando-sinuatis, scapo simplici aut ramoso, involuci squamis glaberrimis, seminum omnium pappis stipitatis. (I) in arenosis et humidiusculis. — Fl. fr. 5. p. 452. (v. s.)
5. H. PINNATIFIDA (Ten. ad cat. h. neapol. app. 1. ed. 2. (1819) p. 60. n. 147.) caule ramoso, foliis radicalibus runcinato-pinnatifidis, lacinias linearis-lanceo- latis obtusis subintegris, caulinis linearibus, involuci squamis linearibus. ♀ in montosis Corsicæ reperiit Salzmann et sub nomine Seriolæ taraxacifoliæ di- vulgavit. (v. s.)

Sect. II. EUHYPOCHÆRIS.

Pappi radii sessiles.

6. H. GLABRA (L. sp. 1141.) foliis radicalibus subtus glaberrimis, supernè pi- loso-hispidis, caule ramoso nudo, involuci squamis linearis-lanceolatis luci- dis internis membranaceo-scariosis. (I) in sylvis humidiusculis. — Fl. fr. 4. p. 47. Lam. ill. t. 646. f. 1. (v. v.)
♂. *minor*, caule 1-floro minimo. (v. s.)

LXXXV. TRAGOPOGON Juss. gen. 170.

Involucrum simplex 8-10-phyllum squamis coalitis; receptaculum nudum; semina longitudinaliter striata; pappus plumosus stipitatus, stipite tenui.

* *Floribus luteis.*

1. T. PRATENSE (L. sp. 1109.) foliis glabris basi canaliculatis, pedunculis apice teretibus, involucris corollæ radio sublongioribus, squamis lanceolatis acutis,



- seminibus asperis. (2) in pratis frequens. — Fl. fr. 4. p. 64. — Fuchs. hist. 821. ic. (v. v.)
2. T. MAJUS (Jacq. aust. t. 29.) foliis glabris planis basi latoribus, pedunculis apice incrassatis, involucri corollæ radio longioris squamis 10-12 lanceolato-ovatis acuminatis, seminibus echinatis. ♀ in apricis Galliæ mediae, australis occidentalisque. — Fl. fr. 4. p. 64. Lam. ill. t. 646. f. 1. (v. v.)
3. T. HIRSUTUM (Gou. monsp. 342.) caule foliisque basi supernè tomentosis, pedunculis apice incrassatis, involucris corollæ radio non longioribus. (2) in sterilibus apricis Galliæ mediterraneæ. — Fl. fr. 4. p. 64. Garid. aix 466. t. 95. Præced. varietas? (v. s.)

** *Floribus cæruleis vel violaceis.*

4. T. PORRIFOLIUM (L. sp. 1110.) caule stricto glabro, foliis lineariformibus basi dilatatis, involuci squamis longè acuminatis corollâ planissimâ duplò longioribus. (2) in pratis provinciarum australiorum — Fl. fr. 4. p. 65. Jacq. ic. rar. t. 159. (v. v.)
5. T. CROCIFOLIUM (L. sp. 1110.) caule stricto tomentoso, foliis linearisubulatis, involuci squamis lanceolatis acutis corollâ sublongioribus. (2) in montibus subherbosis Galliæ australis. — Fl. fr. 4. p. 65. — Col. ecphr. t. 230. (v. v. DC.)

LXXXVI. THRINCIA Roth. cat. bot. 1. p. 98. DC. fl. fr. 4. p. 51.

Involucrum imbricatum; receptaculum favosum; semina disci pappo sessili plumoso et inæquali donata, radii breviter papposa, pappo abortivo.

1. T. HIRTA (Roth. 1. c.) foliis lanceolatis sinuato-dentatis hirtis, scapo 1-floro, involucro glabro basi squamulis aucto. ♀ in sterilibus arenosis ad vias. — Fl. fr. 4. p. 51. Leontodon hirtum L. sp. 1123. — C. Bauh. prod. p. 63. ic. (v. v.)
2. T. HISPIDA (Roth. cat. 1. p. 99.) foliis lanceolatis obtusis dentatis hispidis pilis surcatis, scapo 1-floro piloso, involucro canescente nudo. (1) in lapidosis et arenosis provinciarum australium occidentaliumque. — Fl. fr. 4. p. 52. Hyoseris taraxacoides Vill. dauph. 3. t. 25. (v. s.)
3. T. TUBEROSA (DC. fl. fr. 4. p. 52.) radice tuberosâ, foliis lyratis hirtis scabris, scapo unifloro nudo apice hirto. ♀ in pratis circâ Monspelium, Nicæam, Aquas Sextias, Massiliam. — Leontodon tuberosum L. sp. 1123. — Lob. ic. t. 232. f. 1. (v. s.)

LXXXVII. LEONTODON Juss. gen. p. 170. DC. fl. fr. 4. p. 53.—Apargia Schreb. Wild.

Involucrum imbricatum; receptaculum favosum; pappus plumosus sessilis, pilis aliis squamosis aliis sericeis.

1. L. INCANUM (DC. fl. fr. 4. p. 56.) foliis oblongis subdentalatis cauo-scabris pilis apice radiantibus, scapo unifloro pubescente, involuci squamis linearibus acuminatis pubescentibus. ♀ in pascais excelsis Alpium Delphinensis, circâ Monspelium ex cl. Benth. — Hieracium incanum L. Jacq. austr. t. 287. — Vill. 3. t. 24. (v. s.)
2. L. SQUAMOSUM (Lam. dict. 3. p. 529.) foliis oblongis glabris subdentatis, scapo unifloro squamoso supernè hirto, involuci hirti squamis linearibus acutis. ♀ in pascais montosis. — Fl. fr. 4. p. 54. L. pyrenaicum Gou. ill. t. 22. f. 1. 2. Apargia Alpina Wild. — All. ped. t. 14. f. 4. (v. v.)
3. L. MONTANUM (Lam. fl. fr. 3. p. 640.) foliis runcinato-dentatis glabris, scapis unifloris nudis supernè incrassatis hirtis, involucris villosis. ♀ in lapidosis Alpium Delph., et Pyrenæorum ex Lapeyr. — Fl. fr. 4. p. 54. Hedypnois taraxaci Vill. dauph. 3. t. 26. — All. ped. 1. t. 31. f. 1. (v. v.)
4. L. HISTERIUM (L. sp. 1123.) foliis runcinato-pinnatifidis glaberrimis, laciniis lanceolatis basi dilatatis subdentatis axi inclinatis, scapo 1-floro nudo glabro,

- involucri squamis interioribus glabris. ♀ in pascuis humidis Galliae occidentalis, mediae, orientalique. — Fl. fr. 4. p. 55. L. danubiale Jacq. aust. t. 164. — All. ped. t. 70. f. 3. Vill. dauph. 3. t. 24. (v. v.)
- β. *arenarium*, foliis linear-lanceolatis indivisis subdentatis. — In sabuletis maritimis agri Syrtici propè Teste de Buch reperiit cl. L. Dufour. (v. s.)
5. L. *HISPIDUM* (L. sp. 1124.) radice præmorsâ, foliis pinnatifido-oblongis laciniaiis nervo medio perpendicularibus hispidis pilis bifurcatis, scapo unifloro subglabro, involucri squamis lanceolatis acutis subhirsutis. ♀ in lapidosis apricis. — Fl. fr. 4. p. 55. excl. var. β et γ. 5. p. 453. (v. v.)
6. L. *CRISPUM* (Vill. dauph. 3. p. 84. t. 25.) radice simplici verticali, foliis runcinato-pinnatifidis laciniaiis linear-lanceolatis nervo medio inclinatis hispidis pilis apice ramosis, scapo 1-floro hirto, involucri squamis lanceolatis acutis basi sublanatis. ♀ in siccis Delph., Occitanie, Pyren. ex Lapeyr., Bellovacis ex cl. Graves. — Fl. fr. 5. p. 454. (v. v.)
7. L. *VILLARII* (Lois. gall. 514.) radice subsimplici verticali, foliis pinnatifidis laciniaiis linear-lanceolatis nervo medio perpendicularibus hispidis, pilis simplicibus, scapo 1-floro, involucri squamis hispidulis glabrisve, interioribus lanceolatis acuminatis. ♀ in siccis apricis Delph. infer., Gallo-prov., Occitanie, agri Ruscinonensis. — Fl. fr. 5. p. 454. L. hirtum Vill. dauph. 3. p. 82. t. 25. (v. v.)
8. L. *AUTUMNALE* (L. sp. 1123.) foliis lanceolatis pinnatifidis glabris, scapis ramosis declinatis squamosis, pedunculis sub involucro tumescientibus, involucri squamis puberulis lanceolatis acuminatis. ♀ ad margines agrorum et viarum. — Fl. fr. 4. p. 53. — Fuchs. hist. 320. ic. (v. v.)
- β. *simplex*, caule 1-floro. — eng. bot. t. 830. (v. v.)

LXXXVIII. PODOSPERMUM DC. fl. fr. 4. p. 61. — Scorzoneræ sp. L.

Involucrum imbricatum squamis margine membranaceis; semina pedicellata pedicello cavo incrassato; receptaculum seminibus delapsis tuberculato-muricatum; pappus sessilis plumosus.

1. P. *CALCITRAPÆFOLIUM* (DC. fl. fr. 5. p. 455.) caule basi ramoso, foliis petiolatis pinnatifidis, laciniaiis lanceolatis acutis, terminali longiore lanceolatâ, superioribus simplicibus, seminibus angulatis glaberrimis. ♀ in provinciis australibus et circâ Parisios. — P. resedifolium Fl. fr. 4. p. 61. non L. — Barr. ic. 800. (v. v.)
2. P. *LACINIATUM* (DC. fl. fr. 4. p. 62.) caule ramoso erecto, foliis petiolatis pinnatifidis laciniaiis linearibus acuminatis, terminali longissimâ linear-lanceolatâ, superioribus linearibus, seminibus subangulatis glaberrimis. (2) ad marginem agrorum. — Scorzonerâ laciniata L. Gærtn. fr. 2. t. 159. f. 1. S. petiolaris Lapeyr. abr. supp. 120. (v. v.)
3. P? *SUBULATUM* (DC. fl. fr. 4. p. 61.) caule subramoso infrâ folioso supernè nudo, foliis rigidis linearibus carinato-subulatis. ♀ Sorricinii. — An Scorzoneræ pinifoliæ Gou. ill. 53. var? (v. s. in specim. imperfecto.)

LXXXIX. SCORZONERA DC. fl. fr. 4. p. 59. — Scorzoneræ sp. L.

Involucrum imbricatum squamis margine membranaceis; receptaculum nudum; semina sessilia; pappus substipitatus plumosus.

1. S. *HIRSUTA* (L. mant. 278.) caule 1-floro, foliis linearibus subhirsutis obtusis, involucri squamis lanceolatis acuminatis glabris, seminibus lanatis. ♀ in lapidosis sterilibus Occitanie, Galloprovinciæ circâ Massiliam et montem Victoriae, Rupellam. — Fl. fr. 4. p. 60. — Hieracium capillaceum All. ped. t. 31. f. 3. (v. v. DC.)
2. S. *ANGUSTIFOLIA* (L. sp. 1113.) caule subnudo unifloro apice tomentoso, foliis sublinearibus basi lanatis, involucri squamis subglabris subobtusis, exterioribus lanceolato-ovatis, interioribus linear-oblongis. ♀ in Galliâ mediâ, australi occidentalique. — Fl. fr. 4. p. 60. Gm. sib. 2. p. 2. t. 1. (v. v.)

W 04



- β. Provincialis*, caule foliisque glabris. — In paludosis salsis Galloprovinciae.
(v. s.)
3. *S. ARISTATA* (Ram. in DC. fl. fr. 4. p. 922.) caule subnudo 1-floro, foliis linearibus acuminatis longissimis glabris, involuci squamis inferioribus foliaceis laxis subulatis florem æquantibus, interioribus obtusis, seminibus tuberculosis. ♀ in herbosis Pyren. editiorum. — *S. grandiflora* Lapeyr. (v. v. DC.)
4. *S. HUMILE* (L. sp. 1112.) caule subnudo subunifloro, foliis inferioribus oblongo-lanceolatis 5-7-nerviis acuminatis, superioribus linearibus, involuci squamis exterioribus ovatis subacutis, interioribus lanceolatis obtusis. ♀ in pratis rariis. — Fl. fr. 4. p. 59. — Clus. hist. 2. p. 138. f. 2. (v. v.)
5. *S. HISPANICA* (L. sp. 1112.) caule ramoso 5-6-floro, foliis amplexicaulibus integris basi denticulatis. ♀ in oleraceis hortis culta. — Fl. fr. 4. p. 59. — Blak. t. 406. (v. v.)
6. *S. PARVIFLORA* (Murr. syst. veg. ed. 14. p. 710.) caule ascendentem folioso basi ramoso, foliis lanceolato-ensiformibus glabris amplexicaulibus acuminatis nervosis, involuci glabri squamis obtusis, exterioribus ovatis interioribus lanceolatis. ♀ in littoribus Mediterraneis ex cl. Benth. — Jacq. aust. 4. t. 305. (v. s. ex Hung.)
7. *S. GRAMINIFOLIA* (L. sp. 1112.) caule folioso sub-1-floro apice tomentoso, foliis linear-ensiformibus amplexicaulibus acutissimis nervosis, involuci subvillosi squamis exterioribus acuminatis, interioribus lanceolatis acutis. ♀ in Gallia australi. — Jacq. obs. 4. p. 13. t. 100. sed in nostrâ capitulum foliis non stipatum. (v. s.)
8. *S. PURPUREA* (L. sp. 1113.) caule stricto 1-2-floro basi lanato, foliis linear-subulatis canaliculato-triquetris basi pubescentibus, involuci squamis obtusis exterioribus ovato-oblongis lanuginosis, interioribus sublinearibus. ♀ in pratis umbrosis circâ Mimatem reperiit cl. Prost. — Jacq. aust. t. 35. — Gmel. sib. 2. t. 2. Fl. purpurei. (v. s.)

XC. HYOSERIS Lam. dict. 3. p. 158.

Involucrum calyculatum; receptaculum nudum; seminum centralium pappus pilosus inæqualis, radii squamatus subabortivus.

1. *H. RADIATA* (L. sp. 1137.) foliis glabris runcinato-pinnatifidis laciniis dentato-angulatis reflexis, terminali 3-dentata, scapis unifloris nudis, involuci squamis exterioribus minimis lanceolatis. ♀ in collibus maritimis Galliae australis. — Fl. fr. 4. p. 49. — Pluck. t. 37. f. 2. (v. v.)
2. *H. SCABRA* (L. sp. 1138.) foliis lyrato-pinnatifidis dentatis scabriusculis, laciniis inflexis, scapis unifloris nudis apice incrassatis, involuero exteriore subnullo. ① in olivetis circâ Nicæam. — Fl. fr. 4. p. 49. — Bocc. mus. 2. t. 106. (v. s.)
3. *H. HEDYPNOIS* (L. sp. 1138.) caule tereti ramoso, foliis inferioribus oblongis sinuato-dentatis basi attenuatis, superioribus subamplexicanibus lanceolatis, involueris fructigeris glabris. ① inter segetes et in sterilibus Delph. et provinc. mediterranearum. — Fl. fr. 4. p. 50. — Lob. ic. t. 239. f. 1. (v. v.)

β. nana, caule nano 1-floro. (v. s.)

γ. rhagadioloides (DC. mss.) in involueris hirtellis. — *H. rhagadioloides* L. sp. 1139. Fl. fr. 4. p. 50. (v. s.)

4. *H. CRETICA* (L. sp. 1139.) caule ramoso, foliis radicalibus sinuato-dentatis apicè subretusis, caulinis subdentatis oblongis subcordatis amplexicaulibus, pedunculus tumidis apice fistulosus, involucri hirtis. ① in arvis circâ Nicæam. — Fl. fr. 4. p. 51. Gærtu. fruct. 2. t. 160. f. 2. (v. s.)

XCI. CATANANCHE Tourn. t. 271. L. gen. 920.

Involucrum imbricatum scariosum; receptaculum paleaceum; pappus sessilis 5-squamosus squamis mucronatis.

1. *C. CÆRULEA* (L. sp. 1142.) involuci squamis medio lineatis, inferioribus ovatis mucronatis, foliis villosis linearibus basi subpinnatifidis. \mathcal{U} in sterilibus Galliae australis occidentalisque. — Fl. fr. 4. p. 67. — Barr. ic. t. 1134. (v. v.)

XCII. CICHORIUM *Tourn.* t. 272. *L. gen. n.* 921.

Involucrum calyculatum, externum 5-phylum, internum 8-phylum squamis basi coalitis; receptaculum nudum vel subpilosum; pappus sessilis squamosus semine brevior.

1. *C. INVERNA* (L. sp. 1142.) floribus sessilibus subaxillaribus geminis, foliis runcinatis nervis subhirsutis. \mathcal{U} ad vias. — Fl. fr. 4. p. 68. — Lob. ic. t. 228. f. 2. (v. v.)
2. *C. ENDIVIA* (L. sp. 1142.) pedunculis axillaribus geminis, altero elongato 1-floro, altero brevissimo sub 4-floro, foliis oblongis denticulatis. (I) ex Indiâ (W.) orta, in hortis culta. — Fl. fr. 4. p. 68. (v. v.)
-


Ordo LVII. LOBELIACEÆ. *Juss. ann. mus.* 18. p. 1.

Calyx ovario adhærens limbo 5-lobo aut integro. Cor. monopetala calyci inserta irregularis 5-loba suprà profundè longitudinaliter fissa. Stam. 5 calyci inserta. Antheræ oblongæ filamento adnatæ longitudinaliter dehiscentes. Stylus simplex. Stigma urceolo membranaceo seu coronâ ciliatâ obvallatum. Fructus capsularis 2-aut raro 4-locularis loculis polyspermis apice dehiscentibus, aut drupaceus nucularis 2-aut (abortu) 1-locularis, loculis polyspermis. Embryo rectus cylindricus in albumine tenui carnoso inclusus. Radicula ad hylum versa. — Herbæ aut suffrutices foliis alternis, floribus axillaribus terminalibusve. An potius ut Campanulacearum tribus tantum habendæ?

I. LOBELIA *L. gen. n.* 1006.

Calyx 5-dentatus; cor. inæqualiter 5-loba; stam. 5; antheræ oblongæ in tubum connatae; stigma obtusum sub-2-lobum; capsula calyce coronata 2-3-locularis seminibus numerosis tenuissimis.

1. *L. DORTMANNIA* (L. sp. 1318.) foliis linearibus 2-locularibus integerrimis, scapo simplici subnudo racemoso. \mathcal{U} in stagno Cazaux propè Burdigalam ex Laterr. — Fl. fr. 3. p. 713. Fl. dan. t. 39. (v. s. ex Belgio.)
2. *L. URENS* (L. sp. 1321.) caule erectiunculo, foliis inferioribus subrotundis crenatis, superioribus lanceolatis serratis, floribus racemosis. (I) in Galliæ occidentalibus et mediæ sylvis humidis. — Fl. fr. 3. p. 715. — Moris. s. 5. t. 5. n. 56. (v. v.)
3. *L. LAURENTIA* (L. sp. 1321.) caule folioso prostrato, foliis lanceolato-ovalibus subcrenatis, pedunculis solitariis unifloris. (I) in Corsicâ. — Fl. fr. 3. p. 731. Bocc. mus. 2. t. 27. fig. maj. (v. s.)
4. *L. MINUTA* (L. mant. 292.) foliis radicalibus ovato-spathulatis obtusis crenatis integris, scapis capillaribus 1-floris foliis 2 minutis linearibus instrutis. (I) in Corsicâ. — Fl. fr. 3. p. 716. — Bocc. mus. 2. p. 35. t. 27. fig. min. An præcedentis var? (v. s.)



Ordo LVIII. CAMPANULACEÆ. Juss. gen. p. 163.

Calyx ovario adhærens 5-lobatus. Corolla 1-petala summo tubo calycis inserta 5-loba regularis aut rariūs irregularis, sæpiùs mārcescens. Stamina 5 sub corollâ calyci inserta, corollæ laciniis alterna. Antheræ 2-loculares oblongæ distinctæ rariūs coalitæ. Ovarium suprà glandulosum. Stylus unicus. Stigma 3-5-fidum. Caps. 3-5-locularis sæpiùs 3-locularis, foraminulis aut valvis 3-5 incompletis lateraliter dehiscens, loculis polyspermis, seminibus angulo loculorum interiori affixis. Embryo rectus in albumine carnosō; radicula infera. — Herbæ foliis alternis, floribus distinctis aut capitatis involucratis.

† *Antheræ connatæ,*

I. JASIONE L. gen. n. 1005.

Calyx 5-fidus; corolla rotata, tubo brevissimo, laciniis 5 longis linearibus; stam. 5, antheris in tubum coalitis; stigma 2-fidum; capsula 2-locularis. — Flores aggregati in involucro polyphyllo.

1. *J. HUMILIS* (Pers. enc. 2. t. 215.) canibus cespitosis tortuosis ascendentibus brevibus sub capitulo hirtis, foliis linearibus subundulatis obtusis glabriusculis ciliatis, involueri foliolis lanceolato-ovatis mucronatis flores sessiles subæquantibus, calycis laciniis linearis-setaceis. ♀ in summis Pyrenæorum orientalium pascuis siccis. — Fl. fr. 5. p. 433. (v. v.)
2. *J. MONTANA* (L. sp. 1317.) caule ramoso, foliis obtusis undulatis linearilanceolatis, pedunculis elongatis, involueri foliolis ovatis interioribus acuminatis, floribus pedicellatis, calycis laciniis linearibus acuminatis. (I) in sterilibus siccis. — Fl. fr. 3. p. 717. — Dalech. lugd. 364. f. 1.

a. lœvis, caule ramosissimo erecto, foliis glabriusculis, calyce glabro. (v. v.)

b. hirsuta, caule vix ramoso hirsuto, foliis hirsutis, involueris acutis, calyce subglabro. (v. v.)

γ? maritima, incano-pilosissima, caule prostrato subsimplici, foliis brevibus, involueri squamis exterioribus obtusis, calycibus hirsutis. (I?) in maritimis Galliæ occidentalis. — An distincta sp? (v. s.)

3. *J. PERENNIS* (Lam. dict. 3. p. 216.) caule simplici, foliis obtusis planis lanceolatis, pedunculis elongatis, involueri foliolis ovatis profundè dentatis acuminatis. ♀ in montosis Delph., Arvernæ, agri Lugd., Ligericini et Pyrenæorum. — Fl. fr. 4. p. 717. Lam. ill. t. 724. f. 2. (v. v.)

†† *Antheræ distinctæ.*

II. PHYTEUMA L. gen. n. 220.

Calyx 5-fidus; corolla rotata tubo brevissimo, laciniis 5 longis linearibus; stam. 5; stigma 3-partitum; capsula 3-locularis foraminulis lateralibus dehiscens. — Flores in spicas aut capitula bracteata congesti.

1. *P. PAUCIFLORA* (L. sp. 241.) foliis lanceolato-spathulatis obtusis, capitulo subfoliosi, bracteis subrotundo-cordatis ciliatis subobtusis floribus subduplo brevioribus. ♀ in editioribus Alpibus Delph. et Pyrenæis (Ph. Thomas). — Fl. fr. 3. p. 710. (v. s.)

2. *P. HEMISPHERICA* (L. sp. 241.) foliis sublinearibus subintegerrimis canle vix brevioribus, capitulo subrotundo, bracteis ovatis inæqualibus acuminatis ciliatis floribus brevioribus. \mathcal{U} in Alpibus, editioribus montibus Arvernæ, Cebennis, Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 710. — Moris. s. 5. t. 5. n. 53. (v. v.)
3. *P. SERRATA* (Viv. cors. app. 1.) foliis linear-i-lanceolatis denticulatis, radicalibus obtusis petiolatis caule vix brevioribus, capitulo subrotundo, bracteis glaberrimis lanceolato-ovatis basi cordatis dentatis acutis floribus brevioribus. \mathcal{U} in montibus Corsicæ reperiit Ph. Thomas. (v. s.)
4. *P. CHARMELII* (Vill. dauph. 2. p. 516. t. 11.) foliis radicalibus petiolatis ovato-cordatis subdentatis, caulinis linear-i-elongatis acuminatis denticulatis, bracteis linearibus capitulo rotundo longioribus. \mathcal{U} in Alpibus Delph., Gallopr., Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 712. (v. v.)
5. *P. SCHEUCHZERI* (All. ped. t. 39. f. 2.) foliis radicalibus petiolatis ovato-ellipticis linear-i-lanceolatis denticulatis, caulinis linear-i-elongatis acuminatis vix denticulatis, bracteis linearibus angustissimis valde inæqualibus capitulo rotundo 1-3-plò longioribus. \mathcal{U} in Pyrenæis ad montem Marboré ex cl. Benth. — Fl. fr. 3. p. 711. (v. s. ex Helv.)
6. *P. ORBICULARIS* (L. sp. 242.) foliis oblongo-lanceolatis crenato-serratis obtusis, radicalibus petiolatis lanceolato-cordatis, bracteis cordato-lanceolatis basi latioribus capitulo subrotundo brevioribus. \mathcal{U} in montosis. — Fl. fr. 3. p. 711. — Barr. ic. t. 525. (v. v.)
7. *P. BETONICÆFOLIA* (Vill. dauph. 2. p. 518. t. 12. f. 3.) foliis simpliciter crenatis, radicalibus lanceolato-cordatis, caulinis linear-i-lanceolatis, inferioribus longè petiolatis, spicâ oblongâ subnudâ. \mathcal{U} in Alpibus et Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 713. (v. s.)
8. *P. SCORZONERÆFOLIA* (Vill. dauph. 2. p. 519. t. 12. f. 2.) foliis subdentatis inferioribus oblongis petiolatis, superioribus linearibus sessilibus utrinquè attenuatis, bracteis paucis linear-i-acuminatis spicâ oblongâ subsextuplò brevioribus. \mathcal{U} in Delphinatûs montibus. — Fl. fr. 3. p. 713. (v. s.)
9. *P. SPICATA* (L. sp. 242.) foliis radicalibus obtusis cordato-ovatis duplicato-dentatis petiolatis petiolo alato, caulinis linear-i-lanceolatis dentatis sessilibus, bracteis paucis linear-i-lanceolatis acuminatis spicâ elongatâ subquaduplò brevioribus. \mathcal{U} in sylvaticis humidis. — Fl. fr. 3. p. 714. — C. Bauh. prod. t. 32. f. 1. (v. v.)
10. *P. HALLERI* (All. ped. p. 430.) foliis obtusis, radicalibus cordato-ovatis duplicato-dentatis, inferioribus longè petiolatis, caulinis lanceolatis subsessilibus, bracteis numerosis lanceolatis acuminatis inæqualibus spicâ ovatâ subbrevioribus, stylis hirsutis flore longioribus emarginato-bifidis. \mathcal{U} in Pyrenæorum montibus Esquierry, Bergons, Ereslids. — Fl. fr. 3. p. 714. P. ovata Willd. (v. v. DC.)

III. PRISMATOCARPUS L'Her. sert. angl. DC. fl. fr. 3. p. 708. — Campanulæ sp. L.

Corolla rotata limbo plano; capsula prismatica 2-3-locularis versus apicem dehiscens. Cætera ut in Campanulâ.

1. *P. HYBRIDUS* (L'Her. l. c.) caule stricto basi subramoso, foliis oblongis subcrenatis, floribus solitariis, laciniis calycinis corollâ brevioribus. (1) inter segetes. — Fl. fr. 3. p. 709. Campanula hybrida L. sp. 239. — Moris. s. 5. t. 2. n. 22. (v. v.)
2. *P. SPECULUM* (L'Her. l. c.) caule ramosissimo diffuso, foliis oblongis crenatis, floribus solitariis, laciniis calycinis corollam patulam æquantibus. (1) in agris ad versuras. — Fl. fr. 3. p. 708. Campanula Speculum L. — Lob. ic. t. 418. (v. v.)

IV. CAMPANULA L'Her. DC. fl. fr. 3. p. 696. — Campanulæ sp. Tourn. L.

Calyx 5-fidus sinibus interdum reflexis; corolla campanulata 5-fida,









stam. 5 filamentis basi latioribus ; stigma 4-rarius 5-partitum ; capsula 3-rarius 5-locularis.

§. 1. *Capsulis obtectis sinubus calycis reflexis.*

1. C. ALLIONII (Vill. danph. 2. p. 512. t. 10.) caule unifloro hispido , foliis linear-lanceolatis undulatis hispidis, radicalibus obtusis. $\frac{1}{2}$ in Alpibus Delph., Galloprov. — Fl. fr. 3. p. 706. C. Alpestris All. ped. t. 6. f. 3. (v. v. DC.)
2. C. BARBATA (L. sp. 236.) caule simplici , foliis lanceolatis villosis obtusis , rameo terminali laxo , corollis barbatis cernuis , laciniis calycinis acutis. $\frac{1}{2}$ in pascuis montanis Lothar. ex Buch., Delphin. — Fl. fr. 3. p. 706. — C. Bauh. prod. p. 36. f. 1. — Moris. s. 5. t. 3. n. 35. (v. v. in Helv.)
3. C. MEDIUM (L. sp. 236.) caule indiviso erecto folioso , foliis lanceolatis linearibus crenatis, floribus erectis, calycis laciniis lanceolato-ovatis ciliato-hispidis. (2) in Galloprov. sylvis apricis, sèpissimè in hortis colitur. — Fl. fr. 3. p. 707. — Clus. hist. 2. p. 172. f. 2. Stigmata 5 , capsulae 5-loculares. (v. v. s. DC.)
4. C. SPICATA (L. mant. 337.) hispida , caule simplicissimo , foliis linearibus integris, floribus sessilium spicâ laxâ , bracteis calycem superantibus. (2) in Delphin. et Galloprov. subalpinis. — Fl. fr. 3. p. 708. — All. ped. t. 46. f. 2 et t. 47. f. 1. (v. v. D. in Valesiâ.)
5. C. SPECIOSA (Pourr. act. tol. 3. p. 309.) hispida, caule simplici folioso, pedunculis axillaris unifloris, foliis linearibus subcrenatis longissimis , stigmatibus 3 , capsulae 3-locularibus. $\frac{1}{2}$ in petrosis montosis Pyren., Galliae Narbonensis, agri Ligericini (Prost.), propè Monspelium loco dicto *Capouladoux* ex Benth.— Fl. fr. 3. p. 706. — C. longifolia Lapeyr. fl. pyr. 1. t. 6. (v. v. DC.)

§. 2. *Calycis sinubus non reflexis.*

6. C. THYRSOIDEA (L. sp. 235.) hispida , caule simplicissimo sulcato , foliis lanceolato-linearibus obtusis, floribus spicatis, spicâ densâ terminali oblongâ basi foliosâ. $\frac{1}{2}$ in Jurassi, Alpium et Pyrenæorum ex Lapeyr. declivibus asperis. — Fl. fr. 3. p. 704. Jacq. obs. t. 21. (v. v.)
7. C. CERVICARIA (L. sp. 235.) hispida , caule erecto simplici , foliis lanceolato-linearibus undulatis obtusis , radicalibus in petiolum attenuatis, floribus sessilibus capitato-gloemeratis. (2) in sylvaticis asperis montosis passim. — Fl. fr. 3. p. 703. — Bauh. prod. p. 36. f. 2. (v. v. in Helv. D.)
8. C. PETRÆA (L. sp. 236.) caule erecto simplici aut basi ramoso tomentoso , foliis scabris obtusis subtus cano-tomentosis, radicalibus petiolatis oblongo-lanceolatis crenatis basi attenuatis, caulinis sessilibus semiamplexicaulibus lineari-lanceolatis, florum capitulis terminalibus, seminibus exsertis. $\frac{1}{2}$ in Galloprovinciâ orientali loco dicto *les escales d'Eglon*. — Clus. hist. p. 333. ic. (in herb. Richard v. cl. Alph. DC.)
9. C. GLOMERATA (L. p. 235.) caule obsoletè angulato simplici glabriusceno , foliis scabris obtusis , radicalibus petiolatis oblongo-lanceolatis dentatis basi cordatis, caulinis sessilibus semiamplexicaulibus, florum capitulis terminalibus axillarisbusque. $\frac{1}{2}$ in aridis, collibus calcareis. — Fl. fr. 3. p. 703. — Lob. ic. t. 326. f. 2. (v. v.)
10. C. TRACHELIUM (L. sp. 235.) caule erecto obsoletè angulato , foliis cordato-lanceolatis scabris inæqualiter serratis acuminatis , inferioribus petiolatis , floribus pedunculatis axillaris , calycibus ciliatis laciniis lanceolato-ovatis. $\frac{1}{2}$ in sylvis. — Fl. fr. 3. p. 703. C. urticifolia Schmidt ex cl. Alph. DC. fl. fr. 3. p. 702. — Lob. ic. t. 326. f. 1. (v. v.)
11. C. LATIFOLIA (L. sp. 233.) caule erecto simplicissimo tereti , foliis ovato-lanceolatis scabris crenato-dentatis , inferioribus petiolatis, floribus solitaris axillaris terminalibusque breviter pedunculatis , calycis glabri laciniis nervo medio hispidulo aut glabro, corollis ciliatis. $\frac{1}{2}$ in sepiibus umbrosis montium. — Fl. fr. 3. p. 701. — Lob. ic. 2. t. 278. f. 2. (v. v.)

12. *C. RAPUNCULOIDES* (L. sp. 234.) caule erecto ramoso, foliis scabris cordato-lanceolatis, superioribus linearibus, floribus secundis axillaribus spicatis, calycis patentissimi pubescens laciinis linearis lanceolatis. ♀ in agris, siccissimis. — Fl. fr. 3. p. 702. — Moris. s. 5. t. 3. n. 32. (v. v.)
13. *C. RHOMBOIDALIS* (L. sp. 233.) caule striato, foliis sessilibus serratis, inferioribus subrhomboideis, caulinis acutis ovatis lanceolatis, floribus racemosis secundis, calycis patentissimi laciinis subulato-linearibus. ♀ in pratis Alpium Delph., Gallopr., Arverniæ, Pyren. — Fl. fr. 3. p. 701. *C. lanceolata* Lapeyr. — Barr. ic. t. 567. (v. v.)
14. *C. RAPUNCULUS* (L. sp. 232.) caule erecto striato, foliis undulatis pilosis, radicalibus lanceolato-ovalibus, caulinis linearis lanceolatis, panicula coarctata, calycis laciinis glabris subpatulis linearis-subulatis. ② in sylvaticis, arvis. — Fl. fr. 3. p. 699. — Fuchs. hist. 214. ic. (v. v.)
15. *C. PERSICIFOLIA* (L. sp. 232.) glabra, caule erecto simplici, foliis radicalibus lanceolato-ovatis serratis in petiolum attenuatis, caulinis lanceolato-linearibus subserratis sessilibus remotis, laciinis calycinis subpatulis lanceolato-linearibus. ♀ in sylvaticis. — Fl. fr. 3. p. 700. — Clus. hist. 2. p. 171. f. 3. (v. v.)
16. *C. PATULA* (L. sp. 232.) foliis radicalibus lanceolato-ovalibus dentato-sinuatis subpubescentibus basi attenuatis, caulinis linearibus glabris, panicula patulæ, calycis tubo obconico glabro laciinis basi denticulatis linearis-subulatis patentibus ferè longitudine corollæ. ♀ in sepibus et versuris passim. — Fl. fr. 3. p. 699. *C. decurrentis* L. suec. — Dill. elth. t. 58. f. 68. (v. v.)
17. *C. LINIFOLIA* (Lam. dict. 1. p. 579.) caule decumbente glabro paucifloro, foliis radicalibus oblongo-lanceolatis subdentatis, superioribus linearis-lanceolatis, calycibus glabris laciinis subulato-linearibus. ♀ in pratis frigidis Alpium, Arverniæ montium et Pyrenæorum. — Fl. fr. 3. p. 698. *C. Scheuchzeri* Vill. dauph. 2. t. 10. (v. v.)
β. Valdensis (DC.) pubescens, caule subunifloro. — *C. Valdensis* All. ped. t. 6. Fl. fr. 3. p. 698. (v. v.)
18. *C. ROTUNDIFOLIA* (L. sp. 232.) caule decumbente, foliis radicalibus subrotundo-cordatis crenatis, caulinis linearis-lanceolatis dentatis, superioribus linearibus integerrimis, calycis patentissimi laciinis subulatis. ♀ in muris, saxosis, pascuis montosis. — Fl. fr. 3. p. 697. — Lob. ic. t. 328. f. 1. (v. v.)
β. velutina (DC.) caule foliisque velutinis. — Propè Massiliam. (v. v.)
19. *C. PUSILLA* (Jacq. coll. 2. p. 79.) caulis decumbentibus hispidulis, foliis radicalibus longè petiolatis ovatis dentatis, caulinis lanceolatis crenatis, superioribus linearibus, calycis patentissimi laciinis setaceis. ♀ in rupibus sylvaticis. — Fl. fr. 3. p. 697. — *C. Bauh. prod.* p. 34. ic. (v. v.)
20. *C. CENISIA* (All. ped. t. 6. f. 2.) minuta, caulis diffusis unifloris foliosis, foliis ovatis glabris integerrimis subciliatis, floribus 5-fidis. ♀ in Alpibus Delph. et Galloprov. — Fl. fr. 3. p. 696. (v. s.)
21. *C. HEDERACEA* (L. sp. 240.) glabra, caulis filiformibus decumbentibus laxis, foliis cordatis quinquelobis petiolatis, floribus longè pedunculatis, calycis laciinis linearibus. ① in umbriosis humidis provinciarum occidentalium et rariū australium. — Fl. fr. 3. p. 696. — Moris. s. 5. t. 2. n. 18. (v. v.)
22. *C. ERINUS* (L. sp. 240.) pubescens, caule ramoso dichotomo, foliis sessilibus ovatis profundè dentatis, superioribus oppositis, floribus axillaribus subsessilibus. ♀ in petrosis provinciarum australium et rariū occidentalium. — Fl. fr. 3. p. 705. — Moris. s. 5. t. 3. n. 25. (v. v.)



Ordo LIX. VACCINIEÆ. DC. theor. elem. p. 216.

Calyx adhærens 1-phyllospersistens, integer aut 4-5-6-lobus. Corolla toro inserta monopetala 4-5-partita, sæpiùs urceolata. Stamina definita distincta, toro inserta, sæpiùs decem. Antheræ sæpè bicornes. Ovarium unicum. Stylus 1. Stigma 1. Bacca calyce persistente coronata 4-5-locularis, loculis oligospermis. Embryo rectus in albumine carnosö; cotyledones brevissimæ, radicula longa infera. — Suffrutices foliis alternis coriaceis.

I. VACCINIUM L. gen. 483.

Calyx integer aut dentatus; corolla 4-fida; stam. 8; bacca globosa umbilicata oligosperma.

Sect. I. MYRTILLUS.

Corolla campanulato - globosa 4-dentata, antheræ medio 2-cornes. — Folia decidua.

1. V. ULIGINOSUM (L. sp. 499.) peduncalis unifloris, foliis obovatis lanceolatis integris obtusis glabris venosis, ramis teretibus. ♂ in uliginosis montosis passim. — Fl. fr. 3. p. 687. — Clus. hist. 1. p. 62. f. 1. (v. v.)
2. V. MYRTILLUS (L. sp. 498.) pedunculis unifloris, foliis serratis ovatis mucronulatis, ramis angulatis. ♂ in ericetis, sylvaticis, arenosis. — Fl. fr. 3. p. 687. — Lob. ic. 2. t. 109. f. 1. (v. v.)

Sect. II. VITIS-IDÆA.

Corolla campanulata 4-fida, antheræ muticæ. — Folia persistentia.

3. V. VITIS-IDÆA (L. sp. 500.) foliis obovatis obtusis revolutis integerrimis subtus punctatis, racemis terminalibus nutantibus. ♂ in sylvaticis montium. — Fl. fr. 3. p. 687. — Cam. epit. 136. ic.

Sect. III. OXYCOCOS Pers. enc. 1. p. 419.

Corolla 4-partita reflexa, antheræ muticæ. — Folia persistentia.

4. V. OXYCOCOS (L. sp. 500.) caule filiformi repente, foliis ovatis integerrimis revolutis, pedunculis unifloris. ♀ in uliginosis passim. — Fl. fr. 3. p. 688. — Lob. ic. t. 109. f. 2. (v. v.)

Ordo LX. ERICINEÆ. *Desv. journ. bot.* 1813. p. 28. — Rhodoraceæ et Ericaceæ *DC. fl. fr.* 3. p. 671 et 675. — Rhododendra et Ericæ *Juss. gen.*

Calyx persistens liber 3-4-sæpiùs 5-partitus. Corolla basi calycis inserta, 4-5-fida aut partita, marcescens. Stamina corollæ laciniis alterna aut dupla, distincta, basi calycis aut corollæ inserta. Antheræ basi bicornes. Ovarium unicum liberum; stylus 1; stigma 1. Fructus multilocularis baccatus aut sæpiùs capsularis, polyspermus, multivalvis valvis suturâ aut medio dehiscentibus. Semina minuta placentæ centrali affixa. Embryo rectus in albumine carnosæ. Cotyledones semicylindricæ. — Herbæ aut Frutices foliis sèpè persistentibus alternis verticillatisve integris aut dentatis.

Trib. I. ERICACEÆ DC. fl. fr. l. c.

Fructus valvis medio dehiscentibus.

† *Fructus baccatus.*

I? EMPETRUM *Tourn.* 421. *L. gen.* 1100.

Dioicum. Calyx 3-partitus; corolla 3-petala. *Masc.* Stam. 3, filamentis longis. *Fem.* Stylus subnullus; stigma radiis 6-9; bacca orbiculato-depressa 1-locularis 6-9-sperma; radicula inferior. — An hujus familie? aut ut vult. cl. Nuttall (gen. am. 2. p. 233.) novæ familie vicinæ Coniferis typus?

1. E. *NIGRUM* (L. sp. 1450.) procumbens, foliis oblongis glabris, stigmate 9-radiato. ♂ in petrosis Vogesorum, Jurassi, Alpium, Montis-Aurei, Pyrenæorum passim. — Fl. fr. 3. p. 686. — Cam. epit. 77. ic. (v. v.)

II. ARBUTUS *L. gen.* 552.

Calyx minimus 5-partitus; cor. ovata limbo parvo 5-fido revoluto; stamina 10; bacca 5-locularis.

Sect. I. UNEDO.


Stamina basi villosa, antheræ apice biperforatæ, bacca tuberculosa, loculi polyspermia.

1. A. *UNEDO* (L. sp. 566.) caule arboreo, foliis glabris obtuse serratis, paniculâ terminali. ♂ in maritimis Galliae mediterraneæ et austro-occidentalis. — Fl. fr. 3. p. 682. — Barr. ic. t. 673 et 674. (v. v.)

Sect. II. MAIRANIA Neck. et bot. 1. p. 219.

Stamina glabra, antheræ apice non biperforatæ, bacca laevis, loculi monospermia.

2. A. *ALPINA* (L. sp. 566.) caulibus procumbentibus, foliis rugosis serratis. ♂ in Alpibus et Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 682. — Clus. hist. 1. p. 61. ic. (v. v.)
3. A. *UVA-URSI* (L. sp. 566.) caulibus procumbentibus, foliis integerrimis



lævibus margine revolutis. ♂ in Jurasso, Alpibus, Cebennis, Corbariensibus, Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 683. Fl. dan. t. 33. (v. v.)

† † *Fructus capsularis.*

III. PYROLA *Tourn. inst. t. 132. Gærtn. fruct. 1. t. 63.* — *Pyrolæ sp. L.*

Calyx 5-fidus vel 5-partitus; cor. 5-partita ferè 5-petala; stylus filiformis staminibus longior; stamina filiformi-subulata; capsula 5-locularis, basi angulis dehiscens. — An cum sequente Monotropeis affinior? (DC. mss.)

* *Stylo erecto.*

1. P. UNIFLORA (L. sp. 568.) foliis suborbiculatis, scapo unifloro, calyce 5-partito, corollâ apertâ. ♀ in Alpibus Delph. et Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 685. — Moris. s. 12. t. 10. n. 2. (v. v. D. in Helv.)
2. P. SECUNDA (L. sp. 567.) foliis elliptico-ovatis dentatis, racemo unilaterali, calyce 5-fido, corollâ campanulatâ, stylo exerto. ♀ in montosis sylvaticis. — Fl. fr. 3. p. 685. — Dalech. hist. p. 1148. f. 4. (v. v.)
3. P. MINOR (L. sp. 567.) foliis rotundo-ovatis crenatis, racemo laxo, calyce 5-fido, corollâ campanulatâ stylum subæquante. ♀ in umbrosis montosis. — Fl. fr. 3. p. 684. Radius mon. pyr. t. 1. P. rosea Sm. eng. bot. p. 2543. Rad. pyr. t. 2. (v. v.)

** *Stylo declinato.*

4. P. ROTUNDIFOLIA (L. sp. 567.) foliis ovalibus subrotundis orbicularibusve obtusis, racemo laxo, calyce 5-partito, corollâ apertâ, stylo corollâ duplò longiore. ♀ in sylvaticis humidis. — Fl. fr. 3. p. 684. — Lob. ic. t. 294. f. 2. (v. v.)

IV. CHIMOPHILA *Pursh. fl. am. bor. 1. p. 276.* — *Pyrolæ sp. L.*

Calyx 5-fidus; cor. 5-partita ferè 5-petala patens; stylus brevis teres ovario immersus; stam. medio in discum dilatata; capsula 5-locularis dehiscens.

1. C. UMBELLATA (Nutt. gen. am. 1. p. 274.) foliis cuneato-lanceolatis sessilibus, pedunculis subumbellatis subquaternis, filamentorum stipite nudo ciliato. ♂ in sylvis Vogesorum parte dictâ *ban de la Roche* rarissima ex Oberlin. — Fl. fr. 5. p. 431. — Moris. s. 12. t. 10. n. 5. (v. s. ex Germaniâ.)

V. ANDROMEDA *L. gen. n. 549.*

Calyx minimus 5-partitus; corolla 5-fida laciniis reflexis; stamina 10, capsula 5-locularis, 5-valvis.

1. A. POLIFOLIA (L. sp. 564.) foliis alternis lanceolatis revolutis, pedunculis aggregatis, corollis ovatis. ♂ in uliginosis circâ Rothomagum et in turfosis Jurassi, Vogesorum, Ruthenorum (Rouergue). — Fl. fr. 3. p. 681. — Pluck. t. 175. f. 1. (v. v.)

VI. ERICA *Salisb. soc. lin. 6. p. 369.* — *Ericæ sp. L.*

Calyx 4-partitus; corolla campanulata sæpè ventricosa 4-fida; stam. 8; capsula 4-8-locularis 4-8-valvis.

1. E. SCOPARIA (L. sp. 502.) foliis ternis angustis linearibus, calycis laciniis ovatis, antheris aristatis inclusis, corollis campanulatis, stigmate exerto peltato. ♂ in sterilioribus provinc. med., austr. et occidentalium. — Fl. fr. 3. p. 648. — Lob. ic. 2. t. 215. f. 2. (v. v.)
2. E. ARBOREA (L. sp. 502.) foliis ternis, ramulis incano-villosis, corollâ glabro-campanulatâ glabrâ, antheris aristatis inclusis, stylo exerto peltato,

- calycis laciniis ovatis. ♂ in provinciis australibus et austro-occidentalibus.*
— Fl. fr. 3. p. 677. — Clus. hist. 1. p. 41. ic. — Lob. t. 214. f. 1. (v. v.)
3. *E. RAMULOSA* (Viv. ann. bot. 1. p. II. p. 169.) foliis quaternis quinise, ramulis strictis coarctatis subglabris, floribus capitato-congestis, calycis laciniis lanceolatis, corollis ovoideis stylo æqualibus, antheris aristatis inclusis. ♂ in collibus Corsice australis. — Viv. fragm. ital. 4. t. 7. *E. Corsica DC.* fl. fr. 3. p. 677. ic. rar. t. 17. (v. s.)
4. *E. MULTIFLORA* (L. sp. 503.) caule basi decumbente, foliis quaternis quinise linearibus angustissimis acutis, floribus pedicellatis, calycis minimi laciniis ovatis, corollis ovatis, antheris muticis longè exsertis, stylo exerto. ♂ in ericetis prov. occidentalium et circâ Parisios. — Fl. fr. 5. p. 430. (v. v.)
5. *E. VAGANS* (L. mant. 230.) caule erecto, foliis quaternis quinise linearibus lati obtusis, floribus longè pedunculatis, calycis laciniis linear-lanceolatis membranaceis, corollis cylindraceis, antheris muticis longè exsertis, stylo exerto. ♂ in Galliâ meridionali. — Fl. fr. 3. p. 679 et 5. p. 430. (v. v.)
6. *E. MEDITERRANEA* (Thunb. diss. n. 41.) caule erecto, foliis ternis quaternis linearibus angustis obtusiusculis, floribus pedicellatis, calycis laciniis linearibus triangularibus, corollis cylindricis, antheris muticis styloque exsertis. ♂ circâ Burdigalam ex cl. Des Moulins (bull. soc. lin. burd. 1. p. 34.) — Curt. bot. mag. t. 471. (v. s. ex Italiâ)
7. *E. CINEREA* (L. sp. 501.) foliis ternis, calycis laciniis linearibus, corollis ovatis, antheris aristatis inclusis, stylo exerto, stigmate capitato. ♂ in arenosis aridis, montosis, sylvaticis Galliæ mediæ, australis occidentalisque. — Fl. fr. 3. p. 676. — Clus. hist. 1. p. 43. f. 2. (v. v.)
8. *E. CILIARIS* (L. sp. 503.) foliis ternis quaternisque subovatis ciliatis, racemis secundis, calycis laciniis lanceolatis, corollis ovatis inflatis, antheris muticis inclusis, stylo exerto. ♂ in Galliâ occidentali. — Fl. fr. 3. p. 678. — Clus. hist. 1. p. 46. ic. (v. v.)
9. *E. TETRALIX* (L. sp. 502.) foliis quaternis linearibus ciliatis, floribus cipitatis pedicellatis, calycis longè ciliati laciniis pedicellisque tomentosis, corollis ovatis, antheris aristatis inclusis, stylo subincluso. ♂ in humidis turfosis Pyrenaeorum, Galliæ occidentalis et mediæ. — Fl. fr. 3. p. 676. Fl. dan. t. 81. (v. v.)

VII. CALLUNA *Salisb. trans. linn. l. c. t. 6.* — Ericæ sp. L.

Calyx 4-partitus duplicatus; corolla campanulata 4-fida; stam. octo; capsula 4-locularis dissepimentis receptaculo affixa, 4-valvis, valvulis suturâ dehiscentibus.

1. *C. ERICA* (DC. fl. fr. 3. p. 681.) foliis sessilibus minimis 4-fariam imbricatis. ♂ in sterilibus, sylvaticis, arenosis. *Erica vulgaris L. Cam. epit. 75. ic. (v. v.)*

Trib. II. RHODORACÆE DC. fl. fr. 3. p. 671.

Fructus capsularis, valvis suturis dehiscentibus.

VIII. MENZIEZIA *Smith plant. ic. fasc. 3. 56. Juss. ann. mus. 1. p. 55. t. 4.*


Calyx 4-partitus; corolla oblongo-ovoidea, limbo patente 4-dentato reflexo; stam. 8 basi corollæ inserta.

1. *M. DABEOCI* (DC. fl. fr. 3. p. 674.) floribus terminalibus racemosis, foliis alternis ovatis revolutis subtus incano-tomentosis. ♂ in Pyrenæis occidentalibus et Andegaviâ. — *Erica Dabeoci L. sp. 509. (v. v.)*

IX. AZALEA *L. gen. n. 212.*

Corolla infundibuliformis aut campanulata 5-fida inæqualis; stam. 5 sub pistillo inserta.





1. A. PROCUMBENS (L. sp. 217.) ramis diffusis procumbentibus, foliis ellipticis glabris margine revolutis, calycis lacinias aequalibus, stylo incluso. ♂ in Alpibus et Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 674. Loiseleuria procumbens Desv. journ. bot. 1813. t. 3. p. 35. — Clus. hist. 1. p. 75. f. 3.

X. RHODODENDRON L. gen. n. 548.

Calyx 5-partitus; corolla subinfundibuliformis limbo patente 5-lobo; stam. 10 declinata.

1. R. FERRUGINEUM (L. sp. 562.) foliis ovato-oblongis glabris subtus leprosis, corollis infundibuliformibus. ♂ in Alpibus et Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 673. — Lob. ic. t. 366. f. 2. (v. v.)
2. R. HIRSUTUM (L. sp. 562.) foliis ellipticis ciliatis subtus ferrugineo-punctatis, corollis infundibuliformibus. ♂ in summo Jurassi monte Thoiry ex Hall., Alp. Delphin. ex Vill., Pyren. monte Sissoy ex Lapeyr. — Fl. fr. 3. p. 673. — Lob. ic. t. 468. f. 1. (v. v. D. in Ital.)

XI. LEDUM L. gen. n. 546.

Calyx minimus 5-dentatus; cor. 5-partita sub 5-petala; stamina 5-10 imo calyci inserta; capsula 5-locularis 5-valvis.

1. L. PALUSTRE (L. sp. 561.) foliis linearibus margine revolutis, subtus tomentosis. ♂ in Alsatiæ turfosis uliginosis ex Mapp. et Will. — Fl. fr. 3. p. 672. — Cam. epit. 546. ic. (v. ex Germ.)
-

Ordo LXI. MONOTROPEÆ. Nutt. gen. amer. 1. p. 272.

Calyx 5-partitus persistens interdum nullus aut bracteis irregularibus suppletus. Cor. perigyna persistens, petalis 4-5 nunc imâ basi coalitis, nunc connexis in tubum apice 4-5-dentatum. Stam. petalis dupla, corollæ basi inserta, alia petalis opposita, alia alterna. Antheræ excentricè peltatæ, filamentis adnatae, saepius 1-loculares; appendices filiformes recurvæ inter stamina sitæ. Ovarium liberum? Stylus 1. Stigma simplex discoideum. Caps. 5-locularis 5-valvis valvis medio septiferis, septis axeos basi coalitis. Semina numerosa minutissima pelliculâ samaræformi inclusa, apice interdum alata. — Herbæ orobanchoideæ carnosæ coloratae, in radicibus arborum parasitæ aphyllæ, nempe squamis foliorum loco onustæ.

I. MONOTROPA L. gen. n. 737. Gærtn. fil. carp. 3. t. 185. f. 6.

Calyx 4-5-sepalus coloratus; petala totidem sepalis alterna et cum iis decidua. Stam. 8-10; filamenta subulata; ovarium liberum; stylus simplex cylindraceus; caps. 8-10 sulcis exarata 4-5-locularis 4-5-valvis; albumen carnosum.

1. M. HYPOXYTIS (L. sp. 555.) floribus lateralibus octandris, terminali decandro. ♀ parasitica ad radices arborum passim. — Fl. fr. 4. p. 921. — Moris. hist. 3. s. 12. t. 16. n. 20. (v. v.)

Subclassis III. COROLLIFLORÆ.

Calyx liber gamosepalus, sepalis nempè plus minus inter se coalitis. Petala in corollam hypogynam liberam coalita. Stamina corollæ inserta. Ovarium liberum.

Ordo LXII. EBENACEÆ. *Vent. tabl. p. 443.* — Guyacaneæ
Juss. gen. 155.

Calyx monosepalus apice divisus. Corolla calyci inserta, monopetala lobata lobis corollæ laciniis numero æqualibus. Stamina corollæ inserta, definita aut indefinita sæpè monodelpha. Ovarium liberum aut cum calycis basi subadhærens multiloculare loculis 1-2-ovulatis; stylus simplex aut divisus; stigma simplex aut divisum. Capsula aut bacca 1-∞-locularis, loculis 1-spermis. Embryo rectus in albumine carnosō. Cotyledones planæ. Radicula ad hylum versa. — Arbores aut Fru-tices foliis alternis simplicibus integris aut dentatis, floribus axillaribus.

Trib. I. DIOSPYREÆ. — Ebenaceæ *Rich. R. Brown prod.*
p. 524.

Ovarium liberum multiloculare, loculis 1-2-spermis, semi-nibus pendulis.

I. DIOSPYROS *L. gen. 1161.*

Calyx urceolatus 4-6-fidus; corolla imo calyci inserta urceolata 4-6-fida; stamina 8-16 imæ corollæ inserta interdùm sterilia; stigmata 4 aliquandò bifida; bacca infernè calyce cincta 8-12-locularis.

I. *D. Lotus* (*L. sp. 1510.*) foliis ovato-oblongis infernè discoloribus punctis viridibus subcallosis notatis. ♂ in Occitania cultus et nunc subsppontaneus. — Fl. fr. 3. p. 670 et 5. p. 429. — Cam. epit. p. 156 et 157. ic. (v. v. c.)

Trib. II. STYRACEÆ *Rich. anal. du fr. p. 48.*


Ovarium interdùm adhærens 4-spermum, semi-nibus 2 as-cendentibus, 2 inversis.

II. STYRAX *Tourn. inst. t. 369. L. gen. 595.*

Calyx urceolatus integer aut 5-fidus; corolla imo calici inserta urceolata, limbo brevi 3-7-lobo; stam. 6-16, filamentis basi coa-litis corollæ tubo insertis, stigma 1; drupa exsucca supernè coriacea, nuce osseâ sphæricâ.

I. *S. OFFICINALE* (*L. sp. 635.*) foliis ovatis subtùs villosis, racemis simplicibus folio brevioribus. ♂ 5 in Galloprovinciæ et Niceæ sylvis maritimis. — Fl. fr. 3. p. 671. — Cam. epit. 38. ic. (v. v. D.)





Ordo LXIII. JASMINEÆ *Juss. gen. 104. Ach. Rich. mem. soc. hist. nat. t. 2. — Jasmineæ et Oleineæ Link et Hoffm. fl. portug. R. Brown prod. 520 et 522.*

Flores hermaphroditi aut in Fraxino polygami. Calyx 1-sepalus, in parte inferiori tubulosus 4-5-8-lobus. Corolla 1-petala regularis 4-5-8-loba aut partita, aestivatione mox contortâ mox valvatâ, aliquandò nulla. Stam. 2 corollæ inserta; filamenta brevia; antheræ introrsæ 2-loculares longitudinaliter dehiscentes. Ovarium liberum sessile 2-loculare, loculis 2-ovulatis ovulis pendulis; stylus simplex; stigma 2-lobum. Fructus mox siccus dehiscens indehiscensve 1-2-locularis, loculis 1-2-spermis; mox carnosus 1-2-locularis. Semina integumento membranaceo tenui aut crasso induta. Albumen album carnosum aut subcorneum aliquandò tenuissimum. Radicula cylindrica ad hylum versa. — Arbores aut frutices, foliis sæpius oppositis. Flores axillares aut racemosi terminales.

Trib. I. *JASMINEÆ Vent. tabl. 1. p. 311.*

Fructus carnosus.

I. *OLEA Tourn. inst. t. 370. L. gen. n. 20.*

Calyx parvus 4-dentatus; corolla tubo brevi, limbo 4-fido; stamina 2; laciniæ stigmatis emarginatæ; drupa nuce 2-loculari 2-spermâ, abortu 1-loculari 1-spermâ.

1. *O. EUROPEA* (L. sp. 11.) foliis lanceolatis integerrimis paginis discoloribus, racemis paniculatis. ♂ culta in Galliâ mediterraneâ, in Corsicâ sylvestris forsitan occurrens. — Fl. fr. 3. p. 497. Lam. ill. t. 8. f. 2. (v. v.)

II. *PHYLLIREA Tourn. inst. t. 367. L. gen. n. 19.*

Calyx minimus 4-dentatus; corolla brevis 4-fida; stamina 2; bacca 1-locularis 1-sperma.

1. *P. ANGUSTIFOLIA* (L. sp. 10.) foliis linear-lanceolatis integerrimis acutis. ♂ in Galliâ australi. — Fl. fr. 3. p. 500. Lam. ill. t. 8. f. 3. (v. v.)

2. *P. LATIFOLIA* (Lam. dict. 2. p. 502.) foliis lanceolatis oblongisque subobtusis integerrimis serratisque. ♂ in Gallia australioris collibus. — Fl. fr. 3. p. 499. — *P. latifolia* et *media* L. sp. 10. — *Lob. ic.* 2. p. 132. f. 2. *Clus. hist.* 1. p. 52. (v. v.)

III. *LICISTRUM Tourn. inst. t. 367. L. gen. n. 18.*

Calyx minimus 4-dentatus; corolla tubo brevi, limbo 4-fido patente; bacca 1-locularis 2-4-sperma.

1. *L. VULGARE* (L. sp. 10.) foliis elliptico-lanceolatis glabris, racemis compositis coarctatis. ♂ in glareosis, ad sepes. — Fl. fr. 3. p. 501. Lam. ill. t. 7. (v. v.)

IV. *JASMINUM Tourn. inst. t. 368. L. gen. n. 27.*

Calyx 5-fidus; corolla tubulosa limbo 5-partito plano, laciniis obliquis; bacca bilocularis loculis monospermis; semina arillata.

1. J. *OFFICINALE* (L. sp. 9.) foliis oppositis pinnatis, foliolis acuminatis, laciinis calycinis subulatis. ♂ ex Indiâ ortum, in hortis cultum. — Fl. fr. 3. p. 500. Lam. ill. t. 7. f. 1. (v. v. c.)
2. J. *FRUTICANS* (L. sp. 9.) foliis alternis ternatis simplicibusque, foliolis subcuneatis obtusis, laciinis calycinis subulatis. ♂ in Galliâ australi ad sepes et vineas. — Fl. fr. 3. p. 500. — Lob. ic. 2. p. 52. f. 1. Flores flavi. (v. v.)
3. J. *HUMILE* (L. sp. 9.) foliis alternis simplicibus ternatis pinnatisve, foliolis ovato-oblongis acutiusculis, ramis angulatis, laciinis calycinis brevissimis. ♂ in Galloprovinciâ propè Grasse. — Fl. fr. 5. p. 394. — Lob. ic. 2. t. 106. f. 1. Fl. flavi. (v. s.)

Trib. II. *LILACEÆ Vent. tabl. 1. p. 306. DC. fl. fr. 3. p. 494.*

Fructus siccus.

V. LILAC *Tourn. inst. t. 372. Fl. fr. l. c.* — *Syringa L. gen. n. 22.*

Calyx parvus 4-dentatus; corolla tubulosa limbo 4-partito; stam. 2 intrâ tubum; capsula ovata compressa 2-locularis medio 2-valvis, 2-sperma; valvæ naviculares medio semi-septiferæ.

1. L. *VULGARIS* (Lam. fl. fr. 2. p. 305.) foliis cordatis. ♂ ex Oriente orta, in hortis culta et passim subsppontanea. — Fl. fr. 3. p. 495. *Syringa vulgaris L.* — Duham. arb. 1. t. 138. (v. v. c.)
2. L. *PERSICA* (Lam. l. c.) foliis lanceolatis integris pinnatifidisque. ♂ in hortis colitur. — Fl. fr. 3. p. 495. *Syringa Persica L.* — Mill. dict. t. 164. f. 1 et 2. (v. v. c.)

VI. FRAXINUS L. gen. n. 1160.

Calyx o vel 3-4-partitus; corolla o vel 4-partita quasi 4-petala; samar pendula basi monosperma.

Sect. I. FRAXINUS *Tourn. 343.*


Flores calyce et corollâ destituti, nunquam hermaphroditi; antheræ sessiles.


1. F. *EXCELSIOR* (L. sp. 1509.) foliolis subsessilibus lanceolato-oblongis attenuatis serratis, samaris apice obliquè emarginatis. ♂ in subhumidis. — Fl. fr. 3. p. 496. (v. v.)

Sect. II. ORNUS *Tourn. l. c.*

Flores calyculati tetrapetali; antheræ pedicellate.

- 2? F. *ARGENTEA* (Lois. gall. 2. p. 697.) foliis impari-pinnatis 3-jugis, foliolis petiolatis ovato-lanceolatis apice attenuatis crenato-serratis cinereo-argenteis. ♂ in fissuris rupium in montibus Corsicæ. (v. s. sine fl. et fructu.)
3. F. *FLORIFERA* (Scop. carn. u. 1250,) foliolis lanceolatis attenuatis petiolatis serratis. ♂ in collibus Alsatiæ ex Lam., Galloprovinciæ ex Ger. et Gar. — Fl. fr. t. 3. p. 496. F. *Ornus L.* (v. v. c.)





Ordo LXIV. APOCYNEÆ Juss. gen. p. 143.

Calyx monosepalus 5-divisus persistens. Corolla monopetala hypogyna 5-loba regularis, aestivatione imbricata rarissime valvata, decidua. Stamina 5 imæ corollæ inserta laciniis limbi alterna; filamenta connata aut distincta; antheræ 2-loculares. Ovaria 2; styli 2 arctè approximati sèpè brevissimi. Stigma 1 capitatum. Fructus 2-follicularis, folliculis elongatis 1-locularibus rimâ internâ dehiscentibus. Semina ad marginem folliculi inserta imbricata plana pendula ad umbilicum nuda aut comosa. Albumen carnosum. Embryo rectus. Radicula supera. — Herbæ aut frutices interdùm volubiles sèpè lactescentes, foliis oppositis integris.

Trib. I. *ASCLEPIADEÆ* R. Brown. in mem. soc. wern. 1.
p. 12.

Filamenta sèpiùs connata. Antheræ 2-loculares septisve semi-completis nunc sub 4-loculares; pollen ad dehiscentiam antherarum coalescens in massas numero loculos æquantes rariùsve per paria confluentes et solitariè vel geminatim vel quaternatim processibus 5 stigmatis affixas.

I. *ASCLEPIAS* L. gen. 306.

Corolla 5-partita reflexa; corona summo tubo filamentorum imposita 5-phyllo, foliolis cucullatis; antheræ membranâ terminatæ; massæ pollinis compressæ apice attenuato affixæ pendulæ; stigma depresso muticum; semina comosa.

Sect. I. *GOMPHOCARPUS* Brown. l. c. 1. p. 38.

Coronæ foliola subcucullata utrinquè uni-dentata absque lacinulâ interiori, folliculi inflati aculeis mollibus echinati.

I. A. *FRUTICOSA* (L. sp. 315.) caule fruticoso, foliis linear-lanceolatis glabris, pedunculis pedicellisque pubescentibus. ♂ in Corsicâ. — Pluck. alm. t. 138. f. 2. (v. s.)

Sect. II. *ASCLEPIAS* Brown. l. c.

Coronæ foliola cucullata è fundo exserentia lacinulam corniformem; folliculi gracieles lèves.

2. A. *SYRIACA* (L. sp. 313.) foliis planis ovalibus subtùs tomentosis, caule simplicissimo, umbellis nutantibus. ♀ in hortis culta, nunc subsppontanea in Galliâ australi et occidentali. — Fl. fr. 3. p. 669. (v. v. e.)

II. *CYNANCHUM* Brown l. c. — Cynanchi et Asclepiadis sp. L.

Corolla subrotata 5-partita; corona 1-phyllo 5-10-loba; antheræ membranâ terminatæ; massæ pollinis ventricosæ pendulæ; stigma apiculatum; folliculi lèves; semina comosa.

1. C. *MONTPELIACUM* (L. sp. 311.) caule volubili herbaceo, foliis reniformi-cordatis acutis glabris, corollæ laciniis lanceolatis acutiusculis. ♀ in maritimis

- Galliae mediterraneæ, Santoniæ (Des Moul.), Rupellæ. — Fl. fr. 3. p. 667. — Cav. ic. t. 60. (v. v.)
2. C. *Vincetoxicum* (Brown. mem. wern. soc. 1. p. 47.) caule erecto, foliis ovatis acuminate marginе tenuissimè ciliatis, racemo terminali, corollis imberibus, coronâ 5-lobâ. ♀ in sylvaticis et glareosis. — Ascl. *Vincetoxicum* L. sp. 314. Fl. fr. 3. p. 668. — Lob. ic. t. 630. f. 1. (v. v.)
3. C. *Nigrum* (Brown. l. c. p. 48.) caule supernè subvolubili, foliis ovatis basi barbatis, racemo terminali, corollis barbatis, coronâ semi-decemfida. ♀ in collibus sterilioribus Galliae mediterraneæ. — Ascl. *nigra* L. sp. 315. Fl. fr. 3. p. 668. — Lob. ic. t. 630. f. 2. (v. v. DC.)

Trib. II. *VINCEÆ*. — Apocyneæ *Brown. prod. nov.-holl.* p. 465.

Staminum filamenta distincta; antheræ 2 biloculares longitudinaliter dehiscentes; pollen granulosum stigmati immediate applicitum.

III. *NERIUM* L. gen. 297.

Calyx 5-partitus; corolla infundibuliformis limbo obtusè 5-partito, laciinis basi intùs appendiculatis; appendices 5 sèpè latæ faucem coronantes; antheræ apice in filum desinentes; stylus 1; stigma truncatum orbiculo insidens; semina comosa.


1. N. *OLEANDER* (L. sp. 305.) foliis lanceolatis angustis ternis subtùs costatis, calycinis laciinis squarrosis, appendicibus planis trifidis. ♂ in Galloprovinciâ, agro Nicæensi et Corsicâ. — Fl. fr. 3. p. 666. — Lob. ic. t. 364. f. 1. (v. v. c.)


IV. *VINCA* L. gen. 295.

Calyx 5-partitus; corolla hypocrateriformis tubo longo, sauce prominula 5-gonâ, limbo plano obtusè 5-lobo; antheræ approximatæ; stylus 1; stigma capitatum basi annulatum; semina nuda.

1. V. *MAYOR* (L. sp. 304.) caulis erectinervis, foliis ovato-subcordatis subciliatis, pedunculis unifloris solitariis folio (sæpiùs) brevioribus. ♀ in sylvis et collibus prov. austral. occidentaliumque usque ad Nannetes et Andegavum. — Fl. fr. 3. p. 665. — Lob. ic. t. 636. f. 1. (v. v.)

2. V. *MINOR* (L. sp. 304.) caulis procumbentibus, foliis oblongo-lanceolatis margine glabris, pedunculis 1-floris solitariis axillaribus folio longioribus. ♀ in sepibus et sylvis. — Fl. fr. 3. p. 665. Lam. ill. t. 172. f. 2. (v. v.)





Ordo LXV. GENTIANEÆ Juss. gen. 141.

Calyx monosepalus divisus persistens. Corolla monopetala regularis sæpè marcescens, limbo partito æquali, lobis æstivatione imbricatis, laciniis calycinis numero æqualibus, sæpiùs 5. Stamina totidem corollæ inserta et ejus laciniis alterna. Ovarium liberum. Stylus unicus aut rariùs scissione 2; stigma simplex aut bilobum. Capsula polysperma bivalvis 1-2-loocularis, valvis apice dehiscentibus, margine introflexis et in bilocularibus dissepimentum constituentibus. Semina valvarum margini inserta. Embryo rectus in centro albuminis carnosí; radicula sæpiùs infera. — Herbæ glabræ amaræ, foliis oppositis sæpiùs integris sessilibus.

† *Capsula unilocularis.*I. **MENYANTHES** Tourn. inst. t. 15. DC. fl. fr. 3. p. 647. — *Menyanthis* sp. L.

Calyx 5-partitus; corolla infundibuliformis limbo patente 5-lobo æquali intùs hirto; stamina 5; stylus 1; stigma capitatum 2-5-sulcum; capsula 1-loocularis parietibus seminiferis.

1. **M. TRIFOLIATA** (L. sp. 208.) foliis 3-foliolatis glaberrimis longè petiolatis. $\frac{1}{2}$ in palustribus et aquosis. — Fl. fr. 3. p. 647. Lam. ill. t. 100. f. 1. — *Acopa* Moris. s. 15. t. 2. n. 5. Fl. albescentes aut rosei. (v. v.)

II. **VILLARSIA** Gmel. syst. veg. 1. DC. fl. fr. 3. p. 648. — *Menyanthis* sp. L.

Calyx 5-partitus; corolla rotata tubo brevi, limbo patente 5-lobo lobis margine ciliatis; stamina 5; stylus 1; stigma bilobum lobis crenulatis; capsula unilocularis suturis parietalibus seminiferis; semina biserialia margine membranacea.

1. **V. NYMPHOIDES** (Vent. choix. n. 9. p. 2.) foliis cordato-orbiculatis natantibus, floribus umbellatis, corollis ciliatis. $\frac{1}{2}$ in fluviis et aquis stagnantibus passim. — Fl. fr. 3. p. 648. *Men. nymphoides* L. sp. 207. Lam. ill. t. 100. f. 2. Flores flavi. (v. v.)

III. **CHLORA** L. mant. 10.

Calyx 8-partitus; corolla hypoerateriformis, tubo brevi, limbo 8-partito; stamina 8 brevissima fauci inserta; stylus 1; stigma 4-fidum; capsula 1-loocularis.

1. **C. PERFOLIATA** (L. mant. 10.) foliis perfoliatis, calycibus 8-partitis, lobis subulato-linearibus. (1) in collibus aridis. — Fl. fr. 3. p. 649. — Cam. epit. 427. ic. (v. v.)

2. **C. SESSILIFOLIA** (Desv. soc. am. 1. t. 3. f. 2.) foliis subamplexicaulibus, calycibus 6-7-fidis, laciniis lanceolatis corollâ sublongioribus basi plus minusve coalitis. (1) in maritimis Rupellæ, Narbonæ, Arelatis, Massiliæ (Solier). — Fl. fr. 5. p. 426. (v. v. DC.)

IV. **SWERTIA** L. gen. n. 321.

Calyx sub-5-partitus; corolla rotata tubo brevissimo, limbo plane 5-partito laciniis lanceolatis singulis basi intùs geminâ glandulâ ciliatâ instructis; stamina 5 corollâ breviora.

1. *S. PERENNIS* (L. sp. 328.) corollis ecalcaratis 5-fidis, pedunculis tetragonis subulatis, caule indiviso, foliis radicalibus ovalibus. ♀ in turfosis montosis Jurassi, Alpium, Arverniæ, Pyrenæorum. — Fl. fr. 3. p. 650. — Clus. hist. t. p. 316. f. 2. (v. v.)

V. *GENTIANA* Froel. gent. 9. Willd. sp. n. 512.


Calyx 5-fidus; corolla basi tubulosa, campanulata aut infundibuliformis, limbo 4-5-6-fido, laciñiis integris aut ciliatis interdùm laciñiis interjectis distinctis; stamina 5 tubo corollæ inserta; antheræ interdùm connatæ; stylus 2-partitus; stigmata duo; capsula 1-locularis.

Sect. I. *COELANTHE* Froel. gent. 15.

Corolla subcampanulata 4-9-fida fance et limbo nuda.

1. *G. LUTEA* (L. sp. 329.) foliis latis ovatis nervosis, floribus verticillatis pedicellatis, calycibus membranaceis unilateralibus, corollis rotatis 5-8-fidis acutis. ♀ in montium pratis. — Fl. fr. 3. p. 650. — Lob. ic. t. 308. f. 2. Fl. lutei. (v. v.)
2. *G. BURSERI* (Lapeyr. abr. 132.) foliis ovato-lanceolatis obtusis, floribus verticillatis sessilibus, calycibus membranaceis uni-lateralibus, corollis campanulatis 6-fidis laciñiis ovatis, sinibus dentatis. ♀ in Pyrenæis frequens, in Alpibus rarer. — Fl. fr. 5. p. 426. Variat flore flavescente et nigro-punctato. (v. v.)
3. *G. PURPUREA* (L. sp. 227.) foliis ovato-lanceolatis subacutis, caulinis angustioribus, floribus verticillatis sessilibus, corollis campanulatis 6-fidis, laciñiis subrotundo-spathulatis, calycibus membranaceis unilateralibus. ♀ in Alpibus. — Fl. fr. 3. p. 652. Fl. purpurei aut albi. (v. v.)
4. *G. BILOBA* (DC. fl. fr. 3. p. 653.) corollis subsexfidis verticillatis, calycibus membranaceis bilobis, lobis obtusis integris æqualibus. ♀ in Galloprovinciæ montibus Sedenensibus. — Ic. rar. t. 15. (v. s.)
5. *G. PUNCTATA* (L. sp. 329.) foliis ovato-lanceolatis acutis, floribus verticillatis sessilibus, calycibus membranaceis truncatis lobis inæqualibus tubo calycinō brevioribus, corollis subsexfidis campanulatis punctatissimis, laciñiis ovato-acutis. ♀ in Alpibus et Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 653. — Barr. ic. t. 69. Fl. purpureo-flavescentes. (v. v.)
6. *G. CÆRULEA* (L. sp. 334.) foliis lanceolatis obtusis, caulinis sessilibus basi coadunatis vaginantibus, floribus verticillatis sessilibus, corollis 4-fidis imberbis. ♀ in montosis siccis. — Fl. fr. 3. p. 653. — Clus. hist. 1. p. 313. f. 1. Fl. cœrulei. (v. v.)
7. *G. ASCLEPIADEA* (L. sp. 329.) foliis amplexicaulibus ovato-lanceolatis acuminate, floribus oppositis axillaribus solitariis subsessilibus, corollis 5-fidis campanulatis. ♀ in Alpibus et montibus Galliæ mediterraneæ. — Fl. fr. 3. p. 654. — Clus. hist. 1. p. 312. f. 2. Fl. cœrulei. (v. v. D. in Helv.)
8. *G. PNEUMONANTHE* (L. sp. 330.) foliis linear-lanceolatis linearibusve obtusiusculis, floribus terminalibus axillaribus sessilibus, calycis laciñiis linearibus, corollis 5-fidis campanulatis. ♀ in pratis huinidis. — Fl. fr. 3. p. 654. — Clus. hist. 1. p. 313. f. 2. Fl. cœrulei. (v. v.)
9. *G. ACUTA* (L. sp. 330.) foliis patulis oblongo-lanceolatis acutis, corollæ 5-fidæ caule in quadrangulum subæquantis laciñiis acutis. ♀ in Alpibus et Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 654. excl. var. γ. — Barr. ic. t. 106. Fl. cœrulei. (v. v.)
10. *G. ALPINA* (Vill. dauph. 2. p. 526. t. 10.) foliis obovatis latitudine vix longioribus obtusiusculis, corollæ campanulatae 5-fidæ caule brevissimo longioris laciñiis subobtusis. ♀ in Alpibus et Pyrenæis. — Fl. fr. 5. p. 427. — Barr. ic. t. 105. Fl. cœrulei. (v. v.)





Sect. II. CALATHIA Froel. gent. 57.

Corolla infundibuliformis, fauce nudâ, limbo non ciliato 5-10-fido.

11. *G. VERA* (L. sp. 331.) caule simplici pumilo, foliis lanceolato-ovatis acutis, radicalibus confertis majoribus, corollæ 5-fidæ laciniis acutis margine erosion. \mathcal{U} in pratis Jurassi, Alpium, Pyrenæorum. — Fl. fr. 3. p. 655. *G. utriculosa* Lapeyr. abr. 135. ex cl. Boileau. — Barr. t. 98 et 109. f. 1 et 2. Fl. cœrulei. (v. v.)
12. *G. BAVARICA* (L. sp. 331.) caule simplici, foliis obovato-spathulatis obtusis, radicalibus confertis imbricatis, caulinis minoribus, corollæ 5-fidæ laciniis obtusis serratis. \mathcal{U} in Alpibus. — Fl. fr. 3. p. 656. — Barr. ic. t. 10. fig. super, (v. v.)
13. *G. PYRENAICA* (L. mant. 55.) caule infernè subramoso, foliis lanceolato-linearibus, corollâ 10-fidâ laciniis alternis minoribus obtusis crenatis. \mathcal{U} in Pyrenæis orientalibus. — Fl. fr. 3. p. 657. Gou. ill. 7. t. 2. f. 2. (v. v. DC.)
14. *G. UTRICULOSA* (L. sp. 332.) caule ramoso, foliis radicalibus ovatis confertis, calycibus inflatis plicato-carinatis, corollæ 5-fidæ hypocrateriformis laciniis ovato-lanceolatis angustis. (I) in pratis humidis Alpium, Jurassi, Alsatiæ ex Nestler. — Fl. fr. 3. p. 657. — Barr. ic. t. 48 et 122. f. 2. Fl. azurei. (v. v. D. in Italia:)
15. *G. NIVALIS* (L. sp. 332.) caule submultifloro, ramis alternis unifloris, foliis caulinis lanceolatis, calycibus 5 lineis fuscis notatis, corollæ 5-fidæ laciniis ovato-lanceolatis. (I) in pratis editiorum Alpium et Pyren., Montis-Aurei ex Delarb., Burgundiæ? ex Dur. Fontisbleaudi? ex Thuin. — Fl. fr. 3. p. 656. — Hall. helv. t. 17. f. 5. — Barr. t. 103. f. 2. (v. v.)

Sect. III. ENDOTRICA Froel. gent. 86.

Corolla 4-5-fida, fauce squamis multifidis acutis instructâ.

16. *G. CAMPESTRIS* (L. sp. 334.) caulibus ramosissimis, foliis ovato-lanceolatis, laciniis calycinis 2 maximis obovatis, 2 minoribus linearibus, corollis 4-fidis hypocrateriformibus obtusis fauce barbatis. (I) in pratis montosis. — Fl. fr. 3. p. 659. Fl. dan. t. 367. Fl. purpureo-violacei. (v. v.)
17. *G. GERMANICA* (Willd. sp. 1. p. 1346.) caule ramosissimo, foliis ovato-lanceolatis, pedunculis internodiis longioribus brevioribusve, calycibus æquilater 5-fidis, corollis 5-fidis hypocrateriformibus fauce barbatis. (I) in pratis montosis. — Fl. fr. 3. p. 658. *G. Amarella* W. sp. 1. p. 1347. — Barr. ic. t. 112 et 510. f. 2. Fl. purpureo-violacei. (v. v.)
18. *G. GLACIALIS* (Vill. dauph. 2. p. 532.) caule infernè ramoso folioso, foliis ovatis, laciniis calycinis æquilibus, floribus longè pedicellatis, corollis 4-fidis hypocrateriformibus fauce barbatis. (I) in Alpibus Galloprovinciæ et Pyren. — Fl. fr. 3. p. 659. Fl. cœrulei, tubo pallidiore. (v. v.)

Sect. IV. CROSSEOPTALUM Froel. gent. 109.

Corolla 4-fida infundibuliformis, laciniis ciliatis.

19. *G. CILIATA* (L. sp. 334.) caule flexuoso angulato, foliis lanceolatis linearibus, corollis 4-fidis, laciniis serratis medio inciso-ciliatis. \mathcal{U} in humidis montosis passim. — Fl. fr. 3. p. 659. — Bar. ic. t. 121. Fl. azurei. (v. v.)

++ *Capsula 2-locularis.*

VI. CHRONIA Schmidt bohem. Wild. sp. n. 394. — Erythræa Ren. Rich. in Pers. enc. — Gentianæ sp. L.

Calyx 5-fidus; corolla infundibuliformis limbo 5-lobo; stylus declinatus; stamina 5 tubo corollæ inserta; antheræ post deflorationem spiraliter contortæ; capsula 2-locularis.


1. *C. LINARIFOLIA* (Lois. not. 155.) ramoso-dichotoma, foliis omnibus linea-


- ribus obtusiusculis, calyce 5-partito lobis linearibus obtusiusculis tubum subæquantibus. (2) in arenosis Druentiae propè Avenionem. — Fl. fr. 5. p. 428. — Barr. ic. 423. — Fl. rosei. (v. s.)
2. C. SPICATA (W. sp. 1. p. 1069.) ramis dichotomo-paniculatis, foliis lanceolato-oblongis, floribus sessilibus subsecundis, calyce bracteisque corollæ tubo subæqualibus. (1) in Galliae australis humidis. — Fl. fr. 3. p. 662. — Barr. ic. t. 1242. — Fl. rosei. (v. v.)
3. C. CENTAURIUM (Smith. brit. 1. p. 257.) caule erecto, foliis ovatis aut ovato-oblongis, floribus corymbosis aut paniculato-corymbosis, calycis 5-fidi laciniis subulatis tubo corollæ brevioribus. (1) in sylvis, arvis, ad ripas frequens. — Fl. rosei. Mirum in modum varians adeò ut vix in tres sequentes varietates distingui possit.
- a. fascicularis*, caule subsimplici, floribus fasciculato-corymbosis subsessilibus, calycibus plerūmque tubo corollæ dimidiò brevioribus. — C. Centaurium Fl. fr. 3. p. 660. (v. v.)
 - b. pulchella* (DC. fl. fr. 5. p. 428.) caule ramosissimo, floribus paniculato-corymbosis plerūmque pedicellatis, calycibus plerūmque tubum corollæ subæquantibus. — C. pulchella Swartz act. holm. 1783. t. 3. f. 8. g. Fl. fr. 3. p. 661. — Vaill. bot. t. 6. f. 1. (v. v.)
 - γ. nana*, caule pumilo simplicissimo, floribus terminalibus axillaribusve subsolitariis, calyce tubum plerūmque subæquante. (v. v.)
4. C. OCCIDENTALIS (DC. fl. fr. 5. p. 428.) caule nano è collo subramoso floribus breviore, foliis ovato-oblongis, calyce ultra medium 5-fido laciniis linearisubulatis. (1) in arenosis maritimis à Bayonâ ad Armoraciam passim. — Flos flavus. Sequentis forsitan var? (v. s.)
5. C. MARITIMA (Wild. sp. 1. p. 1069.) caule elongato simplici paucifloro dichotomo-corymboso, foliis ovato-lanceolatis, laciniis calycinis linearisubulatis. (1) in Galliae mediterraneæ maritimis. — Fl. fr. 3. p. 662. Gentiana maritima L. mant. 55. Cav. ic. t. 269. f. 1. — Barr. ic. t. 468. Flores flavi. (v. v.)

VII. EXACUM Wild. sp. 2. p. 634. DC. fl. fr. 3. p. 663. — Gentianæ sp. L.

Calyx 4-partitus; corolla tubo globoso, 4-loba; stamina 4; antheræ post fecundationem non tortæ; stylus unicus; stigma 2-fidum; capsula 2-locularis.

1. E. CANDOLLII (Bast. supp. 22.) glaucum, caule ramoso subdichotomo gracilimo, foliis linearisubulatis trinerviis, pedicellis elongatissimis, calycis laciniis linearisubulatis rectis. (1) in herbidis inundatis circà Domfront ex cl. de Brébisson, Audegaviam, Nannetis, Monselium. — Fl. fr. 5. p. 429. E. pusillum β DC. ic. rar. t. 16. Fl. rosei. (v. v. DC.)
2. E. PUSILLUM (DC. fl. fr. 3. p. 663.) caule ramosissimo dichotomo, foliis oblongo-lanceolatis 3-nerviis, calycis laciniis linearibus subpatulis, corollæ limbo connivente. (1) in locis hyeme inundatis Galliae mediae et occidentalis passim. — Gent. pusilla Lam. dict. 2. p. 645. — Vaill. bot. 32. t. 6. f. 2. Fl. flavescentes. (v. v. D.)
3. E. FILIFORME (Wild. sp. 1. p. 638.) caule filiformi subramoso, foliis radicibus subtrotundis, caulinis subulatis, corollæ limbo patente. (1) in pratis humidiusculis sylvaticis passim. — Fl. fr. 3. p. 663. Gent. filiformis L. — Vaill. bot. t. 6. f. 3. Fl. flavescentes. (v. v.)







Ordo LXVI. POLEMONIDEÆ *Juss. gen. 136.*

Calyx 1-sepalus divisus. Corolla regularis 5-loba. Stamina 5 medio corollæ tubo inserta, ejusdem laciniis alterna. Ovarium liberum. Stylus simplex. Capsula calyce persistente tecta 3-locularis 3-valvis polysperma, valvis medio intus septiferis seu costâ prominente instructis, axi centrali trigono valvularum septis angulis applicito. Embryo rectus in albumine corneo; radicula infera; cotyledones ellipticæ foliaceæ. — Herbæ foliis oppositis aut rariùs alternis.

I. POLEMONIUM *Tourn. inst. t. 61. L. gen. n. 217.*

Calyx 5-fidus; corolla rotata tubo brevi, limbo 5-lobo; staminum filamenta basi latiora; antheræ incumbentes.

1. **P. CÆRULEUM** (L. sp. 162.) foliis pinnatis, calycibus corollæ tubo longioribus. $\frac{2}{4}$ in Jurasso et Pyrenæis ex Lapeyr., frequenter in hortis cultum. — Fl. fr. 3. p. 646. Lam. ill. t. 106. f. 1. Variat floribus albis et cœruleis. (v. v. c.)

Ordo LXVII. CONVOLVULACEÆ *Juss. gen. 132. (1)*

Calyx 5-lobatus, persistens. Corolla monopetala hypogyna, limbo regulari 5-lobo. Stam. 5 imæ corollæ inserta, ejusdem laciniis alterna. Ov. simplex liberum, basi glandulâ annulari cinctum, 2-4-locularis, loc. sæpiùs 1-2-spermis. Stylus unicus apice quandoquè ad basin usque partitus. Stigma acutum vel capitatum. Caps. 1-4-locularis, dissepimento 1-4 valvularum marginibus affixo, in centro basi seminifero. Semina subangulosa basi hilo notata. Embryo convolutus. Rad. infera; cotyl. corrigatæ; albumen mucilaginosum.

Herbæ suffrutices frutices et arbores; plures volubiles lactescentesque. Folia alterna, formâ varia. Inflorescentiæ variæ.

I. CONVOLVULUS *L. gen. n. 215.*

Calyx 5-partitus nudus vel bracteis 2 imbricatus; cor. campanulata 5-plicata; stamina inclusa, sæpè inæqualia; ov. 2-loculare, loculis 2-spermis, rarò 3-loculare; stylus unicus; stigma filiforme aut capitatum, capsula 1-2-locularis.

§. 1. *Floribus subtus 2 bracteis magnis cinctis.*

1. **C. SOLDANELLA** (L. sp. 226.) caule lævi prostrato, foliis reniformibus obtusis-

(1) Hujus familiæ specierum Gallicarum monographiam mihi communicavit cl. amic. Choisy.


- simis apice rarò emarginatis, pedunculis 1-floris, calyce membranaceo, corollà purpureâ, stigm. ovatis complanatis. \mathcal{F} frequens in maritimis sabulosis.
— Fl. fr. 3. p. 641. — Lob. ic. 602. f. 2. (v. v.)
2. C. ~~sericeum~~ (L. sp. 218.) caule glabro volubili angulato, foliis sagittato-acuminatis, pedunculis 1-floris quadrangulis, calyce membranaceo, corolla alba rarò rosea spectabili, stigmatibus ovatis complanatis. \mathcal{F} ubique in sepibus.
— Fl. fr. 3. p. 630. Fl. dan. t. 648. (v. v.)
 $\beta.$ *maritimus* (Gou. fl. monsp. 27.) omni parte gracilior, internodiis longioribus foliis crassiusculis. — In maritimis circà Monspelium. (v. s.)
- §. 2. *Floribus nudis, caule erecto aut diffuso.*
3. C. *SAXATILIS* (Vahl. symb. 3. p. 33.) caule suffruticoso ramoso, ramis foliis calycibusque lanatis, foliis linear-lanceolatis acutis sessilibus, pedunculis longis capitatis, capitulis multibracteatis, calyce acuminato, stigm. linearibus. \mathfrak{Z} In rupestribus circà Perpiganum. — Fl. fr. 5. p. 424. C. *capitatus* Cav. ic. 2. t. 89. — Barr. ic. t. 470. (v. s.)
 $\beta.$ *argenteus* (Ch.) pilis argenteo-sericeis potius compressis, calyce minus elongato. — Circà Cujes propè Telonem. — Conv. linearis DC. fl. fr. 5. p. 424. (v. s.)
4. C. *CANTABRICA* (L. sp. 225.) caule ascendentē ramosissimo villoso, foliis linear-lanceolatis acutis sessilibus villoso, ped. elongatis 1-3-floris, calyce linearī inaequali, stigm. linearibus. \mathcal{F} in totius regionis Mediterranei maris montosis et rupestribus, circà Burdigalam ex Des Moulins. — Fl. fr. 3. p. 642. Jacq. aust. t. 296. (v. v.)
5. C. *LINEATUS* (L. sp. 224.) caule minimo suffruticoso sericeo-villoso, foliis oblongis apice dilatatis acutis in petiolum attenuatis sericeis, ped. 3-6-floris paniculatis, calyce cuneato-lanceolato. \mathcal{F} in rupestribus maritimis Galloprovinciae. — Fl. fr. 3. p. 642. — Triumf. obs. 91. ic. (v. v.)
 $\beta.$ *intermedius*, pube magis argentea, caule longiore recto. — Circà Avenionem. — C. *lineatus* & DC. fl. fr. 5. p. 413.
6. C. *TRICOLOR* (L. sp. 225.) caule herbaceo tereti villoso, foliis lanceolato-obovatis subspathulatis basi ciliatis, ped. 1-floris folio saepè longioribus, calyce ovato-lanceolato acuto, corollà tricolore, stigm. linearibus. (I) in hortis vulgaribus, hab. Siciliam, Hispaniam, Italiam, etc. — Fl. fr. 3. p. 641. — Moris. s. 1. t. 4. n. 4. (v. v. c.)
7. C. *SICULUS* (L. sp. 223.) caule herbaceo prostrato tereti villoso, foliis ovatis acutis subpubescentibus basi truncatis, ped. 1-floris post anthesin nutantibus, calyce lanceolato acuto ciliato, corollà minimâ cœrulecente, stigm. filiformibus. (I) in arenosis agri Syrtici, Ruscinonensis. — Fl. fr. 3. p. 640. — Bocc. sic. 89. t. 48. (v. s.)

§. 3. *Caule volubili, floribus nudis.*

8. C. ~~TRIVENESIS~~ (L. sp. 218.) caule angulato glabro, foliis sagittatis subauriculatis, ped. saepius unifloris angulatis glabris, calyce submembranaceo obtuso, corollà campanulata albo-rosea, stigm. linearibus. \mathcal{F} ubiquè in agris et cultis.
— Fl. fr. 3. p. 640. Fl. dan. t. 459. eng. bot. t. 312. (v. v.)
9. C. *ALTHÆOIDES* (L. sp. 222.) caule hirsuto tereti elongato, foliis inferioribus ovato-cordatis sinuatis aut sublobatis, superioribus lobatis laciniatisque, ped. rectis 1-2-floris longis, calyce ovato-lanceolato inaequali, cor. speciosâ. \mathcal{F} in Galliâ mediterraneâ ad rupes et muros. — Fl. fr. 3. p. 641. — Barr. ic. t. 312. — Lob. ic. 623. f. 2. (v. v.)
 $\beta.$ *ferrugineus* (Chois.) caule tomentoso-ferrugineo. — In Galliâ meridionali. (v. s.)

II. CRESSA L. gen. n. 313.

Calyx 5-partitus; cor. tubulosa 5-partita; stam. exserta; ov. 2-loculare, loc. 2-spermis; styli 2; stigm. capitatum; caps. monosperma.





1. *C. CRETICA* (L. sp. 325.) caule herbaceo humili non lactescente pubescente, foliis integris adpressis, floribus apice congestis. (1) in humidis maritimis Galliae meridionalis. — Fl. fr. 3. p. 643. — Pluck. t. 43. f. 6. (v. v.)

III. CUSCUTA L. gen. n. 170.

Calyx 4-5-fidus; cor. globoso-urceolata, limbō 4-5-fido; stam. sub-tū squamosa; ov. 2-loculare, loc. 2-spermis; stigm. 2; capsula circum-scissa; embryo acotyledoneus.

1. *C. MAJOR* (Bauh. pin. 219.) floribus subsessilibus, corollæ lobis sæpiùs reflexis, stylis è basi arcuatis divergentibus, stigm. acutis. (1) parasitica in multis plantis, vulgaris. — Fl. fr. 3. p. 644. (v. v.)

2. *C. MINOR* (Bauh. pin. 219.) floribus sessilibus, corollæ lobis rectis, stylis apice divergentibus, stigm. acutis. (1) parasitica in fruticibus permultis vulgatissima. — Fl. fr. 3. p. 644. Lam. ill. t. 88. (v. v.)

3. *C. MONOGYNA* (Vahl. symb. 2. p. 32.) caulibus tuberculosis crassis, floribus in brevi pedunculo glomerato-sessilibus, corollâ urceolatâ, lobis rectis, stylis coadunatis, stigm. globosis. (1) in vinetis Occitaniae inferioris. — Fl. fr. 5. p. 425. — Buxb. cent. 1. p. 15. t. 23. (v. v.)

Ordo LXVIII. BORRAGINEÆ Juss. gen. 128.

Calyx 1-sepalus 5-lobus persistens. Corolla 5-loba sæpiùs regularis, fauce nudâ aut squamis 5 obtectâ, aestivatione imbricatâ. Stamina 5 corollæ adfixa et cum ejusdem laciniis alterna. Ovarium liberum 2-4-lobum disco hypogyno appositum; stylus simplex persistens inter ovarii lobos nascens; stigma integrum aut bilobum. Nuces aut cariopsides 2-4 uniloculares 1-spermæ latere interno stylo adnatae. Albumen nullum. Embryo rectus, radicula infera, cotyledones foliaceæ. — Herbae aut suffrutices, folia alterna sæpiùs aspera, sicca maculis parvis conspersa; flores in racemos unilaterales incurvos sæpè digesti.

Sect. I. NUCES 2 BILOCULARES.

I. CERINTHE L. gen. n. 186.

Calyx 5-partitus; corolla tubulosa ventricosa 5-fida; antheræ erectæ vix exsertæ; nuces 2 osseæ 2-loculares 2-spermæ.

1. *C. ASPERA* (Roth. cat. 1. p. 33.) foliis subciliatis asperis, corollis obtusis patulis calyce longioribus. (1) in arvis provinciarum australium. — Fl. fr. 3. p. 618. (v. v.)

2. *C. MINOR* (L. sp. 196.) foliis glabris, corollis acutis clausis calyce longioribus. (2) in montibus Delphin. ex Vill., Galloprovinciæ superioris. — Fl. fr. 3. p. 619. Jacq. aust. t. 124. (v. v. DC.)

Sect. II. NUCES 4 UNILOCULARES.

+ Nuces cohærentes.

II. HELIOTROPIUM Tourn. inst. t. 57. L. gen. n. 179.

Calyx tubulosus 5-fidus aut 5-dentatus; corolla hypocrateriformis 5-fida dentibus 5 interjectis; stigma subconicum.

1. H. PERUVIANUM (L. sp. 187.) caule fruticoso, foliis lanceolato-ovatis, spicis numerosis aggregato-corymbosis. ♂ ex Peruvia ortum, in hortis colitur. — Fl. fr. 3. p. 620. Mill. ic. t. 143. (v. v. c.)
2. H. ~~FRUTICOSUM~~ (L. sp. 187.) caule erecto herbaceo, foliis ovatis integerrimis tomentoso-scabris rugosis, spicis conjugatis, calycibus 5-fidis. (1) in glareosis aridis. — Fl. fr. 3. p. 620. Jacq. aust. 3. t. 207. (v. v.)
3. H. SUPINUM (L. sp. 187.) caule prostrato herbaceo, foliis ovatis obsoletè crenulatis plicatis subtus incanis, spicis conjugatis, calycibus 5-dentatis. (1) in Galliae mediterraneæ humidis rariüs. — Fl. fr. 3. p. 620. Gou. monsp. p. 17. t. 1. (v. v. DC.)

†† *Nuces distinctæ, corollæ faux nuda.*

III. ECHIUM Tourn. inst. t. 54. L. gen. n. 191.

Calyx 5-partitus; corolla tubo brevi, limbo ampliore campanulato, obliquè 5-lobo, laciniis inæqualibus, 2 superioribus longioribus, infimâ minore acutâ reflexâ; nuces tuberculatæ.

1. E. CILIATUM (L. sp. 200.) caule erecto tuberculato hispido herbaceo, foliis lanceolatis hispidis, floribus spicatis lateralibus, spicis axillaribus. (2) ad vias et agros. — Fl. fr. 3. p. 621. Lam. ill. t. 94. f. 1. (v. v.)
2. E. AUSTRALE (Lam. ill. n. 1860.) caule herbaceo hispido erecto, foliis ovatis utrinquè attenuatis, floribus spicatis unilateralibus, spicis terminalibus, bracteis basi ovato-cordatis acuminatis, corollis stamina apice villosa æquantibus. ♀ propè Vindomagum (Beaucaire) reperiit cl. A. Richard. — Fl. fr. 3. p. 622. (v. s.)
3. E. PLANTAGINEUM (L. mant. 202.) caule herbaceo villoso basi prostrato, foliis radicalibus rotundo-ovatis petiolatis, floralibus subcordatis, staminibus glabris corollâ sublongioribus. (2) in agro Nicæensi et Narbonensi. — Fl. fr. 3. p. 622. Jacq. vind. 1. t. 45. (v. s.)
4. E. VIOLACEUM (L. mant. 42.) caule hispido erecto, foliis oblongo-lanceolatis obtusis, floribus spicatis unilateralibus, corollis stamina glabra æquantibus calyce duplò longioribus. (1) in Galliâ australi. — Fl. fr. 3. p. 622. (v. v.)
5. E. PYRENAICUM (L. mant. 334.) caule pilosissimo herbaceo ramosissimo, foliis linear-lanceolatis hispido-scabris, capitulis pedunculatis axillaribus, staminibus glabris corollâ pilosâ longioribus. ♀ in siccis Galliæ australis et austro-occidentalis in Medulco (Médoc) et Santoniâ (Des Moulins). — Fl. fr. 3. p. 621. E. aspernum Lam. E. Italicum L? (v. v.)
6. E. CALYGINUM (Viv. fragm. t. 4.) caulinibus herbaceis basi prostratis, foliis ovato-oblongis, floribus subsparsis, corollâ subregulari, calyce vix longiore, calycibus fructiferis productioribus basi inflatis. (2) in maritimis Niceæ, Massiliæ (cl. Solier). — Fl. fr. 5. p. 419. E. prostratum Tenor. nap. 1. t. 12. (v. s.)

IV. LITHOSPERMUM Tourn. inst. t. 55. L. gen. n. 181.

Calyx 5-partitus; corolla infundibuliformis parva 5-loba; antheræ oblongæ in fauce corollæ inclusæ; stigma obtusum bifidum; nuces nitidæ aut glabrae, lœves aut rugosæ.

1. L. FRUTICOSUM (L. sp. 190.) caule fruticoso, foliis linearibus hispidis margine revolutis, calyce corollâ multò breviore, staminibus corollam æquantibus, nucibus nitidis lœvibus. ♂ in Galliæ australioris aridis. — Fl. fr. 3. p. 625. — Garid. aix t. 15. (v. s.)
2. L. PROSTRATUM (Lois. gall. 105. t. 4.) suffruticosum procumbens, foliis lanceolato-linearibus pilosis margine subrevolutis, corollis puberulis calyce





- duplò longioribus, staminibus fanci villosæ æqualibus. ♀ ♂ circè Bayonam, Aquas Tarbellicas et in Armoraciâ extremâ. — Fl. fr. 5. p. 419. (v. v. D.)
3. L. OLEÆFOLIUM (Lapeyr. abr. supp. p. 28.) suffraticosum, caulis diffusis, foliis elliptico - oblongis obtusis supra viridibus pilis sparsis brevibus adpressis subtus sericeo - argenteis, corollis calyce duplò longioribus extus villosis stamina superantibus. ♂ in rupestribus Pyren. orientalium. Rami incani. (v. s. D.)
 4. L. TINCTORIUM (L. sp. 1. p. 132.) caulis decumbentibus, foliis lanceolatis obtusis, floralibus subcordatis, floribus axillaribus, corollis calyce longioribus, staminibus inclusis, seminibus tuberculosis. ♀ in Galliæ australis arenosis sterilioribus. — Fl. fr. 3. p. 624. — J. Bauh. hist. 3. p. 584. ic. (v. v.)
 5. L. PURPUREO-CÆRULEUM (L. sp. 190.) caulis floralibus erectis, sterilibus prostrato - repentebus, foliis lanceolatis acutis, floribus axillaribus, nucibus laevissimis nitidis. ♀ in nemoribus et agris passim. — Fl. fr. 3. p. 624. Jacq. aust. t. 14. (v. v.)
 6. L. OFFICINALE (L. sp. 189.) caule erecto, foliis lanceolatis acuminatis, corollis calycem vix superantibus, nucibus lapideis nitidis subtuberculatis. ♀ in ruderatis. — Fl. fr. 3. p. 623. Lam. ill. t. 91. (v. v.)
 7. L. ARVENSE (L. sp. 190.) caulis erectis, foliis lanceolatis margine revolutis, corollis vix calycem superantibus, nucibus rugosis. (I) in agris et arvis. — Fl. fr. 3. p. 623. — Moris. s. 11. t. 31. n. 3. (v. v.)
 8. L. APULUM (Vahl. symb. 2. p. 33.) caulis erectis, foliis acutis, caulinis linearibus, radicalibus linear - lanceolatis, spicis terminalibus secundis, bracteis lanceolatis, nucibus nitidis in costis tuberculatis. (I) in Galliæ mediterraneæ maritimis. — Fl. fr. 3. p. 624. — Lob. ic. 578. f. 1. (v. v.)
- V. NONEA Medik. philos. bot. 1. p. 31. DC. fl. fr. 3. p. 626. — Lycopsis sp. L.

Calyx 5-fidus fructifer inflatus; corolla tubo erecto limbo 5-lobo æquali; stamina intra tubum; nuces sulcatæ.

1. N. VIOLENCEA (DC. l. c.) caule prostrato hispido, foliis oblongo - lanceolatis integrerimis. (I) circè Monspelium ex Gouan, in agro Ruscinonensi ex Lapéry. — Lycopsis vesicaria L. sp. 198. — Buglossum II. Moris. s. 11. t. 26. f. 10. (v. s. c.)
2. N. ALBA (DC. fl. fr. 5. p. 420.) caule erecto basi ramoso, foliis integris oblongo - linearibus, pilis rigidis glandulosis. (I)? inter segetes secùs Rhodanum infrà Avenionem, propè Agde ex cl. Benth. — Fl. albi. (v. s.)
3. N. LUTEA (DC. fl. fr. 3. p. 626. in adn.) pilis aliis rigidis longis acutis, aliis brevioribus apice glandulosis, calycibus ultra medium divisis. (I)? in iusulis Stachadum et agro Ruscinonensi propè Prato de Mollo ex cl. Benth. — Fl. fr. 5. p. 420. Fl. lutei. (v. s. spec. imperf.)

VI. PULMONARIA Tourn. t. 55. L. gen. n. 184.

Calyx campanulatus 5-fidus 5-gonus; corolla infundibuliformis sub 5-loba erecto-patens; stigma obtusum emarginatum.

1. P. OFFICINALIS (L. sp. 194.) foliis radicalibus ovato-cordatis maculatis, calyce vix 5-fido, nucibus lucidis laevissimis lenticulari-convexis submarginatis. ♀ in nemoribus. — Fl. fr. 3. p. 627. — Moris. s. 11. t. 29. n. 4. (v. v.)
f. mollis, foliis immaculatis. — P. mollis Schrad., et Fl. fr. 5. p. 420. (v. v.)
2. P. ANGUSTIFOLIA (L. sp. 194.) foliis radicalibus lanceolatis immaculatis in petiolum attenuatis, calyce vix 5-fido. ♀ in sylvis montosis. — Fl. fr. 3. p. 627. Fl. dan. t. 483. (v. v.)

VII. ONOSMA Tourn. L. gen. n. 187.

Calyx 5-fidus ; corolla tubulosa limbo erecto sub 5-lobo ; antheræ sagittatae basi lobis connexæ ; stigma simplex ; nuces ovatae lucidae.

1. O. ECHIOTIDES (L. sp. 196.) foliis lanceolatis hispidis, corollis cylindricis obtusis, fructibus erectis. $\frac{1}{2}$ in Galliæ australis aridis glareosis. — Fl. fr. 3. p. 627. Lam. ill. t. 93. (v. v.)

+++ Nuces distinctæ, corollæ faux squamis instructa.

VIII. SYMPHITUM Tourn. t. 56. L. gen. n. 185.

Calyx 5-fidus ; corolla cylindrico-campanulata tubo brevissimo, limbo tubulato - ventricoso 5-lobo lobis brevibus, squamæ subulatae conniventæ.

1. S. TUBEROSUM (L. sp. 195.) foliis semidecurrentibus, inferioribus in petiolum angustatis, limbi laciñiis brevissimis obtusis. $\frac{1}{2}$ in humidis prov. austral., agri Mimatensis (Prost), Pyrenæorum ex Lapeyr. — Fl. fr. 3. p. 628. Jacq. aust. t. 225. — Moris. s. 11. t. 29. n. 2. (v. s.)

2. S. OFFICINALE (L. sp. 195.) foliis ovato-lanceolatis omnibus sessilibus decurrentibus. $\frac{1}{2}$ in pratis, incultis, et ad sepes. — Fl. fr. 3. p. 628. Fl. dan. t. 664. — Moris. s. 11. t. 29. n. 1. (v. v.)

IX. LYCOPSIS Desf. cat. par. 73. DC. fl. fr. 3. p. 634. — Lycopsis sp. L.

Calyx 5-fidus, corolla infundibuliformis 5-loba erecto-patens tubo incurvo ; squamulæ ad faucem ovatae prominulæ conniventæ ; stigma emarginatum, nuces basi insculptæ.

1. L. ARVENTIS (L. sp. 199.) foliis lanceolatis hispidis, calycibus florescentibus erectis. $\frac{1}{2}$ in arvis, ruderatis. — Fl. fr. 3. p. 634. Lam. ill. t. 92. Anchusa arvensis Lehm. (v. v.)

X. ANCHUSA L. gen. 182.

Calyx 5-fidus ; corolla infundibuliformis 5-loba erecto-patens, lobis integris ; cætera Lycopsis.

1. A. ITALICA (Retz obs. 1. p. 12.) canale exaltato, foliis lucidis strigosis oblongis intrinque attenuatis hispidis, calyce hispido sub-5-partito, bracteis linearilanceolatis, floribus fauce barbatis. $\frac{1}{2}$ in ruderatis, cultis. — Fl. fr. 3. p. 631. Trew. dec. 2. p. 14. t. 13. A. officinalis Gou. an L? (v. v.)

2. A. ANGUSTIFOLIA (L. sp. 191.) foliis oblongo-lanceolatis integris, floribus spicatis, calycibus 5-fidis, bracteis linearilanceolatis. $\frac{1}{2}$ in Galliæ australi et occidentali. — Fl. fr. 3. p. 632. — Lob. ic. 576. f. 2. (v. v.)

3. A.UNDULATA (L. sp. 191.) strigosa, foliis lanceolato-linearibus sinuatis, pedicellis bracteâ lanceolato-ovata brevioribus, corollæ laciñiis angustis, calycibus fructiferis inflatis. $\frac{1}{2}$ in arvis Monspelii. — Fl. fr. 3. p. 633. Mill. dict. t. 59. (v. v. DC.)

4. A. SEMPERVIRENS (L. sp. 192.) foliis hispidis, inferioribus ovatis subsinuatis petiolatis, superioribus sessilibus lanceolatis, pedunculis diphyllos capitatis, calyce hispido. $\frac{1}{2}$ in arvis cultis propè Dax ex Thore, Burdigalam ex Laterrade, Nannetes ex Bon., Maclovii ex cl. Petit-Thouars. — Fl. fr. 3. p. 633. — Lob. ic. 755. f. 2. (v. v. c.)

XI. BORRAGO Tourn. t. 53. L. gen. n. 188.

Calyx 5-partitus ; corolla rotata 5-fida plerūmque patens ; squamulæ obtusæ emarginatae ; fructus rugosi, calyx connivente tecti.

B-oriental

of common

1. *B. OFFICINALIS* (L. sp. 197.) hispida, foliis radicalibus petiolatis, superioribus sessilibus, pedunculis ramosis. (I) in hortis et cultis. — Fl. fr. 3. p. 638. — Black. t. 36. (v. v.)
2. *B. LAXIFLORA* (Desf. cat. par. DC. fl. fr. 5. p. 422.) hispidula, caulinibus procumbentibus, foliis radicalibus oblongis basi in petiolum angustatis, caulinis sessilibus, pedicellis distantibus unifloris. ♀ in Corsicâ. — Anch. laxiflora Fl. fr. 3. p. 631. (v. s.)
f. nana, caule brevissimo unifloro. — Campanula pygmæa fl. fr. 3. p. 705.
 ips. obs. DC. in herb. Lam. nunc Röper.

XII. ASPERUGO Tourn. t. 54. L. gen. n. 189.

Calyx 5-fidus inæqualis dentibus interjectis; corolla tubo brevi 5-lobo; squamulæ convexæ conniventes; semina calyce conduplicato et compresso tecta.

1. *A. PROCUMBENS* (L. sp. 198.) floribus axillaribus, calycibus post maturationem dilatatis. (I) in ruderatis pinguibus. — Fl. fr. 3. p. 634. — Lam. ill. t. 54. — Buglossum 13. Moris. s. 11. t. 26. f. 11. (v. v.)

XIII. MYOSOTIS L. gen. n. 180.

Calyx 5-fidus aut 5-partitus; corolla hypocrateriformis tubo brevi, limbo plano 5-lobo lobis emarginatis; squamulæ convexæ conniventes; nuces læves aut scabréas.

Sect. I. LAPPULA Mœnch. met. 417.

Nuces echinatæ.

1. *M. LAPPULA* (L. sp. 189.) caulinibus erectis, foliis lanceolatis pilosis, calycibus 5-partitis, lobis per maturationem patulis. (I) in argillosis, ruderatis. — Fl. fr. 3. p. 630. Lam. ill. t. 91. (v. v.)

Sect. II. ECHIOIDES Mœnch. met. 416.

Nuces læves.

2. *M. LUTEA* (Pers. enc. 1. p. 156.) caule herbaceo erecto simplici, foliis oblongo-lanceolatis alternis pilosis, inferioribus spathulatis, calycibus campanulatis 5-partitis hirsutis tubo corollæ subbrevioribus, nucibus triquetris pellucidis lævissimis. (I) in pinetis circâ S.-Bonet-le-Froid propè Lugdunum. (D. Foudras ex cl. Balbis.) — Anchusa lutea Cav. ic. 1. t. 69. f. 1. Fl. lutei. (v. s.)
3. *M. ANNUA* (Mœnch. hass. n. 153.) caule ramoso foliisque oblongis pilosis, calycibus campanulatis 5-partitis hirsutis tubo corollæ longioribus, nucibus lævibus. (I) in pratis et arvis. — Fl. fr. 3. p. 629. M. arvensis Bull. herb. t. 355. (v. v.)
4. *M. PUSILLA* (Lois. not. 36. t. 1 f. 2.) radice exili, caulinibus ramosis brevissimis pilosis, ramis decumbentibus, foliis inferioribus ovato-spathulatis superioribus oblongo-lanceolatis, calycibus hirsutis 5-fidis, corollis minimis, nucibus lævibus. (I) in agris Corsicæ, Massiliæ (Solier). — Fl. fr. 5. p. 421. (v. s.)
5. *M. PERENNIS* (Mœnch. hass. n. 154.) caule foliisque lanceolatis hispidis, calycibus campanulatis 5-fidis pilosis tubo corollæ brevioribus, nucibus lævibus. ♀ in rivulis, humidis inque sylvaticis. — Fl. fr. 3. p. 629. (v. v.)
6. *M. NANA* (Vill. dauph. 2. t. 13.) cespitosa, caulinibus simplicibus minimis paucifloris, foliis lanceolato-oblongis villosi, calycibus hirsutissimis 5-partitis, laciniis obtusiusculis, nucibus margine crenulatis. ♀ in editioribus Alpibus Delph. et Galloprov. — Fl. fr. 3. p. 630. (v. v. in Helv.)

XIV. CYNOGLOSSUM L. gen. n. 183.

Calyx 5-partitus; corolla brevis infundibuliformis 5-loba; squamulae convexae conniventes; stigma emarginatum; nuces depressae interiore latere stylo affixae.

Sect. I. EUGLOSSUM.


Nuces planæ echinatæ.

1. *C. OFFICINALE* (L. sp. 192.) caule erecto, foliis lanceolatis basi attenuatis sessiliibus tomentosis, laciniis calycinis ovato-lanceolatis obtusis, staminibus corollâ brevioribus. (1) in sylvaticis, sterilioribus passim. — Fl. fr. 3. p. 635. Lam. ill. t. 92. f. 1. (v. v.)
2. *C. MONTANUM* (Lam. fl. fr. 2. p. 277.) foliis lanceolatis lucidis glabriusculis subtus scabris, inferioribus petiolatis, calycis hispiduli laciniis lanceolatis obtusis corollam subæquantibus, staminibus corollâ brevioribus. ♀ in Alpibus et Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 635. (v. s.)
3. *C. PICTUM* (Ait. kew. 1. p. 179.) caulibus erectis apice ramosis, foliis lanceolatis tomentosis, superioribus basi cordatis, corollis calyci subæqualibus venosis, fructibus convexis. (2) in aridis provinc. austral. et occidentalium. — Fl. fr. 3. p. 636. — Clus. hist. 2. p. 162. f. 2. (v. v.)
4. *C. CHEIRIFOLIUM* (L. sp. 193.) caulibus à basi ramosis, foliis incano-sericeis lanceolatis obtusis, radicalibus spatulatis, staminibus corollâ brevioribus, calycis lanuginosi laciniis lanceolatis corollâ duplò brevioribus. (2) in provinciis australibus. — Fl. fr. 3. p. 636. (v. v.)

Sect. II. OMPHALODES Tourn. t. 58.

Nuces lèves calathiformes, margine membranaceo internè dentato.

5. *C. LINIFOLIUM* (L. sp. 193.) foliis linear-lanceolatis glabris margine denticulato-scabris. (1) in sterilibus Galliæ occidentalis, Galloprovinciæ propè Carpentras et Lotharingiæ propè Nancy (Monnier). — Fl. fr. 3. p. 638. — Barr. ic. t. 1234. (v. s.)
6. *C. OMPHALODES* (L. sp. 193.) foliis subglabris petiolatis, radicalibus ovato-cordatis, caulinis ovatis. ♀ Pedemontii nemorosis indigena, frequenter in hortis culta. — Fl. fr. 3. p. 637. — Moris. s. 11. t. 26. n. 3. (v. v. c.)





Ordo LXIX. SOLANEÆ Juss. gen. 124.

Calyx monosepalus æqualis sæpiùs persistens, 5-fidus aut partitus. Corolla 1-petala sæpiùs regularis 5-fida decidua, æstivatione plicatâ. Stamina 5 basi corollæ inserta, ejusdem lobis alterna. Ovarium liberum simplex; stylus 1; stigma simplex aut bisulcum. Fructus bilocularis polyspermus, nunc capsularis bivalvis, dissepimento valvis parallelo, nunc baccatus receptaculis seminiferis centralibus. Semina numerosa; albumen carnosum; embryo annularis vel spiralis; cotyledones semiteretes elongatae. — Herbæ aut rariùs frutices, foliis alternis simplicibus lobatis, floribus sæpè extrà-axillaribus; interdùm quinta pars floris demitur.

† *Fructus baccatus.*

I. LYCIUM L. gen. n. 262.

Calyx brevis tubulosus; corolla infundibuliformis tubo brevis, limbo 5-fido; filaments 5 basi villosa; stigma sulcatum; bacca subrotunda; embryo uncinatus subcentralis.

1. L. BARBARUM (L. sp. 192.) foliis oblongis glabris, ramis flexuosis nutantibus, calycibus 2-labiatis. ♂ in hortis et in sepibus aliquandò quasi spontaneum, in agro Ruscinonensi ex Benth. — Fl. fr. 3. p. 616. (v. v. c.)
2. L. EUROPAEUM (L. mant. 47.) foliis oblongis glabris, ramis flexuosis, calycibus quinquedentatis. ♂ in Gallia australi. — Fl. fr. 3. p. 616. — Mich. gen. t. 105. f. 1. (v. v. c.)

II. CAPSICUM Tourn. t. 66. L. gen. n. 252.

Calyx 5-fidus; corolla rotata tubo brevissimo, limbo 5-fido patente; antheræ 5 erectæ conniventes longitudinaliter dehiscentes; bacca exsucra; embryo semicircularis.

1. C. ANNUUM (L. sp. 270.) caule herbaceo, pedunculis solitariis. (I) ex Americâ meridionali ortum, in hortis cultum. — Fl. fr. 3. p. 615. Lam. ill. t. 116. f. 1. (v. v. c.)

III. SOLANUM Dunal. sol. p. 115. — Solani sp. L.

Calyx monosepalus persistens 5-10-divisus; corolla monopetala rotata, tubo brevissimo, limbo 4-5-6-diviso patente; antheræ 4-5-6 oblongæ apice poris duobus dehiscentes; bacca subrotunda 2-3-4-6 locularis; embryo spiralis.

§. 1. *Caulibus foliisque aculeatis.*

1. S. ESCULENTUM (Dun. sol. p. 208. t. 3. f. E.) caule aculeato subherbaceo, foliis ovatis subsinuatis tomentosis aculeatis, floribus multipartitis, baccis 2-3-locularibus, seminibus nudis. (I) ex India ortum, in hortis Galliae australis cultum. — S. Melongena L. sp. 266. Fl. fr. 3. p. 615. — Pluck. phyt. t. 226. f. 2. — Moris. s. 13. t. 2. n. 2. (v. v. c.)

§. 2. *Caule foliisque inermibus.*

* *Foliis angulato-repandis integrigrise.*

2. S. VILLOSUM (Lam. dict. 4. p. 289.) caule herbaceo tereti villoso, foliis ovatis angulato-dentatis villosis canescensibus, floribus subumbellatis. (I) in

cultis. — Fl. fr. 3. p. 613. — Dill. elth. t. 274. f. 353. Baccæ croceo-rubræ. (v. v.)

3. *S. OCHROLEUCUM* (Bast. journ. bot. 1814. 3. p. 20.) caule herbaceo erecto, ramis angulatis dentatis pubescentibus, foliis ovato-oblongis angulato-sinuatis subhirsutis, floribus subumbellatis. (I) circà Andegavum. — Fl. fr. 5. p. 418. Baccæ è flavo et viridi variae. (v. s.)

4. *S. HUMILE* (Wild. enum. p. 236.) caule herbaceo patulo, ramis subangulatis subdentatis subpubescentibus, foliis ovatis repandis superioribus subintegris, floribus subumbellatis. (I) in ruderatis agri Aurelianensis et Andegavensis. — Fl. fr. 5. p. 417. Baccæ luteo-virescens. (v. s.)

5. *S. MINIATUM* (Wild. enum. 236.) caule herbaceo, ramis pubescentibus angulato-alatis alis dentatis, foliis ovatis repandis glabriusculis, floribus subumbellatis. (I) in ruderatis Parisiorum ex Tourn., agri Aurelianensis et Andegavensis, in sylvis Vasconia propè la Teste (Des Moul.), circà Monspelium ex Ben th. — Fl. fr. 5. p. 417. Baccæ pallidè rubræ. (v. s.)

6. *S. NIGRUM* (Wild. en. p. 236.) caule herbaceo angulato, foliis ovatis dentatis nudiusculis, floribus subumbellatis. (I) in hortis et ruderatis. — Fl. fr. 3. p. 613. *S. nigrum* a L. sp. 266. Baccæ nigræ. — An tres præcedentes species ritè ab hac distinguuntur? (v. v.)

7. *S. PSEUDO-CAPSICUM* (L. sp. 263.) caule fruticoso, foliis oblongo-lanceolatis subrepandis glabris, pedunculis subunifloris extrafoliaceis. ♂ in hortis cultum, nunc in Bearnie pago Arette subsppontaneum. — Fl. fr. 5. p. 417. — Sabb. h. rom. t. 59. (v. v. DC.)

* * *Foliis lobatis integrisve.*

8. *S. DULCAMARA* (L. sp. 264.) caule fruticoso flexuoso, foliis ovato-cordatis glabris, superioribus laciniatis, corymbis suboppositifoliis. ♂ in sepibus. — Fl. fr. 3. p. 612. — Lob. ic. t. 266. f. 1. (v. v.)

* * * *Foliis impari-pinnatisectis.*

9. *S. TUBEROSUM* (L. sp. 265.) caule herbaceo, foliis impari-pinnatisectis segmentis inæqualibus, alternis minutis, pedicellis articulatis, corollis 5-angulatis. ♀ ex Amer. austr. ortum, ubiquè colitur. — Fl. fr. 3. p. 613. — Clas. hist. 2. p. 79. ic. Varietates innumeræ. (v. v. c.)

IV. *LYCOPERSICUM* Tourn. inst. 150. t. 63. Dun. mon. sol. p. 109. — Solani sp. L.

Calyx monosepalus persists 5-6-partitus; corolla monopetala 5-6-fida; antheræ conicæ membranâ apice elongatâ connatæ, intùs longitudinaliter dehiscentes; semina villosa.

1. *L. ESCULENTUM* (Dun. sol. p. 113. t. 3. f. 3.) pilosum pilis diversis, foliis inæqualiter pinnatisectis, segmentis incisis subtùs glaucescentibus, floribus pluribus coalitis, baccis torulosis. ♀ ex Americâ? ortum, colitur in hortis. — Sol. *Lycopersicum* L. sp. 265. Fl. fr. 3. p. 615. — Cam. epit. 821. ic. (v. v. c.)


V. *PHYSALIS* L. gen. n. 250.

Calyx 5-fidus, corolla rotata 5-fida; antheræ 5 oblongæ erectæ conniventes; baccæ globosa, calyce ampliato vesicario tecta.

1. *P. ALKEKENII* (L. sp. 262.) foliis geminis integris acutis, caule herbaceo. ♀ in humidis, umbrosis, serobibus passim. — Fl. fr. 3. p. 612. — Lob. ic. t. 262. f. 2. (v. v.)

VI. *ATROPA* Gærtn. 2. p. 240. t. 131. DC. fl. fr. 3. p. 611. — Atropæ sp. L.

Calyx campanulatus 5-fidus; corolla campanulata calyce duplò longior 5-loba æqualis; filamenta 5 filiformia; baccæ globosa calyci insidens.



07 A - Mandragora

07 Decore

1. *A. BELADONNA* (L. sp. 260.) foliis ovalibus integerrimis, floribus axillaribus breviter pedunculatis. ♀ in sylvaticis montanis. — Fl. fr. 3. p. 611. — Lob. ic. t. 263. f. 1. (v. v.)

†† *Fructus capsularis.*

VII. *DATURA* L. gen. n. 246.

Calyx magnus tubulosus ventricosus 5-angularis apice 5-fidus caducus, basi orbiculata peltata persistente; corolla maxima infundibuliformis tubo longo limbo 5-angulari 5-plicato 5-acuminato; stamna 5; stigma bilamellatum; capsula echinata aut laevis ovata 2-locularis loculis dissepimento prominente bi aut multipartitis.

1. *D. STRAMONIUM* (L. sp. 255.) foliis ovatis sinuatis glabris basi in petiolum attenuatis, pericarpis ovatis spinosis. (1) in ruderatis. — Fl. fr. 3. p. 609. — Gnid. aix. t. 88. (v. v.)
2. *D. TATULA* (L. sp. 255.) foliis cordatis glabris dentatis, pericarpis ovatis spinosis. (1) propè Burdigalam ex cl. Bory, Perpignanum ex Lapeyr. et Benth., inter Avenionem et Nemausim ex cl. Requien. (v. v. c.)

VIII. *NICOTIANA* Tourn. t. 41. L. gen. n. 248.

Calyx urceolatus 5-fidus; corolla multò longior infundibuliformis 5-fida regularis; stamna 5; stigma emarginatum; capsula 2-valvis.

1. *N. TABACUM* (L. sp. 258.) foliis sessilibus oblongo-lanceolatis acuminatis, inferioribus decurrentibus, corollæ fance inflato-ventricosa, limbi lacinias acuminatis. (1) ex Americâ anno 1560 allata, in prov. variis præsertim in Galliâ australi et Alsatiâ colitur. — Fl. fr. 3. p. 608. — Lob. ic. t. 584. f. 2. (v. v. c.)
2. *N. RUSTICA* (L. sp. 258.) caule tereti, foliis petiolatis ovatis integerrimis, corollæ tubo cylindrico calyce longiore, limbi lacinias rotundatis obtusis. (1) culta in Galliâ australi. — Fl. fr. 3. p. 609. Bull. herb. t. 289. (v. v. c.)

IX. *HYOSCYAMUS* Tourn. t. 42. L. gen. n. 247.

Calyx tubulosus 5-fidus; corolla infundibuliformis limbo patente obliquè 5-lobo inæquali; stamna 5; stigma capitatum; capsula ovata utrinquè compressa et sulco exarata, apice circumscissa seu operculata.

1. *H. NIGER* (L. sp. 257.) foliis amplexicaulibus acute sinuatis, floribus sessilibus. (1) in ruderatis. — Fl. fr. 3. p. 607. — Lob. ic. t. 268. f. 2. (v. v.)
2. *H. ALBUS* (L. sp. 257.) foliis caulinis petiolatis cordatis obtusè sinuatis, floralibus integerrimis, floribus subsessilibus, corollis ventricosis. (1) in Galliâ mediterraneâ. — Fl. fr. 3. p. 607. Lam. ill. t. 117. f. 2. — Clus. hist. 2. p. 84. f. 1. (v. v.)
3. *H. AUREUS* (L. sp. 257.) foliis petiolatis dentatis acutis, floribus pedunculatis, fructibus pendulis. (2) in ruderatis Niceæ ex All., Monspeliæ ex Gouan., agri Narbonensis ex cl. Benth. — Fl. fr. 3. p. 608. — C. Bauh. prod. p. 92. ic. (v. s. c.)

X. *RAMONDIA* Rich. in Pers. encycl. t. p. 216. DC. fl. fr. 3. p. 606.

Calyx 5-partitus; corolla 5-loba subinæqualis basi ad loborum sinus hirsuto-maculata; stamna 5 approximata, antheris apice perforatis; caps. 1-locularis 2-valvis, valvulis margine introflexis septiferis.

1. *R. PYRENAICA* (Rich. 1. c.) foliis radicalibus supernè villosis, subtùs lanugine fuscâ obtectis. ♀ in Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 606. Verbascum Myconi L. Mill. ic. t. 277. Chaixia Myconi Lapeyr. abr. supp. 39. (v. v.)

XI. *VERBASCUM* L. gen. n. 245.

Calyx 5-partitus; corolla rotata 5-loba inæqualis; stamna 5 inæqua-


lia, filamentis inclinatis ut plurimam basi villosis; capsula 2-valvis ovata aut globosa.

§. 1. *Foliis decurrentibus.*

1. V. ~~THYMUS~~ (L. sp. 252.) caule simplici, foliis lanceolato-ovatis subintegris utrinque lanato-tomentosis decurrentibus, floribus spicatis subsessilibus spicâ densâ, bracteolis calycem lanatum superantibus, laciinis calycinis lanceolatis capsulam subtomentosam subæquantibus. 2 in glareosis. — Fl. fr. 3. p. 600. — Lob. ic. t. 561. f. 2. — Fuchs. t. 846. ic. (v. v.)
2. V. ~~THYMUS~~ (Schrad. verb. I. p. 21.) caule simplici, foliis lanceolato-ovatis decurrentibus crenulatis tomentosis superioribus acuminatis, racemo spicato denso, bracteis calycem lanatum superantibus, corollæ laciinis obovatis rotundatis, antheris 2 oblongis. (2) in sterilibus Parisiorum, Andegaviae, Monspelii. — Fl. fr. 5. p. 412. An satis distincta species? (v. s.)
3. V. AUSTRALE (Schrad. mon. I. p. 28. t. 2.) caule subsimplici, foliis lanuginosis crenatis, radicalibus oblongo-lanceolatis in petiolum attenuatis, caulinis oblongis acutis decurrentibus, superioribus lato-ovatis cuspidatis semi-decurrentibus, floribus breviter pedicellatis fasciculatis, fasciculis remotiusculis in spicam elongatam laxam dispositis, calycis lanati laciinis lanceolato-ovatis capsulam tomentosam subæquantibus. (2) Monspelii in sterilibus. — Fl. fr. 5. p. 413. (v. v.)
4. V. PHLOMOIDES (L. sp. 253.) foliis subdecurrentibus ovatis acutis utrinque lanuginoso-tomentosis crenatis, inferioribus in petiolum attenuatis, floribus subsessilibus fasciculatis, fasciculis subremotis in spicam alatam basi laxam dispositis, calycis lanati laciinis lanceolato-ovatis, filamentis staminum barbatis flavescentibus. (2) in ruderat et ad margines viarum. — Fl. fr. 3. p. 601. — Lob. ic. t. 561. f. 1. (v. v.)
5. V. CRASSIFOLIUM (DC. fl. fr. 3. p. 601 non Schrad.) caule subsimplici, foliis subintegris lanuginoso-tomentosis inferioribus petiolatis, floribus sessilibus subfasciculatis in spicam densam dispositis, calycis lanati laciinis lanceolatis capsulam superantibus, filamentis staminum glabris. (2) in Gallia Narbonensi et circâ Suessones. — Dalech. hist. 1301. ic. — J. Bauh. hist. 3. p. 872. ic. (v. v.)
6. V. CANDIDISSIMUM (DC. fl. fr. 5. p. 413.) caule ramoso, foliis decurrentibus lanuginoso-tomentosis candidissimis crenulatis, inferioribus oblongo-lanceolatis acutis, superioribus ovato-acuminatis, racemo paniculato, floribus breviter pedicellatis fasciculatis fasciculis remotis, calycis lanati laciinis linearilanceolatis capsulâ brevioribus. (2) in sterilibus Monspelii. (v. v.)
7. V. SINUATUM (L. sp. 254.) caule ramoso, foliis radicalibus oblongis pinnatifido-repandis tomentosis, caulinis subdecurrentibus amplexicaulibus rameisque cordatis nudiusculis, racemo paniculato, floribus sessilibus fasciculatis, fasciculis remotis, laciinis calycinis lanceolato-ovatis. 2 in aridis ad margines viarum in Gallia australi et austro-occidentali usque ad Burdigalam ex cl. Laterr. — Fl. fr. 3. p. 605. — Cam. epit. p. 882. ic. (v. v.)

§. 2. *Foliis non decurrentibus.*

8. V. LEPTOSTACHYON (DC. fl. fr. 5. p. 415.) caule simplici, foliis oblongis acutis integris tomento crasso adhærente albidis, inferioribus in petiolum attenuatis, superioribus semiamplexicaulibus, floribus subsessilibus fasciculatis, fasciculis in racemum simplicem elongatum dispositis, laciinis calycinis lanceolato-ovatis. (2) in agris lapidosis Monspelii. (v. s.)
9. V. MAYALE (DC. fl. fr. 5. p. 415.) foliis supernè virescentibus subtùs pulvрrulento-tomentosis albidis crenulatis oblongo-lanceolatis acutis inferioribus petiolatis, floribus sessilibus subsolitariis, racemo laxo spicato simplici, calycis hirsuti laciinis linearibus capsulâ brevioribus, staminibus 2 glabris longioribus. (2) in sterilibus Pyren. orient., Occitaniæ, Galloprovinciæ, Nîceæ, Corsicae. (v. v.)



10. *V. MIXTUM* (Ram. in DC. fl. fr. 3. p. 603.) foliis oblongis acutis obsoletè crenatis sessilibus pulvrenlento-tomentosis, inferioribus subpetiolatis, ramis paniculæ villosis, filamentis barbatis violaceis.—In Pyrenæis. An à *V. mayali* distinctum? †
11. *V. BRUTIA* (L. sp. 254.) caule ramoso, foliis amplexicaulibus crenatis oblongis glabris, radicalibus sinuatis, superioribus acuminatis, floribus longè pedicellatis solitariis remotis in racemum elongatum ramosum dispositis, calycis glandulosi laciñiis lanceolato-linearibus capsulâ glabriuscûlâ brevioribus. (2) in argilloso ad ripas.—Fl. fr. 3. p. 604.—Lob. ic. t. 564. f. 2. (v. v.)
12. *V. BLATTARIOIDES* (Lam. dict. 4. p. 225.) foliis oblongis amplexicaulibus crenatis glabriuscûlis, radicalibus sinuato-crenatis, floribus fasciculatis fasciculis 2-4-floris remotis, calycis glanduloso-villosi laciñiis lanceolato-linearibus capsulâ puberulâ brevioribus. (2) ad vias passim.—Fl. fr. 3. p. 605.—Lob. ic. 564. f. 1. An præcedentis var? (v. s.)
13. *V. CHAIKI* (Vill. dauph. 2. t. 13.) foliis oblongis cordatis petiolatis dentatis superne glabrinuscûlis subtûs villosi, inferioribus basi inciso-dentatis aut pinnatifido-incisis, floribus pedicellatis fasciculatis, fasciculis remotis in racemum ramosum paniculatum dispositis, calycis parvî lanuginosi laciñiis linearibus apice interdùm subglabris. (2) in Delph. ex Villars, Galloprovinciâ propè Massiliam (Solier), Occitanâ propè Monspelium et Pyrenæis orientalibus.—Fl. fr. 3. p. 605.—*V. dentatum* Lapeyr. Fl. fr. 5. p. 416. (v. s.)
14. *V. NIGRUM* (L. sp. 253.) foliis oblongo-cordatis petiolatis crenatis superne pubescentibus glabriuscûlisve, subtûs tomentoso-candicantibus, floribus pedicellatis fasciculatis, racemo simplici, calycis minimi lanuginosi laciñiis linear-lanceolatis capsulâ tomentosâ brevioribus, filamentis barbatis purpurascensibus. ♀ ad vias.—Fl. fr. 3. p. 603.—Fuchs. hist. p. 849. ic. (v. v.)
15. *V. RAMOSISSIMUM* (Bast. supp. 42.) foliis oblongis acutis crenatis utrinquè villosis semiamplexicaulibus, caule tenuiter velutino, floribus pedicellatis fasciculatis in paniculam ramosam dispositis, calycis parvis pubescentibus. (2) in collibus et agris Andegaviæ.—Fl. fr. 5. p. 416. An distincta species? †
16. *V. ALOPECURUS* (Thuil. par. II. 1. p. 110.) foliis ovatis subincanis crenatis inferioribus petiolatis, floribus pedicellatis fasciculatis, fasciculis remotis, racemo simplici, calycis parvi subglabri laciñiis linearibus capsulâ tomentosâ brevioribus. ♀ in aridis circâ Lutetiam, Mimatem (Prost), et in Andegaviâ ex Bast.—Fl. fr. 3. p. 603. An ut vult cl. Merat *V. nigri* var? (v. s.)
17. *V. LYCHNITIS* (L. sp. 253.) caule angulato paniculato, foliis ovatis crenatis superne subglabris subtûs tomentosis, floribus pedicellatis fasciculatis, fasciculis remotiusculis, calycis parvi laciñiis apice glabris linear-lanceolatis capsulâ brevioribus. ♀ ad vias in montosis sterilibus.—Fl. fr. 3. p. 602. Fl. dan. t. 586. (v. v.)
18. *V. FLOCCOSUM* (Walds. et Kit. 1. t. 79.) foliis superne pubescentibus subtûs tomento caduco floccoso albis acutis, inferioribus oblongis subpetiolatis superioribus ovatis, racemo paniculato, calycis laciñiis linearibus acutis pedicellisque vix tomentosis. (2) in sterilibus Lutetiæ ex Merat.—Fl. fr. 5. p. 414. An satis à sequente distinctum? (v. v. DC. in Italiâ.)
19. *V. PULVERULENTUM* (Vill. dauph. 2. p. 490.) caule tereti paniculato, foliis ovato-oblongis subserratis utrinquè pulvrenlento-tomentosis, floribus pedicellatis fasciculatis, fasciculis subremotis, calycis parvi pulvrenlenti laciñiis linearibus capsulâ brevioribus. (2) in ruderatis ad margines viarum passim.—Fl. fr. 3. p. 602. (v. v.)
20. *V. LONGIFOLIUM* (DC. fl. fr. 5. p. 414.) foliis oblongis acutis angustis integris tomento subflavante onustis, inferioribus in petiolum attenuatis, racemo paniculato, floribus pedicellatis fasciculatis, fasciculis remotis, calycis parvi lanati laciñiis lanceolatis. (2) in sterilibus Monspelii. (v. s.)

**Ordo LXX. ANTIRRHINEÆ Juss. gen. 118. — Personatæ
DC. fl. fr. 3. p. 573.**

Calyx 1-sepalus divisus sæpè persistens. Corolla irregularis, limbo diviso plerumquè bilabiato personato; stamina 4 didynamia corollæ inserta. Ovarium liberum; stylus 1; stigma simplex aut 2-lobum. Capsula uni-aut 2-locularis 2-valvis valvis concavis plus minùsve segregatis, interdùm 2-partitis; dissepsimento centrali valvis parallelo nunc libero simplici, nunc duplici cum valvis introflexis coalito. Semina numerosa medio dissepsimento adfixa. Albumen carnosum; embryo rectus; cotyledones semicylindricæ. — Herbæ foliis oppositis aut alternis, floribus foliis superioribus minoribus bracteatis.

† *Stamina 4 didynamia; capsulae 2-loculares.*

I. **GRATIOLA L. gen. 29.**

Calyx 5-partitus, basi 2-bracteatus; corolla tubulosa subbilabiata, labio superiore emarginato, inferiore 3-lobo; stamina 4, 2 sterilia; capsula ovata, bilocularis dissepsimento simplici.

1. **G. OFFICINALE** (L. sp. 24.) foliis lanceolatis serratis subtrinerviis, floribus penduculatis. ♀ in humidiuseulis. — Fl. fr. 3. p. 598. — Lob. ic. t. 435. f. 2. (v. v.)

II. **DIGITALIS L. gen. 758.**

Calyx 5-partitus inæqualis; corolla campanulata, limbo obliquè 4-lobo inæquali; stigma simplex aut 2-lamellatum; capsula ovata acuminata.

1. **D. PARVIFLORA** (Lam. fl. fr. 2. p. 333.) foliis ovato-lanceolatis denticulatis glaberrimis, laciñis calycinis lanceolato-linearibus acutis, corollis acutis, labio superiore bifido. ♀ in saxosis rupestribus montosis. — Fl. fr. 3. p. 597. D. lutea L. sp. 867. non Poll. — Lob. ic. t. 573. f. 2. (v. v.)
2. **D. GRANDIFLORA** (Lam. fl. fr. 2. p. 332.) foliis lanceolatis serrulatis subtùs pubescentibus, calycis laciñis lanceolato pubescentibus, corollis inflatis galéa emarginatis. ♀ in montosis umbrosis Galliæ orientalis. — Fl. fr. 3. p. 596. D. ochroleuca Jacq. vind. 1. t. 57. (v. v.)
3. **D. PURPUREA** (L. sp. 866.) foliis lanceolato-ovatis obsoletè crenatis utrinquè pubescentibus, inferioribus petiolatis, laciñis calycinis ovatis acutis, corollis obtusis, labio superiore integro. (2) in montibus sylvaticis Galliæ mediæ, australis occidentalisque. — Fl. fr. 3. p. 595. Lam. ill. t. 525. f. 1. (v. v.)
4. **D. PURPURASCENS** (Elmig. diss. 45.) foliis lanceolatis serratis basi amplexicaulibus supernè glaberrimis subtùs pubescentibus, calycis laciñis lanceolato-ovatis subacutis, corollâ cylindraceâ subventricosâ ad oras villosulâ galeâ obtusa emarginata, labii inferioris lobo medio oblongo obtuso. ♀ in Alsatiæ, Arverniæ, Pyrenæorum dumetis montanis. — Fl. fr. 5. p. 411. D. hybrida Koelr. in journ. phys. 1782. t. 1. f. 1. 2. Hybrida videtur inter 2 precedentes. (v. s.)

III. **ANARRHINUM Desf. atl. 2. p. 52. DC. fl. fr. 3. p. 594.**

Calyx 5-partitus; corolla tubulosa interdùm calcarata vel basi deorsum prominens, fauce patente, palato prominulo destituta; capsula subrotunda apice foraminulis 2 dehiscens.





1. *A. BELLIDIFOLIUM* (Desf. l. c.) foliis radicalibus obovato-lanceolatis obtusis serratis, caulinis partitis integrerimis. (2) in sterilibus Galliae australis et austro-orientalis et rarius occidentalis. — Fl. fr. 3. p. 595. — Bauh. prod. 186. ic. (v. v.)

IV. *ANTIRRHINUM* Tourn. t. 75. Juss. gen. p. 120.

Calyx 5-partitus; corolla non calcarata basi gibba, tubo inflato, limbo 2-labiato, suprà 2-fido reflexo, infrà 3-lobo, palato ad faucem prominulo; capsula basi obliqua, apice foraminulis tribus dehiscens.

1. *A. ORONTIUM* (L. sp. 860.) foliis lanceolatis angustis, floribus subsessilibus subspicatis, laciniis calycinis linearibus inæqualibus corollam capsulamque superantibus. (1) in agris et arvis. — Fl. fr. 3. p. 593. — Cam. epit. 923. ic. (v. v.)

2. *A. MAJUS* (L. sp. 859.) caulinibus basi glaberrimis apice pubescentibus, foliis lanceolatis alternis rameis oppositis, floribus racemosis, calycis glandulosopubescentis laciniis ovatis obtusis corollâ multò brevioribus, capsulâ calycem superante. (2) in maceriis saxosis provinc. austr. et in hortis persæpè cultum undè in muros vicinos migrat. — Fl. fr. 3. p. 593. — Lob. ic. t. 404. f. 2. (v. v.)

β. latifolium, foliis ovatis aut ovato-lanceolatis glabris aut pubescentibus.
— In asperis apricis Galloprovinciæ, agri Ruscinonensis. — *A. latifolium* Mill. dict. n. 4. Fl. fr. 5. p. 411. — Bocc. mus. t. 41. (v. v.)

3. *A. MOLLE* (L. sp. 860.) foliis ovatis obtusissimis oppositis tomentosis, laciniis calycinis ovalibus, caulinibus procumbentibus. $\frac{2}{3}$ in Alpibus?, Pyrenæis Hispaniæ conterminis ex cl. Arnott. — Fl. fr. 3. p. 594. †

4. *A. SEMPERVIRENS* (Lapeyr. fl. pyr. 1. p. 7. t. 4.) foliis ellipticis semperfurentibus oppositis cauleque frutescente divaricato-pubescentibus, calycis pubescentis laciniis brevibus lanceolatis corollâ multò brevioribus, capsulâ calycem superante. $\frac{3}{5}$ in Pyrenæis centralibus ad rupes calcarias. — Fl. fr. 3. p. 593. (v. v.)

5. *A. ASARINA* (L. sp. 860.) caulinibus procumbentibus diffusis villosis, foliis oppositis cordatis crenatis, calycis hirsuti laciniis linearibus corollâ multò brevioribus capsulamque superantibus. $\frac{2}{3}$ in Pyrenæis orientalibus, Cebennis, montibus Ligericinis et Velaunorum ex Arnaud. — Fl. fr. 3. p. 594. — Lob. ic. t. 601. f. 2. (v. v. DC.)

V. *LINARIA* Tourn. t. 76. Juss. gen. p. 120.

Calyx 5-partitus, laciniis 2 inferioribus remotis; corolla ringens basi calcarata, tubo inflato, limbo 2-labiato, suprà 2-fido reflexo, infrà 3-lobo; capsula ovata aut globosa apice biforis multivalvis; semina marginata.

Sect. I. *CHENORRHINUM* DC. fl. fr. 5. p. 410.

Faux aperta palato prominulo destituta, capsula subrotunda.

1. *L. ORGANIFOLIA* (DC. fl. fr. 3. p. 591.) foliis obovatis oppositis, inferioribus glabris, floralibus alternis cauleque ascende ramoso pubescentibus, calycis pubescentis laciniis spathulato-linearibus corollâ multò brevioribus capsulam subsuperantibus, calcare recto obtuso. $\frac{2}{3}$ in rupestribus Pyrenæorum, Cebennarum, Galloprov., Delph., Montis-Aurei ex L. — *Antirrhinum organifolium* L. sp. 852. *A. villosum* Lapeyr. non L. — Barr. ic. 598. — Fl. pureo-cærulescentes. (v. v.)

2. *L. RUBRIFOLIA* (DC. fl. fr. 5. p. 410.) foliis inferioribus oppositis subrotundis glabris carnosis subtùs rubris, superioribus alternis, caule suberecto apice pubescente, calycis pubescentis laciniis spathulato-linearibus corollâ brevioribus capsulam superantibus, calcare subdivergente acuto. (1) in collibus rupestribus Massiliæ, Monspelii. — Magn. bot. 25. ic. Fl. cærulescentes. (v. s.)


3. *L. MINOR* (Desf. atl. 2. p. 46.) caule ramosissimo diffuso, foliis lanceolatis obtusis ellipticisque alternis, inferioribus oppositis, calycis laciniis inaequilibus spathulato-linearibus corollâ subbrevioribus capsulam subsuperantibus. (I) in cultis, ruderatis, glareosis. — Fl. fr. 3. p. 591. Ant. minus L. sp. 852. — Lob. ic. t. 406. f. 1. Fl. purpureo-violacei. (v. v.)

Sect. II. LINARIASTRUM.

Corolla ringens, palatum ad faucem prominulum.* *Foliis angulatis.*

4. *L. Cymbalaria* (Mill. dict. n. 17.) caulis glabris procumbentibus, foliis reniformibus cordatis alternis glabris longè petiolatis 5-7-lobis mucronulatis, pedunculis folio brevioribus, laciniis calycinis lanceolatis capsulâ brevioribus, calcare obtuso recurvo. (I) in rupibus et muris antiquis passim. — Fl. fr. 3. p. 583. Ant. *Cymbalaria* L. — Cam. epit. 860. ic. Fl. cærulescentes palato flavo. (v. v.)
5. *L. HEPATICÆFOLIA* (Dub. mss.) caulis procumbentibus diffusis glabris, foliis longè petiolatis oppositis reniformi-cordatis 3-5-lobis lobo medio maximo, calycis glaberrimi laciniis linearibus subacutis capsulam subsuperantibus, calcare recto obtuso. (I) in Corsicâ et muris antiquis passim. — Ant. *hepaticæfolium* Poir. supp. 4. p. 19. Fl. prioris sed majores. (v. s.)
6. *L. ÆQUITRILoba* (Dnb. mss.) caulis filiformibus procumbentibus diffusis pilosis, foliis reniformibus alternis longè petiolatis pilosis obsoletè 3-lobis lobis rotundatis mucronulatis subæqualibus, pedunculis filiformibus, laciniis calycinis linearibus, calcare brevi recto obtuso. (I) in Corsicæ humentibus. — Ant. *æquitrilobum* Viv. cors. p. 10. Flores L. *cymbalariae* sed minores. An satis à *L. pilosa* distincta? (v. s.)
7. *L. SPURIA* (Mill. dict. n. 15.) caule procumbente, foliis ovato-reniformibus cordatis pilosis alternis, inferioribus oppositis obsoletè dentatis, calycis pilosi laciniis ovato-lanceolatis capsulam subsuperantibus, calcare incurvo acuto. (I) in arvis. — Fl. fr. 3. p. 584. Ant. *spurium* L. sp. 851. — Fuchs. hist. 167. ic. Fl. flavi, labio superiore violaceo. (v. v.)
8. *L. ELATINE* (Desf. atl. 2. p. 37.) pilosa, caulis procumbentibus ramosissimis hirsutis, foliis breviter petiolatis alternis ovato-hastatis, pedunculis filiformibus folia superantibus, calycis laciniis linear-lanceolatis acutis capsulam subsuperantibus, calcare incurvo acuto. (I) in arvis. — Fl. fr. 3. p. 584. Ant. *Elatine* L. sp. 851. Fl. præcedentis palato cærulescente. (v. v.)
9. *L. CYRRHOSA* (Willd. enum. 639.) caulis elongato-filiformibus procumbentibus hirsutis, foliis breviter petiolatis subglabris lanceolato-hastatis, pedunculis capillaceis passim cyrrhescens folia superantibus, laciniis calycinis lanceolatis margine scariosis acuminatis capsulâ subbrevioribus, calcare subrecto acuto. (I) in arenosis Corsicæ, Stæchadum, Telonis (cl. d'Urville). — Fl. fr. 5. p. 407. Ant. *cyrrhosum* L. Jacq. vind. t. 82. Fl. parvi cærulescentes. (v. s.)
- * * *Foliis integerrimis inferioribus verticillatis.*
10. *L. REFLEXA* (Desf. atl. 2. p. 42.) glabra, caulis patulis, foliis ovato-lanceolatis sessilibus glabris ternis, floralibus alternis, pedunculis axillaribus, fructiferis recurvatis, laciniis calycinis lanceolatis acuminatis capsulam subsuperantibus, calcare longissimo recto acuminato. (I) in Corsicâ ex Valle All. — Fl. fr. 3. p. 585. — All. misc. taur. 2. p. 205. t. 1. Fl. pallidè cærulescentes flavescentesve. (v. s. ex Neap.)
11. *L. TRIPHylla* (Mill. dict. n. 2.) glabra, caulis erectis, foliis ternis ovatis obtusis trinerviis, spicâ terminali, floribus subsessilibus, laciniis calycinis lanceolatis ovatisque obtusis capsulam subæquantibus, calcare acuto incurvo. (I) in Corsicâ (Soleiro), Santoniâ? ex Lam. — Fl. fr. 3. p. 585. Ant. *triphyllum* L. — Bocc. sic. p. 45. t. 22. Cor. pallidè purpurascens palato flavo. (v. s.)
12. *L. THYMROLIA* (DC. fl. fr. 3. p. 587.) glaberrima, caulis procumbentibus,







- foliis ovalibus obtusis oppositis ternatisque glabris, floribus capitatis, laciniis calycinis spathulato-ovatis obtusis capsula brevioribus, calcare subrecto subacuto. \mathcal{L} in arenosis maritimis Galliae austro-occidentalis usquè ad ostium Garumnae. — Ant. thymifolium Vahl. Lois. gall. t. 10. Fl. flavi. (v. v.)
13. L. PELISSERIANA (DC. fl. fr. 3. p. 589.) glabra, caule erecto subsimplici, foliis surculorum steriliū ternis lanceolatis ovatis, caulinis linearibus, superioribus alternis, floribus pedunculatis racemoso-capitatis, pedunculis bracteas subæquantibus, calycis laciniis linearibus acuminatis capsulam superantibus, calcare longissimo recto acuto. \mathcal{L} in saxosis rupestribus Galliae occidentalis, mediae australisque. — Ant. Pelisserianum L. sp. 855. Ant. gracile Pers. ench. 2. p. 156. — Barr. ic. t. 1162. Fl. parvi purpurei. (v. v.)
14. L. ARVENSIS (DC. fl. fr. 3. p. 588.) caule erecto ramoso, foliis linearibus inferioribus quaternis, floribus racemosis, calycis glanduloso-viscosi laciniis linearibus acutis capsula brevioribus, calcare incurvo acuto. (I) in arvis cultis præsentim in proy. australibus. — L. arvensis a Desf. — Dill. elth. t. 163. f. 198. Fl. minimi cærulecentes. (v. v.)
15. L. SIMPLEX (DC. fl. fr. 3. p. 588.) caule erecto simplici basi glabro apice glanduloso-pubescente, foliis sublinearibus inferioribus quaternis, floribus racemosis, calycis glanduloso-viscosi laciniis spathulato-linearibus obtusis capsula brevioribus, calcare recto subobtuso. (I) in Gallia australi passim. — L. arvensis / Desf. Ant. simplex Wild. A. parviflorum Jacq. ic. rar. 3. t. 499. non Desf. Fl. minimi flavi. An à priori satis distincta sp? (v. s.)
16. L. ARENARIA (DC. ic. rar. t. 14.) pubescens-viscosa, caulinis ramosis numerosissimis diffusis, foliis lanceolato-linearibus acutis sparsis, inferioribus verticillatis oblongis obtusis, floribus subpedunculatis, bracteis pedunculum multò superantibus, spicula elongatâ, calycis subhirsuti laciniis lanceolato-linearibus acutis capsulam subæquantibus, calcare recto acuto. (I) in Armorica et Neustria usquè ad Cherbourg arenosis maritimis. — Fl. fr. 5. p. 409. Fl. lutei minimi. (v. v.)
17. L. SAXATILIS (DC. fl. fr. 3. p. 590.) pubescens-viscosa, caule decumbente, foliis lanceolato-linearibus sparsis villosa-viscosa, inferioribus verticillatis ovatis obtusis subpetiolatis, floribus spicatis, calycis laciniis lanceolato-ovatis acutis. \mathcal{L} in Armorica maritimis. — Ic. rar. t. 13. Fl. fr. 5. p. 409. Fl. parvi flavi. (v. s.)
18. L. SUPINA (Desf. atl. 2. p. 44.) caule diffuso apice subpiloso, foliis glaucis subquaternis linearibus superioribus sparsis, floribus racemoso-capitatis, calycis laciniis sublinearibus obtusis capsula brevioribus, calcare recto acuto. (I) in arenosis Galliae mediae, australis occidentalisque. — Fl. fr. 3. p. 588. Ant. supinum Lin. L. Thuillierii. Mer. fl. par. 240. — Clus. hist. 1. p. 321. ic. Fl. flavi. (v. v.)
- $\beta.$ *pyrenaica* (Lapeyr.) foliis inferioribus lanceolato-linearibus, caulis apice calycibusque glanduloso-pilosus. — In Pyrenæis et Alpibus. — L. Pyrenaica Fl. fr. 3. p. 587 et 5. p. 408. Ic. rar. t. 11. A. glaucum Lapeyr. abr. 352. non L. ex cl. Arnott. (v. v.)
- $\gamma.$ *maritima*, foliis omnibus verticillatis, laciniis calycinis ovato-oblongis. — In maritimis Galliae occidentalis. — L. maritima DC. syn. p. 232. ic. rar. t. 12. Fl. fr. 5. p. 408. (v. v.)
19. L. FLAVA (Desf. atl. 2. t. 136.) caulinis subdiffusis, foliis lanceolatis alternis, inferioribus ovatis ternis oppositisque, floribus capitatis, calycis glabri laciniis linearibus acutis, calcare recto acuto. (I) in Corsicâ. — Fl. fr. 3. p. 729. Fl. flavi. An L. supinæ var? (y. s. specimen imperf.)
20. L. JUNCEA (Desf. atl. 2. p. 43.) caulinis gracilibus ramosis virgatis, foliis linearibus carnosis alternis, infimis ternis, floribus pedunculatis racemosis, calycis glabri laciniis linearibus subobtusis capsulam subæquantibus, calcare recto acuto. (I) in arenosis et inter segetes circâ Aquas-Tarbellicas et Burdigalam (Des Moulins). — Fl. fr. 3. p. 729. Ant. junceum L. sp. 858. Ant. sparsum L. sp. 854. Fl. flavi. (v. v. D.)

21. *L. ALPINA* (DC. fl. fr. 3. p. 590.) glabra, caule diffuso patulo, foliis quaternis linearibus glaucis, inferioribus ovalibus, floribus racemosis, calycis laciniis linear-lanceolatis linearibus acutis capsulam subæquantibus, calcare recto acuto. (2) in Jurasso, Alpibus et Pyrenæis. — Ant. alpinum L. sp. 856. — Clus. hist. 1. p. 222. f. 2. Fl. purpurei palato flavescente. (v. v.)
22. *L. PURPUREA* (Mill. dict. n. 5.) glabra, caule erecto ramoso, foliis linearibus quaternatim verticillatis, superioribus alternis, floribus pedunculatis racemosiscatis, pedunculis bracteâ brevioribus, calycis laciniis linearibus capsulâ brevioribus, calcare incurvo acuto. (2) in collibus circâ Fontembellaqueum ex Merat, Beauvais ex Graves et propè S.-Omer ex cl. Desmazières. — Fl. fr. 5. p. 407. — Dod. pempt. 183. f. 2. Fl. purpurei. (v. s. ex Italiâ.)
23. *L. STRIATA* (DC. fl. fr. 3. p. 586.) radice repente, caulinibus paniculatis suberectis, foliis linearibus confertis alternis sparsisque infimis verticillatis, calycis glabri laciniis lanceolatis acutis capsulâ brevioribus, calcare brevi recto obtuso. (2) in campis sterilibus, ad muros Galliæ medieæ, australis occidentalisque. — Ant. monspessulanum et A. repens L. sp. 854. — Dill. elth. t. 163. f. 197. Flores striati cærulescentes albescentesve. (v. v.)
24. *L. VERSICOLOR* (Moench. meth. 523.) caule erecto spicato apice glandulos-viscoso, foliis linear-lanceolatis linearibusve, inferioribus ternis quaternisque, pedunculis calycibus villoso-viscidis, laciniis linear-spathulatis capsulam superantibus, calcare recto acuto. (1) in Galliâ australi? — Fl. fr. 3. p. 586. Ant. versicolor Jacq. ic. rar. 1. t. 116. (v. s. c.)
25. *L. CHALEPENSIS* (Mill. dict. n. 12.) glabra, caule erecto, foliis linear-lanceolatis linearibusve alternis inferioribus verticillatis, floribus racemosis, calycis corollâ longioris laciniis linearibus acutis, calcare longissimo gracili acuto deflexo. (1) in cultis circâ Monspelium? — Fl. fr. 3. p. 589. — Triumf. obs. t. 87. f. 2. Fl. albescentes. (v. s. ex Orient.)

*** *Foliis omnibus alternis integerrimis.*


26. *L. VULGARIS* (Moench. meth. 524.) caule erecto, foliis lanceolatis linearibus acutis confertis, spicis terminalibus, calycis laciniis linearibus acutis capsulâ brevioribus, calcare subrecto acuto. (2) in ruderatis. — Fl. fr. 3. p. 592. Ant. Linaria L. sp. 858. — Cam. epit. 930. ic. Fl. flavi. (v. v.)
27. *L. GENISTIFOLIA* (Mill. dict. n. 14.) caule suprà paniculato virgato flexuoso, foliis lanceolatis acuminatis, calycis laciniis linearibus acutis capsulam subæquantibus, calcare recto acuto. (2) in Pyrenæis, Delph., Alsatiâ ex Mapp. — Fl. fr. 3. p. 591. — Clus. hist. 1. p. 322. f. 1. (v. s.)

VI. SCROPHULARIA Tourn. t. 74. L. gen. n. 756.

Calyx 5-lobus; corolla globosa, limbo coarctato bilabiato, suprà biloba squamâ intùs sàpè interjectâ, infra brevior 3-loba; stigma unicum; capsula subrotunda acuminata, valvis integris basi introflexis, disseppimento duplo.

1. *S. PEREGRINA* (L. sp. 866.) caule 4-6-angulo, foliis cordatis dentatis lucidis inferioribus petiolatis, pedunculis axillaribus 2-4-floris, calycis laciniis lanceolatis acutis. (1) in umbrosis et rupestribus Corsicæ, Niceæ ex All., Gallo-prov., Occitanie, circâ Aquas Tarbellicas, Diuan Armoraciæ (cl. de Bré-bisson). — Fl. fr. 3. p. 580. — Cam. hort. t. 43. (v. v.)
2. *S. VERNALIS* (L. sp. 864.) foliis cordatis pubescentibus duplicato-serratis petiolatis, paniculis axillaribus dichotomis, calycis laciniis lanceolatis obtusis, capsulâ ovatâ. (2) in Galliâ Narbonensi ex Lam., in Pyreneis propè St.-Beat ex cl. Benth., circâ Bellovacum ex cl. Graves, Cadomum ex cl. de Bréb., Rothomagum (cl. Le Prévost). — Fl. fr. 3. p. 579. — Barr. ic. t. 273. (v. s.)
3. *S. AQUATICA* (L. sp. 864.) foliis cordatis lanceolatis glabris crenatis petiolatis decurrentibus obtusis, caule membranis angulato, racemis terminalibus,





- pedunculis 6-10-floris, calycis glabri laciñiis rotundato-ovatis margine scariosis. (2) ad ripas et in aquaticis. — Fl. fr. 3. p. 579. Fl. dan. t. 507. (v. v.)
4. S. SCORODONIA (L. sp. 864.) foliis cordatis triangularibus duplicato-serratis pubescentibus acutis petiolatis, pedunculis axillaribus 3-chotomis 5-12-floris, calycis pubescentis laciñiis rotundis obtusissimis margine scariosis. ♀ in humidis Niceæ ex All., circà Cherbourg (cl. Le Prévost). — Fl. fr. 3. p. 580. — Moris. s. 5. t. 35. n. 6. (v. s.)
5. S. NODOSA (L. sp. 863.) foliis glabris cordatis lanceolata-ovatis acutis dentatis petiolatis, caule obtusangulo, calycis glabri laciñiis rotundato-ovatis non scariosis, pedunculis sub 5-floris. ♀ in umbrosis succulentis. — Fl. fr. 3. p. 579. — Cam. epit. 866. ic. (v. v.)
6. S. SCOROLII (Hop. exs. Pers. enc. 2. p. 160.) caulis obtusè 4-gonis, foliis pubescentibus petiolatis inferioribus ternatis cordatis crenato-dentatis, superioribus lanceolatis argutè dentatis, floribus racemoso-paniculatis, pedunculis sub 10-floris, pedicellis elongatis, calycis glabri laciñiis rotundato-ovatis obtusis margine scariosis. ♀ in umbrosis Pyrenæorum. — Fl. fr. 5. p. 406. S. auriculata Scop. carn. t. 32. (v. v.)
7. S. TRIFOLIATA (L. sp. 865.) foliis glabris, inferioribus ternato-pinnatis obtusis, superioribus simplicibus inciso-crenatis, laciñiis calycinis rotundatis obtusissimis, pedunculis axillaribus ramosis 3-6-floris. (2) in Corsicâ ex Linneo. — Fl. fr. 3. p. 581. — Pluck. t. 313. f. 6. (v. s. e.)
8. S. SAMBUCIFOLIA (L. sp. 865.) caule glabro obsoletè tetragono, foliis petiolatis, inferioribus interrupte pinnatis foliolis 5-7 inæqualibus ovato-cordatis glabris crenatis, petiolis appendiculatis, superioribus ovatis crenatis indivisis aut basi incisis appendiculatis, pedunculis axillaribus 3-5-floris, laciñiis calycinis rotundis obtusis margine scariosis, capsulâ ovato-acuminatâ. ♀ in Corsicâ. — Moris. s. 5. t. 8. n. 6. Fl. magni. (v. s.)
9. S. AURICULATA (L. sp. 864.) caule 4-gono, foliis oblongis cordatis subtus hirsutis duplicato-dentatis basi appendiculatis, paniculâ racemosâ terminali, pedunculis multifloris, calycis laciñiis rotundis margine scariosis. ♀ in agro Nicæensi ex All. — Fl. fr. 3. p. 580. — Lob. ic. t. 533. f. 1. (v. s. c.)
10. S. LUCIDA (L. sp. 865.) foliis inferioribus petiolatis subcarnosis glaberimis bipinnatis laciñiis ovato-rotundis crenatis, superioribus sessilibus, foliolis pinnatifidis lobatis, floribus racemoso-paniculatis, pedunculis sub 5-floris, laciñiis calycinis rotundato-ovatis margine pellucido scariosis, corollæ palato subtus appendiculato. (2) ♀? in arenosis Niceæ ex All. — Fl. fr. 3. p. 582. — Bocc. mus. 2. p. 166. t. 117. (v. s. ex littore Genuensi.)
11. S. CANINA (L. sp. 865.) foliis pinnatis, pinnis indivisis lobatisve lanceolatis dentatis, summis confluentibus, racemo terminali subnudo, pedunculis 4-8-floris, bracteis minimis, calycis laciñiis ovato-rotundis obtusis margine pellucido-scariosis. ♀ in lapidosis et sterilibus. — Fl. fr. 3. p. 582. Clus. hist. 2. p. 209. f. 1. (v. v.)
12. S. RAMOSISSIMA (Lois. 2. p. 381.) caule suffruticoso ramosissimo ramis patulis, foliis subcarnosis glabris lanceolatis, inferioribus pinnatifidis inciso-dentatis superioribus denticulatis sessilibus, floribus racemosis, pedunculis simplicibus 1-floris medio 2-bracteolatis, calycis laciñiis rotundis obtusis margine scariosis. ♂ in Corsicæ, Niceæ et Galloprovinciæ orientalis arenosis maritimis. — Fl. fr. 5. p. 406. S. frutescens Fl. fr. 3. p. 729. excl. syn. (v. v. D.)

VII. ERINUS L. gen. n. 771.

Calyx 5-fidus; corolla tubulosa limbo plano 5-lobo subæquali, laciñiis apice cordato-emarginatis; capsula ovata 2-valvis valvis apice 2-fidis, marginibus valvarum inflexis 2-locularis.

1. E. ALPINUS (L. sp. 878.) floribus racemosis, foliis spathulatis. ♀ in montium locis lapidosis apricis. — Fl. fr. 3. p. 578. et 5. p. 405. Lam. ill. t. 521. — Barr. ic. t. 1123. (v. v.)

++ *Stamina 4 didynama; capsula unilocularis.*

VIII. LINDERNIA *All. misc. 3. p. 178. L. mant. p. 252.*

Calyx 5-partitus; cor. tubulosa ringens suprà brevissima emarginata, infrà 3-fida inæqualis; stamna 4 didynama: filamenta breviora apice 2-dentata, altero dente nudo, altero antherifero; stigma emarginatum.

I. L. PYXIDARIA (*All. l. c.*) foliis oblongo-ovatis integerrimis sessilibus, pedunculis axillaribus solitariis unifloris. (I) in paludibus spongiosis inundatis Galliae occidentalis, mediæ, borealis orientalisque passim. — Fl. fr. 3. p. 577. *Capraria gratiolooides L. sp. 876.* — Lind. als. 1. p. 152. t. 1. (v. v. DC.)

IX. LIMOSELLA *L. gen. 776.*

Calyx 5-fidus irregularis; corolla campanulata minima 5-loba subæqualis; stamna 4 aut abortu 2; stigma globosum, ovarium basi 2-loculare apice 1-loculare; capsula ovoidea.

I. L. AQUATICA (*L. sp. 881.*) foliis lanceolato-spathulatis, scapis foliis brevioribus. (I) in inundatis ad fluviorum ripas Gall. occid., mediæ, borealis orientalisque passim. — Fl. fr. 3. p. 576. — Lind. als. 156. t. 5. (v. v.)

Ordo LXXI. OROBANCHEÆ *Juss. ann. mus. 12. p. 445.*

Calyx monosepalus bracteatus, aliquandò profundè in lacinias bracteiformes divisus. Corolla hypogyna monopetala irregularis limbo bilabiato. Stam. 4 corollæ inserta; filamenta 2 longiora. Ovarium simplex liberum 1-loculare polyspermum; stylus unicus. Stigma simplex aut bilobum. Capsula 1-locularis 2-valvis, valvulis liberis in nervo longitudinali seminiferis. Albumen carnosum aut subcorneum in parte superiori lateraliter embryonem parvum foveans. — Herbæ luridæ subcarnosæ sæpius parasiticæ, caulinis mox nudis mox squamosis, foliis mox radicalibus, mox caulinis squamiformibus, floribus terminalibus solitariis spicatisve bracteatis.

I. OROBANCHE *L. gen. 779. Wallr. diaskeue. p. 28. Vaucher monog. p. 1.*

Calyx 1-2-partitus, bracteis 1-3-suffultus; corolla monopetala tubulosa ringens 4-5-fida; stamna 4 didynama; stylus 1; stigma capitatum emarginato-bilobum; ovarium basi glandulosum.

Sect. I. OSPROLEON *Wallr. l. c. p. 21. Vauch. l. c. p. 37.*

Calyx 1-2-partitus, bracteâ 1 suffultus; corolla 4-fida, capsula lateraliter dehiscens. — Scapus simplicissimus.

I. O. RAPUM (*Thuil. par. ed. 2. p. 317.*) scapo in bulbum carnosum imbricatim-squamosum incrassato, squanis bracteisque superioribus ovato-oblongis hirsuto-glutinosis, laciinis calycinis duobus bifidis, lobis linearibus aquilibus, corollâ inflato-ventricosâ bilabiata, labio superiore 2-lobo, inferiore 3-lobo, stigmate bilobato lateo. (I) in sterilibus et argillosis Genistæ tinctoriæ





ræ parasitica. — Wall. l. c. p. 32. O. major Lam. ill. t. 551. DC. fl. fr. 3. p. 488 non L. O. Genistæ tinctoriæ Vauch. l. c. t. 1. — Moris. s. 12. t. 16. f. 2. n. 1. *Planta flavo-rubens*. (v. v.)

β. affinis, duplò triplòe gracilior, squamis basi dilatatis, floribus pancis abbreviatis, filamentis basi dilatatis. — *Genistæ sagittali parasitica*. — O. Genistæ-sagittalis Vauch. l. c. O. vulgaris Lam. dict. 4. p. 621? DC. fl. fr. 3. p. 489? An species?

2. O. FÆTIDA (Desf. atl. 2. t. 144?) scapo ultrà basin incrassato, squamis bracteisque ovato-oblongis remotis furfuraceo-hirsutissimis, laciniis calycinis in dentes lineares divisis, corollâ inflato-ventricosâ extus glanduloso-asperâ, labio superiore brevi subintegro, inferno trilobo, stigmate profundè diviso. \mathcal{U} in lapidosis Galloprovinciæ propè Mées, Pyren. Orientalium et Tolosæ ex Lapeyr., Vasconia (Des Moul.). — Fl. fr. 5. p. 392. O variegata Wallr. p. 40. O. Cytisi-scoparii Vauch. l. c. *Omnium maxima*; flores fulvi. (v. v. DC.)

3. O. CRINITA (Viv. cors. 11.) scapo basi squamis elongatis linearibus onusto, bracteis linearí-acuminatis externè hirsutis florem superantibus, corollâ 4-fidâ incurvâ subcylindricâ lobis rotundatis crenato-ciliatis, filamentis capsulâque glaberrimis, stigmate 2-lobo recurvo. \mathcal{U} in Corsicâ propè Bonifacio ex Viv. — An huic potius quam praecedenti referendum synon. Desf. (v. s.)

4. O. MAJOR (L. sp. 882. excl. syn. non DC.) bulbo mediocri squamoso, squamis lanceolatis non adpressis, laciniis calycinis bifidis, corollâ inflatâ bilabiata, stigmate bifido exerto, staminibus albidis subexsertis. \mathcal{U} in are-nosis Burdigalæ Ulici Europæ parasiticam reperiit cl. Des Moulins. — Eng. bot. t. 421. O. Ulicis-Europæi Vauch. l. c. *Planta albo-fusca*. (v. s.)

5. O. MEDICAGINIS, scapo ad basin vix inflato, squamis inferioribus numerosis lanceolatis nigrescentibus, superioribus abbreviatis paucioribus, laciniis calycinis 2-lobis, corollâ elongatâ, fance constrictâ, labio inferiore trilobo, superiore galeato subemarginato, stigmate bifido reflexo flavo-rubescente. \mathcal{U} Medicagini sativæ parasiticam reperiit cl. prof. Vaucher et nomine O. Medicaginis-sativæ designat l. c. t. 2. Pl. flavescentes.

6. O. MINOR (Sutt. trans. linn. 4. p. 178.) scapo ad basin incrassato modicè squamoso, bracteis lanceolatis pilosis, laciniis calycinis nunc simplicibus nunc bifidis, corollâ arcuato-cylindricâ, labio superiore rotundato-crenulato integro, inferiore trifido lobis æqualibus rotundato-crenulatis, staminibus ultrà basin corollæ insertis, antheris nigrescentibus, stigmate bilobo purpurascente transversè rimoso. \mathcal{U} in agris et pascuis Trifolio pratensi parasitica. — Fl. fr. 3. p. 489. eng. bot. t. 422. O. Trifolii-pratensis Vauch. l. c. t. 4. Flores pallidè violacei aut sordidè albescentes. (v. v.)

7. O. PRUINOSA (Lapeyr. abr. supp. 87.) scapo fistuloso piloso pruinoso-cæsio in bulbum mediocrem dilatato, squamis lanceolatis, bracteis angustis corollâ brevioribus, laciniis calycinis profundè et angustè bifidis, corollâ labiatâ, labiis ore plicatis, superiore bifido, inferiore trilobo lobis denticulatis, stigmate profundè diviso dilutè purpurascente. (I) in Pyrenaicæ orientalibus Fabæ parasitica. — O. Fabæ-sativæ Vauch. l. c. t. 5. Fl. albi. (v. v. c.)


8. O. EPIPHYMUM (DC. fl. fr. 3. p. 490.) scapo subæquali, squamis bracteisque lanceolatis, floribus patentibus sparsis glanduloso-viscidulis remotis, laciniis calycinis lanceolatis rarò bifidis, corollæ labio superiore rotundato-crenulato, inferiore trilobo, lobis obtusè crenatis, stigmate bilobo rubescente. \mathcal{U} in aridis montosis, parasitica in Thymum serpillum. — O. Thymi-Serpilli Vauch. l. c. t. 6. *Planta rubescens*. (v. v. DC.)

β. epithymoides, scapo subinflato, corollâ venosâ, labio superiore bilobo lobis superincumbentibus. — In sylvis Galloprov. prope Brignolles reperiit cl. Vaucher parasiticam Thymo vulgari et hanc habet ut speciem propriam quam nomine O. thymi-vulgaris designat mon. p. 53.

9. O. GALII, scapo mediocriter incrassato ad basin squamoso, squamis bracteisque lanceolatis nigrescentibus, laciniis calycinis lanceolatis vel irregula-

- riter bifidis, corollâ bilabiata inflatâ, labio superiore fornicate subemarginato, inferiore trilobo lobis rotundatis, filamentis inflexis, antheris nigrescentibus, stigmate bilobo atro-rubescente. ♀ in glareosis, Galio Mollugini, erecto etc. parasitica. — O. Galii-Molluginis Vauch. l. c. t. 7. Scapi rubelli; flores purpurascentes. (v. v.)
10. O. HEDERÆ (Vauch. orob. p. 56. t. 8.) scapo in bulbum parcè squamosum incrassato, squamis lanceolatis paucioribus, bracteis apice attenuatis reflexis, corollâ bilabiata, labio superiore integro, inferiore trilobo lobis rotundatis, laciniis calycinis subintegris, staminibus inferioribus approximatis, superioribus divaricatis, stigmate emarginato lutescente. ♀ Hederæ parasiticam in Vasconia reperiit cl. Des Monl. (v. s. ex Genuâ.)
11. O. RUBI, scapo in bulbum squamosum incrassato, pilis albidis non glandulosis onusto, squamis numerosis nigrescentibus, laciniis calycinis bifidis, corollæ labio superiore bifido, inferiore trilobo, lobis rotundatis erosis, staminibus suprà basin adnatis, stigmate bilobo lutescente. ♀ in Galloprovinciae arvis propè Luc, Rubo fruticoso parasiticam reperiit cl. Vauch. — O. Rubi fruticosi Vauch. l. c. t. 9. Scapi rubelli; flores dilutè lutei.
12. O. ERYNGII, scapo ad basin incurvato squamoso, squamis numerosis lanceolatis semi-adherentibus, laciniis calycinis profundè bifidis, lobis linearibus, corollæ labio superiore fornicate vix bifido, inferiore trilobo subuplicato, stigmate bilobo rubescente. ♀ in provinciis australibus detexit cl. Vaucher Eryngio campestris parasiticam et O. Eryngii-campestris nominat l. c. p. 58. t. 10. Scapi rubelli hirsuti; flores rubello-albidi.
13. O. CONCOLOR (Dub. mss.) scapo ad basin dilatato squamoso gracili, squamis numerosis lanceolatis luteo-nigrescentibus, floribus numerosis, laciniis calycinis hirsutis sèpè bifidis, corollâ bilabiata luteâ, labio superiore subbilobo, inferiore 3-lobo undulato, staminibus ovario stigmatisque bilobo luteis. ♀ — Scabiosæ columbariae, Chærophyllo sylvestri et Menthae arvensi parasiticam in Galloprov. ex Foro-Julii usquè ad Cannas reperiit cl. Vaucher et nomine O. Scabiosæ-columbariae designat mon. p. 59. t. 11. Planta omnis lutea.
14. O. ELATIOR (Sutt. trans. linn. 4. p. 178. t. 17.) scapo subæquali gracili piloso-glutinoso, squamis lanceolatis, floribus paucis remotis, laciniis calycinis bifidis, lobis linearibus, corollâ tubulosâ cylindricâ venosâ bilabiata, limbo plicato et fimbriato, labio superiore emarginato, inferiore trilobo, stigmate bifido subfuscō. ♀ in agris et sylvaticis Centaureæ Scabiosæ parasitica. — Fl. fr. 3. p. 490. O. Cent. scabiosæ Vauch. l. c. p. 61. ic. (v. v.)
15. O. RIGENS (Lois. gall. 384.) scapo glabro, squamis lanceolatis rigentibus imbricatis, staminibus infernè nudis, stigmate bilobo, lobis distantibus, stylo glaberrimo. ♀ in Corsicâ ex Lois. — Fl. fr. 5. p. 392. O. nudiflora Wallr. sched. crit. 1. p. 310? †
- Sect. II. TRIONYCHON Wallr. diask. p. 58. Vauch. monog. p. 65.
Calyx 4-5-fidus, bracteis 3 suffultus, corolla 5-fida; capsula apice dehiscens.
— Scapus simplex aut ramosus.
16. O. CÆRULEA (Vill. dauph. 2. p. 406.) scapo simplicissimo, squamis oblongis, calyce 4-fido lobis oblongo-linearibus capsulam superantibus, corollâ tubulosâ subæquali inclinata, labio superiore bilobo, inferiore 3-lobo, stigmate bilobo flavescente. ♀? (1) in agris et collibus Artemisiæ vulgari parasitica. — Fl. fr. 3. p. 490. eng. bot. t. 423. O. Artemisiæ-vulgaris Vauch. l. c. t. 14. Corolla violaceo-cærulescens. (v. v.)
17. O. COMOSA (Wallr. sched. crit. 1. p. 314.) scapo simpliciusculo, squamis bracteisque hirsutis, calyce lobis 4 lineariis, corollâ infundibuliformi tubulosâ in faucom palato striis villosis exaratam ampliatâ, 5-fidâ lobis rotundatis inferiore minore, antheris demùm pilosis, stigmate bilobo griseorufescente. (1)? in provinciis australibus plurimis plantis parasitica. — O. vagabunda Vanch. l. c. t. 15. Scapus cærulescens, corolla cærulea.





18. *O. RAMOSA* (L. sp. 882.) scapo ramoso parcè squinoso, calyce suburceolato 4-fido, lobis ovatis acuminatis, corollâ infundibuliformi-tubulosâ, labio inferiore trilobo lobis æqualibus obtusis rotundatis, staminibus basi pubescentibus; stigmate emarginato albido. (I) in agris parasitica Cannabis sativæ. — Fl. fr. 3. p. 490. Lam. ill. t. 551. f. 2. eng. bot. t. 184. O. Cannabis Vauch. l. c. t. 16. — Moris. s. 12. t. 16. f. 7. n. 8. Corolla infernè flavescens apice cærulescens. (v. v.)

II. LATHRÆA Lin. gen. 743.

Calyx campanulatus 4-fidus; corolla tubulosa 2-labiata labio superiore galeato; stamina 4 didynama; ovarium basi glandulosum; stylus 1; stigma 2-lobum.

1. *L. CLANDESTINA* (L. sp. 843.) caule ramoso subterrestri, floribus erectis solitariis. 2 in umbrosis Galliæ præsertim occidentalis. — Fl. fr. 3. p. 491. Lam. ill. t. 551. f. 1. (v. v.)

2. *L. SQUAMMARIA* (L. sp. 844.) caule simplicissimo, corollis pendulis, labio inferiore 3-fido. 2 in frigidis umbrosis. — Fl. fr. 3. p. 492. Fl. dan. t. 136. (v. v.)

Ordo LXXII. RHINANTHACEÆ DC. fl. fr. 3. p. 454. — Pediculares Juss. gen. 99.

Calyx divisus persistens sæpè tubulosus. Corolla hypogyna irregularis sæpè ringens, aestivatione imbricatâ. Stamina numero definita 2-4, corollæ inserta, bina interdùm breviora; antheræ in plerisque basi bisetosæ. Ovarium liberum; stylus simplex. Capsula 2-locularis 2-valvis valvulis coalitis disseplimento medio seminifero. Albumen carnosum; embryo rectus; cotyledones semiteretes. — Herbæ sæpè siccitate nigrescentes; folia opposita aut alterna; flores singuli bracteati axillares aut spicati. — Ordo nimis Antirrhineis affinis et probabiliter ut vult cl. Brown cum illis conjungendus.

Trib. I. PEDICULARINEÆ.

Corolla irregularis plerumquè bilabiata; stam. 4 didynama.

I. *TOZZIA* Mich. gen. t. 16. *L.* gen. 745. *St-Hil. mém. mus. ann.* 7. p. 98.

Calyx campanul. subbilabiatus 4-dentatus; corolla tubulosa limbo 2-labiato subæquali, suprà 2-lobo infrà 3-lobo; stam. 4 didynama; antheræ basi setulâ aristatæ; ovarium 2-loculare loculis 2-spermis, ovlis oblongis per totam ferè longitudinem affixis infernè liberis; capsula sphærica 2-valvis abortu 1-sperma.

1. *T. ALPINA* (L. sp. 844.) caule debili, floribus axillaribus in spicas foliosas interruptis dispositis. 2 in asperis humidis Jurassi, Alpiam et Pyrenæorum rariüs. — Fl. fr. 3. p. 487. Lam. ill. t. 522. — Col. eephr. 2. p. 49. t. 50. (v. v.)

II. MELAMPYRUM L. gen. 742.

Calyx tubulosus 4-fidus; corolla tubulosa 2-labiata compressa labio superiore galeato margine replicato, inferiore sulcato 3-fido; stamina 4 didynama; capsula oblonga obliquè acuminata compressa, loculis monospermis; semina magna subovoidea.

1. *M. ARVENSE* (L. sp. 842.) foliis linearibus, bracteis ovatis dentato-setaceis coloratis, spicis conicis laxis, calycis pubescentis laciniis scabris lanceolato-linearibus aristato-acuminatis capsulâ longioribus. (I) in agris. — Fl. fr. 3. p. 485. Fl. dan. t. 911. (v. v.)
2. *M. CRISTATUM* (L. sp. 842.) foliis linearibus, bracteis cordatis compactis denticulatis imbricatis, spicis quadrangularibus, calycis laciniis linearibus acutis. (I) in sylvaticis. — Fl. fr. 3. p. 485. Fl. dan. t. 1104. (v. v.)
3. *M. NEMOROSUM* (L. sp. 843.) foliis lanceolato-ovatis, bracteis dentatis cordato-lanceolatis, summis coloratis sterilibus, floribus secundis lateralibus, calycis lanati laciniis lanceolatis ovatisve acuminatis capsulâ subbrevioribus. (I) in Delphinatûs, Jurassi, agri Ligericini (Prost) montibus. — Fl. fr. 3. p. 486. Fl. dan. t. 305. (v. s.)
4. *M. PRATENSE* (L. sp. 843.) foliis elongato-lanceolatis superioribus basi pinnatifido-incisis, floribus axillaribus secundis, calycis laciniis linearibus acuminatis capsulâ brevioribus, corollis clausis. (I) in pratis usquè ad limitem inferiorem abietis. — Fl. fr. 3. p. 486. (v. v.)
5. *M. SYLVATICUM* (L. sp. 843.) foliis elongato-lanceolatis superioribus basi inciso-dentatis inferioribus integerrimis, calycis laciniis lanceolatis linearilanceolatisve acutis capsulam subæquantibus, corollis hiantibus. (I) in sylvis montosis supra limitem inferiorem abietis. — Fl. fr. 3. p. 488. — Fl. dan. t. 145. (v. v.)

III. PEDICULARIS L. gen. 746.

Calyx ventricosus, plerūmque 5-fidus vel inæqualiter 2-3-lobus; **corolla** tubulosa 2-labiata labio superiore compresso galeato elongato sæpius emarginato, inferiore plano patulo 3-lobo; **stam.** 4 didynama; **capsula** compressa acuminata sæpè obliqua et calyce longior.

* *Foliis quaternis.*

1. *P. VERTICILLATA* (L. sp. 846.) foliis caulinis pinnatifidis quaternis, pinnis oblongis dentatis, floribus verticillato-capitatis breviter pedicellatis, calycibus 5-dentatis, corollæ galeâ rectâ obtusâ labium inferius subæquante. ♀ in Alpibus, montibus Arverniae, Cebennis, Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 481. — Hall. helv. t. 9. f. 1. (v. v.)

* * *Corollæ labio superiore utrinquè infrâ medium dentato.*

2. *P. PALUSTRIS* (L. sp. 845.) caule ramoso, foliis pinnatis pinnis lanceolatis pinnatifidis dentatis, calycibus 2-partitis cristatis demùm ovatis inflatis, corollæ labio superiore infrâ medium denticulato, galeâ dilatata gibbâ obtusa truncatâ. (I) in paludibus. — Fl. fr. 3. p. 479. Lam. ill. t. 517. f. 1. — Riv. t. 92. (v. v.)


* * * *Corollæ labio superiore basi edentulo rostrato.*

3. *P. ROSTRATA* (L. sp. 845.) canle declinato, foliis pinnatis, pinnis oblongis pinnatifidis dentatis, racemo paucifloro, calyce cylindrico 5-fido dentibus dilatatis serratis, corollæ galeâ falcato-rostratâ. ♀ in Alpibus et Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 481. — Hall. helv. t. 8. f. 1. (v. v.)

4. *P. INCARNATA* (Jacq. aust. t. 140.) foliis profundè pinnatifidis, pinnis lineari-lanceolatis subpinnatifidis laciniis inæqualibus tenuissimè serrulatis, spicâ laxâ, calycibus villosis 5-fidis, corollæ galeâ falcato-rostratâ. (I) in Alpibus Delph. et Galloprov. — Fl. fr. 3. p. 480. All. ped. t. 3. f. 2. (v. v. DC.)

5. *P. TUBEROSA* (L. sp. 847.) caulis ascendentibus, foliis pinnatis, pinnis profundè pinnatifidis laciniis denticulatis, spicâ laxiusculâ, calyce campanulato 5-fido glabriusculo, corollæ galeâ falcato-rostrata. ♀ in Alpibus et Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 483. — Hall. helv. t. 10. (v. v.)

6. *P. GYROFLEXA* (Vill. dauph. 2. p. 426. t. 9.) caule hirsuto, foliis pinnatis pinnis profundè pinnatifidis, laciniis denticulatis, calyce pubescente 5-fido





dentibus serratis, corollæ galeâ arenatâ, rostro brevi conico. \mathcal{U} in *Alpibus Delphin., Galloprovinciæ.* — Fl. fr. 3. p. 481. — Hall. helv. t. 11. (v. v. DC.)

* * * * * *Corollæ labio superiore basi edentulo, galeâ brevi apice bidentatâ.*

7. P. SYLVATICA (L. sp. 845.) canle basi ramoso, foliis pinnatis, pinnis ovatis acutè dentatis, spicâ pauciflorâ, calyce glabro 5-dentato fructifero inflato, corollæ galeâ obtusissimâ 2-dentatâ. (1) in *sylvis paludosis.* — Fl. fr. 3. p. 479. — Lob. ic. t. 748. f. 2. (v. v.)
8. P. COMOSA (L. sp. 847.) radice fasciculatâ, foliis pinnatis, pinnis pinnatifidis laciiniis linearibus integris aut subincisis, calycibus 5-dentatis, corollæ galeâ obtusâ 2-dentatâ. \mathcal{U} in *Alpibus, montibus Arverniæ, Ligeris (Lozère), Pyrenæorum.* — Fl. fr. 3. p. 484. All. ped. t. 4. f. 1. Stev. mon. ped. t. 14. P. asparagooides Lapeyr. — Fl. flavi. (v. v.)

$\beta.$ rubens (Stev.) corollâ purpureâ. — P. fasciculata Wild. sp. 3. p. 218. — Fl. fr. 3. p. 482. (v. v. DC.)

* * * * * *Corollæ labio superiore omnino edentulo, galeâ brevi.*

9. P. ROSEA (Jacq. ic. rar. 1. t. 115.) foliis pinnatis, pinnis linearibus integris aut pinnatifidis acutis, calyce hirsuto tubuloso inæqualiter 5-dentato, corollæ galeâ obtusâ. \mathcal{U} in *Alpibus editoribus Delph. et Galloprov.* — Fl. fr. 3. p. 482. — P. hirsuta All. ped. t. 3. f. 1. (v. s.)

10. P. FOLIOSA (L. mant. 86.) foliis pinnatis, pinnis pinnatifidis laciiniis lanceolatis inæqualiter denticulatis, spicâ foliosâ, calyce obliquo 5-dentato, corollæ galeâ obtusissimâ. (2) in *summis Vogesis (Mougeot), Alp. Delph., Arverniæ montibus ex Delarb., Pyrenæis.* — Fl. fr. 3. p. 482. — Hall. helv. t. 9. f. 3. (v. v. DC.)

IV. RHINANTHUS Sm. brit. 649. — Rhinanthe sp. L.

Calyx 4-fidus ventricosus; corolla tubulosa 2-labiata, labio superiore compresso, inferiore plano 3-lobo; stamina 4 didynama; capsula compressa obtusa calyce tecta; semina compressa marginata.

1. R. GLABRA (Lam. fl. fr. 2. p. 352.) calycibus glabris. (1) in *pratis.* — Fl. fr. 3. p. 478. R. crista-galli α et β . L. sp. 840. — Riv. t. 92. (v. v.)
2. R. HIRSUTA (Lam. fl. fr. 2. p. 353.) calycibus villosis. (1) in *pratis siccis.* — Fl. fr. 3. p. 478. R. crista-galli γ . L. sp. 840. Prioris var? (v. v.)

V. BARTSIA L. gen. 739.

Calyx non ventricosus 4-fidus; corolla tubulosa 2-labiata; labium superius galeatum ericum integrum, inferius reflexum 3-fidum minimum; stamina galeâ breviora, antheræ tomentosæ; capsula ovata compressa acuminata.

Sect. I. BARTSIA Stev. mon. ped. p. 4.

Corolla brevissimè 2-labiata, semina membranacea striata.

1. B. ALPINA (L. sp. 839.) foliis oppositis ovato-cordatis obtusè serratis, dentibus crebris, florum spicâ simplici subinterruptâ foliaceâ, bracteis calycem superantibus, antheris hirsutis, capsulâ pilosâ calycem superante. \mathcal{U} in *editoribus Vogesi, Jurassi, Alpium, montium Arverniæ, Pyrenæorum.* — Fl. fr. 3. p. 476. — Fl. dan. t. 43. (v. v.)
2. B. SPICATA (Ram. bull. phil. n. 42. p. 141. t. 10. f. 4.) foliis oppositis cordiformibus obtusè dentatis superioribus lanceolatis, dentibus remotis, floribus imbricato-spicatis, spicâ ramosâ, bracteis calyce subbrevioribus, staminibus galeam subæquantibus, antheris hirsutis, capsulâ hirsutâ calycem subæquante. \mathcal{U} in *Pyrenæis.* — Fl. fr. 3. p. 476. B. Fagonii Lapeyr. (v. s.)

Sect. II. TRIXAGO Stev. l. c.

Corollæ galea semicylindrica brevis, semina minuta non alata.

3. *B. PURPUREA* (Dub. mss.) caule subsimplici aut à basi ramoso, foliis ovatis dentato-palmatis, floribus spicatis, spicâ basi interruptâ foliaceâ, calycis villosi lacinii lanceolatis obtusis, antheris subglabris, capsulâ glabrâ calycem subæquante. (I) in Galliæ australis pascuis et ad ripas Aturis (cl. L. Dufour). — *Trixago purpurea* Stev. mon. ped. p. 4. *Euphrasia latifolia* L. sp. 841. Fl. fr. 3. p. 473. — Magn. monsp. p. 94. ic. (v. v.)
4. *B. VIScosa* (L. sp. 839.) caule subsimplici, foliis lanceolatis acuminatis grossè serratis, superioribus alternis, floribus distantibus lateralibus, calycis lacinii linear-i-lanceolatis elongatis subacutis, staminibus galeâ brevioribus, antheris hirsutis, capsulâ hirsutâ calyce duplò breviore. (I) in paludibus, ad rivulos à Nicaë usque ad Neustriam. — Fl. fr. 3. p. 477. — Barr. ic. t. 665. (v. v.)
5. *B. BICOLOR* (DC. ic. rar. t. 10.) pubescens, caule simplici aut subramoso, foliis oppositis lanceolato-linearibus hinc indè serratis, floribus densè spicatis, bracteis ovatis aut ovato-rotundis, calycis lanuginosi lacinii ovatis obtusis, antheris hirsutis, capsulâ villosâ calyce breviore. (I) in arenosis insularum Vindilis Armoricae (DC.), Reæ (Des Moul.) — Fl. fr. 5. p. 391. Semina striata non alata. (v. v. DC.)
6. *B. TRIXAGO* (L. sp. ed. 1. p. 602.) tomentosa, caule simplici, foliis oppositis lanceolatis obtuse serratis, floribus densè spicatis, bracteis ovato-rotundis, calycis lanuginosi dentibus minimis obtusis, antheris hirsutis, capsulâ villosâ calycem subæquante. (I) in Galliæ australioris maritimis humidis. — Fl. fr. 3. p. 476. — Moris. s. 11. t. 24. n. 8. Sem. striata. (v. v. DC.)
7. *B. VERSICOLOR* (DC. fl. fr. 3. p. 477.) hirsuta, caule simplicissimo, foliis oppositis, inferioribus linear-i-lanceolatis crenatis, superioribus linearibus inciso-serratis, spicâ densâ abbreviatâ, bracteis ovato-cordatis acuminatis, calycis lanuginosi dentibus obtusis, staminibus galeâ extùs hirsutâ brevioribus, antheris hirsutis. (I) circâ Antipolim (Stire). — *Rhinanthus versicolor* Wild. sp. 3. p. 190. — Barr. ic. t. 666. Fl. albido-purpurascentes. (v. s.)
8. *B. MAXIMA* (DC. fl. fr. 3. p. 728.) pubescens, caule ramoso, foliis superioribus alternis oblongis obtuse dentatis, floribus densè spicatis, bracteis rotundo-ovatis, calycis lanuginosi dentibus obtusis, stam. galeâ brevioribus, antheris hirsutis, capsulâ villosâ calyce subæquante. (I) in pascuis macilentis circâ Antipolim (Balbis), Nicaeam ex All? et Corsicæ ex Lois. Rhinanthus maximus Wild. sp. 3. p. 189. — Barr. ic. t. 774. n. 2. Semina striata. Fl. maximi. (v. s.)

VI. EUPHRASIA L. gen. 741.

Calyx 4-fidus; corolla tubulosa 2-labiata, labium superius galeatum emarginatum, inferius trilobum æquale; antheræ 2 aut 4 basi acuminatae; capsula ovata compressa obtusa emarginata.

Sect. I. EUPHRASIUM. — *Euphrasia* Stev. mon. ped. p. 4.

Antheræ 2 calcaratæ basi ciliatæ.


1. *E. OFFICINALIS* (L. sp. 841.) caule erecto ramoso, foliis ovatis dentatis dentibus acuminatis crenatis, lacinii calycinis lanceolatis acuminatis, staminibus galeâ brevioribus, lobis labii corollæ inferioris emarginatis. (I) in pascuis aridis. — Fl. fr. 3. p. 472. et 5. p. 390. Lam. ill. t. 518. f. 1. *Bartsia imbricata* Lapeyr. excl. L. syn. (v. v.)

β. Alpina, foliis setaceo-dentatis, calycis glabri lacinii linear-i-setaceis. — in Alpium et Pyren, pascuis aridis. — *E. Alpina* Lam. ill. t. 518. f. 2. Fl. fr. 3. p. 473. *E. Salisburgensis* Hop. (v. v.)

γ. minima, caule subsimplici minimo, foliis obtusis, lacinii calycinis lanceolatis. — In pascuis aridis Alpium et Pyren. — *E. minima* Jacq. Fl. fr. 3. p. 473. *Bartsia humilis* Lapeyr. ex cl. Benth. (v. v.)

Sect. II. ODONTITIS. — *Odontites* Dill. gen. 117. t. 6. Stev. l. c.

Antheræ omnes mucronatae.





2. *E. VISCOSEA* (L. mant. 86.) caulinibus erectis ramosis, foliis linear-lanceolatis trinerviis subintegerrimis, calycibus viscoso-pubescentibus, stam. exsertis galea brevioribus, lobis lateralibus labii corollæ inferioris emarginatis, capsula hirta calycem æquante. (I) in Galliæ australis sterilibus. — Fl. fr. 3. p. 475. — Garid. aix. t. 80. (v. v.)
3. *E. LUTEA* (L. sp. 842.) caule erecto ramoso, foliis lanceolato-linearibus serratis, superioribus integerrimis, calycibus pubescentibus, staminibus exsertis corollâ longioribus, lobis lateralibus labii corollæ inferioris denticulatis, capsula hirsuta calyce breviore. (I) in aridis montosis Galliæ orientalis, mediae australisque. — Fl. fr. 3. p. 474. Jacq. austr. t. 398. (v. v.)
4. *E. LINIFOLIA* (L. sp. 842.) caule erecto ramoso, foliis linearibus omnibus integerrimis, calyce glabro aut adpressè pubescente, staminibus exsertis corollâ longioribus, capsula hirsuta calyce subsuperante. (I) in aridis Galliæ australis et vallium apicarum Alpium. — Fl. fr. 3. p. 475. — Col. ecphr. 2. p. 68. t. 69. (v. v.)
5. *E. CORSICA* (Lois. gall. 2. p. 367.) canle basi prostrato ramoso, foliis linearibus integerrimis, floribus axillaribus subspicatis, calycibus corollam subæquantibus. (I) in montibus Corsicæ. — Fl. fr. 3. p. 391. — Flores ut in 3 præced. lutei (v. s.)
6. *E. Verna* (Bell. app. 33.) canle ramoso, foliis elongato-lanceolatis laxèque dentatis, bracteis flore longioribus, calyce subhirsuto, lobis labii corollæ inferioris obtusis. (I) in arvis Narbonæ. — Fl. fr. 5. p. 390. — Fl. vere. (v. s.)
7. *E. ODONTITES* (L. sp. 841.) canle erecto ramoso, foliis linear-lanceolatis serratis, bracteis flore subbrevioribus, calyce hirsuto, lobis labii corollæ inferioris obtusis. (I) in arvis pascuisque sterilibus. — Fl. fr. 3. p. 474. excl. var. β. — Fl. dan. t. 625. (v. v.)

VII. SIBTHORPIA L. gen. 775.

Calyx 5-partitus; corolla subrotata, tubo brevi, limbo regulari 5-lobo; stamina 4 didynama; stigma capitatum; capsula compressa orbicularis apice dehiscens.

1. *S. EUROPEA* (L. sp. 880.) caulinibus gracilibus diffusis procumbentibus, foliis reniformi-cordatis longè petiolatis. 2. in uidis aggeribus, ad margines rivulorum Galliæ occidentalis. — Fl. fr. 3. p. 472. — Pluck. t. 7. f. 6. (v. v. DC.)

Trib. II. VERONICEÆ.

Stam. 2; cor. rotata inæqualis.

VIII. VERONICA Tourn. t. 60. L. gen. n. 25.

Calyx 4-rarò 5-partitus; corolla rotata 4-loba inæqualis; capsula compressa, ovata aut obcordata.

§. 1. Annuæ, pedunculis solitariis 1-floris.

1. *V. Cymbalaria* (Bod. diss. 1798.) caule ramoso diffuso, foliis rotundis subcordatis sub 5-7-lobis petiolatis florum pedunculis brevioribus, laciinis calycinis ovalibus obtusis ciliatis capsulam obcordatam lateraliter hirsutam subsuperantibus, seminibus in quoque loculo binis magnis umbilicato-concavis margine corrugatis dorso læviusculis. (I) in cultis et muris vetustis Telenonis, Monspelii. — Fl. fr. 5. p. 389. Viv. fragm. 1. t. 16. f. 1. — Buxb. cent. 1. p. 25. f. 2. (v. s.)
2. *V. HEDERÆFOLIA* (L. sp. 19.) caule ramoso patulo, foliis rotundato-cordatis petiolatis sub 5-lobis florum pedunculos subsuperantibus, laciinis calycinis ovato-cordatis ciliatis capsulam glabram cordatam superantibus, seminibus in quoque loculo binis umbilicato-concavis extùs corrugatis. (I) in ruderatis, agris, hortis. — Fl. fr. 3. p. 467. — Fl. dan. t. 428. (v. v.)
3. *V. FILIFORMIS* (Savi. bot. et. 1. p. 15.) caulinibus diffusis prostratis, foliis

- ovatis subcordatis grossè dentatis pedunculis duplò triplò brevioribus, laciniis calycinis lanceolatis divaricatis capsulam obcordatam ciliatam superantibus, seminibus plurimis umbilicato-concavis extùs corrugatis. (I) in cultis Niceæ, Telonis, Monspelii et Tolosæ ex Benth. Burdigalæ (Des Moul.) — Fl. fr. 5. p. 388. — Buxb. cent. 1. t. 10. f. 1 et 2. V. Buxbaumii Ten. (v. s.)
4. *V. AGRESTIS* (L. sp. 18.) caule patulo diffuso, foliis cordato-ovatis inciso-crenatis pedunculis brevioribus, calycis laciniis ovatis acutis capsulâ pubescente longioribus, seminibus plurimis umbilicato-concavis extùs corrugatis. (I) in agris, hortis, ad muros, etc. — Fl. fr. 3. p. 467. *V. pulchella* Bast. ess. 414. Fl. fr. 5. p. 388. — Fuchs. p. 22. ic. Variat floribus albis et cœruleis. (v. v.)
5. *V. ARVENTIS* (L. sp. 18.) caule ramoso, ramis diffusis, foliis ovato-cordatis crenato-dentatis, floralibus alternis oblongis integrerrimis calycem superantibus, floribus subsessilibus, laciniis calycinis lanceolatis obtusis inæqualibus capsulam ciliatam obcordatam superantibus, seminibus plurimis compressis rugulosis. (I) in arvis, cultis. — Fl. fr. 3. p. 466. — Fl. dan. t. 515. (v. v.)
6. *V. DIGITATA* (Vahl. symb. 1. p. 2.) caule stricto, foliis flores sessiles superantibus omnibus digitato-partitis laciniis linearibus obtusis, laciniis calycinis linearibus capsulam truncatam superantibus, seminibus plurimis læviusculis subangulatis. (I) in agris Monspelii ex Vahl, agri Ruscinonensis ex Lapeyr. — Fl. fr. 3. p. 466. (v. s. ex Hisp.)
7. *V. VERNA* (L. sp. 19.) caule stricto subsimplici aut à basi ramoso, foliis inferioribus digitato-partitis pinnatifidis laciniis inæqualibus obtusis, summis indivisis linearibus calyces subsessiles superantibus, laciniis calycinis linearibus aut lineari-lanceolatis acutis capsulam obcordatam glanduloso-ciliatam superantibus, seminibus plurimis lenticulari-compressis læviusculis. (I) in aridis passim. — Fl. fr. 3. p. 465. *V. succulenta* et *V. Bellardi* All. ped. t. 22. f. 4. et t. 85. f. 1. (v. v.)
8. *V. TRIPHYLLOS* (L. sp. 19.) pubescens, caule ramoso patulo, foliis infimis cordatis dentatis, superioribus florum pedunculis subbrevioribus 3-5-digitato-partitis laciniis obtusis, laciniis calycinis lanceolato-ovatis obtusis, capsulâ obcordatâ glanduloso-ciliatâ, seminibus umbilicato-concavis extùs rugulosis. (I) in arvis, cultis et humidis. — Fl. fr. 3. p. 467. — Lob. ic. 464. f. 1. (v. v.).
9. *V. ACINIFOLIA* (L. sp. 19.) subpubescens, caule erecto ramoso, foliis ovato-oblongis obtusis crenatis, superioribus integris florum pedunculos subæquangularibus, laciniis calycinis ovatis obtusis capsulâ obcordatâ profundè emarginatâ glanduloso-ciliatâ brevioribus, seminibus plurimis lævigatis intùs planis extùs convexis. (I) in humidis cultis, etc. — Fl. fr. 3. p. 464. Vaill. bot. t. 33. f. 3. *V. Burdigalensis* Laterr. fl. bord. ed. 2^a. p. 87. (v. v.)
10. *V. PRÆCOX* (All. auct. 5. t. 1. f. 1.) villos-pubescent, caule ramoso erecto, foliis ovatis cordatis petiolatis profundè dentatis, superioribus incisis integrise floris pedunculati superantibus, laciniis calycinis ovato-lanceolatis obtusis capsulam obcordatam glanduloso-ciliatam subsuperantibus, seminibus plurimis umbilicato-concavis extùs lævibus. (I) in cultis passim. — Fl. fr. 3. p. 465. (v. v.)
11. *V. PEREGRINA* (L. sp. 20.) glabra, caulinis ramosissimis ramis ascendentibus, foliis lanceolato-oblongis obtusis integerrimis dentatisque, superioribus linear-lanceolatis flores subsessiles superantibus, calycis laciniis linear-lanceolatis acutis capsulam glabram obcordatam superantibus, semin. plurimis lævibus intùs planis extùs convexis. (I) in Galliæ australis arvis cultis. — Fl. fr. 3. p. 464. Fl. dan. t. 407. (v. v.)
12. *V. REPENS* (Clar. in DC. II. fr. 3. p. 727.) caule repente, foliis ovato-roundis integris pedunculo æquilibus, laciniis calycinis ovato-lanceolatis obtusis capsulâ obcordatâ ciliatâ brevioribus, semin. plurimis lævibus subcompressis. (I) in Corsicæ montibus. — Lois. gall. t. 1. *V. tenella* Viv. cors. an All. ped. t. 22. f. 1? (v. s.)





§. 2. *Perennes, racemis terminalibus.*

13. **V. NUMMULARIA** (Gou. ill. 1. p. 1. f. 2.) caulibus prostratis fruticosis, foliis confertis subrotundo-ovatis obtusis glabris, racemo brevi conferto, laciniis calycinis lanceolatis obtusis ciliatis capsulâ glabrâ obcordatâ subbrevioribus, semin. plurimis lævibus. \mathcal{U} \mathfrak{z} in editioribus Pyrenæorum. — Fl. fr. 3 p. 470.
V. irregularis Lapeyr. (v. v.)
14. **V. SERPYLLIFOLIA** (L. sp. 15.) caule basi repente, foliis ovatis glabris obtusis, inferioribus obsoletè crenatis oppositis, superioribus pedicellos subæquantibus, floribus solitariis racemosis, laciniis calycinis glabris lanceolato-ovatis obtusis capsulâ obcordatâ glabrâ brevioribus, semin. plurimis lævibus minutis lenticulari-compressis. \mathcal{U} in sylvaticis et pratis subhumidis. — Fl. fr. 3. p. 471. Fl. dan. t. 492. (v. v.)
15. **V. ALPINA** (L. sp. 15.) caule simplici erecto folioso, foliis oblongo-ovatis obtusis integris aut dentatis, racemo conferto abbreviato, calycis hispidi laciniis linear-lanceolatis obtusis capsulâ hirtâ obovato-cordatâ brevioribus. \mathcal{U} in Alpibus, Monte-Aureo, Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 471. — Hall. helv. t. 15. f. 2. (v. v.)
16. **V. FRUTICULOSA** (L. sp. 15.) caulibus fruticulosis ascendentibus diffusisque, foliis lanceolatis subdentatis obtusis, racemo corymbiformi laxo, calycis pubescens laciniis lanceolatis obtusis capsulam ovatam pubescentem subæquantibus, seminibus plurimis lævibus lenticulari-compressis. \mathcal{U} in Alpibus, Pyrenæis et Corsicæ montibus (Soleiro). — Fl. fr. 3. p. 469. — Hall. helv. t. 16. f. 1. (v. v.)
f. saxatilis (Lin.) foliis ovatis obtusissimis. — **V. saxatilis** L. f. supp. 83. Fl. fr. 3. p. 469. (v. v.)
17. **V. BELLIDIOIDES** (L. sp. 15.) caule simplici ascidente sub 4-phyllo, foliis villosis pubescentibusque ovato-oblongis obtusis, radicalibus confertis apice crenatis, racemo conferto abbreviato, calycis villosi laciniis lanceolatis obtusis capsulâ villosâ ovatâ subcompressâ brevioribus, semin. plurimis lævibus lenticulari-compressis. \mathcal{U} in Alpibus, Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 470. — Hall. helv. t. 15. f. 1. (v. v.)
18. **V. PONÆ** (Gou. ill. p. 1. t. 1. f. 1.) caule simplicissimo, foliis oppositis cordato-ovatis dentatis sessilibus, floribus racemosis, bracteis linearibus pedicelis multò brevioribus, laciniis calycinis linear-lanceolatis obtusis capsulâ multò brevioribus, seminibus plurimis lævibus lenticulari-compressis. \mathcal{U} in Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 469. (v. v.)


§. 3. *Perennes, racemis terminalibus spicatis.*

19. **V. LONGIFOLIA** (L. sp. 13.) caule erecto apice polystachyo, foliis oppositis verticillatisque lanceolatis argutè serratis acuminatis, racemo spiciformi, calycis hirsuti laciniis lanceolato-linearibus acutis capsulâ globosâ compressiusculâ subemarginatâ brevioribus, seminibus plurimis minutis lævibus. \mathcal{U} in Alsatiâ ex Mapp.; propè Fontembellaqueum ex Thuill., et in Pyrenæis ex Lapeyr. — Fl. fr. 3. p. 468. — Schrad. veron. spic. t. 2. f. 1. (v. v. c.)
20. **V. SPICATA** (L. sp. 14.) caule ascendente pubescente, foliis oppositis oblongis serratis apice integerrimis, inferioribus crenatis acutis aut subobtusis, racemo spiciformi elongato, calycis hirsuti laciniis lanceolatis acutis capsulâ globoso-compressiusculâ vix emarginatâ brevioribus, semin. plurimis minimis lævibus lenticularibus. \mathcal{U} in sylvaticis. — Fl. fr. 3. p. 468. — Vaill. bot. t. 33. f. 4. (v. v.)

§. 4. *Perennes, racemis axillaribus.*

21. **V. ALLIONII** (Vill. dauph. 2. p. 8.) caule subrepente fruticulo prostrato glaberrimo, foliis rigidis nitidis glaberrimis ovatis obovatise acutis serrulatis, racemo spiciformi denso multifloro, laciniis calycinis linear-lanceolatis ciliatis subacutis capsulâ pubescente obcordatâ brevioribus. \mathcal{U} in Alpibus

- Delph., Gallopr., Pyrenæorum ex Lapeyr. — Fl. fr. 3. p. 463. V. Pyrenaica
All. ped. t. 46. f. 3. (v. v. DC.)
22. V. OFFICINALIS (L. sp. 14. a) caulis procumbentibus hirtis ramosis ascendentibus, foliis pilosis rugosis ovatis crenato-dentatis subacutis, racemo laxiusculo, lacinia calycinis linearis-lanceolatis acutis capsula ciliata obcordata brevioribus, seminibus plurimis lenticulari-compressis. ♀ in sylvestribus sterilibus. — Fl. fr. 3. p. 463. Lam. ill. t. 13. f. 2. (v. v.)
23. V. PROSTRATA (L. sp. 22.) caulis prostratis pubescentibus, foliis linearis-lanceolatis inciso-serratis integerrimisque, racemis elongatis post florescentiam laxis, calycis glabri lacinia inaequalibus linearibus subacutis, majoribus capsulam obcordatam glaberrimam subaequantibus, seminibus plurimis laevibus compressis. ♀ in collibus, pascuis, siccis passim. — Fl. fr. 3. p. 461. (v. s.)
24. V. CHAMÆDRYS (L. sp. 17.) caulis prostratis ascendentibus bifarium pilosis, foliis ovatis sessilibus rugosis grossè dentatis inferioribus glabris, racemis laxis elongatis, calycis lacinia linearis-lanceolatis subacutis ciliatis capsulam obcordatam subciliata superantibus. ♀ in pratis, ad sepes. — Fl. fr. 3. p. 460. — Fuchs. 872. ic. (v. v.)
25. V. LATIFOLIA (L. sp. 18.) caule erecto stricto pubescente, foliis ovatis sessilibus subcordatis grossè dentatis iucisisve, racemis elongatis sublaxis, lacinia calycinis linearis-lanceolatis subacutis ciliatis inaequalibus, majoribus capsulam obcordatam subciliata subaequantibus. ♀ in pascuis Alsatiæ. — Fl. fr. 5. p. 387. V. pseudo-chamædrys Jacq. austr. t. t. 60. (v. s.)
26. V. TEGETERUM (L. sp. 16.) caulis ascendentibus villosis, foliis lanceolatis acutis rugosis pilosis inciso-dentatis dentatisque sessilibus, racemis laxis elongatis, calycis hirsuti lacinia linearibus subacutis inaequalibus, majoribus capsulam obcordatam hirsutulam superantibus. ♀ in pascuis siccis. — Fl. fr. 3. p. 460. — Dalech. hist. 1165. f. 2. ic. (v. v.)
27. V. URTICÆFOLIA (L. f. supp. p. 83.) caule stricto, foliis ovatis sessilibus cordatis acutis grossè serratis, racemis laxis elongatis, calycis pubescentis lacinia lanceolatis subobtusis capsula pubescente obcordata multo brevioribus. ♀ in montosis nemorosis. — Fl. fr. 3. p. 459. — Dalech. hist. 1165. f. 1. (v. v.)
28. V. DUBIA (DC. fl. fr. 3. p. 462.) caule basi radicante ascende piloso, foliis ovatis subsessilibus grossè crenato-dentatis obtusis basi angustatis, racemis laxis elongatis, lacinia calycinis ovato-lanceolatis acutis capsulam cuneato-obcordatam pubescentem duplo superantibus, loculis monospermis, seminibus laevibus lenticulari-compressis. ♀ in collibus Alsatiæ ex Vill. (v. s. e.)
29. V. MONTANA (L. sp. 17.) caule prostrato petiolisque hirtis, foliis petiolatis ovatis obtusis grossè serratis, racemis laxissimis paucifloris, lacinia calycinis lanceolato-ovatis obtusis capsula glabra ciliata margine undulata latissimè brevioribus, seminibus plurimis magnis laevibus compressis. ♀ in umbrosis humidis. — Fl. fr. 3. p. 459. Jacq. austr. t. 109. (v. v.)
30. V. SCUTELLATA (L. sp. 16.) caule debili basi decumbente, foliis sessilibus linearibus subdentatis, racemis laxissimis, pedicellis fructiferis pendulis, lacinia calycinis lanceolatis subobtusis capsula glaberrima compressa obcordata latissimè brevioribus, seminibus plurimis laevibus compressis. ♀ in inundatis. — Fl. fr. 3. p. 461. Fl. dan. t. 209. V. parvularia Poit. et Turp. fl. paris. t. 14. (v. v.)
31. V. ANAGALLIS (L. sp. 16.) caule erecto, foliis sessilibus ovato-lanceolatis lanceolatis obsoletè serratis, racemis laxis, lacinia calycinis lanceolatis capsulam glaberrimam vix emarginatam superantibus, seminibus plurimis minutis laevibus. ♀ ad fossas inque inundatis. — Fl. fr. 3. p. 461. Fl. dan. t. 903. (v. v.)
32. V. RECHBERGHIA (L. sp. 16.) caule repente ascende, foliis glaberrimis ovatis obtusissimis obsoletè serratis in petiolum subattenuatis, racemis laxis,



laciniis calycinis lanceolato-ovatis acutis capsulam glaberrimam vix emarginatam subæquantibus, seminibus plurimis minutis lœvibus subovoideis. ♀ ad scaturigines. — Fl. fr. 3. p. 462. — Riv. t. 100. (v. v.)

33. V. APHYLLA (L. sp. 14.) surculis repentibus apice foliosis, foliis confertis obovatis pubescentibus dentatis, pedunculo nudo axillari paucifloro, floribus corymboso-paniculatis, calycis laciniis linear-lanceolatis obtusis capsula ovato-cordata multò brevioribus. ♀ in Alpium frigidis umbrosis. — Fl. fr. 3. p. 463. — Pluck. t. 114. f. 3. (v. v.)

Ordo LXXXIII. LABIATÆ Juss. gen. p. 110.

Calyx 1-sepalus tubulosus 5-fidus aut 2-labiatus. Corolla hypogyna tubulosa irregularis sæpius 2-labiata, labio superiore sæpius bifido, inferiore 3-fido. Stamina rarius 2, sæpissimè 4 didynama sub labio corollæ superiore inserta. Anth. 2-loculares. Ovarium liberum 4-lobum disco hypogyno crasso applicatum; stylus unicus inter ovarii lobos enatus; stigma bifidum. Semina 4 nuda (cariopsides) basi styli dilatatae adnata, imo calyce recondita, interdùm pilis obtecta. Albumen in Europæanis speciebus nullum; embryo rectus; radicula infera; cotyledones planæ. — Caulis herbaceus aut suffrutescens tetragonus, folia opposita; flores oppositi aut verticillati, axillares aut spicati, bracteis sæpè stipati.

† STAMINA 2 FERTILIA.

I. LYCOPUS Tourn. inst. t. 89. L. gen. 33.

Calyx tubulosus 5-fidus ore nudo; corolla tubulosa 4-loba subæqualis, lobo superiore latiore emarginato.

1. L. EUROPEUS (L. sp. 30.) foliis sinuato-serratis appendiculatis. ♀ in paludosis et humidis. — Fl. fr. 3. p. 505. — Moris. s. 11. t. 9. f. 5. n. 20. (v. v.)
2. L. EXALTATUS (L. f. supp. 87.) foliis pinnatifidis, caule altissimo. ♀ in Galiae australis humidis. — Fl. fr. 3. p. 505. — Pluck. t. 45. f. 1. (v. v. c.)

II. CUNILA L. gen. 35.

Calyx cylindricus 10-striatus 5-dentatus, ore villis clauso; corolla 2-labiata, labium superum erectum planum emarginatum, inferum 3-lobum.

- I. C. THYMOIDES (L. sp. 31.) foliis ovalibus integerrimis, floribus verticillatis. (I) Monspelii ex Gouan. Dubia civis. — Fl. fr. 3. p. 506. — Moris. s. 11. t. 19. f. 9. n. 6. (v. s. c.)

III. ROSMARINUS Tourn. inst. t. 92. L. gen. 38.

Calyx compressus 2-labiatus suprà integer infrà 2-fidus, ore nudo; corolla 2-labiata, labio superiore 2-fido, inferiore 5-fido.

- I. R. OFFICINALIS (L. sp. 33.) foliis sessilibus. ♂ in Galliae mediterraneæ montosis apricis. — Fl. fr. 3. p. 506. — Moris. s. 11. t. 16. f. 2 et 3. n. 1 et 2. (v. v.)

IV. SALVIA L. gen. n. 39.

Calyx subcampanulatus 2-labiatus labio superiore 3-dentato, infero 2-fido, ore nudo; corolla ringens superius fornicata emarginata; antheræ loculis 2, uno fertili, altero abortivo, connectivo filiformi transversè filamento adnato dissitis.

Sect. I. HORMINUM Tourn. t. 82.

Labium corollæ superius fornicatum non compressum.

1. *S. OFFICINALIS* (L. sp. 34.) foliis lanceolato-ovatis crenulatis, verticillis panicifloris, calycis bracteas superantis laciniis acuminatis. ♂ in Galliâ australi passim. — Fl. fr. 3. p. 507. — Moris. s. 11. t. 15. f. et n. 1. (v. v.)
2. *S. HORMINUM* (L. sp. 34.) foliis obtusis crenatis, bracteis summis sterilibus majoribus coloratis, stylo labio superiore longiore, calycis bracteam superantis labio superiore submarginato dentibus mucronatis, labio inferiore laciniis acuminatis. (I) secùs agros Niceæ ex All., agri Ruscinonensis ex Lapeyr. — Fl. fr. 3. p. 510. — Lob. ic. t. 555. f. 2. (v. v. c.)
3. *S. VERBENACA* (L. sp. 35.) caule hirto, foliis lanceolatis serratis sinuatis aut grossè dentato-crenatis leviusculis obtusis, bracteis rotundato-ovatis macro-natis, calycis hirsuti dentibus minimis conniventibus, laciniis mucronatis, stylo labio superiore breviore. ♀ in pascuis siccis montanis Galliæ australis et occidentalis. — Fl. fr. 3. p. 511. — Barr. ic. t. 207. (v. v.)
4. *S. CLANDESTINA* (L. sp. 36.) caule subsimplici, foliis oblongo-lanceolatis sinuatis pinnatifidis dentatis nervosis, bracteis rotundo-ovatis acuminatis, calycis substriati hirsuti labii superioris dentibus minimis conniventibus, inferioris laciniis acutis, corollis calyce duplò longioribus. ♀ in Galliâ australi secùs vias primo vere. — Fl. fr. 5. p. 395. *S. præcox* Lois. not. p. 6. — Barr. ic. t. 220. (v. v.)
5. *S. VERTICILLATA* (L. sp. 37.) foliis ovato-cordatis crenato-dentatis, verticillis subnudis multifloris, floribus pedicellatis, calycis hirsuti dentibus distinctis laciniisque acuminatis, stylo corollæ labio inferiori incumbente. (I) ad agrorum et viarum margines rariùs. — Fl. fr. 3. p. 511. — Riv. monop. t. 60. (v. v. c.)

Sect. II. SCLAREA Tourn. t. 82.

Labium superius corollæ compressum.

6. *S. PRATENSIS* (L. sp. 35.) foliis nervosis rugosis cordato-oblongis crenatis summis amplexicaulibus, verticillis subnudis, calycis labii superioris dentibus minimis, inferioris laciniis mucronatis, stylo galea falcata subduplò longiore. ♀ in pratís. — Fl. fr. 3. p. 508. — Cam. epit. 629. ic. (v. v.)
7. *S. PYRENAICA* (L. syst. 71.) villoso-viscosa, foliis dentato-sinuatis obtusis, staminibus corollâ duplò longioribus, labio calycis superiore 2-dentato, inferiore 3-lobo lobis lateralibus ovalibus, medio subulato. ♀ in Pyrenæis? — Fl. fr. 5. p. 394. — Herm. parad. 187. ic. Dubia civis. (in herb. cl. Jussieu v. DC.) †
8. *S. SYLVESTRIS* (L. sp. 34.) caule pubescente, foliis oblongo-lanceolatis subcordatis rugosis acutis aut subacutis birenatis, bracteis coloratis calyce brevioribus, labii superioris dentibus minimis, inferioris laciniis acuminatis, stylo recurvo galeam superante. ♀ in Galliâ australi, in vineis et ad margines agrorum rariùs. — Fl. fr. 3. p. 508. Jacq. austr. t. 212. (v. v. c.)
9. *S. SCLAREA* (L. sp. 38.) foliis rugosis ovato-cordatis villosis serratis, bracteis coloratis calyce longioribus, calycis dentibus laciniisque setaceo-acuminatis.





Trieolor

- ② in aridis montosis Galliæ mediæ, occidentalis australisque. — Fl. fr. 3. p. 508. — Lob. ic. 556. f. 2. (v. v.)
10. S. *GLUTINOSA* (L. sp. 37.) villosa-viscosa, foliis cordato-sagittatis grossè serratis acuminitatis, calyce bilabiato, labio superiore dentibus obsoletis 1-dentato, inferiore subbidentato dentibus acutis. ♀ in sylvis montanis. — Fl. fr. 3. p. 509. — Lob. ic. 557. f. 1 et 2. (v. v.)
11. S. *AETHIOPIS* (L. sp. 39.) caule foliis calycibusque arachnoideo-lanuginosis, foliis oblongo-ovatis incisis dentatis, bracteis recurvatis subspinosis calyce brevioribus, calycis lacinias dentibusque subspinosis. ② in aridis Galliæ australioribus, agri Ligericini (Prost.) Arverniæ ex Del. — Fl. fr. 3. p. 509. — Moris. s. 11. t. 13. f. 1. n. 4. (v. v. DC.)

†† STAMINA 4 DIDYNAMA FERTILIA.

V. AJUGA Schreb. unilab. 24. — Ajuga et Teucrī sp. L.

Calyx 5-fidus subæqualis; corolla tubulosa labiata, labio superiore minimo bidentato, inferiore 3-lobo lobo medio magno obcordato; calyriopsides reticulatae.

Sect. I. CHAMÆPITYS Tourn. t. 98.

Flores axillares solitarii.

1. A. *CHAMÆPITYS* (Schreb. unilab. 24.) caulinis diffusis hirtis, foliis trifidis lacinias linearibus, floribus axillaribus solitariis folio brevioribus. ① in agris, arenosis, lapidosis. — Fl. fr. 3. p. 514. — Lob. ic. 382. f. 2. (v. v.)
2. A. *PSEUDO-IVA* (Rob. et Cast. in DC. fl. fr. 5. p. 395.) caulinibus diffusis lanatis, foliis linearibus parcè dentatis margine subrevolutis, floribus axillaribus solitariis flavis. ① secùs vias Massiliae et ad littus occidentale insulæ S.-Luciae propè Narbonam ex cl. Benth. Inodora. An potius ut sequentis varietas habenda? (v. s.)
3. A. *IVA* (Schreb. unilab. 25.) caulinis diffusis lanatis, foliis linearibus anticè dentatis, floribus axillaribus solitariis purpureis. ① in Galliæ mediterraneâ. — Fl. fr. 3. p. 514. Moris. s. 11. t. 22. f. 11. n. 3. (v. v.)

Sect. II. BUCULA Tourn. t. 98.

Flores axillares spicati.

4. A. *ALPINA* (L. mant. 80.) caule erecto non stolonoso, foliis obovato-spathulatis, radicalibus crenulatis, caulinis dentatis flores sessiles superantibus, calycis hirsuti lacinias linearibus acuminitatis. ♀ in sylvis montosis. — Fl. fr. 3. p. 513. (v. v.)
5. A. *REPTANS* (L. sp. 785.) stolonibus reptantibus, foliis obovato-spathulatis obsoletè crenatis aut undulatis, floribus subsessilibus, calycis hirsuti bracteâ brevioris lacinias linearibus acutis. ♀ in sylvaticis humidis. — Fl. fr. 3. p. 512. Lam. ill. t. 501. f. 2. (v. v.)
6. A. *PYRAMIDALIS* (L. sp. 785.) caulinibus tetragonis villosis hirsutis non stolonosis, foliis obovatis margine sinnatis obtusis, radicalibus in petiolum attenuatis, superioribus flores sessiles superantibus, calycis hirsuti lacinias acutis, labio corollæ inferiore majore trilobo, intermedio emarginato. ② in sylvaticis. — Fl. fr. 3. p. 513. An satis à priore distineta? (v. s.)
7. A. *GENEVENSIS* (L. sp. 785.) villosa, non stolonosa, foliis ovato-lanceolatis margine sinuatis obtusis, caulinis dentatis radicalibus longioribus, calycis lacinias acutis, lobo intermedio labii corollæ inferioris breviore. ♀ in aridis sylvaticis passim. — Fl. fr. 3. p. 513. Fl. saepius purpurei. Vix à prioribus se-jungenda. (v. v.)

VI. TEUCRIUM Schreb. unilab. p. 17. — Teucrī sp. L.

Calyx tubulosus raro campanulatus 5-fidus; corolla tubo brevi labiata, labio superiore 2-partito laciniis ad latera deflexis, inferiore 3-lobo lobo medio majore; stamina intrà fissuram labii superioris exserta.

Sect. I. SCORODONIA Adans. fam. p. 188.

Calyx 2-labiatus, labio inferiore 4-dentato, superiore laciniâ 1 ovatâ.

1. T. SCORODONIA (L. sp. 789.) caulis erectis tetragonis villosis, foliis ovato-cordatis pubescentibus aut glabriusculis, floribus racemosis, racemis axillaris secundis, calyce 2-labiato, labii inferioris dentibus mucronatis brevibus, labii superioris laciniâ ovatâ mucronatâ, seminibus lœvibus. ♀ in sylvis arenosis. — Fl. fr. 3. p. 516. — Lob. ic. 497. f. 2. Variat calycibus hirtis et glabris. (v. v.)
2. T. MASSILIENSE (L. sp. 789 excl. Barr. syn.) caulis erectis suffruticosis, foliis oblongo-ovatis rugosis crenatis incanis, floribus elongato-racemosis, calyce 2-labiato, seminibus lœvibus. ♂ in Corsicâ, Stæchadibus. — Fl. fr. 3. p. 519. — Ger. gallop. t. 11. (v. s.)

Sect. II. TEUCRIUM Tourn. t. 93.

Calyx campanulatus 5-fidus; semina magna pubescentia subreticulata.


3. T. FRUTICANS (L. sp. 787.) caule frutescente erecto, foliis ovato-lanceolatis obtusis integerrimis subtus niveis, floribus binis solitariisve axillaribus, calycibus tomentosis campanulatis laciniis ovato-lanceolatis acutis. ♂ in agro Russinonensi propè Banyuls. — Fl. fr. 3. p. 515. — Dill. elth. 379. t. 284. (v. v.)
4. T. PSEUDO-CHAMÆDRYS (L. sp. 787.) caule erecto hirto, foliis 3-partitis laciniis linearibus acutis margine subrevolutis, floribus pedicellatis solitariis laxe racemosis, calycis campanulati laciniis lineari-lanceolatis acuminatis. ♀ in sterilibus maritimis Massiliæ. — Fl. fr. 3. p. 516. — Lob. ic. 385. f. 1. (v. s.)

Sect. III. CHAMÆDRYS Dill. gen. t. 3.

Calyx tubuloso-campanulatus 5-dentatus; semina parva glabra.

5. T. BOTrys (L. sp. 786.) caulis ramosis sub 4-gonis hirsutis, foliis pubescentibus mollibus multifidis laciniis linearis-lanceolatis, verticillis dimidiatis paucifloris, calycis tubulosi basi dilatati dentibus acuminatis, seminibus punctato-reticulatis. (I) in apricis cultis. — Fl. fr. 3. p. 515. — Lob. ic. 385. f. 2. (v. v.)
6. T. LUCIDUM (L. sp. 790.) caulis erectis lœvibus, foliis ovatis glabris inciso-dentatis, floralibus dentatis aut integris calycem superantibus, verticillis dimidiatis in racemos digestis, calycis campanulati dentibus lanceolatis acutis æqualibus, seminibus sublœvibus. ♀ in sylvis Alpium austral. Gallo-provincie. — Fl. fr. 3. p. 518. — Magn. hort. t. 52. (v. s.)
7. T. CHAMÆDRYS (L. sp. 790.) caulis subprocumbentibus villosis, foliis cuneiformi-ovatis incisis crenatis petiolatis, floribus ternis, calycis campanulati hirti dentibus lanceolato-acuminatis, seminibus lœvibus. ♀ in apricis sylvaticis. — Fl. fr. 3. p. 518. T. pseudo-chamædrys Salzm. cors. exsiccat. — Lob. ic. 491. Variat foliis hirsutis et subglabris. (v. v.)
8. T. FLAVUM (L. sp. 791.) caulis erectis fruticosis pubescentibus, foliis rotundato-ovatis crenatis petiolatis, floralibus lanceolatis integerrimis, verticillis dimidiatis in racemos digestis, floribus pedunculatis, calycis tomentosi campanulati dentibus ovatis acutis, seminibus sublœvibus. ♂ in collibus asperis Galliae mediterraneæ. — Fl. fr. 3. p. 519. — Lob. ic. 490. f. 1. (v. v.)
9. T. SCORDIUM (L. sp. 790.) caulis diffusis hirtis, foliis oblongis sessilibus dentatis pubescentibus, floribus axillaribus geminis brevissimè pedunculatis, calycis parvi subcampanulati dentibus acutis, seminibus punctato-reticulatis.





- ♀* in paludosis. — Fl. fr. 3. p. 517. — Moris. s. 11. t. 22. f. 8. n. 14. (v. v.)
10. T. PYRENAICUM (L. sp. 791.) caulis procumbentibus hirtis, foliis cuneiformi-orbiculatis crenatis pilosis, floribus pedicellatis terminalibus corymboso-capitatis, calycis campanulati dentibus subæqualibus ciliatis acuminatis, seminibus reticulatis. *♀* in rupestribus et vallibus Pyrenæorum, Averniae ex Del. — Fl. fr. 3. p. 520. (v. v.)
11. T. MONTANUM (Schreb. unil. 50.) procumbens, caulis pubescentibus, foliis lanceolatis integrerrimis subtus tomentosis supernè glaberrimis, floribus terminalibus pedicellatis corymboso-capitatis, calycis campanulati dentibus subæqualibus ovato-acuminatis, seminibus reticulatis. *♀* in saxosis rupestribus siccis. — Fl. fr. 3. p. 521. T. montanum et T. supinum L. sp. 791. — Lob. ic. 488. f. 1 et 2. (v. v.)
12. T. POLIUM (Lam. dict. 2. p. 699.) caulis suffruticosis ramosis decumbentibus tomentosis, foliis lanceolato-oblongis obtusis crenatis tomentosis, capitulis subrotundis pedunculatis, calycis tomentosi campanulati dentibus acutis. ♂ in Galliæ australis montosis et maritimis. — Fl. fr. 3. p. 521. — Barr. ic. t. 1074 et 1078. Variat floribus albescentibus et purpureis. (v. v.)
13. T. CAPITATUM (L. sp. 792.) caulis suffruticosis ramosis, ramis niveis erectis, foliis lanceolatis linearibus crenatis tomentosis niveis, capitulis subrotundis breviter pedunculatis, calycis tomentosi subcampanulati dentibus acutis. ♂ in Galliæ australis saxosis aridis. — Fl. fr. 3. p. 522. Cav. ic. t. 119. — Barr. ic. t. 1047. Species à præcedente vix distincta et cum hac probabilitate conjugenda. (v. v.)
14. T. FLAVICANS (Lam. dict. 2. p. 700.) tomentosum, caulis suffruticosis decumbentibus ramosissimis, foliis linearibus anticè crenatis vel ovatis serratis, summitatibus flavescentibus, capitulis sessilibus subrotundis, calycis aureo-tomentosi subcampanulati dentibus acutis. ♂ in Galliæ australis rupestribus. — Fl. fr. 3. p. 521. T. aureum Cav. ic. 2. t. 117. — Barr. ic. t. 1073. (v. v.)
15. T. PSEUDO-HYSSOPUS (Schreb. unil. p. 45.) caulis erectis incanis ramosis, foliis linearibus aut linear-lanceolatis crenatis obtusis, floribus capitatis, capitulis numerosis rotundis in racemum dispositis, calycis tubulosi adpresso cano-tomentosi dentibus parvis subobtusis. ♂ in aridis Corsicæ. — Col. ecphr. 1. t. 67. (v. s.)
16. T. MARUM (L. sp. 788.) canle suffruticoso erecto, ramis canescentibus, foliis integrerrimis ovatis acutis petiolatis subtus tomentosis, floribus racemosis secundis, calycis cano-tomentosi dentibus acutis. *♀* in Corsicæ et Stæchadum montosis. — Fl. fr. 3. p. 516. — Black. t. 47. (v. v. D.)

VII. HYSSOPUS Tourn. inst. t. 95. L. gen. n. 709.

Calyx substriatus, fauce nudâ; corollæ labium superius breviter emarginatum, inferius 3-lobum lebo intermedio majore obcordato crenulato.

1. H. OFFICINALIS (L. sp. 796.) foliis lanceolatis, floribus verticillatis ramosis secundis, laciniâ corollæ intermediâ bilobâ integerrimâ. *♀* in collibus provinciarum austro-orientalium orientaliumque et circa Meduntam propè Parisios ex Merat. — Fl. fr. 3. p. 525. Lam. ill. t. 502. f. 1. — Moris. s. 11. t. 1. f. 2 et 3. n. 1 et 7. (v. v.)

β. canescens (DC. fl. fr. 5. p. 396.) caulis foliisque canescentibus. — in Galloprovinciâ. (v. s.)

VIII. MOLUCELLA L. gen. 724.

Calyx turbinatus campanulatus dentato-spinosus, dente superiori remotiore; corolla calyce angustior.

1. *M. FRUTESCENS* (L. sp. 821.) foliis petiolatis ellipticis obtusis sub-5-dentatis, calycibus infundibuliformibus 8-10-dentatis spinosis, galea pilosissimâ. ♂ inter rupes Galloprovincie propè Entrevaux et S.-Arnoux (Solier). — Fl. fr. 3. p. 556. All. ped. t. 2. f. 2. (v. s.)

IX. PHLOMIS L. gen. 723.

Calyx angulatus 5-dentatus sauce nudâ dentibus patulis; corolla oblonga labiata superius villosa fornicata compressa incumbens subbifida, inferius triloba, lobo medio majore emarginato.

1. *P. FRUTICOSA* (L. sp. 818.) caule fruticoso, ramis densè tomentosis, foliis ovatis obtusis subtus reticulatis tomentosis, bracteis extus tomentosis ovalibus, verticillis 15-20-floris, calycis dentibus minimis retusis mucronato-subulatis. ♂ circa Narbonam et in Pyren. orientalibus ex Lapeyr. — Fl. fr. 5. p. 401. — Dod. pempt. 146. ic. (v. v. c.)
2. *P. LYCHNITIS* (L. sp. 819.) foliis linear-lanceolatis infernè candicantibus, floralibus sessilibus ovatis, bracteis setaceis lanatis calycis hirsutissimi dentes setaceo-acuminatas aequalibus. ♂ in Galliâ mediterraneâ. — Fl. fr. 3. p. 555. — Lob. ic. t. 558. f. 1. 2. (v. v.)
3. *P. HERBA-VENTI* (L. sp. 819.) foliis ovato-lanceolatis serratis subtus hirtis, bracteis subulatis cauleque hirtis, calycis dentibus lanceolato-subulatis erectis. ♀ in Galliâ mediterraneâ. — Fl. fr. 3. p. 556. — Lob. ic. 532. f. 1. (v. v.)

X. GALEOBDOLOM Huds. ang. 258. DC. fl. fr. 3. p. 554.

Calyx campanulatus 5-dentatus dentibus inaequalibus acutis; corolla calyce longior 2-labiata suprà fornicata integra, infrâ 3-fida lacinias acutis intermediâ longiore.

1. *G. MONTICUM* (Huds. ang. 258.) ♀ in nemoribus montosis. — Fl. fr. 3. p. 554. Galeopsis Galeobdolon L. sp. 810. — Moris. s. 11. t. 11. f. 4. n. 5. (v. v.)

XI. LEONURUS L. gen. 722.

Calyx cylindricus pentagonus 5-dentatus, sauce nudâ; corolla calyce vix longior 2-labiata superius villosa integra concava, inferius reflexa 3-partita subæqualis; antheræ punctis nitidis adspersæ.

Sect. I. CHAITURUS Mœnch. meth. 402.

Stamina ovariaque glabra.

1. *L. MARRUBIASTRUM* (L. sp. 817.) foliis oblongis dentatis, corollis calyce sub-pungente vix longioribus. ♀ in cultis siccis. — Fl. fr. 3. p. 554. Jacq. aust. t. 405. (v. v.)

Sect. II. CARDIACA Tourn. inst. t. 87.


Stamina villosa, ovaria apice tomentosa.

2. *L. CARDIACA* (L. sp. 817.) foliis petiolatis, inferioribus cuneiformi-ovatis trilobis dentatis, summis indivisis, laciniâ mediâ labii corollæ inferioris acutâ, calyce pungente. ♀ in dumetis, ruderatis. — Fl. fr. 3. p. 553. Bull. herb. t. 273. (v. v.)

XII. MARRUBIUM L. gen. 721.

Calyx cylindricus 10-striatus 5-aut-10-dentatus; corolla calyce paulò longior 2-labiata, superius angusta 2-fida, inferius 3-fida, laciniâ mediâ latiore emarginatâ.

1. *M. VULGARE* (L. sp. 816.) caule erecto, foliis subrotundo-ovatis dentatis rugoso-venosis, calycibus 10-dentatis, dentibus setaceis uncinatis. ♀ in ruderatis incultis. — Fl. fr. 3. p. 552. — Moris. s. 11. t. 9. f. 8. n. 1. (v. v.)



$\beta \rightarrow \text{K}^+ \pi^-$

longitudinal

2. *M. SUPINUM* (L. sp. 816.) caule decumbente, foliis subrotundis crenatis rugoso-venosis, calycibus 5-dentatis, dentibus setaceis rectis villosis. ♀ in Occitaniâ ex Sauv., Linnæo et Benth. — Fl. fr. 3. p. 553. — Bocc. mus. t. 69. (v. v. c.)

XIII. *BALLOTA* L. gen. 720.

Calyx campanulatus 5-gonus 10-striatus 5-dentatus; corolla bilabiata superius concava crenata, inferius 3-loba, lobo medio majore emarginato; semina triangularia.

1. *B. FOETIDA* (Lam. fl. fr. 2. p. 381.) foliis cordatis indivisis serratis. ♀ in rudera-
tis. — Fl. fr. 3. p. 552. Lam. ill. t. 508. f. 1. *B. nigra* L. sp. ed. 1. p. 582. non
ed. 2. — Cam. epit. 572. ic. (v. v.)

XIV. *BETONICA* Tourn. inst. t. 96. L. gen. n. 718.

Calyx cylindricus 5-dentatus aristatus fauce nudâ; corollæ tubus gracilis, limbus 2-labiatus suprà erectus subrotundus integer vel emarginatus, infrà 3-fidus.

1. *B. OFFICINALIS* (L. sp. 810.) caule 4-gono hirto, foliis cordatis ovatis aut lanceolatis grossè crenatis obtusis, inferioribus petiolatis, spicâ oblongâ interrup-
tâ, calyce basi glabriuscule in parte superiore hispido aut glabro tubo duplò triplò breviore, corollæ galeâ integrâ laciniâ intermediâ labii inferioris crenato-undulatâ. ♀ in pascuis, sylvaticis. — Fl. fr. 3. p. 545. *B. stricta* Ait. kew. 2. p. 299. Fl. fr. 3. p. 545. — Fuchs. hist. 350. ic. Variat plus minus pilosa. (v. v.)

2. *B. INCANA* (Mill. dict. n. 3.) caule 4-gono hirto, foliis ovali-oblongis cordatis obtusis, inferioribus petiolatis, spicâ oblongâ interrup-
tâ, calycis hispidi tubo multò brevioris dentibus subulatis brevibus, corollarum galeâ bifidâ, laciniâ intermediâ labii inferioris crenatâ, tubo pubescente subincurvo. ♀ in sylvis circâ Nanuetes. — Fl. fr. 5. p. 400. (v. s. c.)

3. *B. HIRSUTA* (L. mant. 248.) foliis oblongo-lanceolatis cordatis grossè crenatis obtusis petiolatis, spicâ ovatâ obtusissimâ foliosâ, calyce tubo breviore glabriuscule, corollæ galeâ integrâ, laciniis lateralibus labii inferioris angustioribus acuminatis. ♀ in Alpibus, Monte-Aureo, Pyrenæis. — Fl. fr. 3. 546. — Zanon. p. 46. t. 40. (v. v. in Italâ D.)

4. *B. ALOPECUROS* (L. sp. 811.) villosa, foliis ovato-cordatis grossè dentatis, inferioribus petiolatis, spicâ oblongâ basi foliosâ, calyce tubum æquante, corollæ galeâ emarginatâ labio inferiore longiore. ♀ in Pyrenæis, Alp. Delph. ex Vill., Galloprov. ex Ger. — Fl. fr. 3. p. 547. — Scop. carn. t. 28. (v. v.)

XV. *GALEOPSIS* Huds. ang. 1. p. 256. DC. fl. fr. 3. p. 542.

Calyx campanulatus 5-dentatus spinosus; corolla tubo brevi, fauce dilatatâ 2-dentatâ, limbo 2-labiato suprà fornicato crenato, infrà 3-lobo lobis inæqualibus; antheræ intùs subhirsutæ.

1. *G. TETRAHEDRON* (L. sp. 810. var. a.) caule hispido, internodiis caulinis incrassatis, foliis ovatis hispidis glabrisve grossè serratis acuminatis, calycis hispidi laciniis subulato-pungentibus corollâ subduplò brevioribus, seminibus magnis obsoletè 3-questris leprosò-punctulatis. (I) in arvis. — Fl. fr. 3. p. 544. — Riv. t. 31. (v. v.)

f. versicolor, foliis oblongo-ovatis, floribus majoribus ochroleucis versicoloribus. — *G. versicolor* Cart. lond. 6. t. 38. Fl. fr. 3. p. 544. (v. v.)

2. *G. OCHROLEUCA* (Lam. dict. 2. p. 600.) caulinis erectis ramosis, foliis ovato-lanceolatis petiolatis, verticillis distantibus multifloris, calycibus hirsutis, corollis longè tubulosis, seminibus triquetris punctulatis. (I) in agris rariis. — Fl. fr. 3. p. 543. Fl. ochroleuci. (v. v.)

3. *G. LADANUM* (Vill. dauph. 2. p. 386.) caulinis erectis ramosis, foliis lineari-

lanceolatis lanceolatisve subobtusis dentatis aut subintegris, verticillis distantibus, calycibus pubescentibus, seminibus obsoletè triquetris punctulatis.

(I) *in agris, cultis.* — Fl. fr. 3. p. 543. (v. v.)

4. *G. PARVIFLORA* (Lam. dict. 2. p. 600.) caulis erectis pubescentibus ramosis, foliis lanceolatis æqualiter serratis petiolatis subacutis, calycis hirsuti lacinis subulato-pungentibus corollâ brevioribus. (I) *in cultis, agris.* — Fl. fr. 3. p. 544. *G. intermedia* Vill. danph. 2. t. 9. (v. s.)

XVI. LAMIUM L. gen. 716.

Calyx 5-dentatus aristatus nudus, apice patens; corolla longior fauce inflatâ, limbo labiato suprà fornicato integro, inferiore 3-lobo lobis lateralibus minimis reflexis, medio majore emarginato; antheræ glabræ; semina triquetra laevia.

1. *L. LEVIGATUM* (L. sp. 808.) caule sublaevi, foliis cordatis rugosis grossè serratis petiolatis breviter pubescentibus, verticillis sub 6-floris, calycis glabri dentibus acuminatis inæqualibus longiore tubum corollæ subæquante. ♀ in sepiibus et incultis montanis Galloprov., Delph., Alsatiæ ex Mapp. — Fl. fr. 3. p. 541. — Bocc. mus. 2. t. 23. Corolla ampla purpurea fauce dilatata. (v. s.)
2. *L. ALBUM* (L. sp. 371.) caulis erectis apice pilosulis, foliis cordatis acuminatis serratis petiolatis, verticillis 12-20-floris, calycis dentibus subulatis ciliatis. ♀ in incultis. — Fl. fr. 3. p. 540. — Cam. epit. 865. ic. Fl. albi. (v. v.)
3. *L. MACULATUM* (L. sp. 809.) caulis decumbentibus, foliis cordatis petiolatis acuminatis aut subobtusis grossè serratis, verticillis remotis, calycis obliqui lacinis inæqualibus setaceo-acuminatis ciliatis. ♀ in montanis passim. — Fl. fr. 3. p. 540. *L. hirsutum* Lam. dict. 3. p. 410. Fl. fr. 3. p. 541. *L. stoloniferum* Lapeyr. abr. 333 et supp. 82. — Garid. aix. t. 58. Folia interdùm maculata. (v. v.)
4. *L. PURPUREUM* (L. sp. 809.) caulis decumbentibus glabriusculis, foliis rotundato-cordatis obtusis æqualibus crenatis petiolatis, verticillis confertis 8-10-floris, calycis dentibus subæqualibus linearisubulatis. (I) *in cultis.* — Fl. fr. 3. p. 541. — Blackw. t. 152. f. 1. (v. v.)
5. *L. BIFIDUM* (Cyr. fasc. neap. 1. t. 7.) caule procumbente à basi ramoso, foliis hirsutis petiolatis oblongo-ovatis cordatis obtusis inciso-dentatis, floralibus superioribus sessilibus, corollæ labio superiore bifido lacinis divaricatis. (I) *in Corsicâ (el. Soleirol).* (v. s.)
6. *L. HYBRIDUM* (Vill. danph. 2. p. 385.) caulis decumbentibus glabriusculis, foliis cordatis acutiusculis inciso-dentatis petiolatis, corollis calyce angustioribus, calycis obliqui dentibus subinæqualibus acuminato-subulatis, seminibus sublaevibus. (I) *in cultis.* — Fl. fr. 3. p. 541. *L. incisum* Wild. — Pluck. t. 41. f. 3. (v. v.)
7. *L. AMPLEXICAULE* (L. sp. 809.) caule decumbente glabro, foliis rotundatis obtusissimis inciso-crenatis, caulinis sessilibus, calycis hirsuti dentibus subæqualibus linearisubulatis, corollæ tubo gracili. (I) *in cultis, ruderatis.* — Fl. fr. 3. p. 542. — Lob. ic. t. 463. f. 2. (v. v.)

XVII. ORVALA L. gen. 715.

Calyx 5-dentatus nudus apice patens; corollæ faux inflata utrinquè appendice 3-lobo, labio superiore fornicato dentato, inferiore 3-lobo lobis lateralibus minimis reflexis, medio majore emarginato, antheræ glabræ.

1. *O. LAMIOIDES* (DC. fl. fr. 3. p. 539.) foliis cordatis inæqualiter argutèque serratis. ♀ in umbrosis Pyrenæorum ex Lapeyr., circè Nannetæ ex Bon. — *Lamium Orvala* L. sp. 808. *O. gorganica* L. sp. 807. — Scop. carn. t. 27. — Mich. gen. t. 17. (v. s. c.)





XVIII. GLECHOMA L. gen. 714.

Calyx striatus cylindricus fructiferus nudus ; corolla calyce duplò longior 2-labiata , labio superiore 2-fido , inferiore 5-fido laciniâ intermedia majore emarginatâ ; antheræ per paria in crucem conniventes ; semina læviuscula cylindrico-ovata.

1. *G. HEDERACEA* (L. sp. 807.) foliis reniformibus grossè crenatis petiolatis. \mathcal{Y} in sepibus umbrosis ad muros. — Fl. fr. 3. p. 538. — Moris. s. 11. t. 21. f. 10. n. 1. (v. v.)

XIX. STACHYS L. gen. 719.

Calyx angulatus 5-fidus aut 5-dentatus acuminatus ; corolla tubo brevi , limbo suprà fornicato , infrà trilobo lateribus reflexis ; stamna deflorata ad latus utrinquè reflexa ; semina obsoletè triquetra ovoidea aut subrotunda.

1. *L. CORSICA* (Pers. enc. 2. p. 124.) hirsuta , caulis procumbentibus debilibus , foliis ovatis lobato-crenatis obtusis , floribus axillaribus solitariis oppositis , calycis 5-fidi laciniis acuminato-pungentibus , seminibus subrotundis leproso-punctulatis. (I) in incultis montosis Corsicæ. — Glechoma grandiflora Fl. fr. 3. p. 538. (v. s.)
2. *S. ARVENSIS* (L. sp. 814.) hirsuta , caule debili , foliis ovatis cordatis obtusis crenatis , verticillis 6-floris , calycis 5-fidi laciniis linearibus acuminato-pungentibus , seminibus subrotundis. (I) in arvis , vineis. — Fl. fr. 3. p. 551. (v. v.)
3. *S. ANNUA* (L. sp. 813.) pubescens , caule 4-gono erecto , foliis ovato-lanceolatis trinerviis lævibus obtusis crenatis serratis petiolatis , verticillis 6-floris in spicam subdigestis , calycis 5-fidi laciniis linearis-subulatis , seminibus subrotundis nitidis. (I) in cultis , ad agrorum margines. — Fl. fr. 3. p. 551. Jacq. aust. t. 360. — Moris. s. 11. t. 12. f. 8. n. 14. (v. v.)
4. *S. MARRUBIIFOLIA* (Viv. cors. app. p. 2.) hirta , foliis cordatis subrotundo-ovatis crenatis obtusis , floralibus ovatis ellipticisqne integerrimis apice spinulosis , verticillis 6-floris laxis , calycis 5-lobi laciniis lanceolatis mucronato-pungentibus , seminibus ovoideis punctulato-leprosis. — In Corsicâ (cl. Viviani.) — Fl. purpurei. (v. s.)
5. *S. SIDERITIS* (Vill. dauph. 2. p. 375.) hirsuta , caulis ascendentibus , foliis ellipticis lanceolatisve sessilibus acutis crenatis scabris , verticillis sub 6-floris subspicatis , calycis semi-5-fidi laciniis lanceolatis acutis pungentibus , seminibus subrotundis nitidis rugulosis. \mathcal{Y} in arenosis , sterilibus. — Fl. fr. 3. p. 560. *S. recta* L. mant. 82. Jacq. aust. t. 359. (v. v.)
6. *S. HIRTA* (L. sp. 812.) hirsuta , caulis 4-gonis prostratis , foliis ovatis cordatis crenatis petiolatis , verticillis 6-floris , calycis 5-fidi laciniis lanceolatis acuminatis spinosis , seminibus subrotundis leproso-punctulatis. \mathcal{Y} in saxosis collibus Niceæ , Monspelii ex Gouan , Bayonæ ex Lois , Lotharingiæ ex Moug. — Fl. fr. 3. p. 550. All. ped. t. 2. f. 3. — Dalech. hist. 684. ic. (v. s.)
7. *S. MARITIMA* (L. mant. 82.) hirsuta , caulis tetragonis ascendentibus , foliis oblongo-lanceolatis obtusis tomentosis crenatis , inferioribus petiolatis , superioribus sessilibus ovatis integrerimis , verticillis 2-6-floris spicatis , calycis sub 5-fidi laciniis lanceolatis acutis , seminibus subrotundis nitidis. \mathcal{Y} in Galliæ mediterraneæ maritimis. — Fl. fr. 3. p. 549. — Dill. elth. t. 42. f. 50. (v. v.)
8. *S. HERACLEA* (All. ped. t. 84. f. 1.) hirsutissima , caule simplici ascendentente hirto , foliis oblongo-cordatis crenatis serratis petiolatis , superioribus sessilibus , floralibus ovato-acuminatis integris , verticillis 10-floris subspicatis , calycis 5-lobi laciniis lanceolatis mucronatis pungentibus , corollis extus hirsutissimis , seminibus subrotundis nitidis. \mathcal{Y} in siccis collinis Niceæ , Gallo-

provinciæ circâ Grasse, agri Ruscinonensis, et circâ Milhan (cl. Prost). — Fl. fr. 5. p. 401. *S. barbata* Lapeyr. (v. s.)

9. *S. ALPINA* (L. sp. 812.) tomentoso-pubescent, caule erecto, foliis cordatis oblongo-ovatis obtusis crenato-dentatis petiolatis, verticillis subsexfloris, calycis 5-lobi laciniis ovatis mucronatis, corollæ labio superiore plano, seminibus ovoideis nitidis. ♀ in umbrosis. — Fl. fr. 3. p. 548. Lapeyr. fl. pyr. 1. p. 14. t. 8. (v. v.)

10. *S. GERMANICA* (L. sp. 812.) lanata, caule erecto, foliis ovato-lanceolatis lanceolatis acutis crenato-serratis, superioribus sessilibus, inferioribus petiolatis, verticillis multifloris, calycis 5-dentati dentibus rigidis acuminatis, seminibus subrotundis. ♀ ad margines viarum, agrorum. — Fl. fr. 3. 549. — Moris. s. 11. t. 10. f. 4. n. 1. (v. v.)

11. *S. SYLVATICA* (L. sp. 811.) caule erecto hirsuto, foliis cordatis ovatis petiolatis grossè dentatis, verticillis sub 6-floris subspicatis, calycis sub 5-fidi laciniis linear-lanceolatis rigidis acuminatis, seminibus subrotundis nitidis. ♀ in nemoribus umbrosis. — Fl. fr. 3. p. 547. — Riv. t. 26. f. 2. (v. v.)

12. *S. PALUSTRIS* (L. sp. 811.) caule erecto hispido, foliis lanceolatis sessilibus semiamplexicaulibus serratis, verticillis sub 6-floris subspicatis, calycis 5-lobi laciniis linearibus acuminatis, seminibus ovoideis lœvibus. ♀ in humidis aquosis. — Fl. fr. 3. p. 548. — Riv. t. 26. f. 1. (v. v.)

13. *S. GLUTINOSA* (L. sp. 813.) glabra ramosissima, ramis oppositis rigidis glutinosis apice tandem spinescens, foliis sublinearibus, floribus axillaribus subsessilibus subsolitariis 2-bracteatis, calycis sub 5-fidi laciniis lanceolatis acuminato-spinosis, labio superiore abbreviato, seminibus subrotundis rugulosis. ♂ in Corsicâ. — Fl. fr. 3. p. 549. (v. s.)

XX. SIDERITIS L. gen. 712.

Calyx 5-lobus; corolla calyci æqualis aut sæpius longior 2-labiata, superius integra aut emarginata, inferius triloba lobo intermedio latiore crenulato; staminæ non exserta; stigma alterum longius breviore altero involutum.

Sect. I. BURGSDORFIA Mœnch. meth. 392.

Calyces villis clausi bilabiati, labio superiore lato ovato, inferiore 4-dentato; bractæ nullæ.

1. *S. ROMANA* (L. sp. 802.) caulibus herbaceis decumbentibus hirsutis, foliis lanceolato-ovatis, calycibus spinosis corollam subæquantibus. (I) in Galliæ australis aridis. — Fl. fr. 3. p. 529. Cav. ic. 2. t. 187. (v. v.)

Sect. II. HESIODIA Mœnch. -meth. 392.

Calyces villis clausi bilabiati, labio superiore tridentato, inferiore 2-lobo, bractæ nullæ.


2. *S. MONTANA* (L. sp. 802.) caulibus herbaceis ascendentibus hirsutis, foliis lanceolatis, calycibus corollâ majoribus spinosis. (I) in Galliæ australis montanis. — Fl. fr. 3. p. 530. Jacq. aust. t. 434. — Moris. s. 11. t. 4. f. 10. n. 12. (v. v.)


Sect. III. SIDERITIS DC. fl. fr. 3. p. 531.

Calyx 5-fidus nudus; flores bracteati.

3. *S. SCORDIOIDES* (L. sp. 803.) hirsuta, caulis ascendentibus herbaceis sub-villosis, foliis lanceolatis ovatisve dentatis aut dentato-incisis, bracteis ovatis dentato-spinosis, floribus verticillato-spicatis, calycis campanulati laciniis æqualibus acuminato-spinosis corollam subæquantibus. ♀ ♂ in Galliæ australis aridis. — Fl. fr. 3. p. 532. — Lob. ic. 523. f. 1 et 2. — Clus. hist. 2. p. 40. f. 2. (v. v.)

4. *S. HYSSOPIFOLIA* (L. sp. 807.) caulibus herbaceis ascendentibus, foliis lanceolatis subintegris dentatisve, bracteis cordatis dentato-spinosis, floribus





verticillato-spicatis, *verticillis superioribus approximatis*, *calycis campanulati laciniis æqualibus acuminato-pungentibus corollâ brevioribus*. ♀ in *Alpibus et Pyrenæis*. — Fl. fr. 3. p. 532. S. crenata Lapeyr. — Clus. hist. 2. p. 41. f. 2. — Barr. ic. 171. (v. v.)

5. *S. PERFOLIATA* (L. sp. 802.) *herbacea piloso-hispida*, *caulibus erectis*, *foliis superioribus lanceolatis amplexicaulibus denticulatis acuminatis*, *bracteis cordatis acuminatis reticulato-nervosis margine pilosis*. ♀ in *arenosis maritimis circâ Monspelium ex Magn. et Gonan*, *sed civitas admodum dubia*. — Fl. fr. 3. p. 531. (v. v. c.)

XXI. *NEPETA DC.* fl. fr. 3. p. 526. — *Nepetæ sp. L.*

Calyx cylindricus fauce nudâ; *corollæ tubus longus*, *faux patens*, *limbus 2-labiatus*, *suprà emarginatus*, *infrâ 3-lobus lobis lateralibus brevissimis reflexis medio majore crenato concavo*.

1. *N. CATARIA* (L. sp. 796.) *caule pubescente*, *foliis ovatis cordatis petiolatis grossè dentatis superioribus serratis*, *floribus verticillatis verticillis subpedicellatis in spicas dispositis*, *seminibus ovoideis laevibus*. ♀ in *lapidosis campis passim*. — Fl. fr. 3. p. 526. Bull. herb. t. 287. (v. v.)

2. *N. NEPETELLA* (L. sp. 797.) *caule breviter pubescente*, *foliis oblongo-lanceolatis cordatis profundè serratis crenatis*, *cymis pedunculatis in spicas digestis*, *calyce hirsuto*, *seminibus ovoideis punctato-tuberculatis*. ♀ in *ariidis montosis Delph.*, *Galloprowinciae et Pyren. centralium*. — Fl. fr. 3. p. 527. (v. v. DC.)

♂. *lanceolata*, *foliis ovato-lanceolatis*. — N. *lanceolata* Lam. fl. fr. 2. p. 399. DC. fl. fr. 3. p. 526. — All. ped. t. 2. f. 1. (v. s.)

3. *N. PANNONICA* (L. sp. 797.) *caule subglabro*, *foliis oblongo-lanceolatis cordatis petiolatis crenatis serratisve glabris*, *florum glomerulis pedicellatis cymosis remotis in racemum elongatum dispositis*, *calyce subpiloso dentibus ovato-lanceolatis acutis*, *semin. punctato-tuberculosis*. ♀ in *montosis Corsicæ*. — Moris. s. II. t. 6. f. 10. n. 6. (v. s.)

4. *N. VIOLENCEA* (L. sp. 797.) *caule pubescente*, *foliis subpetiolatis glabrinseulis inferioribus cordatis oblongis superioribus lanceolatis*, *florum glomerulis pedicellatis cymosis in spicam verticillaris distantibus dispositis*, *corollæ lobis lateralibus patentibus*, *seminibus punctato-tuberculosis*. ♀ in *Pyrenæis orientalibus*. — Fl. fr. 5. p. 396. — Barr. ic. 601. (v. s.)

5. *N. NUDA* (L. sp. 797.) *caule breviter pubescente paniculato*, *foliis cordato-oblongis sessilibus serratis*, *superioribus linearibus minimis*, *florum glomerulis pedicellatis cymosis in spicas elongatas interruptè verticillatas digestis*, *seminibus ovoideo-triquetris sublaevibus*. ♀ in *collibus Delph. ex Vill.* — Fl. fr. 3. p. 527. Jacq. aust. t. 24. (v. v. c.)

6. *N. LATIFOLIA* (DC. fl. fr. 3. p. 528.) *caule villoso apice paniculato*, *foliis sessilibus ovatis obtusè dentatis*, *florum glomerulis cymosis pedicellatis remotis*, *calyce hirsuto striato sub 5-fido*, *laciniis lineari-subulatis*. ♀ in *Pyrenæis orientalibus*. — N. *grandiflora* Lapeyr. (v. v. DC.)

XXII. *LAVANDULA L. gen. 711: de Gingins lav. hist. 124.*

Calyx ovatus intùs nudus terdecim nervatus, *dentibus 4 subæquilibus quinto summo*, *apice appendiculatim producto*; *corollæ galea biloba*, *labium inferius 5-lobum*; *semina gynobasi tergo adnata*; *stigmata carnosa complanata*.

Sect. I. *STÆCHAS* Clus. hist. 1. p. 344. Ging. l. c. p. 128.

Flores spicati ebracteolati, bracteæ imbricatae, spica comosa.

I. *L. STÆCHAS* (L. sp. 800. excl. var. α.) *caule folioso*, *foliis oblongo-lanceolatis*

canis, calycibus dentatis ovatis canis, spicâ coarctatâ comosâ, seminibus ovatis reticulatis. ♂ in provinciis australibus. — Fl. fr. 3. p. 529. excl. var. ♀. de Ging. tab. 1. f. A. — Black. herb. t. 241. — Lob. ic. 429. f. 2.

a. brachystachya (de Ging. l. c. t. 3. f. 1.) spicis brevioribus 4-gonis, comâ rarâ, foliis angustis. (v. v.)

β. macrostachya (de Ging. l. c. t. 3. f. 2-4.) spicis crassioribus 8-gonis, comâ speciosâ, foliis latioribus. — In Corsicâ (Ph. Thomas). (v. s.)

Sect. II. SPICA Ging. l. c.

Flores verticillato-spicati bracteolati, bracteæ remotæ, spica non comosa; semina nitida oblonga.

2. L. PYRENAICA (DC. fl. fr. 5. p. 398.) caule supernè nudo, foliis angustè lanceolatis, bracteis late cordatis subfoliaceis calyces æquantibus, calyce oblongo velutino, dentibus validis acutiusculis, appendice reniformi-dilatato. ♂ in Pyrenæis orientalibus.—De Ging. t. 1. f. F. et tab. 6. f. 1. L. Spica Lapeyr. abr. pyr. p. 392. Semina tergo trinervia? (v. v.)
3. L. VERA (DC. fl. fr. 5. p. 398.) caule supernè nudo, foliis lanceolatis, bracteis cordato-acuminatis scariosis calycibus brevioribus, calyce ovato tomentoso, dentibus obsoletis, appendice ovato. ♂ vulgaris in collibus et declivibus montium Gallie meridionalis et propè Lugdunum in loco dicto Montou. — De Geng. t. 1. f. G. et t. 6. f. 2. L. spica & Fl. fr. 3. p. 520.—Blackw. herb. t. 294. — J. Bauh. hist. 3. p. 281. f. 2. Calyces cærulei; semina enervia. Variat angustifolia et latifolia, cærulea et alba. Folia nunquam spathulata. (v. v.)
4. L. SPICA (DC. fl. fr. 5. p. 397.) caule supernè nudo, foliis spathulato-lanceolatis, bracteis linearibus velutinis, calyce ovato cano dentibus obsoletis, appendice rhomboideo-ovato. ♂ in aridis Galliæ australioris in regione Olearum. — De Geng. t. 2. f. H. et t. 7. L. spica & Fl. fr. 3. p. 528.—Blackw. herb. t. 295. — J. Bauh. hist. 3. p. 280. f. 1. Variat caule ramoso, foliis latè et angustè spathulatis. (v. v.)

XXIII. SATUREIA Lin. gen. 707.

Calyx campanulatus cylindricusve 5-fidus laciñis æqualibus; corolla limbo 5-lobo subæquali; stamina distantia.

Sect. I. SABATTIA Mœnch. meth. 388.

Calyx cylindricus 10-striatus, fructifer villis clausus.

1. S. GRÆCA (L. sp. 794.) caulis ramosis, foliis ovatis ovato-lanceolatisve pubescentibus subtûs venosis, pedunculis axillaribus 3-6-floris bracteis brevioribus, calyce hispido, laciñis subulatis ciliatis. ♀ in aridis Corsicæ, Niceæ ex All. — Fl. fr. 3. p. 525. — Moris. s. 11. t. 17. f. 10. n. 2. (v. s.)
2. S. JULIANA (L. sp. 793.) caulis subsimplicibus, foliis lanceolato-linearibus margine revolutis pubescentibus, pedunculis axillaribus 3-6-floris, calyce hispido, laciñis subulatis ciliatis. ♀ in aridis Corsicæ, Niceæ ex All. — Fl. fr. 3. p. 524. — Moris. s. 11. t. 17. f. 7. n. 4. (v. s.)

Sect. II. THYMARIA.

Calyx 3-queter 2-labiatus, fauce villosâ.

3. S. CAPITATA (L. sp. 795.) caule suffruticoso ramoso, foliis linear-lanceolatis punctatis ciliatis, inferioribus plicatis, floribus capitato-spicatis, bracteis floribus punctatis brevioribus calycem 2-labiatum superantibus, calycis labio superiore dentibus 3 conniventibus, inferiore laciñis 2 setaceis ciliatis, fauce villosâ. ♂ in montosis Galloprovinciæ ex Garid. — Fl. fr. 3. p. 523. — Cam. epit. 485. ic. Dalech. hist. 900. ic. (v. s. ex Oriente.)

Sect. III. SATUREIA Mœnch. meth. 386.

Calyx campanulatus, ore nudo.

4. S. THYMRA (L. sp. 794.) caule pubescente, foliis obovato-oblongis acumi-



~~Annotati~~

natis punctatis hispidis, verticillis multifloris subrotundis hispidis, calyce hispido laciniis subulatis ciliatis. ♀ ad colles lapidosos agri Nicaënsis ex All. — Fl. fr. 3. p. 523. — Black. t. 318. (v. s. ex Oriente.)

5. *S. HORTENSIS* (L. sp. 795.) caule ramoso, foliis linear-lanceolatis planis in petiolum subattenuatis, pedunculis axillaribus 1-3-floris, calycis campanulati laciniis lanceolatis æqualibus acutis. (I) in Galliæ australis aridis et agris. — Fl. fr. 3. p. 523. — Cam. epit. 487. ic. (v. v. c.)
6. *S. MONTANA* (L. sp. 794.) caule ramoso, foliis punctatis ciliatis linear-lanceolatis mucronatis sessilibus, pedunculis subtrifloris axillaribus subcymosis, calycis campanulati striati laciniis acuminatis ciliatis. ♀ in montosis Galliæ australis et Pyrenæorum vallibus. — Fl. fr. 3. p. 523. — Cam. epit. 717. B. (v. v.)

XXIV. *MENTHA* L. gen. 713.

Corolla calyce paulò longior 4-loba; subæqualis, lobo superiore latiore sæpius emarginato; stamina distantia.

Sect. I. *MENTHASTRUM*. — *Mentha Tourn.* t. 89.

Calyx campanulatus intùs nudus, lobus superior corollæ emarginatus.

1. *M. SELEVSTERI* (L. sp. 804.) caulinis erectis tomentosis, foliis ovatis oblongis sessilibus tomentosis argutè inæqualiter serratis acutis, spicis oblongis subcontinuis, bracteis subulatis, calycis hirsuti 5-dentati campanulati dentibus acuminatis. ♀ in ruderatis, humidis. — Fl. fr. 3. p. 533. — M. nemorosa, et M. gratissima Wild. sp. 3. p. 75. — Lob. ic. t. 508. f. 2 et 509. f. 2. (v. v.)
2. *M. ROTUNDIFOLIA* (L. sp. 805.) caule erecto hirto apice ramoso, foliis subrotundis rugosis serrato-crenatis sessilibus obtusis, bracteis lanceolatis acuminatis, spicis elongatis basi subinterruptis, calyce campanulato 5-dentato, dentibus acutis. ♀ in aquosis. — Fl. fr. 3. p. 534. M. crispa L. sp. ed. 1. p. 576. — Riv. t. 51. f. 2. Lob. ic. t. 506. f. 2. (v. v.)
3. *M. VIRIDIS* (L. sp. 804.) caulinis erectis flexuosis ramosis glabris, foliis lanceolatis glabris argutè serratis sessilibus acutis, bracteis linear-subulatis, spicis interruptis gracilibus acutis, pedicellis glabris, calycis campanulati 5-lobi glabri laciniis acuminatis ciliatis. ♀ in humidis provinc. borealium, Parisiorum, Occitaniæ ex Benth. et Pyren. ex Lapeyr. — Fl. fr. 3. p. 534. — Lob. ic. t. 507. f. 2. (v. s.)
4. *M. PIPERITA* (Huds. ang. 251.) glaberrima, caulinis erectis flexuosis apice ramosis, foliis petiolatis subovatis glabriusculis serratis acutis, bracteis lanceolatis linear-lanceolatis acuminatis, spicis obtusis inferne interruptis, pedunculis axillaribus oppositis multifloris, calycis punctato-glandulosi campanulato-cylindrici sub 5-lobi laciniis acuminatis. ♀ in hortis sæpe colitur. — Fl. fr. 3. p. 534. eng. bot. t. 687. (v. v. c.)
5. *M. HIRSUTA* (Sm. trans. lin. 5. p. 193.) caulinis hirsutis flexuosis ascendentes, foliis ovatis petiolatis subsessilibus serratis pubescentibus sub-acutis, floribus capitatis, pedicellis hirsutis, calycis subcampanulati hirsuti 5-dentati dentibus acutis. ♀ in aquosis. — Fl. fr. 3. p. 535. eng. bot. t. 447. M. hirsuta L. mant. 81. M. aquatica L. sp. 805. — Lob. ic. 509. f. 1. (v. v.)
6. *M. SATIVA* (L. sp. 805.) caulinis flexuosis basi radicantibus, foliis ovatis acutiusculis subserratis petiolatis, floribus verticillatis axillaribus pedicellatis, calycibus subcylindricis 5-dentatis hirsutis, dentibus acutis. ♀ in humidis. — Fl. fr. 3. p. 535. eng. bot. t. 448. M. procumbens Thunil. Nilium sequenti affinis. (v. v.)
7. *M. AKVENSIS* (L. sp. 806.) caulinis hirsutis ramosis, foliis ovatis acutis serratis subsessilibus, floribus verticillatis axillaribus, calycis campanulati 5-dentati hirsuti dentibus acutis. ♀ in campis humidis frequens post messes. — Fl. fr. 3. p. 535. Fl. dan. t. 512. (v. v.)

8. *M. GENTILIS* (L. sp. 805.) caulinis erectis flexuosis hirsutis ramosis, foliis ovatis acutis serratis petiolatis subacutis, floribus verticillatis axillaribus, calycibus subcampanulatis margine hirsutis basi et pedicellis glabris, calycis dentibus acutis. ♀ in aquosis. — Fl. fr. 3. p. 536. — Moris. s. 11. t. 7. f. 5. (v. v.)

9. *M. RUBRA* (Smith. brit. 2. p. 619.) caulinis erectis flexuosis, foliis ovatis subsessilibus serratis subacutis, floribus verticillatis axillaribus, calyce subcampanulato hirsuto, dentibus acutis. ♀ in aquosis circa Parisios. — Fl. fr. 3. p. 536. — Lob. ic. t. 507. Varietas præcedentis? (v. s.)

Sect. II. PULEGIUM Bauh. pin. 222.

Calyx cylindricus villis clausus, lobus superior corollæ integer.

10. *M. PULEGIUM* (L. sp. 807.) caule repente, foliis ovatis obtusis subcrenatis subtus punctatis, floribus verticillatis, calycis subcylindrici 5-dentati dentibus 3 acutis, dentibus 2 inferioribus sublongioribus acuminatis. ♀ in inundatis, ad ripas. — Fl. fr. 3. p. 537. — Lob. ic. 500. f. 2. (v. v.)

11. *M. CERVINA* (L. sp. 807.) foliis linearibus integerrimis obtusis subtus punctatis, floribus verticillatis, calycis 5-dentati cylindrici dentibus mucronatis. ♀ in Gallia australis humidis. — Fl. fr. 3. p. 537. — Blackw. t. 304. Moris. s. 11. t. 7. f. 9. n. 7. (v. v.)

XXV. THYMUS Scop. carn. 1. p. 424. — Thymus et Melissæ sp. L.

Calyx striatus fauce villis clausâ, limbus labiatus supra 3-dentatus, infra bisetus aut bifidus; corolla brevis labiata supra emarginata infra 3-loba lobo medio latiore integro aut emarginato; semina lævia.

Sect. I. PULEGIASTRUM.

Calyx campanulatus subbilabiatus; corolla 4-fida regularis.

1. *T. PARVIFLORUS* (Req. in ann. sc. natur. t. 5. p. 386.) canulinis cespitosis decumbentibus, foliis subrotundis glabris subnerviis petiolatis subintegris, pedunculis solitariis 1-3-floris axillaribus terminalibusve, calycis campanulati dentibus subæqualibus acutis, corollis 4-fidis, seminibus subglobosis. — In montibus Corsicæ. (v. s.)


Sect. II. SERPYLLUM Pers. encr. 2. p. 130.


Calyx campanulatus, corollæ labii inferioris lobus medius integer, pedunculi subuniflori.

2. *T. HERBA-BARONA* (Lois. gall. 2. p. 360. t. 9.) pumilus procumbens glaber suffruticosus, ramis erectis, foliis lanceolato-linearibus uninerviis integrerimis subacutis glandulosopunctatis, floribus subverticillato-capitatis, calycis campanulati glandulosopunctati labio superiore 3-dentato dentibus acutis, inferiore 2-fido laciniis subulatis ciliatis, seminibus subglobosis. ♂ in montibus Corsicæ. — Fl. fr. 5. p. 402. T. Marschallianus Viv. cors. 9 non Wild. (v. s.)

3. *T. VULGARIS* (L. sp. 825.) erectus suffruticosus, foliis linearis-lanceolatis margine revolutis fasciculatis obtusis punctato-glandulosis, floribus capitatis, calycis punctato-glandulosi labii superioris dentibus acutis, inferioris bifidi laciniis subciliatis, seminibus globosis. ♂ in Galliae australis montosis saxosis. — Fl. fr. 3. p. 561. — Blackw. t. 211. (v. v.)

4. *T. ZYGIS* (L. sp. 826.) caulinis suffruticosis procumbentibus ramosis canescens, foliis oppositis fasciculatis linearibus obtusissimis enerviis sessilibus utrinque punctato-glandulosis margine revolutis basi ciliatis, floribus capitatis, calycis campanulati labio superiore 3-dentato erecto, inferiore subbifido laciniis subulatis, seminibus subglobosis. ♂ in ericetis Pyrenæorum ex Lapeyr., Monspelii, Niceæ (Stire). — Fl. fr. 3. p. 560. — Clus. hist. 1. p. 358. f. 2. (v. s.)





5. T. *SERPILLUM* (L. sp. 825. excl. var. ♂) caulis repentibus, foliis ovatis oblongis planis obtusis integris basi ciliatis petiolatis, floribus verticillato-capitatis, calycis campanulati labio superiore tridentato erecto, inferiore subbifido, laciiniis subulatis, seminibus subglobosis. ♀ in aridis apricis. — Fl. fr. 3. p. 559. — Moris. s. II. t. 17. f. 1 et 2. (v. v.)
β. intermedius, caulis suffruticosis procumbentibus, foliis glabris sub-sessilibus nervosis linearibus obtusissimis planis fasciculatis basi ciliatis. — In Pyrenæis. (v. v.)
6. T. *LANUGINOSUS* (Schk. bot. 2. t. 164.) hirsutus, caulis repentibus, foliis subrotundis obtusis villosis integerrimis subpetiolatis, floribus capitatis, calycis campanulati labio superiore 3-dentato dentibus acutis, inferiore 2-fido laciiniis subulatis, seminibus subglobosis. ♀ in sylvaticis sterilibus passim. — Fl. fr. 3. p. 560. An prioris ut vult Linnæus var? (v. s.)
7. T. *CORSICUS* (Pers. enc. 2. p. 131.) caule tortuoso suffruticoso procumbente, foliis orbiculatis pilosis glabris petiolatis, margine calloso integerimo, floribus subsessilibus axillaribus, calyce cylindrico, labii superioris dentibus acutis, inferioris subulatis, corollis calyce duplo majoribus. ♀ ♂ in montibus editioribus Corsicæ, Pyrenæorum ex Lapeyr. — Fl. fr. 5. p. 402. Lois. gall. 2. t. 9. f. 2. (v. s.)

Sect. III. ACYNOS Mœnch. meth. 407.

Calyx basi gibbus; corollæ labii inferioris lobus medius subinteger.

8. T. *ALPINUS* (L. sp. 826.) caulis diffusis basi glabris apice pubescentibus, foliis subrotundis obtusis subserratis, petiolis glabris, verticillis 6-8-floris, calyce cylindrico basi dilatato gibbo, dentibus superioribus acutis, inferioribus longioribus acuminatis, corollis inflatis calyce subduplicata longioribus, seminibus obsoletè triquetris ovoideis. ♀ in Alpestribus saxosis. — Fl. fr. 3. p. 562. Jacq. aust. t. 97. (v. v.)
9. T. *ACYNOS* (L. sp. 826.) caulis subramosis suberectis hirsutis, foliis ovatis oblongis acutis subserratis integris inferioribus subpetiolatis, pedunculis unifloris, verticillis 6-floris, calyce cylindrico basi gibbo dilatato, labii superioris 3-dentati dentibus acuminatis, inferioris subbifidi laciiniis subulatis, seminibus ovoideis. (I) in glareosis, cretaceis, siccis. — Fl. fr. 3. p. 561. — Lob. ic. t. 506. f. 1. (v. v.)

Sect. IV. CALAMINTHA Lam. fl. fr. 2. p. 394.

Calyx cylindricus, corollæ labii inferioris lobus medius emarginatus; pedunculi multiflori.

10. T. *CRETICUS* (DC. fl. fr. 3. p. 564.) adpressè tomentoso-canescens, caulis ramosis erectis ascendenteribus, foliis ovatis subintegris obtusis subpetiolatis, pedunculis subsolitariis submultifloris, bracteis minimis linearibus, calycis subcylindrici dentibus subæqualibus ovatis mucronatis, seminibus ovoideis. ♂ circè Monspelium ex Lin., Massiliam ex Villen. statist. — Melissa Cretica L. sp. 828. — Lob. ic. t. 514. f. 1. (v. s. c.)
11. T. *GLANDULOSUS* (Req. in ann. sc. nat. t. 5. p. 386.) caulis erectis suffruticosis pubescentibus, foliis ovatis argutè serratis aut subintegris obtusis utrinquè punctato-glandulosis, pedunculis axillaribus multifloris dichotomæ-corymbosis, calycis subcylindrici corollæ paulò brevioris dentibus subæqualibus acuminatis, seminibus subovoideis. ♂ in Corsicâ. — Th. clandestinus Salzm. exsicc. (v. s.)
12. T. *NEPETA* (Sm. brit. 2. p. 642.) caulis pubescentibus decumbentibus, foliis ovatis obtusis subserratis, pedunculis axillaribus multifloris dichotomæ-corymbosis, calycis dentibus subæqualibus superioribus duobus suberectis, inferioribus acuminatis longioribus, seminibus subglobosis. ♀ in aggeribus glareosis. — Fl. fr. 3. p. 563. Melissa nepeta L. sp. 828. Au satis à sequente distincta? (v. v.)

13. *T. CALAMINTHA* (Scop. carn. ed. 2. n. 733.) caulis pubescentibus erectis, foliis ovatis obtusis serratis integris petiolatis hirsutis, pedunculis axillaribus multifloris dichotomis corymbosis, bracteis linearibus minimis, calycis subcylindrici corollâ duplò brevioris dentibus ciliatis labii superioris lanceolatis acutis, inferioris acuminatis longioribus, seminibus ovoides obsoletè 3-questris. ♀ in collibus saxosis. — Fl. fr. 3. p. 563. *Melissa Calaminta* L. sp. 827. — Lob. ic. t. 513. f. 1. (v. v.)
14. *T. GRANDIFLORUS* (Scop. carn. ed. 2. n. 732.) caulis erectis pilosulis, foliis ovatis acutis argutè serratis petiolatis, pedunculis axillaribus 3-4-floris, bracteis linearis-lanceolatis pedicellis subsuperantibus, calyce cylindrico corollâ subtriplo minore laciniis dentibusque ciliatis, seminibus subglebosis. ♀ in montosis umbrosis passim. — Fl. fr. 3. p. 562. *Melissa grandiflora* L. sp. 827. — Fl. maximi. (v. v.)

XXVI. MELISSA *Mœnch. meth. p. 408.*

Calyx apice patens fauce nudâ 2-labiatus, suprà planus 3-dentatus infrâ 2-lobus; corolla tubo cylindrico 2-labiata superius fornicata emarginata, inferius triloba lobo medio obcordato.

1. *M. OFFICINALIS* (L. sp. 827.) caule ramoso, foliis ovatis grossè serratis obtusis mucronatis, verticillis dimidiatis, calycis labii superioris dentibus minimis ovatis mucronatis. ♀ in montosis, sepiibus passim; in hortis sæpè colitur. — Fl. fr. 3. p. 564. — Lob. ic. 514. f. 2. (v. v.)
2. *M. PYRENAICA* (Jacq. vind. 2. t. 183.) caule subnudo simplici, foliis oblongis obtusè dentatis, floribus verticillatis, calycis campanulati labii superioris dentibus acuminatis. ♀ in editioribus Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 565. *Horminum Pyrenaicum* L. sp. 831. — Magn. hort. t. 133. (v. v. DC.)

XXVII. MELITTIS *L. gen. 731.*

Calyx magnus 3-fidus suprà emarginatus inæqualiter 2-labiatus tubo corollæ amplior; corolla calyce duplò longior limbo dilatato patente labiato, suprà integro plano, infrâ 3-lobo, lobis magnis inæqualibus; semina subrotundo-triangularia extùs villosa.

1. *M. MELISSOPHYLLUM* (L. sp. 832.) caulis foliosis, foliis ovalibus dentatis crenatis. (I) in sylvis umbrosis. — Fl. fr. 3. p. 565. *Jacq. aust. t. 26. Fl. maximi.* (v. v.)

XXVIII. DRACOCEPHALUM *L. gen. 729.*

Calyx 5-fidus 2-labiatus vel subæqualis; corolla fauce inflatâ 2-labiata superius fornicata aut emarginata, inferius 3-loba, lobis lateribus brevibus erectis, medio integro aut emarginato.

1. *D. AUSTRIACUM* (L. sp. 829.) hirsutum, foliis sessilibus linearibus mucronatis, canlinis 3-7-partitis, rameis simplicibus, floralibus tripartitis, floribus spicatis. ♀ in Alpibus Delph. ex Vill. et Pyrenæis orient. propè *Font de Comps.* — Fl. fr. 3. p. 566. — Clus. hist. 2. p. 185. f. 1. (v. s.)
2. *D. RUYSCIANA* (L. sp. 830.) glabrum, foliis bracteisque lanceolatis linearibusve indivisis muticis, floribus spicatis. ♀ in Alpibus Delphinatûs propè *Vapincum* ex Vill. — Fl. fr. 3. p. 567. — Moris. s. 11. t. 5. f. 9. (v. s. ex Helv.)

XXIX. CLINOPODIUM *Tourn. inst. t. 92. L. gen. 725.*

Calyx labiatus fauce nudâ, limbo suprà 3-fido, infrâ bipartito; corolla tubo brevi, fauce sensim ampliatâ, labio superiore erecto emarginato, inferiore 3-fido laciniâ mediâ majore emarginatâ.

1. *C. VULGARE* (L. sp. 821.) caule subsimplici foliisque remotè dentatis pilosis,

calomyscus

Calomyscus

bunile

bracteis setaceis. 2 ad oras sylvarum. — Fl. fr. 3. p. 557. — Lob. ic. t. 504. f. 2. (v. v.)

XXX. ORIGANUM L. gen. 726.

Galyx varius nunc 5-dentatus, nunc 2-labiatus aut 2-partitus; corolla tubo compresso labiata, superius erecta emarginata, inferius 3-fida subæqualis; semina subrotunda.

Sect. I. ORIGANUM Tourn. t. 64.

Calyx cylindricus 5-dentatus, fructifer villis clausus.

1. *O. VULGARE* (L. sp. 824.) *foliis ovatis, bracteis calyce longioribus ovatis acutis, spicis subrotundis paniculatis conglomeratis. 2 in rupestribus. — Fl. fr. 3. p. 558. — Fuchs. hist. 552. ic. (v. v.)*
2. *O. CRETICUM* (L. sp. 823.) *foliis ovatis, bracteis membranaceis calyce duplò longioribus subobtusis, inferioribus ovatis, superioribus lanceolatis, spicis aggregatis longis prismaticis rectis. 2 Monspelii. — Fl. fr. 3. p. 558. — Cam. epit. 468. ic. (v. s.)*

Sect. II. MAJORANA Tourn. t. 94.

Calyx fructifer nudus bilabiatus, labio superiore majore tridentato, inferiore bilobo.

- + 3. *O. MAJORANOIDES* (Wild. sp. 3. p. 137.) *caule suffruticoso, foliis petiolatis ellipticis obtusis tomentosis, spicis subrotundis pluribus glomeratis pedunculatis. 2 colitur in hortis. — Fl. fr. 3. p. 558. — Lob. ic. t. 498. f. 1. (v. v. c.)*

XXXI. OCYMUM Tourn. t. 96. L. gen. 732.

Calyx labiatus suprà latior orbiculatus infrà 4-fidus; corolla resupinata tubo brevi, 2-labiata labio altero longiore indiviso crenato, altero 4-lobo; filamenta declinata, 2 breviora basi appendiculata.

1. *O. BASILICUM* (L. sp. 833. excl. var. δ) *foliis ovatis obtusis glabris integris, calycibus ciliatis. 2 colitur in hortis. — Fl. fr. 3. p. 570. — Cam. epit. 308. ic. — Lob. ic. t. 503. f. 2. (v. v. c.)*
2. *O. BULLATUM* (Lam. dict. 1. p. 384.) *foliis ovatis concavis bullatis integris incisisque. 2 colitur in hortis. — Fl. fr. 3. p. 570. — Barr. t. 1053. 1054 et 1072. (v. v. c.)*
3. *O. ~~MINIMUM~~* (L. sp. 833.) *glaberrimum, foliis subrotundo-ovatis integerrimis planis. 2 colitur in hortis. — Fl. fr. 3. p. 571. — Barr. ic. t. 1068. 1075. 1077. (v. v. c.)*

XXXII. CLEONIA L. gen. 736.

Calyx fauce villis clausâ, corolla labiata superius concava inferius 3-loba, lobo medio majore emarginato, filamenta apice bifurca seu bidentata, dente altero antherifero altero nudo, stigma 4-fidum.

1. *C. LUSITANICA* (L. sp. 837.) *2 in Occitanîa inter Carcassonam et Sorricinium ex Dom Fourmeault in Herb. Lamarck. — Fl. fr. 3. p. 569. — Barr. ic. t. 561. (v. s. ex Hisp.)*

XXXIII. BRUNELLA Tourn. inst. t. 84. Juss. gen. 116. — Prunella L.

Calyx labiatus fauce nudâ, suprà planus subtruncatus 3-fidus, infrà brevior 2-fidus; corolla labiata, superius concava integra aut 2-loba, inferius 3-loba, lobo medio majore emarginato; filamenta apice bifurca seu bidentata, dente altero antherifero, altero nudo; semina ovoidea nitida.

1. *B. VULGARES* (Moench. meth. 414.) caule ascendentे, foliis petiolatis oblongo-ovatis obtusis basi dentatis integrisve, bracteis ciliatis rotundatis mucronatis, calycis labio superiore truncato tridentato, dentibus minimis mucronatis. $\frac{2}{4}$ in pascuis. — Fl. fr. 3. p. 368. excl. var. ϵ . — Blackw. t. 24. — Tabern. ic. p. 553. (v. v.)
2. *B. LACINIATA* (Lam. fl. fr. 2. p. 366.) caule ascendentе, foliis petiolatis ovato-oblongis obtusis, superioribus lanceolatis dentatis pinnatifidisque, bracteis rotundatis acuminatis ciliatis, calycis labio superiore truncato dentibus brevissimis emarginato-retusis mucronatis. $\frac{2}{4}$ in pascuis sylvaticis. — Fl. fr. 3. p. 568 et *B. vulgaris* ϵ . p. 567. — Clus. hist. 2. p. 43. f. 2. — Vaill. bot. t. 5. f. 1. (v. v.)
3. *B. GRANDIFLORA* (Moench. meth. 414.) caule ascendentе, foliis petiolatis oblongo-ovatis obtusis basi dentatis, bracteis rotundatis ciliatis acuminatis, calycis labio superiore tridentato, dentibus ovatis mucronatis, galea in medio flexa. $\frac{2}{4}$ in siccis, rupestribus, montosis. — Fl. fr. 3. p. 568. *Prun. grandiflora* Jacq. aust. t. 377. *P. vulgaris* β . L. sp. 837. — Moris. s. 11. t. 5. n. 4. f. 5. (v. v.)
4. *B. HYSSOPIFOLIA* (Lam. fl. fr. 2. p. 366.) caule ascendentе, foliis sessilibus lanceolatis integerrimis scabris ciliatis acutis, bracteis rotundatis ciliatis acuminatis, calycis labio superiore 3-dentato, dentibus mucronatis. $\frac{2}{4}$ in Gallicæ australis pascuis humidis argilloso. — Fl. fr. 3. p. 569. — Moris. s. 11. t. 5. n. 7. f. 6. (v. v.)

XXXIV. SCUTELLARIA L. gen. 734.

Calyx brevis labio utroque integro, squamulâ concavâ superius in-cumbente; corolia longior basi flexa, limbo labiato, suprà compressa fornicate ad ortum bidentata, inferius latior emarginata; semina calyce clauso tecta.

1. *S. ALPINA* (L. sp. 834.) foliis ovatis cordatis crenatis, superioribus ovatis ciliatis flore duplo brevioribus, spicis imbricatis rotundatis. $\frac{2}{4}$ in saxosis Alpium, Cebennarum, Pyrenæorum. — Fl. fr. 3. p. 572. All. ped. t. 26. f. 3. (v. v.)
2. *S. HASTIFOLIA* (L. sp. 835.) foliis inferioribus hastatis, superioribus lanceolatis petiolatis obtusis, floribus axillaribus secundis. $\frac{2}{4}$ in agro Andegavensi, Aurelianensi. — Fl. fr. 5. p. 403. (v. s.)
3. *S. MINOR* (L. sp. 835.) foliis cordatis ovatis integris obtusis, superioribus lanceolatis flores subsuperantibus, floribus axillaribus geminis. $\frac{2}{4}$ in paludibus inundatis. — Fl. fr. 3. p. 572. (v. v.)
4. *S. GALERICULATA* (L. sp. 835.) foliis cordato-lanceolatis crenatis subobtusis, floribus axillaribus geminis. $\frac{2}{4}$ in palustribus. — Fl. fr. 3. p. 572. — Lob. ic. t. 344. f. 2. (v. v.)


XXXV. PRASIUM L. gen. 737.

Calyx bilabiatus labio superiore bilobo inferiore trilobo; corollæ labium superius emarginatum, inferius 3-lobum; semina 4 baccata.

1. *P. MAJUS* (L. sp. 838.) caule suffruticoso, foliis ovato-lanceolatis subcordatis dentatis glabris. $\frac{2}{3}$ in Corsicâ. — Fl. fr. 5. p. 403. — Barr. ic. 895. (v. s.)

Albion

Moorland Ridge



Ordo LXXIV. VERBENACEÆ Juss. in ann. mus. 7. p. 63. —
Viticæs Juss. gen. — Pyrenaceæ Vent. tabl. DC. fl. fr. 3.
p. 501.

Calyx tubulosus sæpè persistens. Corolla hypogyna monopetala tubulosa decidua sæpius irregularis. Stam. 4 didynama, rariùs 2 aut 6. Ovarium liberum 2-4-loculare, ovulis erectis solitariis geminisve. Stylus 1. Stigma simplex aut bilobum; pericarpium drupaceum seu baccatum 1-4 pyrena monosperma continens. Semina aut pyrena interdùm membranà utriculari inclusa. Embryo rectus; radicula infera; albumen nullum. — Herbæ aut frutices, foliis oppositis exstipulatis.

I. VITEX Tourn. inst. t. 373. L. gen. 790.

Calyx brevis 5-dentatus; corolla tubo tenui, limbo plano subbilabiato 5-6-lobo inæquali; stamina 4 didynama; drupa sicca tenuis putamine osseo 4-loculari 4-spermo.

1. V. AGNUS-CASTUS (L. sp. 890.) foliis digitatis septenatis quinatisve, foliolis lanceolatis subintegerrimis, spicis verticillatis paniculatis. ♂ in humidis Galliæ australioris passim. — Fl. fr. 3. p. 502. Lam. ill. t. 541. f. 1. (v. v.)

II. VERBENA Tourn. inst. t. 94. L. gen. 32.

Calyx 5-fidus; corolla limbo subbilabiato 5-lobo inæquali; stamina 4 didynama; textus utricularis nectens semina 4.

1. V. OFFICINALIS (L. sp. 29.) caule erecto solitario, foliis multifido-laciñati, spicis filiformibus paniculatis. (I) in ruderatis. — Fl. fr. 3. p. 503. Lam. ill. t. 17. f. 1. (v. v.)
2. V. SUPINA (L. sp. 29.) caulinibus ramosissimis decumbentibus, foliis bipinnatifidis, spicis filiformibus solitariis. (I) in sterilibus Galloprovinciæ ex Gar., Pyren. centralium ex Lapeyr. — Fl. fr. 3. p. 503. — Clus. hist. 2. p. 46. f. 1. (v. v. c.)

Ordo LXXV. ACANTHACEÆ *Juss. gen. p. 102.*

Calyx divisus persistens, sèpè bracteatus. Corolla monopetala hypogyna decidua irregularis. Stamina 2 aut 4 didynama. Ovarium disco glanduloso basi cinctum 2-loculare, loculis polyspermis; stylus 1; stigma bilobum. Capsula 2-locularis, loculis 2 polyspermis abortu 1-spermis, elasticè bivalvis, dissepimento valvis opposito iisdem mediis innascente, scissili ab apice ad basim in placentas 2 utrinquè seminiferas et continuas valvis indè semilibocularibus. Semina processibus subulatis dissepimenti plerumque subtensa. Albumen nullum; radicula infera; cotyledones foliaceæ. — Herbæ (in nostris).

I. ACANTHUS *Tourn. inst. t. 80. L. gen. 793.*

Calyx 4-partitus subbilabiatus; corolla tubo brevi villis clauso, labio unico inferiore maximo 3-lobo; stamina 4 didynama; antheræ antice villosæ; stigma bifidum; capsula ovata, loculis 1-2-spermis.

1. *A. MOLLIS* (L. sp. 891.) foliis sinnatis inermibus. ♀ in Galliæ mediterraneæ humidis et umbrosis. — Fl. fr. 3. p. 493. Lam. ill. t. 550. f. 2. (v. v.)
 2. *A. SPINOSUS* (L. sp. 891.) foliis pinnatis margine spinosis. ♀ in Galliæ mediterraneæ humidis et umbrosis. — Fl. fr. 3. p. 493. Lam. illust. t. 550. f. 1. — Moris. s. 15. t. 2. f. 2. (v. v.)
-

Ordo LXXVI. LENTIBULARIEÆ *Rich. in flor. paris. 1. p. 26.*


Brown prod. p. 429. — Utriculineæ Hoffm. et Linck. fl. portug.

Calyx divisus persistens. Corolla monopetala hypogyna irregularis calcarata bilabiata. Stam. 2 inclusa imæ corollæ inserta; antheræ simplices nunc medio constrictæ. Ovarium 1-loculare. Stylus 1 brevissimus; stigma bilabiatum. Caps. 1-locularis polysperma, placentâ centrali magnâ. Semina parva exalbuminosa. Embryo nunc dicotyledoneus nunc .indivisus. — Herbæ aquatice seu paludosæ, foliis radicalibus, scapis 1-∞-floris, floribus unibracteatis vel rariùs ebracteatis.

I. PINGUICULA *Tourn. inst. t. 74. L. gen. 30.*

Calyx campanulatus 5-fidus; corolla bilabiata superius triloba, inferius 2 loba brevior basi calcarata; stigma bilamellatum.

1. *P. VULGARIS* (L. sp. 25.) scapo glabro, calcare conico recto longitudine corollæ, labio superiore bilobo, inferiore tripartito. ♀ in uliginosis. — Fl. fr. 3. p. 575. Lam. ill. t. 14. f. 1. (v. v.)
2. *P. LUSITANICA* (L. sp. 25.) foliis obtusissimis, scapo gracili subpubescente,





flore minimo nutante, calcare elongato conico obtuso. ♀ in humidis turfosis provinc. occidentalium. — Fl. fr. 5. p. 405. eng. bot. t. 145. Lois. gall. t. 1. (v. v.)

3. P. ALPINA (L. sp. 25.) calcare conico ascendente corollâ breviore, labio superiore emarginato, inferiore lacinis truncatis, capsulâ rostratâ. ♀ in Alpibus et Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 576. — Clus. hist. 1. p. 310. f. 2. (v. v.)

4. P. GRANDIFLORA (Lam. ill. t. 14. f. 2.) calcare subulato recto longitudine floris, corollæ labio superiore patente emarginato maximo, inferiore trilobo. ♀ in editoribus montibus. — Fl. fr. 3. p. 575. (v. v.)

β. *longifolia* (DC. fl. fr. 5. p. 404.) foliis elongatis scapum subsuperantibus. — In Pyrenæis. — P. longifolia Fl. fr. 3. p. 728. Lapeyr. abr. p. 12. (v. v.)

II. UTRICULARIA L. gen. 31.

Calyx 2-partitus labiis æqualibus indivisis; corolla personata labio inferiore basi calcarato; stam. 2 filamentis apice intus antheriferis; stigma 2-labiatum. — Herbæ aquatice foliis radiciformibus demersis multifidis vesiculis numerosis instructis.

1. U. MINOR (L. sp. 26.) foliis 3-partitis, laciniis capillaribus dichotomis, calcare carinato, corollæ labio superiore integro. ♀ in aquis stagnantibus rariū. — Fl. fr. 3. p. 574. Lam. ill. t. 14. f. 2. eng. bot. t. 254. — Petiv. herb. t. 36. f. 12. (v. s.)

2. U. INTERMEDIA (Hayn. term. t. 26. f. 6.) foliis tripartito-dichotomis, ampullis radicibus (non foliis) adfixis, calcare conico, labio superiore integro palato duplò longiore. ♀ in aquis stagnantibus Alsatiæ? Lutetiae ex Merat. — Fl. fr. 5. p. 404. (v. s.)

3. U. VULGARIS (L. sp. 26.) foliis pinnatifido-multifidis, laciniis capillaribus, calcare conico, labio superiore integro. ♀ in aquis stagnantibus. — Fl. fr. 3. p. 574. Lam. ill. t. 14. f. 1. (v. v.)

Ordo LXXVII. PRIMULACEÆ *Vent. tabl. 2. p. 285. DC. fl. fr. 3. p. 430. Duby prim. monog. ined. — Lysimachiæ Juss. gen. 95.*

Calyx monosepalus persistens 4-5-lobatus. Corolla 1-petala hypogyna regularis staminifera, limbo plus minus profundè diviso. Stamina corollæ inserta, ejus lobis numero æqualia et iisdem opposita. Ovarium liberum; stylus 1; stigma simplex. Capsula 1-locularis, polysperma; placenta centrali liberâ. Embryo rectus intrà albumen carnosum; radicula infera. — Herbæ, foliis oppositis rariū alternis aut radicalibus simpli-cibus.

I. HOTTONIA L. gen. 203.

Calyx 5-partitus; corolla tubo brevi, limbo plano 5-lobo; stamina 5 subsessilia; capsula globosa stylo duplò longiore persistente coronata.

1. *H. PALUSTRIS* (L. sp. 208.) foliis pectinatis verticillatis, floribus pedunculatis verticillatis, calycis lacinii linearibus acutis tubum corollæ æquantibus. ♂ in aquis stagnantibus. — Fl. fr. 3. p. 436. Lam. ill. t. 100. eng. bot. t. 364. (v. v.)

II. LYSIMACHIA L. gen. 205.

Calyx 5-partitus; corolla 5-partita rotata tubo minimo, calyce longior; stamina 5 rarius 6; filamenta in quibusdam basi connata; capsula globosa, 5-10-valvis, apice dehiscens polysperma.

Sect. I. NAUMBURGIA Mœnch. meth. supp. p. 23.

Flores thyrsoidei, racemi axillares multiflori; stam. 6 rarius 5.

1. *L. THYRSIFLORA* (L. sp. 209.) foliis oppositis lanceolatis acutis, calyce 5-partito laciiniis linear-i-lanceolatis acutis, corollæ lobis linear-i-spathulatis. ♂ in paludibus Galliae septentrionalis. — Fl. fr. 3. p. 435. Fl. dan. t. 517. (v. s. ex Helvetiâ.)

Sect. II. EPHEMERUM.

Flores racemosi, racemi terminales, stamina exserta.

2. *L. EPHEMERUM* (L. sp. 209.) foliis elongato-lanceolatis glabris sublævibus sessilibus, corollæ lobis obovatis patulis. ♂ in Pyrenæis orientalibus. — Fl. fr. 5. p. 381. — Till. pis. 106. t. 40. f. 2. — Moris. s. 6. t. 10. n. 16. Fl. albi. (v. s.)

Sect. III. LYSIMASTRUM.

Flores paniculati aut solitarii axillares, stamina corollâ breviora.

3. *L. VULGARIS* (L. sp. 209.) caule erecto, foliis oppositis ternisque ovato-lanceolatis acuminatis, floribus paniculatis, calycis laciiniis ovatis, corollæ lobis ovatis obtusis. ♂ ad ripas et paludes. — Fl. fr. 3. p. 434. eng. bot. t. 761. — Blackw. t. 278. (v. v.)

4. *L. NUMMULARIA* (L. sp. 211.) caule repente, foliis subrotundis subcordatis integerrimis obtusis petiolatis, pedunculis solitariis folio longioribus, laciiniis calycinis ovato-lanceolatis acutis corollâ duplò brevioribus. ♂ in pascuis humidis et umbrosis. — Fl. fr. 3. p. 435. Fl. dan. t. 493. — Moris. s. 5. t. 26. f. 5. n. 1. (v. v.)

5. *L. NEMORUM* (L. sp. 211.) caule procumbente, foliis integerrimis ovatis acutis petiolatis, pedunculis solitariis filiformibus per maturationem recurvis, laciiniis calycinis linearibus acuminatis corollâ brevioribus. ♂ in nemoribus montanis. — Fl. fr. 3. p. 435. Fl. dan. t. 174. Lerouxia nemorum Mer. fl. par. ed. 11. p. 149. — Moris. s. 5. t. 26. f. 6. n. 2. (v. v.)

III. ASTEROLINUM Link et Hoff. fl. portug. 333. Duby prim. mon. ined.

Calyx 5-partitus; corolla calyce triplo quadruplove brevior, tubo ovato limbo campanulato tubum subæquante 5-lobo lobis rotundatis; capsula globosa 5-valvis 2-3-sperma; placenta globosa.


1. *A. STELLATUM* (Link et Hoff. l. c.) caule erecto ramosissimo, foliis oppositis sessilibus lanceolatis acutis, calycis laciiniis linear-i-lanceolatis acuminatis. (I) in siccis et herbosis Galliae australis. — Lys. linum-stellatum Fl. fr. 3. p. 436. — Magn. monsp. 163. ic.

IV. CENTUNCULUS L. gen. 145.

Calyx 4-lobus; corolla rotata-4-loba; stamina 4; capsula globosa circumscissa.

1. *C. MINIMUS* (L. sp. 169.) foliis alternis ovatis, floribus sessilibus. (I) in uli-

next week



ginosis, pascuis et ericetis inundatis passim. — Fl. fr. 3. p. 431. — Vaill. bot. t. 4. f. 2. (v. v.)

V. ANAGALLIS *Tourn. inst. t. 59. L. gen. 206.*

Calyx 5-partitus; corolla rotata 5-loba; capsula globosa circumscissa.

1. A. ARVENSIS (L. sp. 211.) caulis ramosis subprocumbentibus, foliis oppositis ternisve ovatis sessilibus subacutis, pedunculis folio longioribus, calycis laciniis lanceolato-linearibus acuminatis corollæ subæqualibus. (1) in campis et cultis. — A. cærulea et phœnica. Fl. fr. 3. p. 431 et 432. — Cam. epit. 394 et 395. ic. Variat floribus purpureis carneis cæruleisve. (v. v.)
2. A. REPENS (DC. syn. gall. p. 205.) caule ramosissimo ramisque repentibus, foliis sessilibus ovatis oppositis, pedicellis folio subæqualibus, calycis laciniis lanceolato-linearibus acuminatis. (2) in montibus Galloprovinciæ Sedenensis detexit cl. Clarion. — Fl. fr. 5. p. 381. (v. s. spec. imperf.)
3. A. CRASSIFOLIA (Thore chl. land. p. 62.) caule repente, foliis alternis subrotundis crassis subpetiolatis, pedunculis folio brevioribus, calycis laciniis lanceolato-linearibus acuminatis corollâ brevioribus. (2) in uliginosis turfosis circa Aquas Tarbellicas. — Fl. fr. 3. p. 433. (v. v.)
4. A. TENELLA (L. mant. 335.) caule prostrato-filiformi, foliis subrotundis ovatisve mucronulatis oppositis petiolatis, pedunculis folio longioribus, calycis laciniis lanceolato-linearibus acuminatis corollâ quadruplo brevioribus. (2) in humidis et paludosis provinciarum australium occidentaliumque et circa Parisios. — Fl. fr. 3. p. 432. *Lysimachia tenella* L. sp. 211. — C. Bauh. prod. 136. ic. (v. v.)

VI. CORIS *L. gen. 243.*

Calyx ventricosus 5-dentatus dentibus basi spinosis spinis exsertis; corolla tubulosa limbo 5-fido inæquali; stam. 5; capsula globosa 5-valvis 5-sperma.

1. C. MONSPELIENSIS (L. sp. 252.) caulis sublignosis, foliis linearibus, floribus racemoso-capitatis. (2) in Galliae mediterraneæ maritimis aridis. — Fl. fr. 3. p. 437. Lam. ill. t. 102. — Cam. epit. 699. ic. (v. v.)

VII. TRIENTALIS *Tourn. L. gen. 461. DC. fl. fr. 5. p. 382.*

Calyx 7-partitus, corolla rotata 7-partita; stamina 7; bacca exsucca surtis dehiscentes.

1. T. EUROPÆA (L. sp. 488.) caule erecto simplici basi nudo, foliis confertis lanceolatis, calycis laciniis linearibus acuminatis. (2) in Arduennâ sylvâ circa Sanctum Hubertum, in Delphinatû ex Dalech. — Fl. fr. 1. c. eng. bot. t. 15. — Moris. s. 12. t. 10. f. ult. (v. s. ex Germ.)

VIII. ANDROSACE *Tourn. inst. t. 46. DC. fl. fr. 3. p. 437. Aretia et Androsace L.*

Calyx persistens quinquesfidus; corolla hypocrateriformis limbo 5-lobo lobis plerumque integris, fauce ad limbum coarctatâ, tubo ovato calyce breviore; antheræ obtusæ; stylus brevissimus; capsula globosa 5-valvis, valvis ex apice ad basin dehiscentibus; semina plerumque pauca (3-5).

Sect. I. ARETIA *L. gen. 195.*

Flores solitarii.

1. A. BRYOIDES (DC. fl. fr. 3. p. 440.) dñsè cespitosa, foliis imbricatis confertis


lanceolatis obtusis pilosis pilis simplicibus, floribus terminalibus sessilibus, calyce piloso 5-fido, lobis obtusis, capsulae valvis post maturationem erectis. $\frac{1}{2}$ in Alpibus Sedenensis (cl. Clarion), Pyren. editioribus ex cl. Bentham. — DC. ic. rar. t. 6. — Hall. helv. t. 11. (v. v. in Helv. D.)


2. A. IMBRICATA (Lam. ill. t. 98. f. 4.) cespitosa, foliis subverticillatis lanceolato-oblongis obtusis apice tomentosis tomento brevi conferto albo pilis ramosis et radiantibus, floribus axillaribus pedicellatis, calycis tomentosi 5-fidi lobis acutis, capsulae valvis post maturationem reflexis et patentibus. $\frac{1}{2}$ in saxosis editiorum Pyrenæorum, Alpium Delphinatū ex Vill. — Fl. fr. 3. p. 439. A. argentea Gértn. carp. 3. t. 198. f. 4. (v. v. DC.)
3. A. PYRENAICA (Lam. ill. n. 1953.) cespitosa, foliis imbricatis carinatis recurvis linearibus obtusis ciliatis pubescentibus pilis simplicibus, pedunculis folio longioribus incurvatis glabris, calyce campanulato 5-fido subglabro lobis obtusis. $\frac{1}{2}$ in editioribus Pyrenæis ad rupes frigidiores muscosas versus Seculejo et Averan. — Fl. fr. 3. p. 438. — A. diapensioides Lapeyr. fl. pyr. 1. t. 3. (v. s.)
4. A. CYLINDRICA (DC. fl. fr. 3. p. 439.) cespitosa, caule ramoso ramis cylindricis, foliis dense imbricatis lanceolato-ovatis obtusissimis pilosis pilis simplicibus antiquioribus persistentibus reflexis, pedunculis folio longioribus pilosis, calyce 5-lobo lobis lanceolatis acutis. $\frac{1}{2}$ in rupibus calcareis sylvæ dictæ St.-Bertrand, propè la Oule du Marboré in editioribus Pyrenæis. — A. frutescens Lapeyr. abr. pyr. p. 92. (v. s.)
5. A. ALPINA (Lam. ill. t. 98. f. 3.) caulibus elongatis procumbentibus, foliis laxè imbricatis patentibus caducis lanceolatis obtusis ciliatis pubescentibus pilis apice ramosis, pedunculis folio longioribus pilosis ad florem incrassatis, calyce sub 5-partito, lobis subpatentibus lanceolato-linearibus obtusis. $\frac{1}{2}$ in Alpibus Delphin. ex Vill. — Fl. fr. 3. p. 440. (v. v. in Sabandiâ.)
6. A. PUBESCENS (DC. fl. fr. 3. p. 438.) caulibus erectis confertis, foliis densè imbricatis persistentibus spathulatis obtusis ciliatis apice pubescentibus pilis simplicibus raro bifurcati, pedunculis folio subbrevioribus ad florem non incrassatis, calyce 5-fido pubescente pilis simplicibus, lobis lanceolato-ovatis erectis acutis. $\frac{1}{2}$ in rupestribus Alpium Delphin. ex Vill., Pyrenæorum ex Lapeyr. — Ic. rar. t. 5. A. Alpina junior Lapeyr. An var. sequentis cui primo aspectu simillima. (v. s. ex Helv.)
7. A. CILIATA (DC. fl. fr. 3. p. 441.) caulibus laxis, foliis imbricatis lanceolato-oblongis persistentibus glabris venosis ciliatis ciliis simplicibus rarissimè subbifurcati, pedunculis folio sublongioribus incurvatis ad calycem incrassatis, calyce 5-fido pubescente pilis simplicibus, lobis erectis lanceolato-linearibus acutis. $\frac{1}{2}$ in editioribus Pyrenæis, Port d'Oo, Maladetta. — A. Alpina adultior Lapeyr. (v. s.)

Sect. II. ANDRASPIS Duby primul. monog. ined. — Androsace
L. 196.

Flores in umbellam digesti, involucro scapoque muniti.

8. A. VILLOSA (L. sp. 203.) caulibus confertis, foliis rosulatis linearis-oblongis subobtusis utrinquè pilis longis albis obtectis, involueri foliolis acutis linearilanceolatis villosissimis pedicellatos inæqualemente superantibus, calycis sub 5-partiti laciniis subobtusis. $\frac{1}{2}$ in Pyrenæis monte Ventoso, Alpibus Delphin. et Jurrasi summo cacumine la Dole dicto. — Fl. fr. 3. p. 441. Jacq. coll. 1. t. 12. f. 3. bot. mag. t. 743. (v. v.)
9. A. CHAMÆJASME (Wild. sp. 1. p. 799.) caulibus erectis laxis, foliis rosulatis ovato-lanceolatis acutis in petiolum subcoartatis utrinquè subglabris margine ciliatis, scapis villosis pilis ramosis, involueri foliolis subobtusis lanceolato-ovatis villosis ciliatisque, calycis sub 5-partiti pilosi laciniis acutis. $\frac{1}{2}$ in Alpibus Delphinatū. — Fl. fr. 3. p. 443. excl. var. A. villosa Jacq. austr. t. 332. non L. — Clus. hist. 2. p. 62. ic. (v. v. in Helv.)





10. *A. OBTUSIFOLIA* (All. ped. t. 46. f. 1.) caulis erectis confertis, foliis rosulatis lanceolatis obtusis sessilibus glabris margine brevissimè ciliatis, scapis tormentosis, involuci foliolis lanceolato-ovatis acutis pedicellis subduplicatis minoribus, calycis 5-lobi brevissimè tormentosi lacinii acutis. $\frac{1}{2}$ in editioribus Alpibus Delphin. ex Vill. — *A. chamæjasme* var. β et γ . — Fl. fr. 3. p. 443. *A. brevisifolia* Vill. dauph. 2. t. 15. (v. v. in Helv.)
11. *A. LACTEA* (L. sp. 204. excl. syn. All.) caulis procumbentibus, foliis rosulatis lanceolato-linearibus acutis sessilibus pilis brevibus ciliatis, scapis erectis paucifloris glaberrimis, involuci foliolis linear-lanceolatis acutis glaberrimis pedicellis multo brevioribus, calycis 5-fidi glabri lacinii lanceolatis acutis. $\frac{1}{2}$ in Cebennis, Alpibus Delph. Galloprov. — Fl. fr. 3. p. 442. bot. mag. t. 981. *A. pauciflora* Vill. dauph. 2. t. 15. (v. s.)
12. *A. CARNEA* (L. sp. 204.) caulis erectis brevissimis, foliis rosulatis linearibus acutis subulatis subciliatis, scapis flexuosis multifloris pilosis, involuci foliolis acutis exterioribus subappendiculatis pedicellis subbrevioribus, calycis 5-fidi glabri lacinii lanceolatis acutis. $\frac{1}{2}$ in Vogesis, Alpibus, montibus Arvernæ, Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 442. — Hall. helv. t. 17. (v. v.)
13. *A. SEPTENTRIONALIS* (L. sp. 203.) caulis nullis, foliis rosulatis lanceolato-ovatis denticulatis subciliatis in petiolum alatum subcoarctatis, scapis numerosis multifloris, involucro polyphylo minimo foliolis lanceolatis acutis, pedicellis filiformibus elongatis, calycis vix 5-lobi lacinii acuminatis. (I) in frigidioribus montium Delph., Galloprov., Cebennarum ex Gouan. — Fl. fr. 3. p. 444. Lam. ill. 98. f. 2. — Mill. ic. 20. t. 30. f. 2. (v. s.)
14. *A. MAXIMA* (L. sp. 203.) caulis nullis, foliis rosulatis ovatis denticulatis sessilibus acutis, scapis multifloris, involuci maximi foliolis obovatis obtusis pedicellis longioribus, calycis sub 5-partiti urceolati corollâ longioris lacinii acutis. (I) in cultis Delphin., Galloprov., Occitanæ, Ligeris, Pictaviae et Andegaviae. — Fl. fr. 3. p. 444. — Moris. s. 5. t. 24. f. 6. (v. v.)

IX. GREGORIA Duby prim. mon. ined.

Calyx persistens campanulatus 5-fidus; corolla hypocrateriformis limbo 5-fido lobis ovatis, fauce ovatâ non coarctatâ, tubo tereti calyce multo longiore; capsula ovalis 5-valvis, valvis ex apice ad basin dehiscentibus, disperma, placenta centralis compressa.

1. *G. VITALIANA* (Dub. l. c.) caulis numerosis prostratis sublignosis, foliis imbricatis linearibus angustissimis acutis, floribus subsessilibus solitariis. $\frac{1}{2}$ in Alpibus Delphin., monte Ventoso, Pyrenæis. — *Primula Vitaliana* L. sp. p. 206. — Sesl. epist. t. 10. f. 1. — Column. ephr. 2. t. 65. f. 1. Flores lutei dessicatione virescentes. (v. v.)

X. PRIMULA L. gen. 197. Duby l. c.

Calyx plus minus profundè 5-dentatus; corollæ hypocrateriformis limbus 5-lobus lobis plerumque emarginatis, fauce ad limbum dilatatâ, tubo tereti calycem æquante aut superante; antheræ sæpè acuminatae; capsula ovata 5-aut 10-valvis, valvulis apice tantum dehiscentibus, seminibus minimis numerosis.

Sect. I. PRIMULASTRUM Dub. l. c.

Calycis corollæ tubum æquantis aut subæquantis laciniae acutæ; involuci foliola subæqualia sublinearia acuta. — Folia rugosa mollia crenata aut dentata.

1. *P. OFFICINALIS* (Jacq. misc. 1. p. 159.) foliis ovato-oblongis in petiolum subcoarctatis undulato-crenatis obtusis, scapo multifloro, involuci foliolis linearibus acutis, floribus nutantibus secundis, calycis campanulati ampliati 5-dentati dentibus lanceolato-ovatis. $\frac{1}{2}$ in sylvis pascaisque. — Fl. fr. 3. p. 446. — *P. veris* Cam. epit. 833. ic. — Fuchs. hist. 850. ic. (v. v.)

2. *P. ELATIOR* (Jacq. misc. 1. p. 158.) foliis ovatis in petiolum subcoartatis infernè tomentosis sinuatis aut denticulatis obtusis, scapis pubescentibus multifloris, pedicellis divaricatis, calycis pubescentis subventricosi adpressi dentibus lanceolatis acutis. $\frac{1}{2}$ in pascuis et sylvis submontosis. — Fl. fr. 3. p. 445. *P. veris elatior* L. — Fuchs. hist. p. 845. t. 851. ic. (v. v.)
3. *P. GRANDIFLORA* (Lam. fl. fr. 2. p. 248.) foliis ellipticis subsessilibus denticulatis obtusis supernè glabris subtus pilosis, scapo plerūmque abortivo, pedunculis unifloris foliis minoribus, calycis campanulati 5-costati sub 5-fidi lobis lanceolatis acutis. $\frac{1}{2}$ in pratis nemoribus, etc. — Fl. fr. 3. p. 445. *P. vulgaris* Huds. *P. acaulis* Fl. dan. t. 194. *P. brevistyla* DC. fl. fr. 5. p. 383. — Lob. ic. 568. Scapi cum adest involucrum foliolis linearibus acutissimis. (v. v.)

Sect. II. AURICULA Tourn. 46.

Calycis campanulati corollæ tubo duplò aut triplò minoris laciniæ subacutæ; involucri foliola inæqualia ovata aut ovato-lanceolata obtusa. — Folia plana crassa obtusa.

4. *P. AURICULA* (L. sp. 205.) foliis ovato-spathulatis sessilibus glabris glancescentibus farinaceis, scapo farinoso, involucri foliolis obtusis ovatis, calycis 5-lobi laciniis ovato-lanceolatis subobtusis. $\frac{1}{2}$ in Alpibus Delphinatus spontanea, in hortis culta. — Fl. fr. 3. p. 448. Jacq. austr. t. 415. — Lob. ic. 569 et 570. Variat spontanea flor. rubris et luteis, foliis integerrimis aut crenatis. (v. v. in Alp. Helv.)
5. *P. MARGINATA* (Curt. bot. mag. t. 191.) foliis lanceolato-ovatis obtusis serrato-dentatis margine albo farinaceo cinctis in petiolum subcoartatis, involucri foliolis ovatis obtusis inæqualibus, calycis sub 5-fidi parvi intus farinacei laciniis lanceolatis acutis. $\frac{1}{2}$ in Alpibus Delph. Galloprovinc., Pyrenæis ex Lapeyr. — *P. crenata* Lam. ill. t. 98. f. 3. DC. fl. fr. 3. p. 449. — Fl. purpurei. (v. v. DC.)
6. *P. VILLOSA* (Jacq. aust. 5. app. t. 27.) foliis spathulatis inæqualiter serratis in utrâque superficie glanduloso-villosis margine ciliatis in petiolum subcoartatis, involucri foliolis linearibus acutis, calycis villosa-pubescentis laciniis subacutis. $\frac{1}{2}$ in Alpibus et Pyrenæis. — *P. viscosa* et *P. hirsuta* Vill. dauph. 2. p. 467 et 469. Fl. fr. 3. p. 449. *P. pubescens* Jacq. misc. 1. t. 18. f. 2. *P. latifolia* Lapeyr. (v. v.)

Sect. III. ARTHRITICA Dub. l. c.

Calycis corollæ tubo minoris laciniæ obtusæ, involucri foliola caduca oblonga acuta pedicellis majora. — Folia plana obtusa crassa.

7. *P. INTEGRIFOLIA* (L. sp. 205.) foliis ellipticis integerrimis ciliatis nitidis sessilibus, involucri foliolis lineari-lanceolatis tomentosus, calycis 5-fidi laciniis obtusis. $\frac{1}{2}$ in Alpibus, Corbariensibus, Cebennis et Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 450. Jacq. austr. t. 327. — Clus. hist. p. 304. ic. (v. v.)


Sect. IV. ALEURITIA Dub. l. c.


Calycis tñbum corollæ subæquantis glabri laciniæ acutæ, involucri foliola lanceolato-linearia acuminata. — Folia plana subobtusa farinâ plerūmque aspersa.

8. *P. FARINOSA* (L. sp. 205.) foliis in petiolum subcoartatis obtusissimis in paginâ inferiore pulvere lnteo farinaceo obtectis, involucri farinacei foliolis lanceolato-linearibus basi subappendiculatis, calycis 5-fidi laciniis acutis. $\frac{1}{2}$ in pratis humidis Jurassi, Alpium, Pyrenæorum. — Fl. fr. 3. p. 446. — Lob. ic. 570 et 571. (v. v.)

XI. CORTUSA L. gen. 198.

Calyx 5-partitus; corolla tubo minimo, limbo campanulato sub 5-partito; stamina 5 basi limbi inserta; antheræ conniventes acuminatæ; caps. 5-valvis apice dehiscentia polysperma.





1. **C. MATTHIOEPI** (L. sp. 206.) foliis petiolatis villosis 7-9 lobis obtusis, calycibus corollâ brevioribus. ♀ in Pyrenæis ex Lapeyr. — Fl. fr. 3. p. 451. bot. mag. t. 987. Valde dubia civis. (v. s. ex Pedem.)

XII. SOLDANELLA L. gen. 199.

Corolla campanulata lacero-multifida; stamina 5; capsula multivalvis spiraliter striata oblonga cylindrica polysperma.

1. **S. ALPINA** (L. sp. 206.) foliis petiolatis cordato-orbiculatis. ♀ in Jurasso, Alpibus, Pyrenæis propè nives deliquescentes. — Fl. fr. 3. p. 451. — Moris. s. 3. t. 15. f. 8. (v. v.)

XIII. DODECATHEON L. gen. 200.

Calyx 5-fidus; corolla tubo minimo, limbo rotato 5-partito lobis reflexis; stam. 5 filamentis minimis, antheris magnis acutis apice conniventibus; capsula oblongo-ovata 5-valvis, valvis ex apice ad basin dehiscentibus, polysperma.

1. **D. MEADIA** (L. sp. 207.) foliis ovato-oblongis irregulariter dentatis, scapo multifloro, floribus nutantibus, involueri foliolis exterioribus ovato-spathulatis, interioribus lanceolatis. ♀ ex Virginiam orta, in hortis colitur. — Fl. fr. 3. p. 452. Curt. mag. 12. — Catesb. car. 3. p. 1. f. 1. (v. v. c.)

XIV. CYCLAMEN L. gen. 201.

Calyx campanulatus 5-fidus; corolla tubo ovato ad limbum dilatato, limbo 5-partito reflexo; stam. 5 imo tubo inserta; antheræ sessiles; capsula coriacea aut subcarnosa globosa polysperma.

1. **C. EUROPEUM** (L. sp. 207.) foliis reniformibus crenatis basi cordatis sinubus rotundis, calycis lobis ovatis acutis. ♀ in sylvis umbrosis et lapidosis montium. — Fl. fr. 3. p. 452. — Moris. s. 13. t. 7. f. 1. n. 2. (v. v.)

2. **C. HEDERA-EFOLIUM** (Ait. kew. 1. p. 196.) foliis oblongis crenatis subhastatis angulatis basi cordatis sinubus angulatis divaricatis, calycis 5-fidi lobis lanceolatis acuminatis. ♀ in montosis Corsicæ, Galloprovinciæ et Occitanie? — Folia sèpè zonata. Flores sèpè antè folia nascuntur. — C. linearifolium DC. fl. fr. 3. p. 453. ic. rar. t. 8. nihil aliud mihi videtur quam hujus speciei specimen, cuius pedunculi aliquot floribus aliquo casu orbat foliorum linearium dessicatione speciem induerunt; aliter censem summus De Candolle qui (organogr. 1. p. 181.) hæc organa habet ut phyllodia aut pedunculos floribus orbatos. Dub. in bibl. univ. genev. mai 1827. sc. et art. p. 76. (v. s.)

XV. GLAUX L. gen. 291. Dut. de Salv. et St.-Hil. mem. mus. 2. p. 393.

Calyx campanulatus 5-fidus coloratus; cor. nulla; stam. 5 hypogyna; stigma capitatum; capsula 1-locularis 5-valvis; semina placentæ centrali globoso affixa, embryo rectus umbilico parallelus.

1. **G. MARITIMA** (L. sp. 301.) ♀ in Oceani maritimis et Niceæ ex All. — Fl. fr. 4. p. 411. Lam. ill. t. 141. Folia opposita coriacea ovato-lanceolata, flores sessiles axillares. (v. v.)

XVI. SAMOLUS L. gen. 222.

Calyx semi-adhærens persistens; corolla hypocrateriformis 5-loba, squamis 5 filiformibus introflexis è corollæ sinubus ortis; stamina 5 imæ corollæ inserta; ovarium semi-inferum; capsula semi-5-valvis.

1. **S. VALERANDI** (L. sp. 243.) caule erecto, foliis ovato-spathulatis obtusis. ♀ in paludosis. — Fl. fr. 3. p. 454. — Moris. s. 3. t. 24. n. 28. f. 10. (v. v.)

Ordo LXXVIII. GLOBULARIEÆ DC. fl. fr. 3. p. 427. Cambess. glob. mon. in ann. sc. nat. 9. p. 15.

Flores capitati, involucro polyphyllo cincti, receptaculo paleaceo impositi. — Calyx 1-sepalus tubulosus 5-lobus. Corolla hypogyna, receptaculo inserta, tubulosa inaequaliter 5-loba. Stamina 4-5 summo tubo inserta et corollæ lobis alterna. Antheræ medio dorso insertæ, uniloculares. Ovarium liberum ovoideum 1-loculare ovulo unico pendulo. Stylus bifidus. Fructus ovoideus calyce persistente tectus 1-spermus. Embryo rectus; radicula supera; albumen carnosum. — Herbae aut suffrutices, foliis alternis. Ordinem vicinum Dipsaceis affirmat cl. Cambes sedes l. c.

I. GLOBULARIA Tourn. t. 265. L. gen. n. 112.

Vide characterem ordinis.

* Fruticosæ.

1. G. ALYBUM (L. sp. 139.) caule erecto fruticoso, foliis lanceolato-ovatis mucronatis integris apice interdum tridentatis, capitulis terminalibus, involuci squamis imbricatis lanceolatis margine ciliatis, calycibus hirsutis. ♂ in lapidosis Galliæ mediterraneæ. — Fl. fr. 3. p. 427. — Lob. ic. t. 371. f. 2. Garid. aix. t. 42. (v. v.)
2. G. CORDIFOLIA (L. sp. 139.) caulis prostratis suffruticosis, foliis cuneiformibus petiolatis integerrimiis apice emarginatis, dente intermedio minimo, scapis unifloris subnudis, involuci squamis imbricatis lanceolatis acuminatis, calyce hirsuto. ♂ in saxosis et apricis Alpium, Vogesorum, Jurassi. — Fl. fr. 3. p. 429. Lam. ill. t. 56. f. 2. (v. v.)
3. G. NANA (Lam. dict. 2. p. 723.) caule fruticoso prostrato ramoso, foliis ovato-spathulatis integerrimiis petiolatis mucronatis, scapis nudis brevissimis, squamis imbricatis lanceolatis acuminatis, calycibus hirsutis. ♂ in collibus et montibus apricis à Nicæa usque ad Pyrenæos passim. — Fl. fr. 3. p. 429. G. cordifolia ⚡ nana Cambess. l. c. p. 27. G. punctata Lapeyr. (v. v.)

* * Herbaceæ.

4. G. NUDICAULIS (L. sp. 140.) foliis radicalibus integerrimiis ovatis oblongis obtusis petiolatis, scapo nudo, involuci squamis linear-lanceolatis acuminatis, calycibus glabris. ♀ in Alpibus meridionalibus et in Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 428. Jacq. aust. t. 230. (v. v.)
5. G. VULGARIS (L. sp. 139.) caule herbaceo, foliis radicalibus petiolatis ovato-spathulatis apice tridentatis, caulinis alternis ovato-lanceolatis lanceolatis acutis, squamis lanceolatis acuminatis, calycibus hirsutis. ♀ in sterilibus et pratis siccis. — Fl. fr. 3. p. 428. — Lob. ie. t. 478. f. 2. (v. v.)



W. G. W. B.

Subclassis IV. MONOCHLAMYDEÆ.

Perigonum simplex, petalis nempè aut nullis aut cum calyce coalitis.

Ordo LXXIX. PLUMBAGINEÆ *Juss. gen. 92.*

Perigonum duplex persistens; externum (involucrum? calyx ex R. Brown?) 1-sepalum tubulosum integrum aut dentatum; interius corollaceum hypogynum mono-aut polypetalum. Stamina 5, in monopetalis receptaculo inserta, in poly-petalis imis petalis adnata. Ovarium simplex liberum monospermum, ovulo inverso pendulo ab apice funiculi è fundo ovarii orti. Styli plures, aut unicus stigmata plura gerens. Capsula monosperma. Semen inversum. Embryo compressus albumine farinaceo cinctus. — Herbæ aut suffrutes; folia simplicia integra alterna aut radicalia; flores hermaphroditi capitati aut spicati.

I. PLUMBAGO *Tourn. inst. t. 5. L. gen. 213.*

Perigonum externum hirtum tubulosum 5-dentatum; internum petaloideum infundibuliforme monopetalum 5-lobum; stamina 5 hypogyna basi dilatata; stylus 1; stigmata 5; capsula apice dehiscens, 5-valvis.

1. P. EUROPEA (L. sp. 215.) foliis amplexicaulibus lanceolatis scabris, caule stricto. ♀ in Galliâ australi. — Fl. fr. 3. p. 424. — Moris. s. 15. t. 1. f. 2. (v. v.)

II. STATICE *L. gen. 388.*

Perigonum externum scariosum plicatum integrum; internum monopetalum aut 5-petalum coloratum persistens; stamina 5, petalis inserta; styli 5; capsula non dehiscens dupli perigonio obtecta.

Sect. I. LIMONIASTRUM *Mœnch. meth. 428.*

Flores monopetali, sessiles, secùs ramos longà serie dispositi; folia caulinæ sparsa.

1. S. MONOPETALA (L. sp. 396.) caule fruticoso folioso, foliis lanceolatis vaginantibus tuberculosis, floribus solitariis alternis, ramis paniculato-fasciculatis, squamis cucullatis vaginantibus mucronulatis dimidio brevioribus perigonio externo 5-dentato dentibus linearibus acuminatis, perigonio interno 1-petalo 5-lobo. ♂ in arenis maritimis propè Narbonam. — Fl. fr. 3. p. 423. — Bocc. sic. t. 17. (v. v.)

Sect. II. LIMONIUM *Tourn. inst. 177.*

Flores 5-petali, sessiles, secùs ramos longà serie dispositi, squamis scariosis cincti; folia radicalia rosulata.

* *Perigonio externo bracteâ internâ longiore.*

2. S. **LIMONIUM** (L. sp. 394.) foliis obovato-oblongis margine undulatis glabris obtusis subtus mucronatis petiolatis, scapo erecto paniculato, paniculâ ramosa, floribus solitariis geminisve fasciculato-spicatis unilateralibus, squamis obovatis imbricatis, perigonio externo denticulato dentibus acutis. ♀ in maritimis Mediterranei et Oceani. — Fl. fr. 3. p. 421. Fl. dan. t. 315. Folia scapo vix triplò breviora. (v. v.)
3. S. **AURICULÆFOLIA** (Vahl. symb. 1. p. 25.) foliis spathulatis glancis obtusis aut mucronatis petiolatis margine membranaceis, scapo tereti paniculato, paniculâ simplici, floribus solitariis geminisve dense spicato-fasciculatis secundis 2-bracteatis, squamis foliaceis obtusissimis rotundato-ovatis, perigonio externo subdeutato dentibus obtusis. ♀ in arenosis maritimis rariū. — Fl. fr. 3. p. 421. Squama interna maxima flores involvens. Folia scapo octuplo decuplove breviora. (v. v.)
4. S. **RETICULATA** (L. sp. 394.) caulis diffusis, foliis spathulato-lanceolatis petiolatis obtusis aut subtus mucronulatis, scapis teretibus paniculatis, floribus solitariis geminisve laxè spicatis unilateralibus 2-bracteatis, squamis subscariosis obtusissimis rotundato-ovatis, perigonio externo 5-dentato dentibus obtusis. ♀ in arenosis maritimis Corsicæ, Monspelii ex Gonan et Benth. — Fl. fr. 3. p. 422. — Pluckn. t. 42. f. 4. (v. s.)
5. S. **OLEÆFOLIA** (Pourr. ex DC. fl. fr. 3. p. 422. non Scop.) caulis erectis, foliis spathulato-lanceolatis mucronato-cuspidatis margine cartagineis, scapis paniculatis ramis angulatis, floribus geminis ternis quaternisve laxè spicatis unilateralibus, squamis rotundato-ovatis externâ minimâ sèpè mucronulatâ, internâ obtusâ, perigonio externo 5-dentato dentibus obtusis. ♀ in maritimis Galliæ mediterraneæ. — Nimirum præcedenti affinis. an satis diversa? (v. v.)
6. S. **GLOBULARIÆFOLIA** (Desf. atl. 1. p. 274.) caulis erectis, foliis obovato-spathulatis mucronatis in petiolum attenuatis, scapis erectis dichotomis, floribus unilateralibus ternatim aggregatis et simul floridis laxè spicatis, bracteis subscariosis obtusis, perigonii externi 5-dentati dentibus ovatis obtusis. ♀ in maritimis Arelatis et Seti. — Fl. fr. 5. p. 379. — Barr. ic. t. 793. Bractea interna flores amplectens sed non involvens. (v. s.)
7. S. **DICHOTOMA** (Cav. ic. 1. p. 37. t. 50.) foliis lanceolato-spathulatis mucronulatis petiolatis, scapis teretibus dichotomis ramosis ramis tuberculatis, floribus geminis secundis laxè spicatis spicis paniculatis, bracteis obtusis scariosis, perigonii externi dentibus subacutis. ♀ in arenosis maritimis agri Syrtici propè la Teste reperiit cl. Des Moulins. (v. s. D.)
8. S. **BELLIDIFOLIA** (Gou. monsp. 231.) caulis diffusis, foliis oblongis spathulatis obtusis petiolatis, scapis teretibus dichotomis ramosissimis, ramis tuberculato-leprosis, floribus geminis secundis spicato-capitatis, spicis longè pedicellatis subcorymbosis, bracteis obtusis scariosis externâ membranaceo-pellucidâ, perigonii externi dentibus obtusis. ♀ in maritimis Galliæ mediterraneæ. — Fl. fr. 3. p. 421. — Bocc. mus. t. 103. (v. v.)
9. S. **MINUTA** (L. mant. 59.) caule fruticoso nano ramoso, foliis cuneatis margine revolutis obtusis, scapis pubescentibus ramosis, floribus geminis solitariisve laxè spicatis, spicis paniculato-corymbosis, bracteis coriaceis marginè scariosis mucronulatis, perigonii externi dentibus subobtusis. ♂ in rupes-tribus maritimis Galloprovinciae, Corsicæ. — Fl. fr. 3. p. 423. — Pluck. t. 200. f. 3. (v. v.)
10. S. **PUBESCENS** (DC. fl. fr. 5. p. 380.) caule fruticoso, foliis scapis bracteis perigonioque externo pubescentibus, foliis ovato-spathulatis obtusis petiolatis, scapis ramosissimis dichotomis, floribus solitariis distichis spicatis, spicis confertis subcorymbosis, bracteis coriaceis non scariosis confertis obtusis, perigonii externi dentibus subobtusis. ♂ circa Nicæam et in Gallo-prov. orientali: — Bocc. sic. 25. t. 13. (v. v.)

11. S. ARTICULATA (Lois. gall. 2. p. 723. t. 6.) caule à basi ramoso, foliis lanceolato-spathulatis mucronulatis petiolatis, scapis dichotomis ramosissimis, ramis flexuoso-articulatis tuberculosis, floribus solitariis geminis fastigiatocorymbosis è basi articulorum nascentibus 3-bracteatis, squamis 2 externis minimis, internâ ovatâ margine scariosâ mucronulatâ, perigonii externi interno pauplò minore dentibus obtusis. ♀ ad rupe maritimæ Corsicæ. — Fl. fr. 5. p. 380. (v. s.)

12. S. ECHIOIDES (L. sp. 394.) foliis bracteis calycibusque tuberculato-leprosis, foliis obovato - spathulatis obtusissimis, scapis teretibus articulatis, floribus laxissimè spicatis 3-bracteatis, squamis 2 exterioribus minimis, internâ coriaceâ, perigonio externo dentibus 10, externis 5 subulatis apice hamatis. (1) (2) in arenis maritimis Galloprovinciae, Occitanie. — Fl. fr. 3. p. 422. Gou. ill. t. 2. f. 4. — Magn. monsp. 157. ic. Squama interna flores involvens. (v. v.)

* * Perigonio externo bracteâ internâ breviore.

13. S. FERULACEA (L. sp. 396.) scapis ramosissimis paniculatis basi aphyllis? squamosis, ramulis confertis densè fasciculatis multi-squamosis squamis scariosâ basi latis apice longè setaceo-cuspidatis, florum bracteâ internâ apice scariosâ obtusâ, perigonii externi 5-fidi perigonio interno duplò brevioris lacinias setaceo - subulatis. ♀ in pratis salsis circâ Narbonam. — Fl. fr. 5. p. 380. — Pluckn. t. 28. f. 3 et 4. — Moris. s. 15. t. 1. f. 5. n. 23. Fl. rosei. (v. v.)

14. S. DIFFUSA (Pourr. act. tol. 3. p. 330.) scapis ramosissimis diffusis basi aphyllis squamosis, ramulis laxis in paniculam secundam dispositis, bracteis argenteo-membranaceis imbricatis breviter cuspidatis, floribus spieatis, perigonii externi interno duplò brevioris dentibus acuminatis. ♀ in maritimis circâ Narbonam. — Fl. fr. 3. p. 423. — Pluck. t. 42. f. 5. (v. v.)

Sect. III. ARMERIA DC. fl. fr. 3. p. 419.

Flores terminales capitato-involucrati, involucro communi imbricato scarioso scapum nudum vaginante; folia subradicalia conferta.

15. S. FASCICULATA (Vent. cels. t. 38.) caule fruticoso supernè folioso, foliis fasciculatis canaliculatis linearibus acutis, scapo glaberrimo simplici foliis triplò quadruplò longiore, squamis obtusis scariosis obovatis, perigonii externi dentibus obsoletis mucronulatis perigonio interno brevioribus. ♂ in Corsicâ. — Fl. fr. 3. p. 420. (v. s.)

16. S. PLANTAGINEA (All. ped. n. 1606.) foliis oblongo-lanceolatis 3-5-nerviis acuminatis, scapo glaberrimo elongato foliis 6-10-plò longiore, involucri squamis exterioribus linearibus lanceolatis acuminatis flores sèpè superantibus, interioribus obovatis scariosis mucronulatis, perigonii externi dentibus aristato - acuminatis interno monopetalō brevioribus. ♀ in arenosis præsertim montanis Galliae australis, mediae et occidentalis passim. — Fl. fr. 3. p. 420. — Jacq. vind. t. 42. (v. v.)

17. S. ARENARIA (Pers. enc. 1. p. 332.) foliis sublinearibus trinerviis rigidulis subacutis, scapis elongatis foliis 4-6-plò longioribus, involucri squamis exterioribus lanceolatis acuminatis flores sèpè superantibus, interioribus obovatis scariosis mucronulatis, perigonio externo basi piloso dentibus aristato-acuminatis interno monopetalō subæqualibus. ♀ in collibus aridis Galliae mediae australisque. — S. armeria ♂ Fl. fr. 3. p. 419. — Fl. dan. t. 1092. (v. v.)

18. S. ARMERIA (L. sp. 394.) foliis linearibus planis obtusis, scapo foliis duplò quadruplò longiore, involucri squamis scariosis obovatis obtusissimis floribus brevioribus, perigonio externo basi piloso 5-dentato dentibus acutis interno monopetalō brevioribus. ♀ in arenosis. — Fl. fr. 3. p. 419. excl. var. ♂.

α pubescens (DC.) foliis angustissimis, scapis pubescentibus. — In mari-

- timis. — *S. linearifolia* Laterr. fl. bord. ed. 11. p. 189. *Armeria maritima* Wild. enum h. ber. — Eng. bot. t. 226. (v. v.)
β. alpina (DC.) scapis glaberrimis. — In Alpibus et Pyrenæis. — *Armeria Alpina* W. L. c. (v. v.)

Ordo LXXX. PLANTAGINEÆ Juss. gen. 89.

Flores hermaphroditi rariū monoīci. Perigonium duplex; exterius (calyx?) 4-partitum persistens; interius (corolla?) monopetalum tubulosum hypogynum scariosum persistens basi staminifer, limbo 4-partito. Stamina 4 tubo inserta, laciñiis alterna; filamentis exsertis. Antheræ biloculares, loculis longitudinaliter dehiscentibus. Ovarium liberum simplex. Stylus unicus capillaris; stigma 1 hispidulum indivisum raro semi-bifidum. Capsula circumscissa, in 2-4 loculamenta divisa ope dissepimenti longitudinalis mobilis nunc plani nunc tetragoni. Semina parietibus dissepimenti affixa sessilia peltata, sæpius definita nunc indefinita. Embryo rectus intrà albumen subcornuum. Radicula infera. — In monoīcis stamina receptaculo inserta. Fem. perigonium externum 3-partitum, internum urceolatum indivisum; ovarium 1-spermum. — Herbæ nunc acaules nunc caulescentes, flores sessiles spicati vel spicato-capitati 1-bracteati.

I. LITTORELLA L. mant. 295.

Monoica. Masc. pedicellati 4-partiti; stamina receptaculo inserta. Fem. Fl. sessiles; perig. externum 3-partitum; internum urceolatum ore coarctatum obsolete dentatum; ovarium monospermum.

1. *L. LACUSTRIS* (L. mant. 160 et 295.) 2/4 in herbosis humidis inundatis, circè lacus stagna et aquilegia passim. — Fl. fr. 3. p. 417. — Juss. acad. 1742. t. 7. — Moris. s. 8. t. 9. f. ult. n. 30. (v. v.)

II. PLANTAGO L. gen. 142.

Flores hermaphroditi, capsula 2-4-locularis, 2-aut 10-sperma.

Sect. I. CORONOPUS Tourn. t. 49.

Dissepimentum 3-4-laterale, semen unicum in quaque facie gerens.

1. *P. CORONOPUS* (L. sp. 166.) foliis subhirsutis pinnatifidis, scapo tereti pubescente, spicâ cylindricâ, bracteis lanceolatis ovatisve perigonio externo brevioribus. ① in graminosis et sterilibus. — Fl. fr. 3. p. 417. Fl. dan. t. 272. — Moris. s. 8. t. 17. f. 3. n. 31. (v. v.)

Sect. II. PSYLLIUM Tourn. inst. t. 49.

Dissepimentum planum, semen unicum utrinque gerens.

* *Caulibus elongatis foliosis, pedunculis axillaribus.*

2. *P. ARENARIA* (Walds. et Kit. hung. t. 51.) caule herbaceo ramoso erecto pubescente, foliis linearibus aut linear-i-lanceolatis pubescentibus viscidis integris aut denticulatis basi pilosis, capitulis ovatis, bracteis pubescentibus



lineari-lanceolatis perigonii externi lacinias lanceolatas acutas superantibus, exterioribus foliaceis obovatis longè acuminatis capitulum subæquantibus. ♀ in sterilibus et arenosis passim. — Fl. fr. 3. p. 416. P. *Psyllium Bull. herb. t. 363. non L. (v. v.)*

3. P. *PSYLLIUM* (L. sp. 167.) caule herbaceo ramoso pubescente, foliis linearibus subdentatis basi pilosis, capitulis ovato-globosis, bracteis linearibus aut lineari-lanceolatis perigonii externi lacinias lanceolatas margine scariosas æquantibus. ♂ in arenis et segetibus provinciarum australiorum. — Fl. fr. 5. p. 378. — Moris. s. 8. t. 17. f. 8. n. 2. (v. v.)

4. P. *CYNOPS* (L. sp. 167.) caule ramoso basi suffruticoso, foliis linearibus strictis basi ciliatis, capitulis globosis, bracteis rotundatis acutis exterioribus acuminatis perigonii externi lacinias scariosas superantibus. ♂ in incultis prov. australiorum, mediarnum usque ad Lugdunum, austro-occidentalium propè Burdigalam ex Laterr. — Fl. fr. 3. p. 415. P. *Genevensis* Fl. fr. 3. p. 416. — Lob. ic. t. 437. f. 1. (v. v.)

** *Caule subnullo, pedunculis et foliis axillaribus.*

5. P. *SUBULATA* (L. sp. 166.) dense cespitosa, foliis linearibus subulatis duris, scapo erecto aut subflexuoso, spicâ cylindricâ strictâ, bracteis lanceolatis carinatis acutis perigonii externi laciiniis ovatis subcarinatis dorso ciliato-asperis submucronatis perig. interno subbrevioribus. ♀ in lapidosis et arenosis Galliæ australis et occidentalis. — Fl. fr. 3. p. 415. P. *pungens* Lapeyr. — Lob. ic. t. 439. f. 2 et 438. f. 2. Folia sèpè basi lanata. (v. v.)

6. P. *SERPENTINA* (Lam. ill. n. 1686.) cespitosa, foliis linearibus glabris acutis, scapo ascendentē tereti, spicâ cylindricâ sèpius curvatâ, bracteis linear-lanceolatis flore longioribus, perigonii externi laciiniis ovatis submucronulatis. ♀ in Galliæ australi et in Andegaviâ (Bast.). — Fl. fr. 3. p. 414. (v. v.)

7. P. *GRAMINEA* (Lam. ill. n. 1685.) foliis sublinearibus planis subdentatis sub-acutis, scapo tereti ascendentē, spicâ elongatâ cylindricâ densâ, bracteis rotundo-ovatis ovatis glabris acutis perigonii externi lacinias lanceolatas obtusas margine scariosas subæquantibus. ♀ in Galliæ australis montosis, Cebennis, Arvernâ et paludosis ad ostium Sequanæ. — Fl. fr. 3. p. 413. P. *coronopus* ♂ integralis. — Fl. fr. 5. p. 378. — Dod. pempt. 108. ic. (v. v.)

8. P. *MARITIMA* (L. sp. 165.) foliis semicylindraceis integerrimis carnosis sub-acutis, scapo tereti pubescente erecto vel basi ascendentē foliis longiore, spicâ cylindricâ elongatâ densâ, bracteis rotundatis glabris obtusis perigonii externi laciiniis ovatis obtusis margine scariosis duplò brevioribus. ♀ in maritimis Mediterranei et Oceani. — Fl. fr. 3. p. 412. Fl. dan. t. 243. (v. v.)

9. P. *ALPINA* (L. sp. 165.) foliis sublinearibus elongatis integerrimis acutis utrinque attenuatis glabris mollibus, scapo tereti foliis duplò longiore, spicâ cylindricâ, bracteis ovatis subacutis perigonii externi lacinias ovato-lanceolatas glabras superantibus. ♀ in pascuis Jurassi, Alpium, Montis-Anrei, Pyrenæorum. — Fl. fr. 3. p. 413. Jacq. vind. t. 125. (v. v.)

10. P. *INCANA* (Ram. in DC. fl. fr. 3. p. 414.) foliis sublinearibus elongatis sub-denticulatis integris acutis pubescentibus planis basi lanatis, scapis incurvis pubescentibus folio duplò longioribus, spicâ oblongo-cylindricâ, bracteis rotundatis subacutis ciliatis perigonii externi laciiniis ovatis obtusis glabriusculis subbrevioribus. ♀ in humidis Pyrenæorum et Cebennarum. (v. v. DC.)

β. *capitellata*, foliis linearibus scapo triplò quadruplicè brevioribus subglabris, spicâ cylindrico-globosâ pauciflorâ. — In Pyrenæis et editioribus montibus Corsicae. — P. *capitellata* Fl. fr. 3. p. 414. (v. v. DC.)

11. P. *ALBICANS* (L. sp. 165.) foliis lineari-lanceolatis sericeo-pubescentibus utrinque attenuatis acuminatis, scapis ascendentibus teretibus sublanatis, spicâ elongatâ laxiusculâ subhirsutâ, bracteis rotundato-ovatis obtusis perigonii externi lacinias ovatas obtusas margine scariosas superantibus. ♀ in sterilibus agri Ruscinonensis, Occitanie, Galloprov., Delph. australioris. — Fl. fr. 3. p. 411. — Clus. hist. 2. p. 110. ie. (v. v.)

12. *P. PILOSA* (Poirr. act. toul. 3. p. 324.) foliis linearibus linear-i-lanceolatisve hirtis acuminatis basi lanuginosis, scapo tereti hirto foliis sublongiore, spicâ elongato-ovatâ, bracteis lanceolatis subulatis perigonii externi lacinias ovatas acutas superantibus, inferioribus flore longioribus. (I) in sterilibus maritimis provinciarum australium. — Fl. fr. 3. p. 412. P. Bellardi All. ped. t. 85. f. 3. (v. v.)
13. *P. LAGOPUS* (L. sp. 165.) foliis lanceolatis subdenticulatis pubescentibus acutis, scapo tereti pubescente, spicâ ovato-globosâ hirsutâ, bracteis ovatis lanceolatis acutis perigonii externi lacinias lanceolatas pilis coronatas sub-superantibus. ♀ in siccis et petrosis Galliae australis. — Fl. fr. 3. p. 410. *P. intermedia* Lapeyr. non Gil. — Moris. s. 8. t. 16. f. 3. n. 13. (v. v.)
14. *P. MONTANA* (Lam. ill. n. 1670.) foliis ovato-lanceolatis lanceolatisve 5-nerviis subpilosis planis integris utrinque attenuatis, scapo hirsuto foliis sub-duplo longiore, spicâ ovato-globosâ, bracteis rotundatis scariosis obtusis ciliatis perigonii externi lacinias ovatas obtusas scariosas apice ciliatas superantibus. ♀ in Alpibus, Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 410. (v. v.)
15. *P. VICTORIALIS* (Poir. dict. enc. 5. p. 377.) foliis linear-i-lanceolatis hirsutis acuminatis, scapo tereti pubescente pilis rufescens basi circumdato, spicâ ovato-globosâ 12-20-florâ basi hirsutâ, bracteis obovatis hirsutis perigonum externum superantibus internaque brevioribus. ♀ in Alpibus et monte Victoriae Galloprovinciæ, circâ Vapincum ex Vill. — Fl. fr. 3. p. 410. — Ger. gallop. t. 12. (v. v. DC.)
16. *P. ARGENTEA* (Lam. ill. n. 1660 excl. syn. Ger.) foliis linearibus oblongis sericeo-argentis sessilibus, scapo erecto tereti pubescente, spicâ ovato-sphærica densâ, bracteis obovatis obtusis dorso sericeis margine scariosis perigonum externum scariosum superantibus interno brevioribus. ♀ in montosis siccis Galloprovinciæ, Pyrenæorum. — Fl. fr. 3. p. 411. (v. v.)
17. *P. LANCEOLATA* (L. sp. 164.) foliis oblongo-lanceolatis nervosis utrinque attenuatis, scapis pubescentibus erectis ascendentibus vel folio 2-6° longioribus, spicâ subovatâ densâ, bracteis glabris scariosis subacutis perigonii externi lacinias ovatas subacutâs æquantibus. ♀ in pratis siccis frequens. — Fl. fr. 3. p. 409. — Moris. s. 8. t. 15. f. 9. (v. v.)
18. *P. MEDIA* (L. sp. 163.) foliis ovatis pubescentibus subsessilibus, scapo tereti foliis 4-8° longiore, spicâ cylindricâ abbreviatâ, bracteis obtusis perigonii externi lacinias ovatis obtusis subbrevioribus. ♀ in aridis frequens. — Fl. fr. 3. p. 409. Gærtn. fruct. 1. p. 237. t. 51. (v. s.)

Sect. III. PLANTAGO DC. fl. fr. 3. p. 408.

Disseminatum planum utrinque polyspermum.

19. *P. CORNUTI* (Gou. ill. p. 6. non Jacq.) foliis ovatis glabris carnosis utrinque attenuatis longe petiolatis scapo nudo duplo triplò brevioribus, collo tomentoso, spicâ multiflorâ elongatâ, bracteis ovatis subobtusis perigonii externi lacinias ovatis obtusis subduplo brevioribus, capsula 4-spermâ. ♀ in pratis salsis circâ Monspelium. — Fl. fr. 5. p. 376. — Corn. can. p. 163. ic. (v. v. DC.)
20. *P. INTERMEDIA* (Gil. elem. 1. p. 125. t. 1.) foliis ovatis subsessilibus inæquilater grossè serratis, scapo ascendentem, spicâ elongatâ, bracteis ovatis acutis perigonii externi lacinias ovatas obtusas subæquantibus. ♀ in humidis arenosis Lugduni, Monspelii. — Fl. fr. 5. p. 376. Varietas probabiliter subsequentialis. (v. s.)
21. *P. MAJOR* (L. sp. 163.) foliis ovatis septemnerviis integris vel subdentatis in petiolum subattenuatis, spicâ elongatâ multiflorâ, bracteis ovatis acutis perigonii externi lacinias ovatis obtusis subbrevioribus. ♀ in pratis, aridis, ad vias. — Fl. fr. 3. p. 408. — Moris. s. 8. t. 15. f. 2. (v. v.)

P. minima (DC. fl. fr. 5. p. 376.) foliis 3-5-nerviis, spicâ 3-10-florâ. — In humidis passim. — *P. minima* Fl. fr. 3. p. 408. Planta vix pollicaris. (v. s.)









Ordo LXXXI. NYCTAGINEÆ Juss. gen. 90.

Involucrum calyciforme monophyllum uni-aut multiflorum. Perigonum monopetalum coloratum basi dilatatum suprà ovarium coarctatum et in tubum dein ampliatum, persistens, cum ovario non adhærens. Stamina definita, inserta disco glanduloso ovarianum ambienti; filamenta cum perigonii parte contractatâ adhærentia. Ovarium 1 perigonio tectum. Stylus 1. Stigma capitatum. Capsula monosperma indehiscens disco staminifero et perigonio tecta. Albumen farinaceum embryone involutum. — Herbæ aut frutices, folia sæpius opposita.

I. NYCTAGO Royen. Juss. gen. p. 90. — Mirabilis L.

Involucrum campanulatum 5-lobum uniflorum; perigonum campanulatum, limbo patulo 5-gono 5-lobo; stam. 5; capsula obtecta basi perigonii coriacea et densa, ejusdem parte superiore marcescente et post inflorescentiam decidua.

1. N. JALAPÆ (DC. fl. fr. 3. p. 426.) floribus congestis pedunculatis foliisque glabris. (1) ♀ è Peruvia orta, in hortis culta. — Mirabilis Jalapa L. sp. 252. (v. v. c.)
 2. N. LONGIFLORA (DC. l. c.) floribus congestis sessilibus foliisque pubescensibus. ♀ (1) ex editoribus Mexici montibus orta, in hortis culta. — M. longiflora L. l. c. (v. v. c.)
-

Ordo LXXXII. AMARANTHACEÆ Juss. gen. 87.

Perigonum (calyx?) liberum 1-sepalum persistens 4-5-lobum sèpè coloratum. Stamina 3 aut 5 hypogyna libera aut monadelpha. Ovarium unicum 1-loculare rariùs 2-loculare uni-aut rariùs pluri-ovulatum. Stylus et stigma simplex aut multiplex. Capsula 1-locularis circumscissa aut indehiscens. Semina solitaria aut rariùs plurima receptaculo centrali adfixa. Albumen farinaceum embryone curvato involutum. — Herbæ; folia alterna, integra; flores parvi interdùm sexu distincti sèpè squamis coloratis cincti, spicati paniculati aut capitati.

I. AMARANTHUS L. gen. 1064.

Monoicus. Perigonum 3-5-lobum. Masc. Stamina 3 aut 5. Fem. Styli 3; stigmata 3; capsula 1-sperma 3-rostris circumscissa.

1. A. ALBUS (L. sp. 1404.) caule ramosissimo erecto, foliis ovato - oblongis setulâ macronatis, bracteis subulatis, floribus triandris glomeratis axillaribus, glomerulis 2-partitis. (1) Monspelii in vineis, in agro Ruscinonensi ex cl. Bentham. — Fl. fr. 3. p. 726. (v. v. DC.)
2. A. SYLVESTRIS (Desf. cat. 44.) caule ramoso erectisculo striato, foliis ovatis integris petiolatis obtusiusculis, floribus triandris glomeratis axillaribus, bracteis lancolato-linearibus acuminatis, perigonii laciinis linearibus

- mucronulatis. (I) secùs vias Galliæ mediæ, occidentalis australisque. — Fl. fr. 5. p. 374. (v. s.)
3. A. BLITUM (L. sp. 1405.) caule diffuso ramoso, foliis petiolatis obovatis retusis aut emarginatis, floribus triandris glomeratis lateralibus terminalibusque, bracteis perigonique lobis lanceolatis acutis. (I) ad muros in vicis pagorum. — Fl. fr. 3. p. 401. — Cam. epit. 236. ic. (v. v.)
4. A. PROSTRATUS (Balb. misc. p. 44. t. 10.) caule prostrato ramoso striato, foliis petiolatis ovato-subrhomboideis obtusiusculis retusis, floribus triandris dense spicatis lateralibus terminalibusve, bracteis sublinearibus acutis. 2^o in Corsicâ, agro Nicaënsi, Occitanico, Narbonensi, Nannetensi et Andegavensi. — Fl. fr. 3. p. 727. (v. v. DC.)
5. A. RETROFLEXUS (L. sp. 1407.) caule erecto subramoso sulcato, foliis ovato-oblongis petiolatis obtusis subemarginatis, floribus pentandris dense spicatis terminalibus, bracteis lanceolatis acuminatis, perigonii laciniis lanceolatis mucronatis. (I) in agris sterilibus, lapidosis, ruderatis passim. — Fl. fr. 5. p. 374. A. spicatus Lam. dict. 1. p. 117. DC. fl. fr. 3. p. 401. (v. v.)
-

Ordo LXXXIII. CHENOPODEÆ *Vent. tabl. 2. p. 253. DC.*
fl. fr. 3. p. 380. — Atripliceæ *Juss. gen. 83.*

Perigonium liberum monosepalum 5-partitum, aestivatione imbricatâ. Stamina imo perigonio inserta, ejusdem laciniis numero æqualia. Ovarium 1. Stylus simplex aut multiplex. Fructus indehiscens, nunc bacca multilocularis polysperma, nunc cariopsis baccata seu perigonio demùm pulposo obiecta, nunc cariopsis nuda aut perigonio membranaceo obiecta. Albumen saepius farinaceum centrale. Embryo circularis aut spiraliter tortus. Radicula infera. — Herbae aut rariis suffrutes; folia alterna simplicia stipulis vaginisque destituta; flores parvuli virescentes saepius hermaphroditi.

Trib. I. ATRIPLICEÆ. — Chenopodeæ Rob. Brown congo 33.

Stamina definita perigonii laciniis opposita, rarissimè indefinita.

† FRUCTUS CAPSULARIS, ALBUMEN CARNOSUM.

I. THELIGONUM L. gen. 1068.

Monoicum, *Masc.* Perigonium turbinatum 2-fidum, laciniis revolutis; stamina 12-19. Fem. Perigonium 2-fidum persistens; stylus unicus, capsula 1-sperma globosa coriacea; albumen globulosum bifidum carnosum; embryo filiformis incurvus; radicula infera.

i. T. CYNOCRAMBE (L. sp. 1411.) (I) in rimis saxorum umbrosorum Corsicæ, Nicaë, Stæchadum, Monspelii. — Fl. fr. 3. p. 399. Lam. ill. t. 777. — C. Bauh. prod. p. 59. ic. Caules prostrati, folia ovalia subobtusa petiolata. (v. v.)

II. POLYCNEMUM L. gen. 53.

Perigonium 5-partitum; stamina 5; stylus 2-fidus; capsula 1-sperma non dehiscens.





1. *P. ARVENSE* (L. sp. 50.) caule diffuso, foliis subulatis triquetris. (I) in arvis.
— Fl. fr. 3. p. 398. Lam. ill. t. 23. (v. v.)

III. CAMPHOROSMA L. gen. 164.

Perigonium urceolatum 4-partitum laciinis alternis majoribus; stam. 4 exserta; stylus 2-fidus; capsula monosperma.

1. *C. MONSPELIACA* (L. sp. 178.) foliis hirsutis linearibus. ♂ in sabulosis ad vias in Galloprovinciâ, Occitanîâ. — Fl. fr. 3. p. 398. Lam. ill. t. 86. (v. v.)

†† FRUCTUS PERICONIO TECTUS; ALBUMEN FARINACEUM.

IV. CORISPERMUM L. gen. 12.

Perigonium 2-partitum; stamina 1-5; semen ovatum compressum hinc planum indè convexum nudum margine membranaceum.

1. *C. HYSSOPIFOLIUM* (L. sp. 6.) foliis linearibus muticis. (I) in Occitanîâ, Agathæ, Monspelii. — Fl. fr. 3. p. 397. Gærtn. fruct. 1. t. 76. f. 7. (v. s.)

V. SALICORNIA Tourn. inst. t. 485. L. gen. 10.

Perigonium tubuloso-ovoideum compressum vix 5-dentatum; stam. 1-2 exserta; stylus 1 brevis; stigmata 2 exserta papillosa; utriculus perigonio tectus; semen cochleatum.

1. *S. HERBACEA* (L. sp. 5.) caule herbaceo carnoso ramoso articulato articulis apice compressis emarginato-bifidis, ramis patentibus, sterilibus acutis, spicis axillaribus oppositis pedunculatis, squamis obtusis. (I) in paludosis maritimis et in salsis Lotharingiæ. — Fl. fr. 3. p. 396. Lam. ill. t. 4. f. 1. (v. v.)

2. *S. FRUTICOSA* (L. sp. 5.) caule erecto fruticoso, ramis ascendentibus obtusis, articulis ramulorum ancipitibus, superioribus sterilibus crassitiæ triplò longioribus, spicis cylindricis breviter pedunculatis, squamis floralibus truncatis membranaceis. ♂ in maritimis Mediterranei et rariis Oceani. — Fl. fr. 3. p. 397. (v. v.)

3. *S. MACROSTACHYA* (Moric. fl. venet. 1. p. 2.) caule fruticoso ramis ascendentibus, articulis superioribus vix crassitiæ longioribus, spicis crassis subelatato-cylindraceis sessilibus. ♂ in arenosis maritimis Corsicæ, Occitaniae. (v. v.)

VI. SALSOLA Bieb. DC. fl. fr. 3. p. 394. — Salsolæ sp. L.

Perigonium 5-partitum persistens, laciinis post inflorescentiam appendice scarioso (peraphyllo) dorso instructis; stam. 5; stigmata 2-3; semen solitarium; embryo periphericus.

Sect. I. *KALI* Tourn. inst. t. 128. — *Salsola Roth.* in Schrad. journ. 1800. 1. p. 307.

Perigonium 5-partitum, embryo spiralis.

1. *S. KALI* (L. sp. 322.) caule herbaceo prostrato, foliis subulatis spinosis scabris, inferioribus linearibus triquetris, superioribus ovalibus, floribus solitariis axillaribus, perigonii fructiferi appendicibus latis scariosis. (I) in maritimis Mediterranei et Oceani. — Fl. fr. 3. p. 396. Gærtn. fruct. 1. t. 75. f. 4. S. decumbens Lam. ill. t. 181. f. 2. (v. v.)

2. *S. TRAGUS* (L. sp. 322.) caule herbaceo ascendente ramoso, foliis carnosis linearis-subulatis spinosis laevibus subtriangularibus, superioribus lanceolatis, floribus axillaribus solitariis, perigonii fructiferi appendicibus brevissimis. (I) in maritimis Galliæ australis, circâ Nannetes, ad littora Calvadosii (de Bréb.), ad ostium Sequanæ (Le Drév.). — Fl. fr. 3. p. 396. (v. v.)

3. *S. Seta* (L. sp. 323.) caule erecto ascendente herbaceo glaberrimo ramoso, foliis linearibus carnosis mucronulatis, floribus hermaphroditis axillaribus solitariis, perigonii sepals lanceolatis acutis fractiferis auctis rotundatis, appendicibus nullis. (I) in maritimis Galliæ australis. — Fl. fr. 3. p. 395. Lob. ic. t. 394. f. 1. (v. v.)

Sect. II. *KOCHIA Roth. in Schrad. journ. l. c. t. 2.*

Perigonium 5-fidum, embryo curvatus non spiralis.

4. *S. PROSTRATA* (L. sp. 318.) caule frutescente prostrato, foliis fasciculatis linearibus inermibus, floribus polygamis, antheris purpuraceo-mentibus. (J) in locis subsalsis agri Ruscinonensis, Narbonensis, Avenionensis, Tarasconensis. — Fl. fr. 3. p. 394. Kochia prostrata Schrad. — All. ped. t. 38. t. 4. (v. v. DC.)

VII. **CHENOPODIUM** Bieb. DC. fl. fr. 3. p. 388. — Chenopodium et Salsola sp. L.

Perigonium 5-partitum nunc 3-4-partitum, persistens nec tuberosum nec post inflorescentiam accretum; stam. 5 vel pauciora; stylus 2-fidus; stigmata 2-4; semen orbiculare integumento dupli externo crustaceo.

* *Foliis linearibus integris.*

1. *C. FRUTICOSUM* (L. sp. ed. 1. p. 221.) caule fruticoso glabro ramis erectis, foliis glabris carnosis teretibus obtusis laxè imbricatis, floribus subsolitariis axillaribus. (J) in maritimis provinc. Mediterran. et austro-occidentalium. — Fl. fr. 3. p. 393. S. fruticosa L. sp. 324. — Lob. ic. t. 381. f. 2. (v. v.)

2. *C. HIRSUTUM* (L. sp. ed. 1. p. 221.) caule herbaceo diffuso, foliis teretibus obtusis tomentosis, floribus axillaribus solitariis. (I) in maritimis Occitaniae. — Fl. fr. 3. p. 394. S. hirsuta L. sp. 323. Fl. dan. t. 187. (v. v. DC.)

3. *C. MARITIMUM* (L. sp. 321.) foliis glabris obtusis carnosis semiteretibus, floribus glomeratis axillaribus. (I) in paludosis maritimis Oceani et Mediterranei. — Fl. fr. 3. p. 393. — Lob. ic. t. 394. f. 2. — Dod. pempt. 81. f. 2. (v. v.)

4. *C. SETIGERUM* (DC. cat. monsp. 94.) caule ramosissimo, foliis teretibus crassis glabris glaucis setâ rectâ longiusculâ terminatis, floribus glomeratis axillaribus. (I) in salsis subcultis Monspelii et Narbouæ. — Fl. fr. 5. p. 372. (v. v.)

5. *C. SCOPARIA* (L. sp. 321.) caulis erectis ramosissimis, ramis strictis, foliis planis linear-lanceolatis margine ciliatis, racemis axillaribus foliosis hirsutis. (I) circâ Nicæam? — Fl. fr. 3. p. 393. — Dod. pempt. 151. (v. v. c.)

* * *Foliis ovatis aut rhomboideis, sæpius dentatis aut lobatis.*


6. *C. POLYSPERMUM* (L. sp. 321.) caule decumbente, foliis ovatis integrerrimis petiolatis acutis utrinque viridibus, floribus glomeratis in racemos breves divaricatos aphyllos axillares terminalesve dispositis. (I) in cultis. — Fl. fr. 3. p. 392. C. arrectum Desmaz. cat. pl. bot. belg. p. 60. — Lob. ic. t. 256. f. 1. (v. v.)

7. *C. VELVETINA* (L. sp. 321.) caule diffuso, foliis glaucis rhombéo-ovatis sub-integerrimis, floribus glomeratis in racemos glaucos axillares breves dispositis. (I) ad vias, muros et in hortis. — Fl. fr. 3. p. 392. — Moris. s. 5. t. 31. f. 10. n. 6. (v. v.)

8. *C. GLAUCUM* (L. sp. 320.) foliis ovato-oblongis obtusis repandis glabris subtus glaucis, floribus glomeratis in racemos glabros laxos axillares simplices compositosve digestis. (I) in arvis et cultis. — Fl. fr. 3. p. 392. — Tab. ic. 247. (v. v.)

9. *C. AMBROSIOIDES* (L. sp. 320.) foliis lanceolatis remote dentatis sessilibus, floribus glomeratis in racemos foliosos laxos simplices dispositis. (I) in Galliæ austro-occidentali ex agro Ruscinonensi ad Nanuetes. — Fl. fr. 3. p. 391. — Moris. s. 5. t. 31. f. 2. n. 8. (v. v.)





10. *C. BOTrys* (L. sp. 320.) foliis oblongis pinnatifido - sinuatis viscidis sub-hirsutis, floribus in racemos numerosissimos axillares breves hirsutos dispositis. (I) in arenosis Galliae australis et austro-occidentalis. — Fl. fr. 3. p. 391. — Black t. 314. (v. v.)
11. *C. HYBRIDUM* (L. sp. 319.) foliis cordatis petiolatis angulato-dentatis acuminatis, floribus glomeratis in racemos ramosissimos subcymosos divaricatos aphyllos dispositis, seminibus punctulatis. (I) in arvis et cultis. — Fl. fr. 3. p. 391. — Vaill. par. t. 7. f. 2. (v. v.)
12. *C. BLITOIDES* (Lejeune fl. spa 126.) foliis lanceolatis acuminatis basi cuneatis inciso-dentatis lăvibus subcarnosis, floribus glomeratis in racemos foliosos axillares confertos erectos dispositis. (I) secūs muros Parisiis. — Fl. fr. 5. p. 372. An satis à sequente distinctum? (v. s.)
13. *C. RUBRUM* (L. sp. 318.) foliis cordato-triangularibus subacutis sinuato-dentatis subtus glaucis, superioribus lanceolatis acuminatis, florum glomerulis minimis in racemos compositos graciles longissimos foliosos dispositis, staminibus stigmatibusque subexsertis. (I) in ruderatis et fimis. — Fl. fr. 3. p. 389. — Tab. ic. 427. (v. v.)
14. *C. FICIFOLIUM* (Sm. brit. 1. p. 276.) foliis hastato-sinuatis erosis postice integris, superioribus oblongis integerrimiis, floribus glomeratis in racemos simplices confertos axillares terminalesve dispositis, staminibus stigmatibusque inclusis, seminibus subpunctatis. (I) in cultis. — Fl. fr. 3. p. 390. An satis à sequente distinctum? (v. v.)
15. *C. LEIOSPERMUM* (DC. fl. fr. 3. p. 390.) foliis rhomboideo-ovatis erosio-dentatis postice integris, superioribus oblongis integerrimiis, florum glomerulis laxis in racemos subsimplices axillares terminalesve dispositis, stigmatibus inclusis, seminibus lăvibus. (I) frequens ad vias et in agris. — *C. album* et *C. viride* L. sp. 319. (v. v.)
16. *C. OPULIFOLIUM* (Schrad. ex DC. fl. fr. 5. p. 372.) foliis rhomboideo-ovatis inaequaliter dentatis mucronatis subtus glaucis, florum glomerulis in racemos glaucos confertos subsimplices axillares terminalesve dispositis, staminibus exsertis, stigmatibus inclusis, seminibus lăvibus. (I) in locis submontanis agri Parisiensis, Andegaviensis, Monspeliensis. — Fl. fr. 5. p. 372. — Vaill. bot. paris. t. 7. f. 1. *C. erosum* Bast. (v. s.)
17. *C. MURALE* (L. sp. 318.) caule ramoso subpatulo, foliis ovato-deltoides subinciso-dentatis acutis nitidis, floribus solitariis binis aut ternis in racemos corymbosos nudos compositos terminales axillaresve digestis, s' minibus stigmatibusque subexsertis, seminibus lăvibus. (I) ad muros et vias. — Fl. fr. 3. p. 389. — Tab. ic. 428. (v. v.)
18. *C. URBICUM* (L. sp. 318.) foliis triangularibus inaequaliter dentato-sinuatis, floribus glomeratis confertis in racemos compositos strictissimos axillares terminalesve cauli approximatos dispositis, stigmatibus inclusis. (I) circa urbes et pagos. — Fl. fr. 3. p. 389. eng. bot. t. 717. (v. v.)
19. *C. BONI'S HERMANNES* (L. sp. 318.) foliis triangulari-sagittatis integris, floribus glomeratis in spicas compositas terminales erectas aphyllas digestis, stigmatibus exsertis. (I) in ruderatis, secūs vias. — Fl. fr. 3. p. 388. Fl. dan. t. 579. (v. v.)

VIII. ATRIPLEX Tourn. inst. t. 286. L. gen. 1153.*

Polygama aut sæpius monoica. *Hermafrod.* Perigonium 5-partitum; stam. 5; pistillum mancum rarò perfectum. *Fem.* Perigonium 2-partitum, laciniis adpressis, post inflorescentiam crescentibus et semen tegentibus; stylus 2-fidus; semen erectum integumento duplice, exteriori crustaceo.

1. *A. HALIMUS* (L. sp. 1492.) caule fruticoso, foliis alternis deltoideis utrinque argenteis integris aut basi obsoletè dentatis in petiolum decurrentibus superioribus acutis, summis lanceolatis. (I) ad sepes et in fossis circa Nannetes ex

- Bon., in arenosis maritimis Niceæ, Antipolis (Stire.) — Fl. fr. 3. p. 384. — J. Bauh. hist. 1. p. 2. p. 227. f. 1. (v. s.)
2. A. PORTULACOIDES (L. sp. 1493.) caule fruticoso, foliis oppositis utrinque argenteis integerrimis ovato-lanceolatis lanceolatis obtusis. ♂ in paludosis maritimis à Portu-Gratiæ ad Nicæam. — Fl. fr. 3. p. 385. — Clas. hist. 1. p. 54. ic. — Dalech. hist. 552. ic. (v. v.)
3. A. PEDUNCULATA (L. sp. 1675.) caule herbaceo flexuoso subramoso, foliis lanceo-lato-ovatis obovatis obtusis in petiolum attenuatis integerrimis utrinque argenteis, floribus femineis cuneatis bicornibus pedunculatis. (I) in maritimis circa Abbavillam. — Fl. fr. 3. p. 385. eng. bot. t. 232. — Plack. t. 36. f. 1. (v. s.)
4. A. ROSEA (L. sp. 1493.) caule diffuso herbaceo, ramis patalis, foliis incanis subtus argenteis rotundato-ovatis inæqualiter sinuato-dentatis, floribus spicato-glomeratis axillaribus terminalibusque, valvis seminalibus rhomboideis angulato-dentatis acutis. (I) in maritimis Niceæ ex All., Corsicæ, Narbonæ et Galliæ occidentalis passim. — Fl. fr. 3. p. 386. (v. v.)
- β. *alba* (DC. herb.) caule erecto, foliis glaucis, valvis seminalibus serratis. — In Arverniâ propè Claromontem. (v. s.)
5. A. LACINIATA (L. sp. 1494.) caule herbaceo erecto summitatibus pubescens, foliis subtus argenteis elongato-deltoides laciniatis obtusis mucronulatis petiolatis, inferioribus oppositis, floribus gloomeratis in spicas simplices densas axillares terminalesve dispositis, valvis seminalibus rhomboideis angulatis obtusis. (I) in maritimis Corsicæ, Galloprov., Occitaniae. — Fl. fr. 3. p. 386. A. tatarica Lois. gall. 2. p. 694; non L. — Dod. pempt. 615. f. 4. (v. v.)
6. A. HASTATA (L. sp. 1494.) caule herbaceo erecto, ramis diffusis, foliis latis triangularibus hastatis glaberrimis utriusque viridibus acuminatis petiolatis, floribus gloomeratis in racemos laxos elongatos axillares terminalesve dispositis, valvulis seminalibus hastato-deltoides acuminatis basi argutè inciso-serratis. (I) ad muros et sepes. — Fl. fr. 3. p. 386. — Moris. s. 5. t. 32. f. 5. n. 14. (v. v.)
7. A. HORTENSIS (L. sp. 1493.) caule herbaceo erecto, foliis hastato-deltoides, superioribus ovato-lanceolatis obtusis integerrimis mucronulatis, valvulis seminalibus rotundo-ovatis integerrimis obtusis mucronulatis. (I) ex Asiâ orta in oleraceis culta. — Fl. fr. 3. p. 388. — Black. t. 99 et 552. (v. v. c.)
8. A. PROSTRATA (Bouch. fl. abb. 76.) caule herbaceo prostrato ramosissimo, foliis triangularibus auriculatis glaberrimis utriusque viridibus obtusis petiolatis, superioribus lanceolatis acutis, valvulis seminalibus triangularibus acutis integerrimis. (I) in maritimis Galliæ boreali-occidentalis usquè ad Rupel-lam passim. — Fl. fr. 3. p. 387. (v. v. DC.)
9. A. PATULA (L. sp. 1494.) caule herbaceo ramoso patulo, foliis deltoideis subglaucis subhastatis denticulatis subacutis petiolatis, floribus gloomeratis in racemos laxos elongatos ramos terminantes dispositis, valvulis seminalibus triangularibus acutis dorso exasperatis basi serratis. (I) in maritimis Oceani et Mediterranei passim. — Fl. fr. 5. p. 371. non 3. p. 387. A. oppositifolia DC. fl. fr. 5. p. 371. (v. s.)
10. A. ANGUSTIFOLIA (Sm. fl. brit. 3. p. 1092.) caule herbaceo patulo ramosissimo, foliis viridibus lanceolatis integerrimis acutis in petiolum attenuatis, infimis subhastatis denticulatis, floribus gloomeratis in racemos graciles laxos breves axillares terminalesque digestis, valvulis seminalibus hastatis laeviusculis. (I) ad vias et margines agrorum. — DC. syn. 196. et Fl. fr. 5. p. 371. A. patula Fl. fr. 3. p. 387. non L. (v. v.)
11. A. LITTORALIS (L. sp. 1494.) caule herbaceo erecto ramoso, foliis lanceo-lato-linearibus linearibusve dentatis integrisve acutis subpetiolatis utrinque viridibus, floribus gloomeratis in racemos ramos terminantibus digestis, val-

W. H. G.

vulis seminalibus ovatis acutis sinuatis disco muricatis. (1) *in maritimis septentrionalibus, etiam circa Parisios.* — Fl. fr. 3. p. 387. eng. bot. t. 708. — Bocc. sic. t. 15. f. 1. (v. v.)

Æ. erecta, foliis lanceolatis, inferioribus siuuato-dentatis. — Propè Nannen-tes. — A. erecta Sm. brit. 3. p. 1093. Fl. fr. 5. p. 371. (v. s.)

IX. SPINACIA Tourn. inst. t. 308. L. gen. 1112.

Dioica. Masc. Perigonum 5-partitum, stamina 5. *Fem.* Perigonium 2-4-partitum; styli 4; fructus tectus perigonio persistente et post inflorescentiam crescente.

1. S. INERMIS (Moench. meth. 318.) foliis oblongo-ovatis, fructibus inermibus. (1) (2) in hortis culta. — Fl. fr. 3. p. 384. — Moris. s. 5. t. 30. f. 5. n. 2. (v. v. c.)

2. S. SPINOSA (Moench. l. c.) foliis sagittatis, fructibus cornutis. (1) (2) in hortis oleraceis culta. — Fl. fr. 3. p. 383. — Moris. s. 5. t. 30. f. 6. n. 1. (v. v. c.)

X. BETA Tourn. inst. t. 286. L. gen. 310.

Perigonum 5-partitum, basi ovario semi-adhærens; stamina 5; styli 2; fructus reniformis basi perigonii capsulari involutus.

1. B. VULGARIS (L. sp. 322.) caule erecto, floribus ternis aut quaternis. (2) colitur in hortis oleraceis. — Fl. fr. 3. p. 383. — Moris. s. 5. t. 30. f. 2 et 3. n. 3 et 6. (v. v. e.)

2. B. MARITIMA (L. sp. 322.) caule basi prostrato, floribus solitariis aut binis. (2) in maritimis passim. — Fl. fr. 3. p. 382. (v. v.)

XI. BLITUM L. gen. 14.

Perigonum 3-partitum; stamen unicum; styli 2; fructus perigonio baccato tectus.

1. B. VIRGATUM (L. sp. 7.) floribus glomeratis, capitulis sparsis lateralibus. (1) in humidis et cultis. — Fl. fr. 3. p. 381. — Moris. s. 5. t. 32. f. 2 et 3. n. 10 et 11. (v. v.)

2. B. CAPITATUM (L. sp. 7.) floribus glomeratis, capitulis spicatis terminalibus. (1) in humidis et cultis. — Fl. fr. 3. p. 382. — Moris. s. 5. t. 32. f. 1. n. 9. (v. v.)

Trib. II. PHYTOLACEÆ Rob. Brown congo 35.

Stamina indefinita aut cum perigonii lacinias alterna; fructus baccatus; albumen farinaceum.

XII. PHYTOLACCA Tourn. inst. t. 154. L. gen. 588.

Perigonum 5-partitum; stamina 8-20; ovarium 8-10-striatum; stigmata 8-10; bacta 8-10-locularis, loculis monospermis.

1. P. DECANDRA (L. sp. 631.) floribus decandris decagynis. ♀ in Pyrenæis et Gallia austro-occidentali. — Fl. fr. 3. p. 381. Lam. ill. t. 393. f. 1. (v. v.)

Ordo LXXXIV. POLYGONEÆ Juss. gen. 82.

Perigonium liberum simplex persistens monosepalum profundè divisum, lacinias dupli serie dispositis, internis ovarii lateribus externis ovarii angulis oppositis. Stamina definita imo perigonio inserta. Antheræ 2-loculares quadrisulcatæ lateraliter rimâ dupli dehiscentes. Ovarium 1. Styli plures aut stigmata plurima sessilia. Cariopsis perigonio plus minus tecta 1-sperma. Embryo lateralis aut centralis sæpè curvatus; albumen farinaceum. — Herbæ (in nostris); caules nodosi, folia alterna basi vaginantia aut vaginæ intrafoliaceæ adnata, juncea subtus revoluta.

I. RUMEX *Campd. rum. mon. p. 60.* — Rumicis sp. L. DC.

Involucellum infundibuliforme vel campanulatum 3-bracteolatum; perigonium 6-partitum lacinias 3 interioribus post anthesin sæpè auctis, 3 exterioribus involucelli bracteolis adnatis; stamina 6; styli 3 reflexi; stigmata totidem dissecta; cariopsis acute trigona; embryo unilateralis; radicula supera.


Sect. I. LAPATHUM *Tourn. inst.* — *Campd. l. c. p. 63.*

Involucellum è pedicelli articulatione ortum bracteolis nunquam spontè reflexis; styli liberi. — Sapor minimè acidus.

* *Flores hermaphroditæ; lacinias internis demum dentatis basi nunquam cordatis, apice acuminatis vel subacutis.*

1. R. MARITIMUS (L. sp. 478.) foliis infimis ovato-lanceolatis acutis planis, superioribus oblongo-lanceolatis, ramis floriferis alternis simplicibus, verticillis confertis multi-floris omnibus axillaribus, lacinias internis demum valde granulatis ovatis acuminatis setaceo-dentatis dentibus lacinias longioribus. (1) in paludosis praesertim maritimis. — Fl. fr. 3. p. 3; 5. excl. var. *Campd. mon. t. 1. f. 3. J. Bauh. hist. 2. p. 387. ic. (v. s.)*
2. R. PALUSTRIS (Smith. brit. 1. p. 394.) foliis infimis linear-lanceolatis acutis subcrispis, ramis floriferis alternis vel geminatis simplicibus vel divisis, verticillis confertis omnibus axillaribus, lacinias demum granulatis ovato-lanceolatis acutiusculis 3-dentatis dentibus lacinias brevioribus. (2) in cæniosis et palustribus Parisiorum, Andegaviæ. — Fl. fr. 5. p. 368. R. maritimus f. Fl. fr. 3. p. 375. — Lob. ic. 286. (v. s.)
3. R. PULCHER (L. sp. 477.) foliis infimis cordato-ovatis obtusiusculis nunc panduriformibus, ramis floriferis alternis, verticillis remotis 1-lateralibus paucifloris omnibus axillaribus, lacinias internis demum deltoideo-ovatis acutis obtusiusculis serrato-dentatis dentibus lacinias longè brevioribus, omnibus altero præcipue granulatis. (3) ad sepes et vias. — Fl. fr. 3. p. 374. excl. var. eng. bot. t. 1576. — Moris. s. 5. t. 27. f. 10. n. 13. (v. v.)
4. R. PURPUREUS (Poir. dict. 5. p. 63.) foliis infimis cordato-ovatis acutiusculis undulosis, ramis floriferis alternis raro geminatis simplicibus, verticillis confertis, superioribus aphyllis, lacinias iuternis demum granulatis triangulari-ovatis acutiusculis 2-3-dentatis dentibus lacinias brevioribus. (4) circa Lentiam ex Merat. — *Campd. mon. t. 1. f. 4. (v. s. c.)*
5. R. ROTUNDIFOLIUS (L. sp. 478.) foliis infimis cordato-ovatis raro rotundatis subcrispis, superioribus ovato-lanceolatis ntrinque attenuatis obtusis longè petiolatis, ramis floriferis alternis rarius geminatis simplicibus,





verticillis subconfertis superioribus aphyllis, laciniis internis demùm granulatis ovatis obtusiusculis 2-raro 4-dentatis dentibus laciniis brevioribus subbulatis. ♀ in pratis, ad sepes. — Fl. fr. 3. p. 375. eng. bot. t. 1999. — Lob. ic. 285. — Cam. epit. 228. ic. (v. v.)

6. R. ACUTUS (L. sp. 478.) foliis infimis cordato-lanceolatis acutis margine sèpè leviter crispis, superioribus lanceolatis acuminatis, ramis floriferis alternis vel rariùs geminatis, verticillis distantibus multifloris axillaribus, laciniis internis demùm ovatis acutiusculis integris vel leviter 2-3-dentatis, omnibus granulo maximo onustis. ♀ in humidis et paludosis, ad rivulos, fossas et stagna. — Fl. fr. 3. p. 375. eng. bot. t. 924. — Dod. pempt. 637. ic. — Fuchs. hist. 461. ic. (v. v.)

** *Flores hermaphroditæ vel polygami, laciniis internis demùm integris rarò serratis sèpissimè basi cordatis apice obtusis.*

7. R. NEMORAFATHUM (L. f. supp. 212.) foliis infimis cordato-lanceolatis, superioribus lanceolatis undulatis serratis acutis, ramis floriferis alternis simplicibus divaricatis, verticillis distantibus paucifloris superioribus aphyllis, laciniis internis demùm granulatis ovatis obtusis integris. ♀ in sylvaticis, humidis et paludosis. — Fl. fr. 3. p. 373. R. divaricatus Thuil. fl. par. excl. syn. (v. v.)

8. R. NEMOROSUS (Schrad cat. goett. ex Wild. enum. 1. p. 397.) foliis superioribus subsessilibus planis infimisque? lanceolatis, ramis floriferis rectis, verticillis distantibus ferè omnibus aphyllis, laciniis internis demùm integris, uno granulato. ♀ in Galliâ septentrionali ex cl. Desmazières. — Fl. fr. 5. p. 367. Nimium præcedenti affinis. (v. s. ex Germaniâ.)

9. R. SANGUINEUS (L. sp. 476.) foliis acutis leviter crispis purpurascens petiolatis infimis cordato-lanceolatis, ramis floriferis alternis simplicibus, verticillis distantibus paucifloris superioribus aphyllis, laciniis internis demùm ovato-lanceolatis obtusiusculis integris, uno sèpius valde granulato. ♀ in paludosis et secis rivis. — Fl. fr. 3. p. 374. eng. bot. t. 1533. — J. Bauh. hist. 2. p. 988. ic. (v. v.)

10. R. CRISPUS (L. sp. 476.) foliis undosis crassis acutis infimis oblongo-lanceolatis petiolatis, ramis floriferis alternis binis vel ternis simplicibus vel divisis, verticillis subconfertis multifloris superioribus aphyllis, laciniis internis demùm cordato-orbiculatis integris acutiusculis profusè granulatis. ♀ in humidis et ruderatis. — Fl. fr. 3. p. 373. eng. bot. t. 1998. — Tabern. ic. 436. — Munt. brit. t. 190. (v. v.)

11. R. AQUATICUS (L. sp. 479.) foliis infimis cordatis undosis, superioribus oblongis utrinque acutis, ramis floriferis alternis binis, verticillis subconfertis superioribus aphyllis, laciniis internis demùm deltoideo-ovatis acutiusculis integris granulato agno oblongo notatis. ♀ in stagnorum, fossarum aquaticarum oris. — Fl. fr. 3. p. 373. eng. bot. t. 2014. — Lob. ic. 285. f. 2. (v. v.)

12. R. PATIENTIA (L. sp. 476.) foliis inferioribus cordato-ovatis acutiusculis undatis; superioribus oblongo-lanceolatis peracutis, ramis floriferis sèpè ternis, laciniis internis demùm cordatis integris acutiusculis planis, altero granulo globoso notato. ♀ in Pedemontii Alpibus indigena, in hortis culta et ex cl. Merat circà Parisios spontanea. — Fl. fr. 3. p. 372. Campd. mon. t. 1. f. 7. — Fuchs hist. 462. ic. (v. v. c.)

13. R. ALPINUS (L. sp. 480.) foliis infimis caulinisque cordato-ovatis obtusis petiolatis, summis minoribus ovato-lanceolatis, verticillis multifloris confertis sèpius aphyllis, floribus longè pedicellatis, laciniis internis demùm cordatis acutiusculis apice subcontortis sinuatis uno sèpius granulato. ♀ in Alpibus, Pyrenæis et Arverniæ montibus circà stabula. — Fl. fr. 3. p. 372. 5. p. 367. Campd. mon. t. 2. f. 1. Rheum Rhaponticum Delarb. non L. — Moris. s. 5. t. 27. f. 2. n. 2. (v. v. DC.)

Sect. II. ACETOSA Tourn. Campd. mon. p. 67.

Involucellum longè vel è pedicelli articulatione ortum, bracteolis demùm spontè reflexis; styli ovarii angulis supernè accreti. — Sapor acidus.

* *Involucello longè à pedicelli articulatione orto; ramis et verticillis ferè omnibus aphyllis.*

14. R. ARIFOLIUS (All. ped. 2. p. 204. non Ait. nec L. f.) foliis deltoideis hastatis auriculis brevibus obtusis rectâ divaricatis, inferioribus acutiusculis longè petiolatis, superioribus subacuminatis sessilibus, floribus dioicis, verticillis subconfertis paucifloris, florum fem. laciiniis demùm cordato-ovatis obtusis. ♀ in summis jugis Alpium, Arverniæ, Pyrenæorum. — Fl. fr. 3. p. 377. — Bocc. mus. t. 125. (v. v.)

15. R. AMPLEXICAULIS (Lapeyr. fl. pyr. p. 200.) foliis infimis cordato-ovatis obtusis petiolatis auriculis obtusis nervo medio parallelis, caulinis acutiusculis sessilibus amplexicaulibus, ramis floriferis terminalibus aphyllis, floribus dioicis, verticillis subconfertis paucifloris, laciiniis demùm cordato-orbicularibus obtusis subgranulatis. ♀ in Pyrenæis et Arverniæ summo jugo Cantal. — Fl. fr. 5. p. 369. — Bocc. mus. 2. t. 126. (v. v. DC.)

16. R. TUBEROSUS (L. sp. 481.) radice tuberosâ, foliis petiolatis infimis lanceolato-sagittatis, auriculis linearibus acuminatis patentibus, floribus dioicis. ♀ in pratis circa Nicaem. — Fl. fr. 3. p. 376. 5. p. 368. — Tabern. ic. 449. f. 1. (v. s.)

17. R. ACETOSA (L. sp. 481.) foliis subtûs glaucescentibus, infimis longè petiolatis oblongo-sagittatis, auriculis retrorsum porrectis, superioribus oblongo-lanceolatis basi cordatis amplexicaulibus, verticillis nudis paucifloris, floribus dioicis, laciiniis fem. internis demùm cordato-orbicularibus obtusis granulo sphæroideo parvo notatis. ♀ in pratis et pascuis spontanea, in hortis culta. — Fl. fr. 3. p. 377 excl. var. eng. bot. t. 127. — Fuchs hist. 461. ic. — Tabern. ic. 440. (v. v.)

18. R. INTERMEDIUS (DC. fl. fr. 5. p. 369.) foliis infimis elongatis longè petiolatis hastato-lanceolatis acutis undosis, auriculis acutis bifidis incurvis, summis amplexicaulibus revolutis, floribus dioicis, verticillis paucifloris subconfertis, laciiniis internis orbicularibus profunde cordatis obtusis demùm granulo parvo sphæroideo instructis. ♀ in siccis Galliæ meridionalis. — Campd. mon. t. 2. f. 3. (v. v.)

19. R. ACETOSELLA (L. sp. 481. excl. var. ♂) foliis infimis hastato-lanceolatis subovatis petiolatis, auriculis divaricatis acutis integris, summis oblongo-linearibus in petiolam subdecurrentibus, ramis aphyllis filiformibus elongatis, floribus dioicis, laciiniis fem. internis demùm ovatis acutiusculis cariopsidei accretis. ♀ in cultis, sabulosis. — Fl. fr. 3. p. 378. eng. bot. t. 1674. Campd. mon. t. 2. f. 4. — Tabern. ic. 440 et 441. f. 1 et 2. (v. v.)

20. R. TINGITANUS (L. sp. 479.) caule herbaceo, foliis hastato-ovatis acutis erosis petiolatis, floribus hermaphroditis, verticillis aphyllis paucifloris distantibus, laciiniis internis demùm cordato-orbicularibus integris. ♀ in maritimis ab Arelate ad Narbonam. — Fl. fr. 5. p. 370. — Bauh. prod. 56. ic. — Moris. s. 5. t. 28. f. 10. n. 8. (v. v.)

21. R. SCUTATUS (L. sp. 480.) caule herbaceo tereti, foliis cordato-hastatis obtusis longè petiolatis, verticillis paucifloris, floribus hermaphroditis, laciiniis internis demùm cordato-orbicularibus obtusissimis integris. ♀ in paludosis Galliæ occidentalis, lapidosis montosis Pyren., montium Lupi, Cantal, Aurei. — Fl. fr. 3. p. 378. Campd. mon. t. 2. f. 6. — J. Bauh. hist. 2. p. 991. ic. — Munt. brit. t. 74. (v. v.)

** *Involucello è pedicelli articulatione orto, ramis floriferis et verticillis ferè omnibus axillaribus.*

22. R. EUCEPHALOPHORUS (L. sp. 479.) foliis infimis obovatis, floribus hermaphroditis, laciiniis internis demùm deltoideo-ovatis acutiusculis 3-dentatis. (I)





in sabulosis maritimis Galliae mediterraneæ. — Fl. fr. 3. p. 376. Cav. ic. t. 41. Campd. mon. t. 3. f. 2. — Col. ephr. 1. t. 150. (v. v.)

II. OXYRIA Hill. veg. syst. 10. p. 24. *Campd. mon.* 153. — *Rumicis sp. L. DC.*

Flores hermaphroditi, involucellum nullum; perigonum 4-partitum laciniis post anthesin auctis; stylis 2 reflexi; cariopsis 2-gona; embryo centralis.

1. **O. DIGYNA** (Campd. mon. 155. t. 3. f. 3.) ♀ in Alpibus, montibus Arvernæ, Pyrenæis, in editioribus. — *Rumex digynus L. sp.* 480. Fl. fr. 3. p. 379. eng. bot. t. 910. — Pluck. alm. 8. t. 252. f. 2. Folia radicalia subreniformia longè petiolata. (v. v.)

III. POLYGONUM L. gen. 495. *Meisner polyg. mon.* p. 3.

Perigonum 4-6-partitum persistens, stamna 5-9 saepius 8; ovarium 2-3 stylos totidemque stigma gerens; cariopsis ovata aut triangularis; embryo lateralis vel centralis, radicula supera.

Sect. I. FAGOPYRUM Tourn. t. 290. *Meisn. mon. polyg.* p. 61.

Cariopsis triquetra acuminata, embryo incurvus centralis, cotyledones induplicatae. — Folia cordata, flores racemoso-corymbosi.

1. **P. FAGOPYRUM** (L. sp. 522.) caulis erectis, stipulis amplexicaulis abbreviatis integris basi vaginantibus, foliis cordato sagittatis petiolatis, floribus pedicellatis racemoso-corymbosis, cariopside laevi perigonio longiore. (I) ex Asiæ ortum in arvis cultum. — Fl. fr. 3. p. 370. — Moris. s. 5. t. 29. f. 1. (v. v. c.)

Sect. II. TINIARIA *Meisn. l. c. p. 62.*

Cariopsis triquetra acuminata, embryo lateralis incurvus, cotyledones angustæ lineares albumini accumbentes (i). — Cäules volubiles, flores laxe racemosi axillares.

2. **P. SUMETORUM** (L. sp. 522.) caule volubili tereti, stipulis brevibus amplexicaulis subacutis, foliis ovatis acuminatis basi cordatis petiolatis, racemis axillaribus foliosis, floribus verticillatis remotis pedicellatis, cariopsisibus triquetris laevibus perigonio persistente triptero arcte obvallatis pendulis. (I) ad sepes et in umbrosis. — Fl. fr. 3. p. 371. — Lob. ic. t. 624. f. 1. (v. v.)

3. **P. CONVOLVULUS** (L. sp. 522.) caule volubili angulato, stipulis amplexicaulis subtruncatis brevibus, foliis hastato-cordatis acuminatis petiolatis, racemis axillaribus, floribus subverticillatis remotis, cariopside triquetra granulato-striata perigonio persistente involuta. (I) in agris frequens. — Fl. fr. 3. p. 371. Fl. dan. t. 744. (v. v.)

Sect. III. ACONOGONUM *Meisner. l. c. p. 55.*

Cariopsis acute triquetra acuminata, embryo lateralis incurvus, cotyledones plauæ ovatae albumini accumbentes. — Stipulae simplices, flores racemoso-paniculati.

4. **P. ALPEM** (All. ped. t. 68. f. 1.) caule erecto ramoso, ramis divaricatis, stipulis brevibus vaginatis truncatis hirsutis demùm laceris et deciduis, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis undolatis margine ciliatis laevibus basi in petiolum brevem decurrentibus, floribus racemoso paniculatis. ♀ in pascuis Alpium, Pyren. orient., Corsicæ montium ex Wild. — Fl. fr. 3. p. 369. (v. v.)

(i) Cotyledones albumini *incumbentes* appellamus, cum commissura cotyledonum axi albuminis parallela est (|| o), *accumbentes* cum commissura axin albuminis specat (=o).

Sect. IV. BISTORTA Tourn. t. 291. Meisn. polyg. p. 50.

Cariopsis triquetra acuminata, embryo lateralis, cotyledonibus accumbentibus angustis. — Spicæ densæ cylindricæ solitariae terminales, radix tuberosa.

5. P. VIVIPARUM (L. sp. 516.) caule simplicissimo monostachyo erecto, stipulis cylindricis dilatatis in parte superiori lateraliter dehiscentibus amplexicanibus oblique truncatis, foliis lanceolatis acutis margine revolutis, inferioribus ellipticis in petiolum attenuatis, cariopside obtusè triquetra. $\frac{1}{2}$ in pascuis Vosgesorum, Jurassi, Alpium, Pyrenæorum. — Fl. fr. 3. p. 364. — Plack. t. 151. f. 2. (v. v.)
6. P. BISTORTA (L. sp. 516.) caule erecto simplicissimo monostachyo, stipulis dilatatis glabris truncatis demum lateraliter dehiscentibus basi vaginantibus, foliis ovato-lanceolatis acuminatis, superioribus sessilibus, radicalibus basi subcordatis in petiolum decurrentibus, cariopside laevi acute triquetra. $\frac{1}{2}$ in pratis et pascuis montosis. — Fl. fr. 3. p. 364. Fl. dan. t. 421. — Moris. s. 5. t. 28. f. 11. n. 2. (v. v.)

Sect. V. AMBLYGONUM Meisn. p. 53.

Cariopsis globosa compressa vix mucronulata, embryo lateralis incurvus, cotyledonibus linearibus albumini incumbentibus. — Stipulae cylindricæ liberæ, flores densè spicati.

7. P. ORIENTALIS (L. sp. 519.) caulibus erectis altissimis villosis supernè ramosis, stipulis vaginantibus hypocrateiformibus truncatis ciliatis, foliis ovatis acuminatis pubescentibus petiolatis, spicis elongatis densis nutantibus, cariopside laevi nitidâ. (I) in hortis cultum. — Fl. fr. 3. p. 367. Mill. ic. t. 201. Meisn. t. 3. f. k. (v. v. c.)

Sect. VI. PERSICARIA Tourn. t. 290. Meisn. polyg. p. 66.

Cariopsis compressa lenticularis acuta aut acuminata, embryo lateralis incurvus, cotyledonibus linearibus planis albumini incumbentibus. — Stipulae teretes vaginantes simplices, flores spicati.

8. P. AMPHIBIUM (L. sp. 517.) caulibus radicantibus procumbentibus ascendentibus, stipulis tubulosis vaginantibus caulem vestientibus illique adnatis, foliis lanceolato-ellipticis petiolatis acutis margine scabris basi plus minus cordatis, floribus densè spicatis spicâ terminali ovato-oblongâ. $\frac{1}{2}$ in paludibus, fossis, aquaticis. — Fl. fr. 3. p. 365. eng. bot. t. 436. — Moris. s. 5. t. 29. f. 4. n. 2. (v. v.)
9. P. HYDROMERUM (L. sp. 517.) caule erecto ramoso, stipulis dilatatis infernè vaginantibus supernè amplexicanibus truncatis ciliatis, foliis lanceolatis apice attenuatis obtusiusculis glabris margine ciliato-scabriusculis, spicis elongatis filiformibus laxissimis, floribus inferioribus remotis axillaribus, cariopside obsolete 3-quetrâ acuminatâ nitidâ tenuissimè punctato-striatâ. (I) in aquosis et ad fossas humidas. — Fl. fr. 3. p. 365. eng. bot. t. 989. — Moris. s. 5. t. 29. f. 11. n. 6. (v. v.)

10. P. PERSICARIA (L. sp. 518 var. α .) caulibus procumbentibus aut ascendentibus ramosis, stipulis vaginantibus truncatis ciliatis, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis margine brevissimè ciliatis asperis, floribus in paniculas spiciformes laxiusculas congestis, cariopside lenticulari auminatâ laevi. (I) in humidis, ad margines fossarum et viarum. — Fl. fr. 3. p. 366. eng. bot. t. 756. Folia sæpius maculata. (v. v.)

- β . incana, caulibus suberectis, foliis immaculatis antiquioribus subtus pubescenti-incanis. — Cum priore passim. — P. incanum Willd. sp. 2. p. 446. Fl. fr. 3. p. 366.
- γ . lapathifolia (Meisn.) caule erecto, stipulis integris, foliis ovato-lanceolatis, floribus in spicas multas axillares terminalesve densas oblongas dis-

intoximante

Adrenals

- + — adrenalin
- + — cortexoles
- + — corticostern
- + — hydrocortisone
and tetan

positis. — In paludosis uberioribus. — *P. lapathifolium* L. Fl. fr. 3. p. 367. — Lob. ic. t. 315. f. 1. (v. v.)

11. *P. pusillum* (Lam. fl. fr. 3. p. 235.) caulibus ascendentibus ramosis, stipulis vaginantibus truncatis ciliato-fimbriatis, foliis linear-lanceolatis acuminate glabris margine scabrinusculis, spicis filiformibus elongatis laxiusculis, cariopside lenticulari acutâ laevi nitidâ. (I) in humidis et sabulosis passim. — Fl. fr. 3. p. 366. eng. bot. t. 1043. *P. minus* Ait. kew. 2. p. 31. *P. strictum* All. ped. t. 68. f. 2. — Lob. ic. t. 316. f. 1. (v. v.)

Sect. VII. AVICULARIA Meisn. L. c. p. 85.

Cariopsis triquetra, embryo lateralis, cotyledonibus angustis linearibus planis albumini incumbentibus. — Stipulae plus minus bilobae, flores subsolitarii axillares.

12. *P. AVICULARIA* (L. sp. 519.) caule procumbente herbaceo ramoso folioso, stipulis 2-partitis ovato-lanceolatis acutis demum fimbriato-laceris, foliis lanceolatis subobtusis margine saepè scabriusculis, floribus axillaribus 2-3 pedicellatis, cariopside granulato-striata. (I) ad vias, in agris et incultis frequens. Fl. fr. 3. p. 368. — Moris. s. 5. t. 29. f. 12. n. 1. (v. v.)

P. Bellardi, caulibus erectis, foliis angustioribus acutis. — In agris passim. — *P. Bellardi* All. ped. t. 90. f. 2. Fl. fr. 3. p. 369. (v. v.)

13. *P. MARITIMUM* (L. sp. 519.) canle procumbente ramoso folioso basi sublignoso, stipulis magnis 2-partitis ovato-lanceolatis acutis demum fimbriato-laceris, foliis subcarnosis lanceolatis acutis, floribus axillaribus 2-4 pedicellatis, cariopside laevissimâ. (I) in arenosis maritimis. — Fl. fr. 3. p. 368. — Cam. epit. 691. ic. (v. v.)

15. *P. EQUISETIFORME* (Sibth. et Smith. fl. græc. p. 266.) caule erecto ramoso aphylo basi sublignoso, stipulis apice sub 2-lobis demum dentato-fimbriatis internodiis multo brevioribus, floribus axillaribus solitariis geminatisve sessilibus aut breviter pedicellatis in spicam laxam flagelliformem dispositis. (I) secus torrentes Corsicæ. — Bocc. mus. t. 41. (v. s.)

Ordo LXXXIV. THYMELEÆ Juss. gen. 76.

Perigonium liberum coloratum monopetalum tubulosum, limbo 4-fido rarò 5-fido, aestivatione imbricatâ. Stamina definita fauci tubove inserta, perigonii laciñiis numero dupla. Antheræ 2-loculares, loculis medio longitudinaliter dehiscensibus. Ovarium unicum, ovulo 1 pendulo. Stylus 1 saepè lateralis; stigma 1. Fructus unicus monospermus perigonio tectus, siccus aut baccatus. Albumen nullum vel tenue carnosum. Embryo rectus; radicula supera brevis; cotyledones plano-convexæ. — Frutices, folia simplicia integra alterna aut opposita exstipulata; flores saepius hermaphroditi interdum abortu dioici.

I. STELLERA L. gen. 488.

Perigonium tubulosum 4-lobum; stamina 8; stylus brevis; stigma capitatum; capsula dura nitida rostrata.

1. *S. PASSERINA* (L. sp. 512.) foliis linearibus, floribus axillaribus sessilibus 4-fidis. (I) in agris. — Fl. fr. 3. p. 361. Gou. monsp. p. 44. t. 3. (v. v.)

II. PASSERINA L. gen. 489.

Perigonium 4-lobum; stamina 8; stylus filiformis lateralis; capsula 1-locularis 1-sperma.

1. *P. dioica* (Ram. bull. phil. n. 41. t. 9. f. 4.) foliis subtus punctulatis linearis-lanceolatis acutis glabris confertis, floribus dioicis aut hermaphroditis axillaribus geminis ebracteatis, perigonio tubuloso, laciniis lanceolatis. ♂ in Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 359. *Daphne dioica* Gou. ill. 27. t. 17. f. 1. *P. empetrifolia* Lapeyr. (v. v.)
2. *P. nivalis* (Ram. bull. phil. n. 41. t. 9. f. 4.) caulis tortuosus prostratus ramosus, foliis nitidis linearis-lanceolatis obtusis glabris, floribus dioicis aut hermaphroditis axillaribus solitariis bracteatis, perigonio tubuloso, laciniis ovatis. ♂ in summis Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 359. *P. calycina* Fl. fr. 3. p. 360. *Daphne calycina* Lam. ill. t. 290. f. 3. *P. juniperifolia* Lapeyr. abr. pyr. (v. v. DC.)
3. *P. Thomasii* (Duby mss.) caulis erectis ramosis, foliis coriaceis linearis-lanceolatis subspatulatis subacutis glaberrimis, floribus axillaribus sessilibus geminis ternis bracteatis, perigonio tubuloso hirsuto, laciniis ovatis. ♂ in montosis Corsicæ reperiit Ph. Thomas. (v. s. D.)
4. *P. TARTON-RAIRA* (DC. fl. fr. 5. p. 367.) caule hirsuto, foliis obovatis aut elliptico-lanceolatis utrinque sericeis, floribus sessilibus lateralibus aggregatis basi squamis imbricatis, perigonio hirsuto, laciniis ovatis. ♂ in rupestribus Nicaeæ, Galloprovinciæ, Corsicæ. — *Daphne Tarton-raira* L. sp. 510. Fl. fr. 3. p. 357. — Lob. ic. t. 371. f. 2. (v. v.)
5. *P. hirsuta* (L. sp. 513. excl. Breyn. syn.) caulis erectis ramosis tomentosus, foliis ovatis carnosis intus tomentosis extus glabris, floribus aggregatis axillaribus, perigonio extus hirsuto subcampanulato, laciniis ovatis. ♂ in lapidosis sterilibus provinc. mediterr. — Fl. fr. 3. p. 360. — Lob. ic. 2. p. 217. f. 1. (v. v.)


β. *polygalæfolia*, foliis confertis utrinque tomentosis. — Circà Massiliam.
P. polygalæfolia Lapeyr. (v. v. D.)
6. *P. THYMELÆA* (DC. fl. fr. 5. p. 366.) ramis simplicibus, foliis ovato-lanceolatis glaucis acutis, floribus axillaribus sessilibus inferne solitariis superne aggregatis, perigonio longè tubuloso piloso, laciniis linearibus. ♂ in provinciis mediterraneis. — *Daphne Thymelæa* L. sp. 509. Fl. fr. 3. p. 356. Gér. gallop. t. 17. f. 2. (v. v.)

III. *DAPHNE* L. gen. 485.

Perigonium 4-lobum; stamina 8; stylus brevis terminalis; bacca 1-locularis 1-sperma.

* *Floribus terminalibus.*

1. *D. GNIDIUM* (L. sp. 511.) caule ramosissimo, foliis coriaceis linearis-lanceolatis glabris acuminato-cuspidatis, racemis terminalibus paniculatis, floribus sessilibus, tubo tomentoso, laciniis ovato-lanceolatis. ♂ in aridis provinc. mediterr. et occidentalium. — Fl. fr. 3. p. 358. — Lob. ic. t. 369. f. 1. (v. v.)
2. *D. CNEOBUM* (L. sp. 511.) foliis elliptico-lanceolatis obtusis mucronulatis nitidis coriaceis glabris, floribus fasciulatis terminalibus sessilibus, tubo pubescente, laciniis ovato-lanceolatis. ♂ in montibus Alsatiæ, Lotharingiæ propè Commercy (Monnier), Jurasso, Alpibus, Cebennis, Pyrenæis, in syrtibus circà Aginnum ex St.-Am., Aquas Tarbellicas ex Thore, Burdigalam ex Laterr. — Fl. fr. 3. p. 358. Bull. herb. t. 121. (v. v.)
3. *D. OLEOIDES* (L. mant. 66.) caulis ramosus, foliis coriaceis elliptico-lanceolatis acutis supra nitidis glabris subtus adpressè subpubescentibus, floribus ternis geminis terminalibus sessilibus, perigonii tubo hirsuto basi dilatato, laciniis linearibus. ♂ in montosis Corsicæ. — Schreb. dec. t. 7. — Alp. exot. 44. t. 43. (v. s.)





* * *Floribus axillaribus lateralibusve.*

4. **D. ALPINA** (L. sp. 510.) foliis elliptico-lanceolatis obtusis subtus pubescentibus, floribus sessilibus aggregatis in extremitate ramorum lateralibus, perig. tubo hirsuto, laciniis ovatis lanceolatisve. ♂ in lapidosis Alpium, Cebennarum, Pyren. ex cl. Benth. — Fl. fr. 3. p. 357. — Lob. ic. t. 370. f. 1. (v. v.)
 5. **D. MEZEREUM** (L. sp. 509.) foliis lanceolatis acutis glabris post flores evolutis deciduis, floribus ternis lateralibus sessilibus, tubo pubescente, laciniis ovatis. ♂ in sylvis montosis. — Fl. fr. 3. p. 356. Lam. ill. t. 290. f. 1. (v. v.)
 6. **D. LAUREOEA** (L. sp. 510.) foliis coriaceis lanceolatis glabris acutis perennantibus, floribus axillaribus pedicellatis quinis, tubo glabro, laciniis ovato-lanceolatis. ♂ in sylvis montosis. — Fl. fr. 3. p. 357. Bull. herb. t. 37. (v. v.)
-

**Ordo LXXXV. LAURINEÆ DC. fl. fr. 3. p. 361. — Lauri
Juss. gen.**

Perigonum liberum 1-sepalum persistens 6-fidum aut 6-partitum, æstivatione imbricatâ. Stamina imis laciniis inserta, nunc 6 ordine simplici nunc 12 ordine dupli digesta. Antheræ filamento adnatæ à basi ad apicem dehiscentes. Ovarium 1; stylus 1; stigma simplex aut divisum. Drupa aut bacca 1-locularis 1-sperma. Albumen nullum; embryo rectus, radicula supera. — Arbores aut frutices; folia alterna; flores hermaphroditæ aut abortu dioici.

I. LAURUS *Tourn. inst. t. 367. L. gen. 503.*

Perigonum 4-6-fidum æquale; stamina 6-9-12 dupli serie disposita; exteriora omnia fertilia, interiora alterna sterilia alterna fertilia et basi 2-appendiculata aut 2-glandulosa; drupa carnosa.

- x. **L. NOVEM** (L. sp. 529.) foliis lanceolatis venosis perennantibus, floribus 4-fidis dioicis. ♂ in provinciis mediterraneis et in occidentalibus usque ad Armoraciam sub dio crescit. — Fl. fr. 3. p. 362. Duham. arb. 2. t. 134 et 135. (v. v. c.)
-

Ordo LXXXVI. SANTALACEÆ R. Brown. prod. nov. holl.
p. 350.

Perigonium cum ovario adhærens, 4-5-fidum semicoloratum, aestivatione valvatâ. Stamina 4-5 perigonii laciniarum basi inserta iisque opposita. Ovarium uniloculare 2-4-spermum, ovulis juxtâ apicem placentæ centralis affixis pendulis. Stylus 1. Stigma sæpè lobatum. Fructus monospermus, nucamentaceus vel drupaceus. Albumen carnosum. Embryo inversus teres. — Herbæ aut suffrutices (in nostris), foliis alternis aut suboppositis exstipulatis indivisis, floribus parvis subspicatis raro umbellatis vel solitariis.

I. THESIUM L. gen. 292.

Perigonium 4-5-fidum; stamina 4-5 perigonii lobis opposita; capsula monosperma non dehiscens perigonio persistente coronata.

1. T. LINOPHYLLUM (L. sp. 301.) floribus pedunculatis pentandris, caulis erectiusculis. ♀ in collibus, pratis siccis et montosis. — Fl. fr. 3. p. 352. — Moris. s. 15. t. 1. f. 9. n. 3. (v. v.)
♂. *humifusum*, caulis numerosis humifusis. — in arenosis maritimis Galiae occidentalis. — T. *humifusum* Fl. fr. 5. p. 366. (v. v.)
2. T. ALPINUM (L. sp. 301.) floribus subsessilibus tetrandris, ramis subsimplicibus. ♀ in editioribus montibus. — Fl. fr. 3. p. 366. Gér. galloprov. t. 17. f. 1. (v. v.)


II. OSYRIS L. gen. 1101.

Flores abortu polygami; perigonium 3-fidum. *Masc.* Stamina 3 brevia; ovarii rudimentum. *Herm.* Stam. 3 aliquando abortiva; ovarium 1; stigma triplex; bacca globosa siccâ umbilicata; nucleus 1-spermus.

1. O. ALBA (L. sp. 1450.) ♂ in rupestribus et sterilibus Delph. et prov. austr. et austro-occidentalium passim. — Fl. fr. 3. p. 353. — Cam. epit. 26, ic. Flores parvi pedicellati in parte superiore ramorum aggregati. (v. v.)
-









Ordo LXXXVII. ELÆAGNEÆ R. Brown in prod. nov. holl. p. 350. A. Rich. in mém. soc. hist. nat. paris. t. 1. p. 374. — Eleagnorum gen. Juss. gen.

Flores dioici rariū hermaphroditi. *Masc.* subamentiformes 3-4-8-andri, staminibus introrsis subsessilibus bilocularibus. *Fem.* Perigonum tubulosum monosepalum persistens, limbo integro aut 2-4-fido ad faucem disco glandulari prominenti variè lobato coronatus (in Hippophaë discus nullus). Ovarium è fundo perigonii assurgens nec cum illo coalitum uniloculare uniovulatum, ovulo ascendentī subpedicellato. Stylus brevissimus. Stigma linguiforme. Nux calyce baccato et akenio crustaceo constans, semen erectum. Albumen carnosum tenuē; embryo rectus, radicula infera; cotyledones planæ carnosæ. — Arbores aut arbusculæ foliis alternis aut oppositis integris exstipulatis.

I. **ELÆAGNUS L. gen. 159.**

Flores hermaphroditi; perigonii tubus gracilis, limbus campanulatus 4-5-fidus, discus annularis aut 2-fidus; stamina 4-5; nux calyce baccato intus osseo et akenio constans.

1. **E. ANGUSTIFOLIA** (L. sp. 176.) foliis lanceolatis acutis integerrimis utrinque squamulato-argenteis nitidis, floribus in axillis foliorum 1-3 pedicellatis erectis. ♂ in humidis Galloprov. ex Gér. — Fl. fr. 3. p. 354. Lam. ill. t. 73. f. 1. (v. v. c.)

II. **HIPPOPHÆ Nutt. gen. amer. 1. p. 97. A. Rich. l. c. p. 402.**

Flores dioici. *Masc.* amentiformes, tetrandri. *Fem.* axillares solitarii; perigonum tubulosum apice bifidum clausum, disco nullo; fructus calyce baccato et akenio constans.

1. **H. RHAMNOIDES** (L. sp. 1452.) ♂ in sabulosis humidis secùs Mediterraneanum, secùs flumina in prov. orient. et littora Neustriæ ex cl. de Bréb. et Lépré. — Fl. fr. 3. p. 353. Lam. ill. t. 808. Folia alterna lanceolata subiùs squamato-argentea. (v. v.)

Ordo LXXXVIII. CYTINEÆ R. Brown in linn. trans. 13.
Ad. Brongn. in ann. sc. nat. 1. p. 39.

Fl. monoici vel dioici. Perigonum adhærens aut (in exotis) liberum, 4-5-partitum, aestivatione imbricatâ. Stam. 8, 16, vel numerosiora columnæ centrali inserta extrorsa. Antheræ 2-loculares longitudinaliter dehiscentes. Ovarium 1-loculare (in nostris), placentæ 4 vel 8 parietales. Stylus cylindricus vel nullus. Stigma lobatum lobis numero placentarum æquilibus. Semina numerosa. Albumen carnosum; embryo rectus 2-cotyledoneus.

I. CYTINUS L. gen. 1232.

Fl. monoici. Perigonum superum tubulosum - campanulatum limbo 4-fido basi squamosum. *Masc.* Columna centralis antherifera apice tuberculis conicis circiter 8 coronata; antheræ 8 circum columnæ apicem sessiles. *Fem.* Ovarium inferum 1-loculare; placentæ 8 parietales; stylus cylindricus simplex; stigma capitatum 8-sulcatum; sem.

1. C. HYPOCISTIS (L. gen. p. 566.) 2^f. Parasiticus in radicibus Cistorum, in Galloprov., Occitanâ, Corsicâ, propè Burdigalam ex Laterr.—Fl. fr. 3. p. 350. Lam. ill. t. 737. Caulis simplex squamis oblongis ovatisve imbricatis undique tectus, flores spicati subcapitati, fem. inferiores masculi superiores, utriusque 3-bracteati. (v. v. DC.)

Ordo LXXXIX. ARISTOLOCHIEÆ Juss. gen. 74. excl.
Cytino.

Flores hermaphroditæ. Perigonum ovario adhærens, monosepalum limbo mox 3-lobo, mox tubulosum in parte superiori irregulariter dilatato; aestivatione valvatâ. Stamina definita numero ternario, mox libera et distincta, mox cum stylo et stigmate cohærentia epigyna. Ovarium 3-6-loculare; stylus brevis; stigma divisum. Capsula aut bacca coriacea 6-locularis polysperma, placentæ laterales. Embryo minimus ad basin albuminis cartilaginei. — Herbæ aut suffrutescens sæpius sarmentosi, foliis alternis simplicibus petiolatis.


I. ARISTOLOCHIA Tourn. inst. 71. L. gen. 1022.

Perigonum tubulosum basi ventricosum apice dilatum et in ligulam extensum; antheræ 6 subsessiles stylo insertæ; stigma 6-fidum; capsula 6-gona 6-locularis.

* *Floribus solitariis.*

1. A. ROTUNDA (L. sp. 1364.) foliis ovatis cordatis subsessilibus, radice rotundâ. $\frac{f}{2}$ ad vineas et in arvis Galliae australis et austro-occidentalis usque ad Burdigalam ex Laterr. — Fl. fr. 3. p. 348. — Lob. ic. t. 606. f. 2. (v. v.)





2. A. LONGA (L. sp. 1364.) foliis petiolatis cordatis integerrimis ovatis, radice longâ simplici. ♀ in arvis, ad sepes et vineas Galliae australis. — Fl. fr. 3. p. 348. Mill. ic. t. 51. f. 2. — Cam. epit. 420. ic. (v. v.).
3. A. PISTOLOCHIA (L. sp. 1364.) foliis breviter petiolatis cordatis ovatis crenatis scarbris, radice fasciculatâ. ♀ in sterilibus Galloprov., Occit., agri Ligericini (Prost), Ruscinonensis. — Fl. fr. 3. p. 348. — Moris. s. 12. t. 17. f. 7. n. 12. (v. v.)
- * * *Floribus confertis.*
4. A. CLEMATITIS (L. sp. 1364.) foliis petiolatis subtundido-cordatis obtusiusculis, floribus axillaribus confertis. ♀ in lapidosis sterilibus Galliae austro-orientalis, australis, mediae occidentalisque. — Fl. fr. 3. p. 349. — Moris. s. 12. t. 17. f. 5. n. 5. (v. v.)

II. ASARUM Tourn. inst. 286. L. gen. 589.

Perigonum campanulatum 3-lobum; stamna 12 ovario imposita; antheræ mediis filamentis adnatae; stylus brevis; stigma stellatum 6-lobatum; capsula 6-loicularis.

1. A. EUROPEUM (L. sp. 633.) foliis reniformibus obtusis subhirsutis. ♀ in umbrosis saxosis. — Fl. fr. 3. p. 349. Lam. ill. t. 394. f. 1. (v. v.)

Ordo XC. EUPHORBIACEÆ Juss. gen. 384. Adr. Juss. gen. euph. p. 10.

Flores monoici aut dioici. Perigonum monosepalum laci-niis definitis, interdùm nullum, sèpissimè intùs appendicibus variis squamiformibus aut glandulosis auctum. *Masc.* Stamina indefinita aut sèpius definita, centro floris nonnunquam sub pistilli rudimenta inserta. Antheræ 2-loculares, loculis extùs in longum dehiscentibus interdùm distinctis. *Fem.* Ovarium superum sessile aut stipitatum 2-3-∞-loculare, loculis circa placentam centralem in orbem dispositis; ovula solitaria geminatave, angulo interiori sub apice suspensa. Styli tot quot loculi nunc distincti, nunc coaliti, nunc nulli. Stigma multiplex aut pluri-lobatum. Capsula 2-3-cocca coccis distinctis elasticè bivalvibus. Semina solitaria aut geminata placentæ centrali superiùs annexa arillata. Embryo albumine carnosò involutus; cotyledones planæ; radicula supera. — Herbæ aut frutices, sèpissimè lactescentes, foliis plerumque stipula-ceis alternis aut rarissimè oppositis, floribus axillaribus aut terminalibus plerumque bracteatis, bracteis quibusdam interdùm majoribus involucriformibus.

I. CROTON L. gen. 1083.

Monoicum. Perigonum 5-10-partitum, laci-niis alternis 5 minoribus petaloideis. *Masc.* Stampa 8-15 filamentis coalita; glandulæ 5 receptaculo affixæ. *Fem.* Styli 3; stigmata 6 vel pluria; capsula 3-cocca 3-sperma.

- I. C. TINTORIUM (L. sp. 1425.) foliis ovato-rhomboideis repandis basi integerimis utrinque canis, pedunculis terminalibus sub 5-floris, capsulis squamato-pubescentibus pendulis. (1) Niceæ, in Occitanâ, agro Ruscinonensi et Corsicâ. — Fl. fr. 3. p. 345. Lam. ill. t. 790. f. 4. (v. v.)

II. RICINUS Tourn. inst. t. 307. L. gen. 1085.

Monoicus. *Masc.* Perigonium 5-fidum; stamina plurima, filamentis coalita quasi ramosa. *Fem.* Perigonium 3-partitum; styli 3 bifurci; capsula tuberculis spinosis hirta, 3-locularis loculis 1-spermis.

- I. R. COMMUNIS (L. sp. 1430.) foliis peltatis palmatis, lobis lanceolatis serratis, caule herbaceo pruinoso, stigmatibus 3 apice 2-fidis, capsulis echinatis. (1) 5 ex Barbariâ et Oriente ortus, in hortis cultus. — Fl. fr. 3. p. 346. Lam. ill. t. 792. (v. v. c.)

III. BUXUS Tourn. inst. t. 345. L. gen. 1053.

Fl. monoici. Perigonium 3-4-partitum. *Masc.* Squama 2-loba; stam. 4 germinis rudimento inserta. *Fem.* Squamulæ 3 minimæ; styli 3; stigmata 3 obtusa; capsula 3-cornis 3-locularis 6-sperma.

- I. B. SEMPERVIRENS (L. sp. 1394.) foliis ovatis, petiolis margine pilosiusculis, antheris ovato-sagittatis. ♂ ♂ ad sepes et in sterilibus. — Fl. fr. 3. p. 345. (v. v.)

IV. EUPHORBIA L. gen. 243. Ræper enum. euph. germ. et pann. p. 11. (1)

Flores monoici masculi et feminei in eadem inflorescentiâ cinctâ involucro monophyllo 5-fido laciniis integris aut ciliato-fissis, exterius appendiculato glandulis 5-1 magnis cum laciniis involucri alternis truncato-peltatis. *Masc.* plures (10-36) verticillato-umbellati, articulati cum pedicellis persistentibus, bracteis ciliato-laceris stipati, abortu monandri; perigonum nullum. *Fem.* solitarii centrales, perigonio destituti; ovarium pedicellatum; stigmata 3 bifurca; capsula exserta 3-cocca, 3-sperma.

Sect. I. ANISOPHYLLUM Ræper ined.

Stipulatæ, involuci glandulæ processibus membranaceis externe suffultæ, semina carunculâ arillari destituta.

- I. E. CHAMÆSYCE (L. sp. 652.) ramis filiformibus foliisqne suborbiculatis basi hinc leviter cordatis membranaceis, fructibus subrotundo-trigonis lævibus vel ad ovariorum dorsum punctulato-scabris, seminibus subobovato-tetragonis rugulosis albidis. (1) in arenosis provinciarum australiorum.

a. *glabra* (Ræp.) foliis caulibus capsulisque glabris. — E. Chamaesyce Fl. fr. 3. p. 330. — Lob. ic. t. 363. f. 2. (v. v.)

b. *canescens*, foliis caulibus capsulisque pilosis. — In littoribus Gallo-prov. — E. canescens L. sp. 652. E. Massiliensis Fl. fr. 5. p. 357. (v. v.)


2. E. PEPLIS (L. sp. 652.) ramis firmis, foliis oblongis basi hinc profundè cordatis integerrimis vel in baseos latere subdentatis membranaceo-carnosis glaberrimis, fructibus ovoideo-trigonis lævissimis glaberrimisque, seminibus obovato-subtetragonis lævibus albidis. (1) in arenosis maritimis. — Fl. fr. 3. p. 330. — Lob. ic. t. 363. f. 1. (v. v.)

Sect. II. TITHYMALUS Tourn. inst. 18.

Exstipulatæ, processus membranacei nulli sub involuci glandulis, semina carunculâ arillari destituta (exceptâ E. ptericoccâ).

(1) Hocce genus mecum elaboravit cl. et amiciss. Ræper, auctor excellentissimæ euph. germanicæ et pannonicæ enumerationis.





§. 1. *Helioscopia* (Rœp. ined.) — *Involuci glandulæ integræ subrotundæ, cotyledones (subrotundæ) radiculâ latiores. — Rami florigeri sœpius trifidi.*

* *Helioscopiæ veræ. — Capsulæ læves, semina reticulato-exsculpta.*

3. E. *HELIOSCOPA* (L. sp. 658.) foliis obovato-cuneatis obtusis emarginatis apicem versus serratis glabris vel rariū sparse pilosis, verticillo 5-fido rariū 4-3-fido, ovariis dorso convexis lævibus glabris, seminibus obovatis reticulato-exsculptis opacis fuscis. (I) in cultis ubique. — Fl. fr. 3. p. 331. Fl. dan. t. 725. — Matth. comm. 864. ic. (v. v.)

4. E. *PTERICOCCA* (Brot. fl. Ius. 2. p. 312.) foliis spathulatis lanceolatis serrulatis obtusiusculis laxis, verticillo 5-fido, glandulis integris, ovariis glabris lævibus in dorso convexo bialatis alis subdistantibus, seminibus ovatis subnitidis reticulatis ecarunculatis. (I) in umbrosis circa Ajaccio reperiit Saltzmann et sub nomine E. stellulatae divulgavit. (v. s.)

** *Helioscopiæ spuriæ. — Capsulæ verrucosæ rariū læves, semina lævia rarissimè scabriuscula.*

5. E. *PLATYPHYLLOS* (L. sp. 660.) foliis membranaceis lanceolatis plerumque acutis serrulatis glabris vel piloso-pubescentibus, verticillo 5-fido rariū 4-3-fido, ovariis dorso convexis læviusculis vel plus minus verrucosis glabris, seminibus lævibus obovatis fuscis nitidis. (I) 2/4 in siccioribus campis et secūs vias. — Fl. fr. 3. p. 343.

a. *micrantha*, involucro extus glabro, verticillo plerumque 3-fido, ovariis verrucosis glabris. — E. micrantha Willd. ex Rœp. (v. v.)

β. *stricta*, involucro extus plerumque piloso, verticillis plerumque 5-rariū 3-fidis, ovariis verruculosis glabris aut pilosis. — E. stricta L. E. Coderiana Fl. fr. 5. p. 365. (v. v.)

6. E. *PUBESCENS* (Vahl. symb. 2. p. 55.) foliis lanceolatis plerumque acutis serrulatis pilosis, involucro extus piloso, verticillo plerumque 5-fido, ovariis dorso convexis verruculosis pilosis, seminibus obovatis fuscis nitidis punctis elevatis plus minus scabris. 2/4 in maritimis Galliæ mediterraneæ. — Fl. fr. 3. p. 344. E. platyphyllos γ Rœp. l. c. p. 60. An ut vult. el. amicus præcedentis var? (v. v.)

η. *paniculata*, foliis glabriusculis. — E. paniculata Lois. gall. 728. DC. fl. fr. 5. p. 365. non Desf. (v. v.)

7. E. *HYBERNA* (L. sp. 662.) foliis lato-lanceolatis sessilibus obtusis vel acutis integerrimis pubescentibus vel subglabris, verticillo 5-fido rariū 6-fido, ovariis dorso convexis muricato-verrucosis glabris, seminibus obovatis lævibus subnitidis nigrofuscis. 2/4 in montibus Corsice, Arverniæ, Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 344. — Dill. elth. 287. t. 290. f. 374. (v. s.)


8. E. *DULCIS* (L. sp. 656. non DC. fl. fr. 3. p. 341.) foliis lato-lanceolatis subpetiolatis petiolatisque obtusis vel acutis integerrimis vel serrulatis, glabris vel piloso-pubescentibus, verticillo 5-rariū 4-fido, ovariis in dorso convexo verrucis obsitis glabris aut pilosis, seminibus obovatis lævibus subopacis cinereo-fuscis. 2/4 in sylvaticis. — E. purpurata Thoil. fl. par. II. 1. p. 235. Fl. fr. 3. p. 342. E. carniolica Jacq. Host. Fl. fr. 3. p. 342. — Scop. carn. 1. t. 21. Magnoperæ variat. (v. v.)

9. E. *VERRUCOSA* (L. sp. 658.) foliis lato-lanceolatis sessilibus obtusiusculis mucronulatis vel acutis serrulatis, verticillo 5-fido rariū 4-fido, ovariis dorso convexis undique verrucosis glabris, seminibus obovatis lævibus rufogriseis. 2/4 in humidiusculis sylvarum et viarnm. — Fl. fr. 3. p. 343. E. flavicomæ Fl. fr. 5. p. 364. — Moris. s. 10. t. 3. f. 2. n. 3. (v. v.)

10. E. *SPINOSA* (L. sp. 655.) caule fruticoso, ramis senescentibus subspinosis, foliis ovato-vel linear-lanceolatis sessilibus obtusis vel acutis integerrimis vel rariū apicem versus subserrulatis glabris, verticillo 5-4-3-fido, ovariis

- dorso convexis verruculoso - muricatis glabris, seminibus obovatis lœvibus. ♀ in maritimis Corsicæ, Niceæ, Galloprovinciæ, agri Ruscinonensis ex Lapeyr. — Fl. fr. 3. p. 342. — Moris. s. 10. t. 1. f. 9. n. 8. (v. v.)
11. E. PALUSTRIS (L. sp. 662.) foliis lanceolatis ovato - lanceolatis sessilibus acutis vel obtusis inculis subintegerrimis vel serrulatis glabris, ramis florigeris sub verticillo in pseudo-umbellam multifidam aggregatis vel rariū verticillo 5-fido, ovarii dorso convexis undique tuberculato-verrucosis glabris, seminibus obovatis lœvibus nitidis nigro-fuscis. ♀ in paludibus secüs rivos. — Fl. fr. 3. p. 344. — Moris. s. 10. t. 2. f. 12. n. 1. Rami caulinis inferiores steriles. (v. v.)
12. E. PILOSA (L. sp. 659.) foliis lato - lanceolatis sessilibus acutiusculis vel obtusis serrulatis pubescenti-pilosis, verticillo 5-fido, ovarii dorso convexis lœvibus vel verrucosis plus minusve pilosis, seminibus obovatis nitidis nigro-fuscis. ♀ in Galloprovinciâ, Occitanâ, agro Syrtico et Burdigalensi. — Fl. fr. 3. p. 341. — Gm. sib. 2. t. 93. (v. v.)
- §. 2. *Esula* (Rœp. ined.) — *Glandulæ involuci triangulares lunatae aut lunato-bicornes, cotyledones (sublineares) latitudine radiculæ; rami florigeri, ferè semper bifidi.*
- * *Esula veræ. — Folia ramorum florigerorum libera.*
13. E. DENDROIDES (L. sp. 662.) foliis linearis - lanceolatis utrinque attenuatis integerrimis obtusis sessilibus glabris, verticillo 5-10-fido, glandulis reniformibus, ovarii dorso carinato - convexis punctis elevatis scabriusculis glabris, seminibus lœvibus cylindraceo-ovatis? obtusè tetragonis. ♂ in Corsicâ, insulis Stæchadum, Niceæ. — Fl. fr. 3. p. 340. — Moris. s. 10. t. 1. f. 5 et 6. n. 11 et 12. (v. v.)
14. E. ESULA (L. sp. 660.) foliis lanceolatis sessilibus obtusiusculis mucronatis integerrimis vel superne denticulato - scabris glabris, ramis florigeris sub verticillo in pseudo-umbellam multifidam congestis vel rariū verticillo 5-fido, glandulis lunatis subbicornibus, ovarii in dorso convexo punctato-scabris glabris, seminibus obovatis lœvibus opacis griseo-fuscis. ♀ in Galliâ occidentali et boreali. — E. Esula α et γ. Fl. fr. 5. p. 361. *Esula minor* Lob. ic. 357. (v. v.)
15. E. LUCIDA Waldst et Kit. hung. 1. t. 54.) foliis lanceolatis sessilibus obtusis mucronulatis vel acutis integerrimis glabris, ramis florigeris sub verticillo in pseudo-umbellam multifidam congestis vel rariū verticillo 5-fido, glandulis lunato-bicornibus, ovarii in dorso convexo punctato-scabris glabris, seminibus obovatis lœvibus cinereo-fuscis. ♀ in demissioribus Corbaniensibus propè Villesèque ex cl. Benth. (v. s. ex Pann.)
16. E. SALICIFOLIA (Host. syn. p. 267.) foliis lanceolatis sessilibus acutiusculis mucronulatis integerrimis pubescentibus, ramis florigeris sub verticillo in pseudo-umbellam multifidam congestis vel rariū verticillo 5-fido, glandulis lunatis vel lunato-bicornibus, ovarii in dorso convexo punctato-scabris glabris, seminibus obovatis lœvibus subopacis griseo-fuscis vel albidis. ♀ ad ripas Rhodani ex Lois, Gardinis (le Gardon), circâ Monspelium — E. salicifolia α. Fl. fr. 5. p. 363. Praecedenti nimis affinis. (v. s.)
17. E. TENUIFOLIA (Lam. dict. 2. p. 428.) foliis linearibus acutis glaberrimis lucidis sessilibus integerrimis, verticillo terminali 5-fido, bracteis reniformi-subcordatis, glandulis lunulatis breviter bicornibus, ovarii glabris lœvibus dorso convexis. ♀ in herbidis Galloprovinciæ. — Fl. fr. 3. p. 332. E. gracilis Lois. Semina non vidi. Affinem E. virgata Wald. et Kit. ait cl. Rœper. (v. s.)
18. E. CYPARISSIAS (L. sp. 661.) foliis linearibus sessilibus obtusis vel acutiusculis integerrimis glabris, ramis florigeris sub verticillo in pseudo-umbellam multifidam aggregatis vel rariū verticillo 5-fido, glandulis lunatis subbicornibus, ovarii in dorso convexo punctato-scabris glabris, seminibus obovatis lœvibus opacis griseo-fuscis vel albidis. ♀ in sterilibus frequens. — Fl. fr. 3. p. 337. Jacq. aust. 5. t. 435. E. Esula Fl. fr. 3. p. 337. non L. (v. v.)





- 19. E. GERARDIANA** (Jacq. aust. 5. t. 436.) foliis lanceolatis sessilibus acutis vel obtusiusculis mucronatis integerrimis glabris, ramis florigeris sub verticillo in pseudo-umbellam multifidam aggregatis vel rariū verticillo 5-fido, glandulis obtusè triangularibus, ovariis dorso convexis punctis elevatis minutissimis obsitis glabris, seminibus obovato-cylindraceis lăvibus opacis albidis. ♀ in sterilibus et glareosis. — Fl. fr. 3. p. 337. E. cajogala Ehrh. (v. v.)
β. minor, 2-3-pollicaris, foliis oblongis obovatisve. — in monte Ventoso. — E. saxatilis Lois. not. p. 77. DC. fl. fr. 5. p. 363. non Bieb. nec Jacq. (v. s.)
- 20. E. NICÆENSIS** (All. ped. 1. p. 285. t. 69. f. 1.) foliis lanceolatis vel ovato-lanceolatis sessilibus acutis vel obtusis mucronatis margine scabris glabris, ramis florigeris sub verticillo in pseudo-umbellam multifidam aggregatis vel rariū verticillo 5-fido, glandulis lunatis vel lunato-bicornibus, ovariis dorso convexis punctis elevatis minutissimis obsitis vel lăvibus glabris vel lanatis pilosisve, seminibus obovato-cylindraceis lăvibus vel rarissimè subexsculptis opacis griseis. ♀ in sterilibus Galliæ australis, propè Parisios ex Thuil. — Fl. fr. 3. p. 338. E. oleæfolia Gou. — Barr. ic. 823. (v. v.)
- 21. E. PITHYUSA** (L. sp. 656.) suffruticosa, foliis rigidis linearis-lanceolatis confertis acuminatis glaucis margine revolutis scabris inferioribus reflexis, superioribus latioribus, verticillo 4-8-fido, glandulis reniformibus, ovariis dorso convexo lăvibus glabris, seminibus ovatis lăvibus. ♀ ♂ in arenosis maritimis Galloprovinciæ, insulae S. Luciæ propè Narbonam ex cl. Benth. — Fl. fr. 3. p. 334. — Matth. comm. 867. ic. (v. v.)
- 22. E. PARALIAS** (L. sp. 657.) foliis crasso-coriaceis lanceolatis sessilibus acutis vel obtusiusculis integerrimis glabris, verticillo 5-4-3-fido, glandulis lunatis suberosis, ovariis in dorso convexo sulco longitudinali exaratis punctis elevatis minutissimis obsitis rugulosis glabris, seminibus obovato-globosis lăvibus vel exsculptis cinereis. ♀ in areposis maritimis. — Fl. fr. 3. p. 335. Jacq. vind. t. 188. — Moris. s. 10. t. 1. f. 8. n. 24. (v. v.)
- 23. E. MYRSINITES** (L. sp. 661.) foliis ovato-lanceolatis spathulatisve glaucis carnosis glaberrimis mucronatis margine scabris confertis, verticillo 5-fido, glandulis 2-cornibus, cornibus compressis dilatis, ovariis lăvibus glabris carinato-convexis, seminibus cylindraceo-ovatis obsoletè tetragonis tuberculato-rugosis opaceis griseis. ♀ in Corsicâ, circâ Nicæam ex All. — Fl. fr. 3. p. 338. — Lob. ic. t. 355. f. 1. (v. s.)
- 24. E. SERRATA** (L. sp. 658.) foliis linearis-lanceolatis lanceolatisve sessilibus acutis mucronatisve glabris superioribus latioribus bracteisque dentato-serratis, verticillo 3-5-fido, glandulis suborbiculatis vix lunulatis, ovariis dorso convexis lăviusculis glabris, seminibus obovato-rotundis lăvibus opacis carunculâ magnâ antheræformi instructis. ♀ secùs arva et vias in prov. australioribus. — Fl. fr. 3. p. 336. Jacq. ic. rar. 3. p. 384. — Moris. s. 10. t. 1. f. 3. n. 6. (v. v.)
- 25. E. BIUMBELLATA** (Poir. voy. barb. 2. p. 174. ic.) foliis linearis-lanceolatis mucronatis glabris apicem versùs scabris patulis, superioribus latioribus, bracteis cordato-reniformibus mucronatis, verticillo 5-9-fido, glandulis lunulatis bicornibus cornibus clavatis, ovariis in dorso convexo punctis elevatis scabriusculis glabris, seminibus ovoideis tuberculato-rugosis. ♀ in agro Russinensi ex Benth. Occitanâ, circâ Avenionem, Télonem. — Fl. fr. 5. p. 360. — Plerumque sub verticillo terminali secundus tertisque invenitur. (v. s.)
- 26. E. SEGETALIS** (L. sp. 657.) foliis rigidulis linearis-lanceolatis sessilibus seu in petiolum attenuatis mucronatis integerrimis glabris, verticillo 5-fido, glandulis lunatis longissimè bicornibus, ovariis in dorso convexo punctis elevatis scabris glabris, seminibus obovatis reticulato-exsculptis albidis. (I) inter segetes prov. australiorum occidentaliumpque et propè Parisios ex Mer. — Fl. fr. 3. p. 335. excl. var. Jacq. aust. t. 450. E. pinifolia Lam. ex cl. Röper. Fl. fr. 3. p. 336. — Moris. s. 10. t. 2. f. 10. n. 3. E. Artandiana Fl. fr. 5. p. 361. est E. segetalis canlocarpica. (v. v.)
β. longibracteata, foliis ramorum florigerorum linearis-lanceolatis. — Propè Monspelium. — Fl. fr. 5. p. 359. (v. s.)

- γ. maritima*, bracteis latis subcordatis mucronulatis. — In maritimis passim. — E. Portlandica Fl. fr. 5. p. 359 an L. sp. 656? (v. s.)
27. E. PROVINCIALIS (Wild. sp. 2. p. 914.) foliis lanceolatis spathulatis obtusis mucronulatis minutissimè serrulatis sessilibus glabris, bracteis cordato-reniformibus, verticillis 5-4-3-fidis, glandulis lunatis longissimè bicornibus, ovariis dorso carinato-convexis glaberrimis lèvibus, seminibus subovatis lèvibus opacis griseo-albis. (1) 2 in maritimis Corsicæ, Galloprovinciæ, et agri Ruscinonensis ex cl. Benth. — E. Terracina Fl. fr. 3. p. 333 an L? E. affinis Fl. fr. 5. p. 363. — Barr. ic. 83r. (v. v.)
- β. seticornis, foliis linear-lanceolatis acutis, bracteis cordatis ovatis longè acuminiatis. — In collibus propè Digne. — E. seticornis Poir. voy. 2. p. 178. Fl. fr. 5. p. 359. (v. v. DC.)
28. E. EXIGUA (L. sp. 654.) foliis rigidulis linearibus vel linear-cuneatis sessilibus acutiusculis submucronatis integerrimis glabris, verticillo 3-4-5-fido, glandulis longissimè bicornibus, ovariis in dorso convexo punctis elevatis scabris glabris, seminibus obovato-cylindraceis subtetragonis tuberculato-reticulatis opacis albidis vel cinereo-fuscis. (1) in arvis. — Fl. fr. 3. p. 332. — Lob. ic. t. 357. f. 2. (v. v.)
- β. retusa, foliis retusis. — E. retusa Cav. ic. 1. t. 34. f. 3. Fl. fr. 5. p. 358. E. rubra Fl. fr. 5. p. 359. non Cav. — Magn. bot. p. 259. ic. 258. (v. v.)
29. E. FALCATA (L. sp. 654.) foliis rigidis lanceolatis sessilibus acutis mucronatis margine denticulato-scabris glabris, verticillo 3-4-5-fido, glandulis lunatis vel lunato-bicornibus, ovariis dorso convexis lèvibus glabris, seminibus obovato-cylindraceis subtetragonis, lateribus transversè rugosis, opacis albidis ciuereis vel fuscis. (1) in cultis passim. — Fl. fr. 3. p. 331. Jacq. aust. t. 121. (v. v.)
- β. obscura, foliis bracteisque acuminatis. — In arvis Galloprovinciæ. — E. obscura Lois. not. 76. t. 5. f. 2. Fl. fr. 5. p. 358. (v. v.)
30. E. PERPLUS (L. sp. 653.) foliis suborbiculatis in petiolum attenuatis obtusissimis integerrimis glabris, verticillo 3-fido rarissimè 5-fido, glandulis lunatis longissimè bicornibus, ovariis in dorso bicarinato alato ruguloso-scabris glabris, seminibus obovato-cylindraceis obtusè hexagonis, lateribus quatuor punctorum serie exsculptis, duobus sulco longitudinali exaratis, opacis griseo-albidis. (1) in cultis, vineis, sepibus. — Fl. fr. 3. p. 331. E. peploides Gou. fl. 174. Fl. fr. 5. p. 358. E. rotundifolia Lois. not. t. 5. f. 1. (v. v.)
31. E. LATIFOLIA (L. sp. 655.) foliis linearibus sessilibus acutiusculis vel obtusis mucronatis integerrimis glabris, verticillo 4-fido rarius 2-fido rarissimè 5-fido, glandulis lunatis bicornibus cornubus dilatatis obtusis, ovariis dorso convexis sulco longitudinali profundo exaratis lèvibus glabris, seminibus obovatis basi truncatis scabris opacis fuscis. (2) in cultis et secùs vias, vix indigena. — Fl. fr. 3. p. 333. (v. v.)
- ** *Esulae spuriae. — Folia ramorum florigerorum connata;*
32. E. SYLVATICA (L. sp. 663.) foliis lato-lanceolatis in petiolum attenuatis acutis vel obtusis mucronulatis integerrimis pubescentibus, verticillo 5-fido vel ramis florigeris subverticillo in pseudo-umbellam sex-octofidam aggregatis; glandulis lunatis bicornibus, ovariis dorso convexis punctis minutissimis elevatis obsitis glabris, seminibus subrotundo-ovatis lèvibus opacis fuscis. 2 in sylvaticis, sepibus. — Fl. fr. 3. p. 339. Jacq. aust. t. 275. E. amygdaloïdes L. — Moris. s. 10. t. 1. f. 2. n. 3. (v. v.)
33. E. CHARACIAS (L. sp. 662.) foliis linear-lanceolatis in petiolum attenuatis acutis vel obtusiusculis mucronulatis integerrimis pubescentibus vel glabris, ramis florigeris sub verticillo in pseudo-umbellam multifidam aggregatis, glandulis lunulatis, ovariis dorso convexis punctis minutissimis elevatis obsitis, seminibus oblongo-ovatis lèvibus opacis nigricantibus. 3 in montosis lapidosis provincie Mediterranearum. — Fl. fr. 3. p. 340. — Jacq. ic. rar. 1. t. 89. (v. v.)

Science



V. MERCURIALIS *Tourn. inst. t. 308. L. gen. 1125.*

Dioica aut rariūs monoica. Perigonum 3-partitum. *Masc.* Stam. 9-12. *Fem.* Ovarium 2-gibbosum 2-sulcatum, filamentis 2 sterilibus brevibus ex quoque sulco prodeuntibus cinctum; styli 2 bifurcati, capsula 2-cocca 2-sperma.

1. *M. TOMENTOSA* (L. sp. 1465.) caule suffruticoso, foliis ovatis tomentosis, capsulis hirsutis. ♂ in Occitania, agro Ruscinonensi, Corbariensibus. — Fl. fr. 8. p. 329. — Clus. hist. 2. p. 48. f. 1. 2. (v. v.)
 2. *M. TERRICOLA* (L. sp. 1465.) caule simplicissimo, foliis ovato-lanceolatis lanceolatis scabris crenato-serratis pubescentibus, floribus longè pedunculatis, capsulis pubescentibus. ♀ in sylvis. — Fl. fr. 3. p. 328. Fl. dan. 400. Moris. s. 5. t. 84. f. 3 et 4. (v. v.)
 3. *M. ELLIPTICA* (Lam. dict. vol. 4. p. 119.) dioica, caule suffruticoso brachiatum, foliis lanceolatis serratis glaberrimis, floribus masculis verticillato-glomeratis longè pedunculatis, femineis verticillatis axillaribus breviter pedunculatis, capsulis glabris. ♂ in montosis Corsicæ. — Vent. cels. t. 12. (v. s.)
 4. *M. ANNUA* (L. sp. 1465.) caule brachiatum, foliis lanceolatis serratis glabris subpetiolatis, floribus masculis spicato-glomeratis pedunculatis, femineis verticillatis axillaribus, capsulis echinato-pubescentibus. (I) in cultis frequens. — Fl. fr. 3. p. 328. Lam. ill. t. 820. — Moris. s. 5. t. 34. f. 1 et 2. (v. v.)
♂. *ambigua*, floribus verticillatis femineis masculisque intermixtis. — In Corsicâ, Galloprovinciâ. — *M. ambigua* Lin. f. dec. 1. t. 8. Fl. fr. 5. p. 357. (v. s.)
-

Ordo XCI. URTICEÆ *Juss. gen. 400. excl. Pipere. DC. fl. fr. 3. p. 517.*

Flores parvuli virescentes monoici aut dioici, solitarii amentacei aut involucro monophyllo cincti. Perigonum monosepalum 3-5-lobum persistens. *Masc.* Stamina definita, basi perigonii inserta. *Fem.* Ovarium simplex liberum; styli 2 aut 1 bifurcatus. Fructus Achenium aut Drupa perigonio persistente tecta, solitaria aut inserta receptaculo carnoso dilatato. Semina pendula albuminosa aut exalbuminosa. Embryo rectus curvatus aut spiralis. Radicula sæpius supera. — Herbæ aut Arbores foliis sæpius hispidis et spathulatis. Fl. capitati aut racemosi.

Trib. I. URTICEÆ *DC. fl. fr. l. c.*

Flores solitarii, amentacei vel spicati, fructus nunquam carnosus. Albumen nullum. Embryo sæpius rectus.

I. CANNABIS *Tourn. inst. t. 308. L. gen. 1115.*

Dioica. *Masc.* Perigonum 5-partitum; stamina 5. *Fem.* Perigonum oblongum latere fissum; ovarium 1; styli 2; capsula crustacea 2-valvis, valvis subglobosis perigonio obtectis, embryo incurvus.

- I.** *C. sativa* (L. sp. 1457.) (I) ex Indiâ orta, circâ pagos culta. — Fl. fr. 3. p. 325. — Lob. ic. t. 526. f. 1-2. Folia petiolata digitata. (v. v. c.)

II. HELXINE *Req. in ann. sc. nat. 5. p. 384.*

Monoica. *Masc.* Flores solitarii perigonio campanulato 4-partito. *Fem.* Perigonium persistens ventricosum suprà 3-partitum; semen unicum. (Req.)

- I.** *H. SOLITARIA* (Req. l. c.) — in muris umbrosis Corsicæ. — Cespitosa, caulinibus radicantibus, folia obliqua subrotunda glabriuscula subsessilia. (v. s. s. fl.)

III. PARIETARIA *Tourn. inst. t. 289. L. gen. 1152.*

Fl. polygami, involucro multipartito cincti. *Herm.* Perigonium 4-partitum; stam. 4, filamentis primo incurvis elastice dehiscentibus; ovarium 1; stylus 1; stigma 1; semen perigonio elongato et suprà connivente tectum. *Fem.* Stamina 0; cætera hermaphroditis similia.


- I.** *P. LUSITANICA* (L. sp. 1492.) caule filiformi procumbente ramoso pubescente, foliis ovatis subrotundis obtusis pilosis petiolo longioribus, floribus axillaribus subsessilibus subternatim aggregatis. (I) in humidis montosis Corsicæ, ad muros propè Telonem et in agro Ruscinonensi circâ Banyuls ex Lapeyr. — Fl. fr. 5. p. 356. Viv. cors. app. f. 1. — Bocc. rar. t. 24. f. B. (v. s.)
2. *P. OSTRICATE* (L. sp. 1492.) caule ascendente ramoso, foliis longè petiolatis lanceolato-ovatis suprà sublucidis subtùs hirsutis nervosis. ♀ ad muros et sepes. — Fl. fr. 3. p. 324. Lam. ill. t. 853. f. 1. (v. v.)
3. *P. JUDAICA* (L. sp. 1492.) caule prostrato ramoso, foliis longè petiolatis ovatis pubescens, floribus maribus elongato-tubulosis. ♀ circâ Vapincum ex Vill., in provinciis australibus, in muris Chantenai propè Nannetes, circâ Aureliam, Arcueil propè Parisios ex Lois. — Fl. fr. 3. p. 824. Lam. ill. t. 853. f. 2. — Au prioris varietas aut potius deformatio? (v. v. DC.)

IV. URTICA *Tourn. inst. t. 308. L. gen. 1054.*

Monoica rarius dioica. *Masc.* racemosi; perigonium 4-partitum; stamina 4; filamenta antè florescentiam curvata. *Fem.* capitato-racemosi; perigonium 2-valve; ovarium 1; stigma 1; semen 1 perigonio cinctum.

- 1.** *U. FILULIFERA* (L. sp. 1395.) foliis oppositis ovatis dentatis dentibus obtusis, amentis fructiferis globosis pedunculatis. (I) in arvis Gallie australis, circâ Aginnum ex St.-Am., ad ostium Ligeris, propè Parisios ex Mérat, Falaise (cl. de Bréb.). — Fl. fr. 3. p. 322. Lam. ill. t. 761. f. 2. eng. bot. t. 148. — Moris. t. 25. f. 8. n. 5. (v. v.)
2. *U. MEMBRANACEA* (Poir. enc. 4. p. 638.) monoica, foliis oppositis ovatis acutis grossè dentatis longè petiolatis, spicis pedunculatis simplicibus, mascularum geminarum petiolo longiorum rachi ntrinque alatâ. ♀ in cultis Telonis, Arelatis, Perpiniani, Armoraciæ infer. — Fl. fr. 5. p. 355. (v. s.)
3. *U. HISPIDA* (DC. fl. fr. 5. p. 355.) dioica, caulinibus foliisque hispidis, foliis petiolatis grossè dentatis acuminatis ovato-orbicularibus, spicis axillaribus geminatis, masculis ramosis. ♀ in Corsicâ, agro Ruscinonensi propè Prades (Coder). (v. s.)
4. *U. minor* (L. sp. 1396.) dioica, foliis oppositis cordatis ovato-lanceolatis grossè serratis, spicis paniculatis glomeratis geminatis petiolo longioribus. ♀ ad sepes et in hortis. — Fl. fr. 3. p. 322. Lam. ill. t. 761. f. 1. fl. dan. t. 746. (v. v.)
5. *U. urens* (L. sp. 1396.) monoica, foliis oppositis ellipticis sub 5-nerviis argutè serratis subincisis, spicis glomeratis geminatis. (I) in cultis, ad pagos

Cathartes aura



areas frequens. — Fl. fr. 3. p. 323. Fl. dan. t. 739. — *Moris.* s. 11. t. 25. f. 6.
n. 4. (v. v.)

V. HUMULUS *L. gen.* 1116.

Dioica. *Masc.* Perigonium 5-partitum; stamina 5. *Fem.* Strobili constantes squamis magnis persistentibus concavis axillâ unifloris; ova-rium 1; styli 2; semen 1 arillatum; embryo spiraliter tortus.

1. *H. LUPULUS* (L. sp. 1457.) $\frac{1}{2}$ ad sepes, sæpè colitur. — Fl. fr. 3. p. 322. Lam. ill. t. 815. Caules scandentes, folia petiolata cordata serrata simplicia aut 3-loba. (v. v.)

Trib. II. *ARTOCARPEÆ DC.* fl. fr. 3. p. 318.

Flores receptaculo communi insiti. Fructus carnosus. Semina albuminosa. Embryo curvatus.

VI. MORUS *Lam. DC. fl. fr.* 3. p. 320. — *Mori* sp. *L.*

Monoica. Amenta unisexualia; perigonium 4-lobum, lobis concavis. *Masc.* Stamina 4 perigonii laciniis alterna. *Fem.* Ovarium liberum; stigmata 2; semina 1-2, perigonio pulposo obtecta.

1. *M. ALBA* (L. sp. 1398.) foliis profundè cordatis basi inæqualibus ovatis lobatisve serratis lævibus tenuioribus. $\frac{5}{5}$ ex Oriente orta, nunc subsppontanea, secùs rivos Galliæ australis. — Fl. fr. 3. p. 321. Gærtn. fruct. 2. t. 126. f. 6. Fructus albi aut rubelli. (v. v. c.)

2. *M. NIGRA* (L. sp. 1398.) foliis cordatis ovatis lobatisve inæqualiter dentatis scabris crassiusculis. $\frac{5}{5}$ ex Persiâ aut Chinâ orta, in hortis culta. — Fl. fr. 3. p. 320. — Duham. arb. fruct. 2. p. 161. t. 1. Fructus atropurpurei. (v. v. c.)

VII. *FLCUS* *Tourn. inst.* t. 410. *L. gen.* 1168.

Monoica. Flores numerosi pedicellati, receptaculo carnoso apice umbilicato intùs cavo inclusi; perigonium 3-5-lobum, lobis acuminatis. *Masc.* umbilico vicini; stamina 3-5. *Fem.* Ovarium liberum (Desf.), semi-adnatum (Gærtn.); stylus 1; stigmata 2; drupa sive utriculus 1-spermus, in receptaculi pulpâ nidulans; nuclei cortex fragilis, crustaceus.

1. *F. CARICA* (L. sp. 1513.) foliis cordatis palmatis suprà scabris subtùs pubescentibus. $\frac{5}{3}$ in siccis et lapidosis Galliæ australis. — Fl. fr. 3. p. 318. (v. v.)

Ordo XCII. JUGLANDEÆ DC. theor. ed. 1. p. 215. Kunth.
tereb. gen. p. 11.

Fl. monoici. *Masc.* amentacei. Perigonium squamosum lateraliter plus minus profundè 2-vel 6-lobum. Stamina hypogyna numero indefinita; filamenta brevissima libera; antheræ 2-loculares basi affixæ. *Fem.* Perigonium duplex aut simplex cum ovario adhærens, externum 4-divisum, internum quandò adest 4-sepalum. Ovarium 1-loculare, ovulo erecto. Styli nunc 1-2 brevissimi et stigmata 2 crassa, aut nulli et stigma magnum discoideum 4-lobum. Drupa carnosa nucem 2-4-valvum fovens. Semen cerebriforme plus minus 4-lobum, integumento membranaceo instructum. Embryo magnus exalbuminosus. Cotyledones carnosæ 2-lobæ. Radicula supera. — Arbores, folia alterna imparipinnata; stipulæ nullæ. Fl. masculi et feminei in eadem vel in distinctis gemmis; feminei terminales 1-3 vel plures laxè spicati; masculi remoti arctè spicati.


I. JUGLANS Nutt. gen. amer. 2. p. 220. — Juglandis sp. L.

Masc. Amentum imbricatum; perigonium simplex singulæ bracteæ internè adnatum 5-6-partitum, stamina numerosa (14-36); antheræ crassæ. *Fem.* Perigonium duplex; styli 2 brevissimi; stigmata 2 magna; drupa fæta nuce osseâ bivalvi extùs rugosâ et irregulariter profundè sulcatâ.

1. J. REGIA (L. sp. 1415.) foliolis subnovenis ovalibus glabris subserratis subæqualibus, fructibus globosis. *Ex Persia?* orta, nunc in totâ Galliâ frequens. — Fl. fr. 4. p. 618. — Blackw. t. 247. (v. v. c.)

Ordo XCIII. AMENTACEÆ Juss. gen. 407.

Flores dioici monoici aut rariùs hermaphroditi. *Masc.* capitati aut in amentum dispositi, squamâ aut perigonio squamifero instructi. Stamina squamæ inserta ferè nunquam monadelpha; antheræ biloculares. *Fem.* solitarii, fasciculati aut julacei, squamâ aut perigonio instructi. Ovarium liberum simplex aut rariùs multiplex; stigmata plurima. Pericarpia tot quot ovaria ossea aut membranacea. Albumen nullum aut tenuis. Embryo rectus aut curvatus planus. Radicula sæpiùs supera. — Arbores aut frutices, foliis alternis caducis, junioribus basi stipulis binis stipatis.





Trib. I. *CELTIDEÆ* Duby mss.

Fl. hermaphroditæ polygami vel monoici. Perigonum liberum campanulatum 5-6-partitum. Stam. 5-6 imo perigonio inserta ejusque lobis opposita libera. Ovarium unicum simplex. Stigmata 2 ex ovarii apice distincta. Drupa globosa. Putamen osseum 1-loculare. Semen unicum pendulum. Albumen membranaceo-carnosum tenuë; embryo curvatus; cotyledones foliaceæ contortuplicatæ tenuissimæ; radicula ad hylum versa. — Arbores, folia alterna petiolata simplicia. Flores axillares solitarii racemosi vel rariū paniculati.

I. *CELTIS* Tourn. inst. t. 383. L. gen. n. 1143.

Caracter isdem ac ordinis.

- I. *C. AUSTRALIS* (L. sp. 1478.) foliis ovato-lanceolatis subhirsutis. ♂ in Occitanâ, Galloprovinciâ, circâ Aginnum et Burdigalam. — Fl. fr. 3. p. 315. Lam. ill. t. 844. f. 1. — Duham. arb. ed. secunda. 2. p. 34. t. 8. (v. v.)

Trib. II. *BETULINEÆ* Rich. in Kunth nov. gen. am. 2. p. 21. DC. mss.

Flores hermaphroditæ polygami aut monoici, dispositione variâ. Perigonum liberum campanulatum 4-5-lobum. Stam. 4-12, sæpius tot quot perigonii lobi et tunc iis opposita aut eorum numero dupla triplave, perigonii basi inserta libera. Ovarium 1 simplex. Stigmata 2 ex ovarii apice distincta. Pericarpium indehiscens 2-loculare membranaceum aut subcoriaceum compressum, interdùm lateraliter in alam expansum. Semina in quoque loculo solitaria pendula exalbuminosa. Radicula ad hylum versa. Cotyledones planæ foliaceæ. — Arbores et frutices. Folia alterna petiolata simplicia penninervia.

Subtr. I. *ULMEÆ* Mirb. elem. 2. p. 905.

Flores in capitula parva aggregati laxiusculi pedicellati hermaphroditæ aut abortu polygami.

II. *ULMUS* Tourn. inst. t. 372. L. gen. 316.

Hermaphrodita. Perigonum campanulatum 4-5-dentatum coloratum persistens; stamena 3-6; ovarium compressum; stigmata 2; samara suborbiculata latè marginata membranacea 1-sperma.

- I. *U. CAMPESTRIS* (L. sp. 327.) foliis duplicato-serratis basi inæqualibus, floribus subsessilibus conglomeratis. ♂ ad vias, in sylvis montosis. — Fl. fr. 3. p. 315. Lam. ill. t. 185. (v. v.)

a. microphylla, ramis erectis, foliis scabris, samaris obovatis glabris. — *U. campestris* eng. bot. t. 1886. Host. fl. aust. 1. p. 330. (v. v.)

β. suberosa, cortice suberoso, ramis patulis, foliis scabris, inferioribus obovatis, superioribus oblongis, samaris suborbiculatis glabris. — *U. suberosa* Willd. eng. bot. t. 2161. Host. l. c. 328. (v. v.)

γ. major, ramis patulis, foliis oblongis scaberrimis basi cordatis, samaris

- subrotundis glabris. — *U. major* eng. bot. t. 254a. Host. 1. c. An hæ varietates revera nt sp. distincta habendæ? (v. v.)
2. *U. EFFUSA* (Wild. sp. 1. p. 1325.) foliis duplicato-serratis basi inæqualibus, floribus longè pedunculatis effusis. ♂ Lutetiae in horto Armamentarii, in agro Bellovacensi ex Graves, ad mænia Saessionum cultus, in agro Andegavensi ex Bast, in sylvis propè Argentoratum ex Nestler. — Fl. fr. 3. p. 316. *U. octandra* Schk. bot. handb. 178. t. 57. (v. s.)

Subtr. II. BETULEÆ DC. mss.

Fl. amentacei, squamis ad axillam flores 1-3 sessiles gerentibus, monoici in amentis distinctis.

III. BETULA Tourn. inst. 350. Hall. helv. p. 298. — Betulæ sp. L.

Monoica. Amenta elongato-cylindrica. *Masc.* Squamæ ternatæ, media staminifera. *Fem.* Squamæ 3-lobatae membranaceæ deciduæ; styli 2; ovarium compressum 2-loculare, loculo uno abortivo; nuculæ compressæ margine membranaceæ uniloculares.

1. *B. NANA* (L. lapp. t. 6. f. 4.) foliis orbiculatis crenatis glabris subtùs reticulato-venosis, strobilis ovatis subsessilibus, squamis cuneatis, nuculis ovatis subcompressis. ♂ in humidis Jurassi. — Fl. fr. 3. p. 302. — Fl. dan. t. 91. (v. v.)
2. *B. PUBESCENS* (Ehr. arb. n. 67.) foliis deltoidibus acutis subcordatis duplicato-serratis subtùs ramulisque pubescentibus, strobilorum squamis lobis lateralibus rotundatis. ♂ in turfosis Jurassi, circè Valletriam, Marly propè Parisios ex cl. Ram. et Mérat, Beauvais ex Graves. — Fl. fr. 3. p. 302. (v. s.)
3. *B. ALBA* (L. sp. 1393.) foliis deltoidibus acutis duplicato-serratis glabris; strobilorum cylindricorum pedunculatorum squamis lobis lateralibus rotundatis, petiolis glabris pedunculo longioribus. ♂ in sterilibus arenosis frigidioribus. — Fl. fr. 3. p. 301. — Duh. arb. 1. p. 100. t. 39. (v. v.)

IV. ALNUS Tourn. inst. t. 359. Hall. helv. p. 300. — Betulæ sp. L.


Monoica. *Masc.* Amenta elongato - cylindrica; squamæ pedicellatae cordiformes, subtùs squamulis ternis instructæ basi floriferæ. *Fem.* Amenta ovato-globosa pedicellis ramosis; squamæ 2-floræ coriaceæ persistentes; ovarium compressum; stigmata 2; nuculæ compressæ ovatae nudæ biloculares dispermæ.


* Stamina 12.

1. *A. SUAVEOLENS* (Req. in ann. sc. nat. 5. p. 381.) foliis subrotundis argutè duplicato - serratis obtusis valdè resinosis glabris margine crispis, strobilis ovatis minoribus, squamis cuneatis. ♂ in montibus Corsicæ. (v. s.)
2. *A. VIRIDIS* (DC. fl. fr. 3. p. 304.) foliis ovatis argutè duplicato-serratis glabris subtùs in nervis pubescentibus acutis, strobilis ovatis minoribus, squamis cuneatis, seminibus lanceolatis compressis. ♂ in montibus editioribus Delphinatūs. — *Betula ovata* Schrank. DC. syn. gall. p. 180. (v. s.)

** Stamina 4 ex urceolo 4-lobo.

3. *A. INCANA* (DC. fl. fr. 3. p. 304.) foliis ovatis acutis subtùs tomentoso-pubescentibus duplicato-serratis, stipulis lanceolatis, amentis masculis cylindricis elongatis, strobilis ovato-globosis. ♂ 5 in montosis. — *Betula incana* Reich. syst. 4. p. 127. (v. v.)
4. *A. GLUTINOSA* (Gærtn. fruct. 2. t. 90. f. 2.) foliis subrotundo - cuneatis obtusis subretusis glutinosis duplicato-serratis, axillis venarum subtùs villosis, amentis masculis cylindricis, strobilis subglobosis. ♂ 5 secùs rivos et in humidis. — Fl. fr. 3. p. 303. *Betula Alnus* L. (v. v.)





5. *A. CORDATA*, foliis subrotundis obtusissimis cordatis æqualiter serratis, axillis venarum subtūs villosis, strobilis grossis subglobosis valdè glutinosis, squamis densè imbricatis, nucibus lanceolato-ellipticis. 5 ♂ in Corsicā.—*Betula cordata* Lois. not. 139. (v. s.)
6. *A. ELLIPTICA* (Req. in ann. sc. nat. 5. p. 381.) foliis ellipticis obtusis lucidis glutinosis regulariter serratis, axillis venarum subtūs villosis, fructibus paucis majoribus. ♂ in Corsicā ad ripas Salenzaræ (Req.) An satis à priori distincta? (v. s. sine fr.)

Trib. III. *SALICINEÆ* Rich. l. c. DC. mss.—*Salicin. sect. I.*
Mirb. elem. 2. p. 905.

Flores dioici ad eujusque squamæ axillam solitarii, amentacei. *Masc.* in amentum cylindricum dispositi. Perigonium parvum glanduliforme. Stam. 2-30 glandulæ subadnatae sæpius libera rarissimè monadelpha. *Fem.* in strobilum ovatum seu cylindricum densè dispositi. Perigonium liberum simplex sæpè persistens aut minimum. Ovarium 1-loculare. Stylus simplex. Stigm. 2 sæpè bifida. Caps. 1-locularis 2-valvis, loculis ∞ -spermis. Semina minima pendula exalbuminosa crinita undique aut apice comosa. Embryo rectus. Radicula ad umbilicum tendens. Cotyledones planiusculæ foliaceæ.—Arbores aut frutices, foliis alternis simplicibus, stipulis nunc minimis subnullis nunc foliaceis. Gemmæ squamis foliaceis constantes.

V. *SALIX* Tourn. inst. t. 364. L. gen. 1098.

Flores dioici aut rarissimè monoici julacei, squamæ imbricatae; glandula genitalia cingens. *Masc.* Stamina 2-5 sæpius 2 interdum in unum coalita et tunc anthera 4-locularis. *Fem.* Semina comosa; radicula infera.

Sect. I. *CINERELLA* Ser. sal. rev. ined. (1)

Amenta præcoccia primo ovato-cylindrica, fem. demùm elongata; ovaria tomentosa; stylus brevis. *Masc.* diandria; stam. libera vel monadelpha.—Folia ovata obovata vel lanceolata plerumque tomentosa.

1. *S. CAPRÆA* (L. sp. 1448.) arborea aut subarborea, foliis ovatis rugosis subtūs tomentosis undatis supernè denticulatis acutis ant mucronatis petiolatis, amentis ovato-cylindricis, feminine sessilibus pilosis, ovarii tomentosis basi ventricosis longè conicis pedicellatis. ♂ 5 in sylvaticis et sepibus.—Fl. fr. 3. p. 290. L. fl. lapp. t. 8. f. 3. Hoffm. sal. t. 3. f. 1 et 2. t. 5. f. 4. t. 21. f. 1. a. b. c. d. *S. tomentosa* Ser. ess. 14. (v. v.)
2. *S. CINEREA* (L. sp. 1449.) subarborea, foliis ovato-oblongis acuminatis acutis subcrenatis aut subintegris reticulato-nervosis subtūs tomentosis petiolatis, stipulis rotundatis subserratis, amentis feminine sessilibus elongatis pilosis, ovarii tomentosis longè conicis pedicellatis. ♂ 5 in pratis et sepibus.—*S. acuminata* Mill. Fl. fr. 3. p. 290 et 5. p. 342. Hoffm. sal. t. 6. f. 1. 2. t. 22. f. 2. *S. rufinervis* Fl. fr. 5. p. 341. *S. aurigerana* et incerta Lapeyr. (v. v.)
3. *S. CINERASCENS* (Willd. sp. 4. p. 706.) arborea aut subarborea, ramulis subglabris, foliis oblongo-lanceolatis dentatis integris acutis petiolatis suprà viri-

(1) In sal. helv. collect. exsicc. 1824. cum notis è quibus plures hic laudatos et imprimis Smithii et Hoffmanni synonymos desumpsi.

- dibus glbris subtus subcanis, stipulis magnis dimidiato-cordatis serratis, stylo brevissimo, amentis feminineis subcoëtaneis sessilibus demùm elongatis pilosis, ovariis oblongo-conicis tomentosis pedicellatis. ♂ 5 secùs rivos et in turfosis Jurassi, Alpium, Pyrenæorum. — S. grandifolia Ser. ess. p. 20. Fl. fr. 3. p. 343. (v. v.)
4. S. AURITA (L. sp. 1446.) frutex, foliis obovatis rugosis subtus villosis reticulato-nervosis subobtusis aut breviter mucronatis petiolatis, stipulis dimidiato-cordatis, staminum filamentis basi coalitis, amentis feminineis sessilibus pilosis, ovariis conico-oblongis tomentosis pedicellatis. ♂ ad sepes, locis umbrosis. — Fl. fr. 3. p. 291 et 5. p. 342. eng. bot. 1487. — L. lapp. t. 8. f. 9. S. rugosa Ser. ess. p. 18. (v. v.)
5. S. REPENS (L. sp. 1447.) arbuscula, foliis ovatis aut ovato-oblongis acutis integerrimis petiolatis subtus sericeo-pubescentibus, amentis feminineis sessilibus ovato-cylindricis, ovariis confertis sessilibus sericeis. ♂ ♂ in humidis. — S. depressa Fl. fr. 5. p. 346. S. arenaria Fl. fr. 3. p. 293. non L. nec Willd.
- a. *argentea* (Ser.) foliis ovatis supernè pubescentibus mucronatis, amentis feminineis sessilibus. — S. argentea Sm. brit. 1059. eng. bot. t. 1354.
S. incubacea L. sp. 1447. Fl. fr. 3. p. 293. (v. v.)
- β. *elliptica* (Ser.) foliis ellipticis supernè glabris, amentis feminineis subpedunculatis. — S. repens eng. bot. t. 183. Vill. dauph. 4. t. 50. f. 10. S. depressa Hoffm. sal. t. 15 et 16. Fl. fr. 3. p. 294. (v. v.)
6. S. VERSIFOLIA (Wahl. lapp. t. 18. f. 2.) suffrutex, foliis ovatis lanceolatisve integris aut denticulato-serratis subrevolutis supernè subglabris aut adpressè pubescentibus subtus velutinis reticulatis discoloribus petiolatis acutis, stipulis lanceolatis ovatisve subacutis, amentis coëtaneis sessilibus, feminineis primum ovatis densis subvillosis demùm ovato-cylindricis, ovariis tomentosis ovato-oblongis demùm pedicellatis. ♂ in turfosis Jurassi, Alpium. — Fl. fr. 5. p. 345. S. spathulata Willd. sp. 4. p. 700. (v. s.)

Sect. II. DAPHNELLÆ Ser. sal. rev. ined.

Amenta præcoccia primum ovato-cylindrica, ovaria glabra raro tomentosa; stylus elongatus; *Masc.* diandri liberi. — Folia lanceolata vel obovata.


7. S. DAPHNOIDES (Vill. dauph. 4. t. 50. f. 7.) frutex, foliis elliptico-acuminatis serratis glabris subtus glaucis supernè viridibus nitidis junioribus subvillosis, amentis sessilibus crassis dense tomentosis, ovariis glabris. ♂ in Alpibus Delphinatûs. — Fl. fr. 3. p. 286. excl. syn. L. S. præcox Ser. ess. 55. (v. v. in Helv.)
8. S. PHYLLICIFOLIA (L. sp. 1442.) frutex, foliis ovatis lanceolatisve dentato-serratis acuminatis subtus pubescentibus, junioribus tomentosis, stipulis magnis dentatis, amentis subcoëtaneis ovatis demùm cylindricis, feminineis subpedunculatis, stylo elongato, capsulis longè conicis pedicellatis glabris aut tomentosis. ♂ secùs rivos et torrentes Alpium. — Ser. rev. ined. exsicc. n. 10. non Fl. fr. 3. p. 286.


- α. *stylosa*, capsulis laxis glabris aut vix tomentosis. — S. stylosa Fl. fr. 5. p. 339. S. stylaris Ser. ess. 65. S. amaniana Willd. sp. 4. p. 663. S. phyllicifolia Wahl. lapp. t. 17. f. 2. — L. lapp. t. 8. f. d. (v. v.)
- β. *nigricans*, capsulis subconfertis tomentosis. — S. nigricans Wahl. lapp. t. 17. f. 3. Fl. fr. 5. p. 345. Smith. eng. bot. t. 1223.


Sect. III. VIMINELLÆ Ser. sal. rev. ined.


Amenta cylindracea subcoëtanea; ovaria tomentosa raro glabra; stylus elongatus; *Masc.* diandri; stamina libera vel monadelpha. — Folia lanceolata vel linearia.

9. S. LANCEOLATA (Ser. ess. 37. t. 1.) arbuscula, ramis junioribus subpubescentibus, foliis lato-lanceolatis denticulatis acutis breviter petiolatis supernè









- subglabris subtus cano-velutinis reticulatis, stipulis ovatis acutis obtusisve, amentis subpræcocibus cylindricis subcurvis breviter pilosis, ovariis tomentosis elongato - conicis pedicellatis. 5 in udis circa Parisios. — Fl. fr. 5. p. 348. (v. s.)*
- 10. S. MOLLISSIMA** (Ehr. dec. 8. n. 79.) *arbuscula, foliis linearis lanceolatis subintegerrimis aut tenuissimè glanduloso - serratis superne glabris subtus adpressè tomentosis discoloribus acuminatis breviter petiolatis, amentis subpræcocibus oblongis, femineis subpedunculatis lanatis, pilis squamarum stigmatis longitudine, ovariis lanatis sessilibus confertis. ♂ secùs rivos in valle Rhenanâ. — Fl. fr. 5. p. 349. (v. s.)*
- 11. S. VIMINALIS** (L. sp. 1448.) *frutex, foliis lanceolato-linearibus longissimis integrerrimis acuminatis subtus argenteis, junioribus margine revolutis, amentis femineis sessilibus elongato - cylindricis, ovariis sessilibus sericeo-pubescentibus. ♂ in humidis. — Fl. fr. 3. p. 297. eng. bot. t. 1898. (v. v.)*
- 12. S. FISSA** (Hoffm. sal. 61. t. 13. f. 2. t. 14. f. 3. 4.) *arbuscula, foliis linearis lanceolatis denticulatis aut undulato - crenatis acuminatis breviter petiolatis superne glabratris subtus pubescentibus, stipulis linearis lanceolatis acuminatis petiolo subbrevioribus, amentis præcocibus cylindricis sessilibus, staminibus 2 basi subcoalitis, ovariis sessilibus sericeis confertis. ♂ in humidis. — Fl. fr. 5. p. 349. S. rubra eng. bot. t. 1145. S. virescens Vill. dauph. 3. t. 51. f. 3o. (v. v.)*
- 13. S. MONANDRA** (Ard. mem. 1. t. 11.) *subarborea, foliis lanceolato-linearibus apice glanduloso-serratis sessilibus acutis glabris, junioribus adpressè pubescentibus, staminibus in unum coalitis, amentis femineis cylindricis sessilibus, ovariis ovato-globosis confertis tomentosis. ♂ ad ripas et in humidis. — Fl. fr. 3. p. 297. Hoffm. sal. t. 1. f. 1. 2. et t. 5. f. 1. S. purpurea et S. Helix L. (v. v.)*
- 14. S. INCANA** (Schranck. fl. bav. 1. p. 230 non Mich.) *frutex, foliis linearibus aut linearis lanceolatis margine revolutis glanduloso - serrulatis sessilibus subtus tomentosis, staminum filamentis bifidis, amentis femineis cylindricis sessilibus, ovariis confertis sessilibus glabris. ♂ in montosis Galliae orientalis, australis et austro - occidentalis. — Fl. fr. 3. p. 284 et 5. p. 337. S. angustifolia Poir. in Duham. arb. 2. ed. 2. t. 29. non Willd. S. lavandulæ-folia Lapeyr. S. riparia Willd. (v. v.)*
- Sect. IV. ALBELLA Ser. I. c.**
- Amenta cylindrica elongata coetanea vel saepius serotina, ovaria glabra vel villosa, stylus brevis. Masc. 2-3-andri liberi. — Folia lanceolata vel linearia.*
- 15. S. TRIANDRA** (L. sp. 1442.) *arborea, foliis oblongo-lanceolatis glabris subintegris serrulatisve acuminatis acutisve petiolatis, stipulis parvulis obtusis ovato-cordatis serrulatis, staminibus ternis, amentis femineis elongatis sessilibus pubescentibus, ovariis glabris. ♂ in arenosis secus flumina. — Fl. fr. 3. p. 285 et 5. p. 337. eng. bot. t. 1435. S. amygdalina L. sp. 1443. Fl. fr. 3. p. 285. eng. bot. t. 1936. S. Villarsiana Willd. (v. v.)*
- 16. S. FRAGILIS** (L. sp. 1443.) *subarborea, foliis oblongo-lanceolatis serratis glabris acuminatis petiolatis, inferioribus minoribus obovatis, amentis femineis elongatis pubescentibus pedunculatis, ovariis laxis glabriusculis pedicellatis. ♂ 5 secus rivulos et flumina. — Fl. fr. 3. p. 288 et 5. p. 340. eng. bot. t. 1807. S. decipiens Hoffm. sal. 2. t. 31. eng. bot. t. 1397. S. pendula Ser. ess. 79. (v. v.)*
- 17. S. ALBA** (L. sp. 1449.) *arborea, foliis lanceolato-acuminatis serratis subpubescentibus subsessilibus serraturis infimis glandulosis, amentis femineis elongatis pedunculatis pubescentibus, ovariis laxis glabris sessilibus. 5 5 Ad vias, ripas et prata humida. Fl. fr. 3. p. 283. Hoffm. sal. t. 7. f. 1. t. 8. f. 2. t. 24. f. 3. S. vitellina L. Fl. fr. 3. p. 283. Hoffm. sal. t. 11. f. 1; t. 12. f. 2 et 3. Variat cortice virescente aut vitellino. (v. v.)*

- 18. S. BABYLONICA** (L. sp. 1443.) *arborea*, ramis elongatis flexilibus pendulis, foliis linear-lanceolatis oblongo-lanceolatis integris aut subserratis longe acuminatis glabris, amentis femineis subpedunculatis elongatis, ovariis confertis. δ ex Oriente orta, in humidis culta. — Fl. fr. 3. p. 286. S. propendens Ser. ess. (v. v. c.)

Sect. v. HERBELLIA Ser. l. c.

Amenta ovata coetanea; ovaria nuda vel villosa; stylus brevissimus; *Masc. 2-andri*, filamenta libera. — Folia elliptica vel subrotunda, caulis prostratus.

- 19. S. HERBACEA** (L. sp. 1445.) suffruticosa, canibus procumbentibus subterranieis, foliis orbiculatis serratis glabris petiolatis, amentis paucifloris. δ in pascuis editorum Alpium et Pyrenaeorum. — Fl. fr. 3. p. 288. Lin. lapp. t. 7. f. 3 et 4 et t. 8. f. 12. Hoffm. sal. t. 20. f. 1-4. (v. v.)

- 20. S. RETICULATA** (L. sp. 1446.) suffruticosa procumbens, foliis ovato-rotundis obtusissimis integerrimis petiolatis subtus albidis reticulato-nervosis glabris aut lanâ caducâ villosis, amentis femineis longe pedunculatis, ovariis ovato-globosis tomentosis sessilibus. δ in lapidosis editorum Alpium et Pyrenaeorum. — Fl. fr. 3. p. 289. Hoffm. sal. t. 25, 26 et 27. — Lin. lapp. t. 7. f. 1. 2. et t. 8. f. L.

Sect. vi. ARBUSCELLA Ser. l. c.

Amenta coetanea ovata obovata vel elliptica raro præcoccia; ovaria tomentosa vel glabra, stylus elongatus; *Masc. 2-rarò 5-8-andri*, filamenta libera. — Folia ovata vel elliptica.

- 21. S. BICOLOR** (Ehr. dec. 11. n. 118.) suffratex, foliis ellipticis integris supernè glabris atroviridibus, subtus pubescentibus glaucis, amentis præcocibus, masculis ellipticis sericeis, femineis gracilibus, ovariis tomentosis. — δ in montibus Arverniæ. — Fl. fr. 5. p. 344. (v. v. c.)

- 22. S. ARBUSCULA** (L. sp. 1445.) arbuscula, foliis ovatis glanduloso-serrulatis glabris lucidis acutis aut subobtusis breviter petiolatis, junioribus subtus pubescentibus, amentis ovato-cylindricis sessilibus, squamis lanato-villosis, ovariis tomentosis subsessilibus ovato-oblongis. δ in vallibus editoribus Alpium. — Fl. fr. 3. p. 295. et 5. p. 347. L. lapp. t. 8. f. E. S. fætida Schleich. Fl. fr. 3. p. 296. et 5. p. 347. S. vaccinifolia eng. bot. t. 234. S. vennlosa eng. bot. t. 1362. S. prunifolia Ser. ess. 49. (v. v.)

- 23. S. CÆSIA** (Vill. dauph. 3. t. 50. f. 11.) arbuscula, foliis ovali-lanceolatis lanceolatis acutis integerrimis glabris subsessilibus, amentis cylindricis brevibus sessilibus, squamis glabriusculis, ovariis confertis sessilibus lanato-sericeis. δ secus rivulos in editoribus Alpibus Galloprovinciæ. — Fl. fr. 3. p. 294. S. prostrata Ehr. pl. select. 159. Ser. ess. 24. (v. s.)

- 24. S. MYRSINITES** (L. sp. 1445.) arbuscula, foliis ovatis aut lanceolato-ovatis acutis subobtusis glabris serratis reticulato-venosis sessilibus, amentis ovatis, femineis demùm cylindricis subpedunculatis, ovariis hirsutis oblongo-ovatis sessilibus. δ in Alpibus editoribus Delphinatus. — Fl. fr. 3. p. 296. Linn. lapp. t. 7. f. 6. eng. bot. t. 1360. S. arbutifolia Willd. Ser. ess. 44. (v. v. in Helv.)

- 25. S. PYRENAICA** (Gou. ill. 77.) suffruticosa repens, foliis obovatis subobtusis ant breviter mucronulatis integerrimis subsessilibus ciliatis supernè adpresso pubescentibus subtus pilosis, junioribus sericeis, amentis femineis subpedunculatis elongatis, ovariis sessilibus tomentosis ovatis. δ in Pyrenæis ad nives perpetuas. — Fl. fr. 3. p. 292. S. ciliata Fl. fr. 3. p. 292 excl. syn. — Clus. hist. 1. p. 85. ic. (v. v.)

- 26. S. ARENARIA** (L. sp. 1447 non fl. fr. 293.) arbuscula, foliis oblongo-lanceolatis petiolatis obtusis aut subacutis integerrimis supernè primo pubescentibus demùm glabris atro-viridibus subtus tomento albo lanatis, amentis femineis primùm ovatis demùm cylindricis subpedunculatis, ovariis tomen-

tosis sessilibus ovato-oblongis. ♂ in summo jugo Cantal reperiūt cl. DC., in Alpibus Delphinatūs? — Eng. bot. t. 10. t. 1809. S. Helvetica Vill. Fl. fr. 3. p. 291 et 5. p. 343. S. limosa Wahl. lapp. t. 16. f. 4. — Hall. helv. t. 14. f. 2. (v. v. DC.)

27. *S. GLAUCÀ* (L. sp. 1446.) arbuscula basi procumbens, foliis oblongo-lanceolatis acutis integerrimis petiolatis utrinque sericeo-villosis, amentis femineis demum cylindrico-elongatis lanatis pedunculatis, ovariis sessilibus sericeo-lanatis. ♂ in montosis subhumidis Montis Aurei, Alpinum Delphinatūs. — Linn. lapp. t. 7. f. 5. S. sericea Vill. dauph. t. 51. f. 27. Fl. fr. 3. p. 292 et 5. p. 344. S. Lapponum Linn. lapp. t. 8. f. t. (v. s.)

28. *S. RETUSA* (L. sp. 1445.) suffruticosa procumbens, foliis obovatis obtusissimis glabris integris aut subserratis sessilibus, amentis paucifloris, femineis sessilibus glabris, ovariis laxis glabris. ♂ in Jurasso, Alpibus, montibus Arverniæ, Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 289. Schk. handb. t. 317. a. (v. v.)

♂. *serpillifolia* (Wahlemb.) foliis ellipticis integerrimis interdùm subacutis.
— *S. serpillifolia* Scop. carn. t. 61. (v. v.)

29. *S. HASTATA* (L. sp. 1443.) frutex, foliis ovatis lanceolatisve subpubescentibus serratis acutis aut subacuminatis, amentis sericeo-villosum ovatis demum elongato-cylindricis et glabriusculis, femineis subpedunculatis, ovariis glabris longè conicis breviter pedicellatis. ♂ ♂ secùs torrentes Alpium, Pyren. (cl. L. Dufour). — Fl. fr. 5. p. 338. Wahl. lapp. t. 16. f. 5. S. malifolia eng. bot. t. 1617. (v. v.)

30? *S. PENTANDRA* (L. sp. 1442) arborea, foliis elliptico-lanceolatis tenuiter serrato-crenulatis glabris subviscosis supernè lucidis acutis acuminatisve, staminibus 5-7, amentis femineis cylindricis subpedunculatis, ovariis laxis glabris subsessilibus. ♂ in Jurasso, Alpibus, montibus Arverniæ, Ligeris (Lozère), Pyrenæis. — L. lapp. t. 8. f. z. Fl. fr. 3. p. 287. — Gm. sib. 1. t. 34. f. 1. (v. v.)

VI. POPULUS Tourn. inst. t. 365. L. gen. 1123.

Dioica. Amenta cylindrica, squamis apice laceris. *Masc.* Stamina 8-30, squamularum basi ex urceolo oblique truncato prodeuntia. *Fem.* Ovarium 1; stigmata 4; capsula 2-valvis marginibus introflexis sub-2-locularis polysperma; semina comosa; radicula supera.

Sect. I. LEUCE.

Turiones tomentosi vel hirti non glutinosi, stam. 8.

1. *P. ALBA* (L. sp. 1463.) foliis cordato-subrotundis lobatis dentatis subtus tomentoso-niveis supra glabris, amentis ovato-oblongis. ♂ ubiqüe, præcipue in humidis. — Fl. fr. 3. p. 298. — Lob. ic. 2. p. 193. f. 1. (v. v.)

2. *P. CANESCENS* (Smith. brit. 3. p. 1080.) foliis subrotundis angulato-dentatis subtus subtomentosis supra glabris, amentis cylindraceis longis. ♂ in nemorosis humidis. — Fl. fr. 3. p. 299. — Lob. ic. 2. p. 192. f. 2. (v. v.)

3. *P. TREMULA* (L. sp. 1464.) foliis suborbiculatis dentatis utrinque glabris, petiolis compressis, amentis oblongis. ♂ ♂ in frigidioribus subhumidis. — Fl. fr. 3. p. 299. (v. v.)

Sect. II. AIGEIROS.

Turiones laves et glabri glutinosi, stamina 12-30.

4. *P. NIGRA* (L. sp. 1464.) foliis deltoidibus acuminatis serratis utrinque glabris, ramis patulis, ♂ in aquosis et cultis. — Fl. fr. 3. p. 299. — Blackw. t. 248. (v. v.)

5. *P. VIRGINIANA* (Desf. cat. 242.) foliis deltoidibus latis acuminatis grossè crenatis longè petiolatis utrinque glabris, ramis patulis. ♂ ex Americâ boreali orta, nunc in provinciis plurimis et præsertim in Neustrâ et circâ Parisios subs spontanea. (v. v. c.)

6. P. FASTIGIATA (Poir. dict. 5. p. 235.) foliis subdeltoidibus inæqualiter serratis utrinque glabris, ramis erectis strictis. Ex Oriente? orta, in ambulacris subhumidis culta. — Fl. fr. 3. p. 300. (v. v.)

Trib. IV. QUERCINEÆ Juss. dict. sc. nat. 2. supr. DC. mss. — Corylaceæ Mirb. elem. p. 906.

Fl. monoici. *Masc.* in amentum cylindricum dispositi. Perigonum parvum aut squamiforme. Stamina 5-20 perigonii basi adnata, filamentis liberis rariūs basi coadunatis. *Fem.* Involucrum varium 1-∞-florum. Perigonum ovario adhærens pluridentatum. Ovarium unicum ∞-loculare ∞-ovulatum. Stylus 2-3-∞-fidus, stigmatibus distinctis. Involucrum (Calybio Mirb.) post anthesin excrescens pericarpia 1-∞ obtegens aut fœvens. Glandes aut nuces abortu 1-loculares 1-spermæ. Semen pendulum exalbuminosum. Embryo rectus. Radicula ad umbilicum tendens. Cotyledones crassæ aut foliaceæ. — Arbores aut rariūs frutices. Folia alterna simplicia. Stipulæ deciduæ gemmam constituentes.

Sect. I. INVOLUCRUM HISPIDUM CLAUSUM, DEMUM DEHISCENS.

VII. FAGUS Tourn. inst. 351. Lam. dict. 3. p. 125. — Fagi sp. L.

Monoica. *Masc.* Amenta pendula globosa densa; perigonum 6-lobatum; stamina 8. *Fem.* bini in involucro 4-lobo extus spinis mollioribus muricato; perigonum ovario adnatum tomentosum 6-lobum; stigmata 3; ovarium 3-gonum 3-loculare, nux triangularis abortu 1-locularis 1-2-sperma.

I. F. SYLVATICA (L. sp. 14:6) foliis ovatis glabris obsoletè dentatis margine ciliatis. Ex sylvas constituit præcipue in calcariorum montium declivibus. — Fl. fr. 3. p. 305. — Gærtn. fruct. 1. t. 37. f. 2. (v. v.)

VIII. CASTANEA Tourn. inst. t. 352. Lam. dict. 1. p. 708. — Fagi sp. L.


Polygama. *Masc.* Amenta longissima cylindrica floribus hinc indè glomeratis; perigonum 6-partitum; stamina 5-20. *Herm.* Involucrum subtriflorum 4-lobum, extus spinis durioribus et ramosis muricatum; perigonum ovario adnatum 5-6-lobum tomento rigido intus obtectum; stamina 12 rubra abortiva, ovarium 6-loculare loculis dispermis, 5 abortivis; styli 6; nux 1-locularis subrotunda; semina 1-3 rugosa.

I. C. VULGARIS (Lam. dict. 1. p. 708.) foliis oblongo-lanceolatis acuminatis mucronato-serratis utrinquè glabris. Ex in montosis et glareosis. — Fl. fr. 3. p. 306. — Duham. ed. sec. 3. p. 65. t. 19. (v. v.)

Sect. II. INVOLUCRUM PATENS.

IX. QUERCUS Tourn. inst. 394. L. gen. 1070.

Monoica. *Masc.* Amentum laxum et pendulum, perigonum lacerum; stamina 5-10. *Fem.* Involucrum squamosum squamis plurimis imbricatis, in cupulam hemisphæricam et coriaceam coadunatis constans; perigonum ovario adnatum 6-lobatum; ovarium 3-loculare, loculis 2 abortivis; stigmata 3; nux (glans) 1-locularis 1-sperma cupulâ basi cincta.



* *Foliis deciduis.*

1. Q. CERRIS (L. sp. 1415.) foliis oblongis pinnatifidis glabris aut subtus hirtis basi angustatis, lobis oblongo-lanceolatis dentatis, cupula hemisphaericâ squamis longis acutis patulis echinatâ. ♂ circa Bellovacum ex cl. Graves, Cœnomanum, Andegavum, Nannetes. — Fl. fr. 5. p. 354 et 3. p. 311. excl. var. ε. et γ. (v. v. DC.)
2. Q. TOZA (Bosc. journ. hist. nat. 2. p. 155. t. 32. f. 3.) foliis petiolatis subtus tomentosis oblongis sinuato-lobatis pinnatifidive, lobis obtusis, fructibus pedunculatis, cupula hemisphaericæ squamis oblongis subacutis basi adpressis apice subdivergentibus. ♂ et ♀ in provinciis occidentalibus vulgaris. — Fl. fr. 5. p. 352. Q. Cerris γ. Fl. fr. 3. p. 311. Q. humilis Fl. fr. 3. p. 312. non L. Foliorum formâ, pedunculi longitudine et habitu mire variat. (v. v.)
3. Q. PUBESCENS (Willd. sp. 4. p. 450.) foliis petiolatis oblongo-obovatis sinuatis subtus pubescentibus lobis obtusis angustatis basi subcordatis inæqualibus, fructibus subsessilibus, cupula hemisphaericâ glande vix duplò breviore, squamis ovatis adpressis obtusis. ♂ in collibus siccis. — Fl. fr. 5. p. 352. (v. v.)
4. Q. APENNINA (Lam. dict. 1. p. 725.) foliis subpetiolatis obovatis sinuato-lobatis lobis obtusis subtus petiolisque pubescentibus, fructibus pedunculatis spiratis, cupula hemisphaericâ glande vix duplò breviori, squamis lanceolatis subobtusis. ♂ in collibus Alsatiæ ex cl. Nestler, Lugduni et provinc. australium ex cl. Bosc. — Fl. fr. 5. p. 352. (v. s.)
5. Q. RACEMOSA (Lam. dict. 1. p. 725.) foliis subsessilibus glabris oblongis apice dilatatis sinuato-lobatis, lobis rotundatis, fructibus oblongis longè pedicellatis, cupula hypocraeriformi glande triplò breviori, squamis ovatis subobtusis. ♂ in sylvis vulgaris. — Fl. fr. 3. p. 309. — Duham. arb. 2. t. 47. Q. microcarpa Lapeyr. (v. v.)
6. Q. FASTIGIATA (Lam. dict. 1. p. 725.) foliis subsessilibus glabris oblongis sinuato-lobatis, lobis obtusis, ramis erectis, fructibus 3-5 in extremitate longi pedunculi, cupula hemisphaericâ glande quadruplò quintuplò breviore, squamis ovatis obtusis. ♂ in Pyrenæis occidentalibus et agro Syrtico culta? — Fl. fr. 5. p. 351. Vix à priore distincta? (v. v.)
7. Q. SESSILIFLORA (Sm. brit. 3. p. 1026.) foliis petiolatis glabris oblongis sinuato-lobatis, lobis rotundatis, fructibus oblongis subsessilibus, cupula hypocraeriformi fructu triplò quadruplò minori, squamis lanceolatis obtusis. ♂ in sylvis. — Fl. fr. 3. p. 310. excl. var. ε. et ζ. (v. v.)

** *Foliis persistentibus.*

8. Q. ILEX (L. sp. 1412.) cortice integro, foliis oblongis indivisis serratisque acuminatis subtus incanis, cupulis pedunculatis glande ovato-oblongo triplò quadruplò brevioribus. ♂ in Galliâ australiori frequens, in Galliâ occiali usquè ad Nannetes rario. — Fl. fr. 3. p. 313. — Duham. arb. 1. t. 123. — Pluck. t. 197. f. 1. (v. v.)
9. Q. SUBER (L. sp. 1413.) cortice rimoso fungoso, foliis ovato-oblongis indivisis serratisve subtus tomentosis obtusis aut mucronatis. ♂ in Galliâ australiori et austro-occidentali. — Fl. fr. 3. p. 313. — Duh. arb. 2. p. 291. t. 80 et 81. (v. v.)
10. Q. COCCIFERA (L. sp. 1413.) foliis oblongis indivisis spinoso-dentatis basi cordatis utrinque glabris, cupula subsessili, squamis linearis-lanceolatis acutis patulis. ♂ in Galliâ australiori et Nigri-Monasterii insulâ. — Fl. fr. 3. p. 313. — Carid. aix. t. 53. (v. v.)

X. CORYLUS Tourn. inst. 347. L. gen. 1074.

Monoica. *Masc.* Amenta cylindrica, squamæ 3-lobatæ deltoideæ lacinia mediâ latiore laterales tegente, stamina 8, antheræ 1-loculares.

Fem. Flores plurimi in gemmâ squamosâ inclusi; stigmata 2; ovarium 1 primo denudatum, dein involucro calyciformi monophyllo margine lacero cinctum; nux ovata laevis basi involucrata 1-sperma.

1. *C. AVELLANA* (L. sp. 1417.) stipulis oblongis obtusis, involucris campanulatis apice patulis lacero-dentatis, foliis ovato-cordatis acuminatis. ♂ in sepiibus. — Fl. fr. 3. p. 308. Lam. ill. t. 780. — Lob. ic. 2. t. 192. (v. v.)

XI. CARPINUS *Mich.* 104. *DC.* fl. fr. 3. p. 304. — *Carpini sp. L.*

Monoica. *Masc.* Amenta elongato-cylindrica; squamæ basi ciliatae; stamina 8-14 apice subbarbata. *Fem.* Strobili laxi; involucrum squamiforme 3-lobum biflorum; ovarium apice denticulatum 2-loculare, loculo uno antè maturitatem abortivo, stigmata 2; nux ossea.

1. *C. BETULES* (L. sp. 1416.) strobilorum squamis 3-partitis, laciñiis integris lanceolatis, intermedia elongatâ. ♂ 5 in sylvis. — Fl. fr. 1. c. *Gærtn. fruct.* 2. t. 89. f. 2. (v. v.)

Trib. V. PLATANEÆ *Juss. dict. sc. nat. DC. mss.*

Fl. monoici in amenta globosa aut oblonga sexu distincta densè aggregati. Involucrum commune o aut 4-phylum ad basin amenti. *Masc.* Squamulæ lineares parvæ innumeræ cum staminibus intermixtae et squamarum aut perigoniorum vices gerentes. *Fem.* Squamæ floribus intermixtae aut nullæ? Perigonium ovario adhærens? nunc cupuliforme nunc in setas piliformes minimas desinens, nunc vicinis adglutinatum nunc ab iis liberum. Carpella 1-2 unilocularia cum perigonio coalita oblonga aut subturbinata apice cornuta indehiscentia aut dehiscentia subcoriacea. Semen in quoque carpello solitarium pendulum exalbuminosum. Embryo rectus. Radicula supera. Cotyledones planæ foliaceæ. — Arbores, folia alterna petiolata palminervia palmatiloba; stipulæ nullæ aut foliaceæ. Gemmæ intrà petioli basin latentes.


XII. PLATANUS *Tourn. inst. t. 363. L. gen. 1075.*

Amenta basi nuda. *Fem.* Squamæ spatulatae; ovaria filiformia apice incrassata stigmate adunco terminata; carpella solitaria clavata basi papposa.

1. *P. ORIENTALIS* (L. sp. 1417.) foliis 5-lobo-palmatis laciñiis lanceolatis sinuatis, stipulis subintegerrimis. ♂ ex Oriente orta, in ambulacris culta. — Fl. fr. 3. p. 314. Lam. ill. t. 783. (v. v. c.)
2. *P. OCCIDENTALIS* (L. sp. 1418.) foliis 5-angularibus obsoletè lobatis dentatis basi cuneatis subtùs pubescentibus. ♂ ex Americâ septentrionali orta, in ambulacris culta. — Catesb. carol. 1. t. 56. (v. v. c.)

Trib. VI. MYRICEÆ *DC. mss.*

Flores rariùs hermaphroditi sæpiùs diclini monoici dioicive amentacei, amentis unisexualibus. Squamæ ovatae acutæ ad axil-lam 1-floræ. *Masc.* Squamulæ aut perigonii partes 2 oppositæ. Stam. 4, uno interdùm incompleto, libera. Antheræ 2-loculares longitudinaliter dehiscentes. *Fem.* Squama post anthesin excres-



cens. *Squamulæ seu perigonii partes 3-6 minutissimæ. Ovarium simplex liberum. Stigmata 2 filiformia. Drupa sessilis globosa extus granulis ceraceis plus minus obtecta, matura subexsiccata stylo persistente superata aut apice submutica. Putamen osseum evalve. Albumen nullum aut amygdalino-carnosum. Embryo rectus inversus. Radicula supera. Cotyledones carnosæ plano-convexæ. — Frutices in partibus plurimis punctis resinosis instructi aromatici. Folia alterna, simplicia.*

XIII. MYRICA L. gen. 1107.

Dioica. Amenta ovata squamis lunulatis. Masc. Stam. 4-6; antheræ 4-valves. Fem. Ovarium 1; stigmata 2; drupa 1-locularis 1-sperma, semen exalbuminosum.

1. *M. GALE* (L. sp. 1453.) caule fruticoso, foliis lanceolatis subserratis. ♂ in ericetis uliginosis Galliae occidentalis et boreali-occidentalis. — Fl. fr. 3. p. 301. Fl. dan. t. 327. (v. v.)

Ordo XCIV. CONIFERÆ Juss. gen. p. 411. Rich. conif. 89.

Fl. diclini monoici aut dioici in amentum formâ varium sæpius dispositi. *Masc. squamæ plurimæ varie dispositæ antheras nunc gerentes nunc foventes. Perigonium nullum. Antheræ numero variæ 1-∞-loculares, nunc squamis bracteiformibus insertæ, nunc pedicello proprio donatæ. Fem. Squamæ bracteiformes varie dispositæ interdùm post anthesin accretæ succulentæ aut fructu adnatæ. Cupula interdùm duplex, rariū simplex 1-flora ovarium cingens (an Perigonium?). Ovarium unicum. Stylus in Ephedrâ longus exsertus stigmate obliquo terminatus; in cæteris sessilis simplex parvus. Pericarpium proprium (bracteis cupulisque quibuscum sæpè adhæret aut quibus occultatur exclusis) indehiscens, 1-loculare coriaceum osseumve. Semen 1 pendulum albuminosum. Embryo axilis rectus. Radicula ad umbilicum tendens sæpè apice attenuata et cum albumine adnata. Cotyledones 2 oppositæ aut plurimæ verticillatae. — Arbores aut frutices resinosæ. Folia alterna aut verticillata aut rariū opposita sæpius acerosa sempervirentia, ramulis abortivis sæpè fasciculata.*

Trib. I. *TAXINEÆ* Rich. ann. mus. 16. p. 296. conif. 124.

Gemmæ florales uni-aut rariū bifloræ, squamis plurimis cruciatim oppositis et imbricatis constantes. Fl. feminei squamis minimè innati.

I. TAXUS *Tourn. inst. 362. L. gen. 1135.*

Flores dioici vel monoici, squamis pluribus cincti. *Masc.* Stamina 8-10, filamentis monadelphis, antheris peltatis 6-8-loocularibus, loculis subtus dehiscentibus. *Fem.* Stylus nullus; stigma concavum; drupa carnosa apice hians; nucleus 1-spermus.

1. *T. BACCATA* (L. sp. 1472.) foliis approximatis linearibus acutis, floribus axillaribus sessilibus. ♂ in subalpinis et Jurasso frequens, Neustriæ indigena ex cl. Le Prévost. — Fl. fr. 3. p. 280. Rich. conif. t. 2. f. 1. — Cam. epit. 8407 ic. (v. v. c.)

II. EPHEDRA *Tourn. inst. t. 477. L. gen. 1136.*

Flores dioici in amentum breve dispositi. *Masc.* Perigonum 2-lobum; stamna 6-8, filamentis monadelphis, antheris 1-loocularibus, extus dehiscentibus. *Fem.* Squamæ 4-5 persistentes concavæ truncatæ imbricatae post inflorescentiam carnosæ; ovaria 2, monostyla; bacca ovata 2-sperma, seminibus hinc planis indè convexis.

1. *E. DISTACHYIA* (L. sp. 1472.) pedunculis oppositis, amentis geminis. ♂ in sabulosis maritimis Galliæ australis à Nicæâ ad Nannetes usque. — Fl. fr. 3. p. 281. *E. vulgaris* Rich. conif. t. 4. f. 1. — Barr. ic. 731. (v. v.)

Trib. II. *CUPRESSINEÆ Rich. l. c. conif. 137.*

Amenta feminea squamis paucis constantia, squamis demum inter se agglutinatis in galbulos subglobosos mutata. Flores erexit stigmate nempè sursum directo.

Sect. I. SQUAMÆ DEMUM CARNOSÆ BACCAM SPURIAM CONSTITUENTES.

III. JUNIPERUS *L. gen. 1134.*

Dioica rariùs monoica. *Masc.* Amenta ovata, squamis verticillatis peltato-pedicellatis; antheræ 4-8, uniloculares. *Fem.* Amenta globosa squamis 3 concavis coadunatis; stigma hians; bacca conflata ex tribus cariopsidibus osseis 1-spermis cinctis squamis coalitis et carnosis.

1. *J. PHÆNICEA* (L. sp. 1471.) foliis ternis densissimè imbricatis obtusis ovatis convexis. ♂ in Galliâ australi. — Fl. fr. 3. p. 279. — Duham. arb. t. 52. — Lob. ic. 2. p. 221. (v. v.)
2. *J. SABINA* (L. sp. 1472.) foliis ovatis convexis densissimè imbricatis erectis decurrentibus oppositis, oppositionibus pyxidatis. ♂ in Alpium vallibus calidis. — Fl. fr. 3. p. 279. Bull. herb. t. 139. (v. v. c.)
3. *J. OXYCEDRUS* (L. sp. 1470.) foliis ternis patentibus mucronatis baccâ brevioribus. ♂ in Galliâ australi. — Fl. fr. 3. p. 278. Rich. conif. t. 6. f. 1. — Lob. ic. 2. p. 223. f. 2. (v. v.)
4. *J. COMMUNIS* (L. sp. 1470.) foliis ternis patentibus mucronatis baccâ longioribus. ♂ in collibus aridis et siccis. — Fl. fr. 3. p. 278. Rich. conif. t. 5. — Duh. arb. t. t. 127. — J. Bauh. hist. 1. p. 301. ic. p. 302. (v. v.)

Sect. II. SQUAMÆ SICCÆ GALBULUM DEHISCENTEM CONSTITUENTES.

IV. CUPRESSUS *Tourn. inst. t. 358. L. gen. 1079. DC. fl. fr. 5. p. 335.*

Monoica. *Masc.* Amentum imbricatum; antheræ 4 sessiles. *Fem.* Amentum strobilaceum, squamis lignosis pedicellatis; galbulus angulatus.



1. **C. FASTIGIATA** (DC. cat. monsp. 22.) ramis strictis apice quadrangulis, foliis quadrifariam imbricatis obtusis, strobili squamis muticis. δ in prov. australibus culta. — Fl. fr. 5. p. 336. C. sempervirens & L. sp. 1422 Duham. arb. ed. 2 vol. 3. t. 1. (v. v. c.)
2. **C. HORIZONTALIS** (Mill. dict. n. 2.) ramis patulis apice quadrangulis, foliis quadrifariam imbricatis obtusis, strobili squamis muticis. δ in prov. australibus culta. — Fl. fr. 5. p. 336. — Black. herb. t. 127. (v. v. c.)

Trib. III. *ABIETINEÆ* Rich. l. c. conif. 145.

Amenta feminea squamis plurimis constantia, squamis imbricatis demum distinctis in strobilos conosve conicos dispositis. Fl. inversi bracteis nempe per totam ferè longitudinem adnatis, stigmate deorsum directo.

V. *PINUS* Tourn. inst. 355. Juss. gen. 414. — Pini sp. L.

Monoica. *Masc.* Amenta racemosa compacta et terminalia, squamosa squamis apice staminiferis; stamina 2; antheræ 1-loculares. *Fem.* Amenta simplicia imbricata squamis acuminatis; ovaria 2; stigmata glandulosa; coni squamæ oblongæ clavatae ligneæ, apice umbilicato anguloso; cariopsides geminæ 1-spermæ membranâ apiculatâ obtectæ; cotyledones digitato-partitæ. — Folia bina aut plurima ex eadem vaginâ.

1. **P. SYLVESTRIS** (Mill. dict. n. 1.) foliis geminis rigidis, strobilis ovato-conicis acutis longitudine foliorum subgeminis basi rotundatis, embryone 5-lobo. δ in montosis sylvas formans. — Fl. fr. 3. p. 271. Lamb. pin. t. 1. Rich. conif. t. 11. **P. rubra** Mill. Fl. fr. 3. p. 272. — Duham. 2. t. 30. — Blackw. t. 180. (v. v.)
2. **P. UNCINATA** (Ram. in DC. fl. fr. 3. p. 726.) foliis geminis longioribus strictis subglancis, strobilis ovato-oblongis obtusis, squamis umbilicato-uncinatis, embryone 7-lobo. δ in Pyrenæis editioribus, Alpibus, Jurasso. — **P. sanguinea** Lapeyr. abr. 587. (v. v. DC.)
3. **P. MUGHIO** (Mill. dict. n. 5.) foliis geminis trinis tenuioribus rigidis, strobilis pyramidatis acutis basi rotundatis, squamis acutis. δ in editioribus montibus Delphinatûs ex Vill. — Fl. fr. 3. p. 273. Duham. arb. 2. p. 134. t. 31. n. 6. **Dubia civis.**
4. **P. MARITIMA** (Lam. fl. fr. 2. p. 201.) foliis geminis prælongis rigidis punctigentibus squamâ reflexâ basi donatis, strobilis oblongo-conicis obtusis glaberrimis lucidis foliis brevioribus, squamis echinatis. δ in arenosis maritimis Galliæ austro-occidentalis, Narbonæ ex Benth. Galloprov., Niceæ. — Fl. fr. 3. p. 273. et 5. p. 335. **P. Pinaster** Lamb. pin. t. 4 et 5. — Duham. arb. 2. t. 29. n. 4. (v. v.)
5. **P. RUMILIO** (Waldst. et Kit. hung. t. 149.) foliis geminis adpressis, strobilis ovatis subtundidis erectis, truncis ascendentibus. δ in turfosis Jurassi. — Lamb. pin. t. 2. Fl. fr. 5. p. 334. (v. s.)
6. **P. PINEA** (L. sp. 1419.) foliis geminis primordialibus ciliatis, strobilis ovatis obtusis subinermibus foliis longioribus, nucibus duris. δ in montosis Galliæ australis frequens. — Fl. fr. 3. p. 273. Lamb. pin. t. 6, 7 et 8. Rich. conif. t. 12. f. 1. — Duham. arb. 2. t. 27. n. 1. (v. v.)
7. **P. ALEPENSIS** (Mill. dict. n. 8.) foliis geminis filiformibus, strobilis ovato-oblongis deorsum inflexis, squamis lævibus obtusis, ramis patulis. δ in regione Olearum. — Fl. fr. 3. p. 274. et 5. p. 335. Lamb. pin. t. 11. **P. maritima** Lamb. pin. t. 9 et 10. non L. (v. v.)
8. **P. LARICIO** (Poir. dict. 5. p. 339.) foliis geminis longissimis distortibus, strobilis conicis acutis brevibus nutantibus, squamis basi angustioribus apice crassissimis non angulatis. δ in montibus Corsicæ. — Fl. fr. 3. p. 274. (v. s.)

9. P. CEMBRA (L. sp. 1419.) foliis quinis, strobilis ovatis obtusis, squamis adpressis ovalibus concavis. \S in montibus Galloprov., Delphinatūs. — Fl. fr. 3. p. 275. Lamb. pin. t. 23 et 24. — Duham. arb. 1. t. 32. (v. s.)

VI. ABIES Tourn. inst. t. 353. DC. fl. fr. 3. p. 275. — Pini sp. L.

Monoica. *Masc.* Amenta solitaria non racemosa, squamis apice statiniferis; stam. 2; antheræ 1-loculares. *Fem.* Amenta simplicia; ovaria 2; stigmata glandulosa; strobili squamæ imbricatae tenues apice rotundatae nec incrassatae nec angulosæ nec dorso umbilicatae; cotyledones digitato-partitæ. — Folia solitaria ex vaginâ communī prodeuntia.

Sect. I. EPICEA DC. fl. fr. l. c.

Strobili penduli; folia sparsa.

1. A. EXCELSA (DC. l. c.) foliis 4-gonis, strobilis cylindricis, squamis rhombeis complanatis margine repandis erosionis. \S in Vogesis, Jurasso, Alpibus, Pyrenæis. — Rich. conif. t. 14. f. 2. t. 15. Pinus Abies L. sp. 1421. — Cam. epit. 47. ic. (v. v.)

Sect. II. ABIES DC. l. c.


Strobili erecti; folia disticha.


2. A. PECTINATA (DC. l. c.) foliis planis emarginatis, strobili squamis obtusissimis adpressis. \S in montibus excelsis. — Rich. conif. t. 16. f. 2. Pinus Picea L. sp. 1420. — Cam. epit. 48 et 49. ic. (v. v.)

VII. LARIX Tourn. inst. 357. DC. fl. fr. 3. p. 277. — Pini sp. L.

Monoica. Omnia Abietis sed cotyledones simplices nunquam lobatae; strobili laterales. — Folia caduca in primordio cespitoso - fasciculata demum solitaria.

1. L. EUROPAEA (DC. l. c.) strobilis ovato-oblongis obtusis. \S in Alpibus editioribus. — P. Larix L. sp. 1428. Abies Larix Rich. conif. t. 13. — Lam. ill. t. 785. f. 2. (v. v.)





**Classis Secunda. MONOCOTYLEDONEÆ
seu ENDOGENÆ PHANEROGAMÆ DC.
organ. 1. p. 138.**

Truncus medullâ centrali , radiis medullaribus cor-
ticeque verâ plane destitutus , fibris sparsis nec concen-
tricè dispositis constans , apice tantùm crescens , in
marginē magis quām in centro induratus , interdūm
abortivus subterraneus radiciformis. Folia sæpè vaginata
integra nervis simplicibus , aut lobata nervis ramosis ,
nunquām verè composita. Flores distincti et sæpius
numero ternario dispositi , tegumento simplici biseriato ,
aut si mavis duplici utriusque seriei partibus similibus.
Embryo cotyledone unico aut potius cotyledonibus
alternis donatus.

**Ordo XCV. HYDROCHARIDEÆ DC. fl. fr. 3. p. 265. L. C.
Rich. in mem. inst. sc. phys. 1811. p. 1. et seq. — Hydro-
charidum gen. Juss.**

Flores in spathâ inclusi , dioici rariū hermaphroditi. Spatha
in masculis mox uniflora flore sessili aut pedunculato , mox
multiflora floribus pedunculatis ; in femineis et hermaphro-
ditis spatha uniflora floribus sessilibus. Perigonium sexparti-
tum (in femineis ovario adhærens), lobis externis foliaceis ,
internis petaloideis longioribus , intūs (in generibus acaulibus)
appendicibus variis instructum. Stamina 1-13 , in hermaphro-
ditis ovario , in masculis ovarii loco inserta ; antheræ 2-locu-
lares. Ovarium inferum ; stylus sæpè 0 ; stigmata 3-6 internè
glandulosa sæpè bifida. Fructus limbo calycis persistente
interdūm coronatus oblongus indehiscens. Pericarpium car-
nosum intūs pulposum mox uniloculare , mox sepimentis
plus minus prolongatis submultiloculare. Semina plurima
mox parietibus mox dissepimentis adfixa , integumento mem-
branaceo duro. Embryo cylindraceus rectus. Albumen nul-
lum. — Herbæ aquatice. Folia sessilia aut petiolata integra
aut tenuissimè denticulata.

† FRUCTUS UNILOCULARIS.

I. VALLISNERIA L. gen. 1097.

Dioica. *Masc.* Spadix terminalis conicus parvus, spathâ 2-3-4-partitâ, floribus minimis sessilibus tectus; singulis perigonium 3-partitum; stamina 2 (ovario abortivo imposta?) *Fem.* Scapus spiralis longissimus; spatha tubulosa, 2-fida, 1-flora; perigonium elongatum 6-partitum, laciniis alternis linearibus; stylus 0; stigmata 3 ovata 2-fida medio appendiculata; capsula elongata cylindrica 3-dentata 1-locularis polysperma ad parietes seminifera.

1. *V. SPIRALIS* (L. sp. 1441.) in canali Occitanico, in Rhodano propè Arelatem, Arausioñem, in Axonâ propè Suessiones, circâ Domfront. — Fl. fr. 3. p. 267. Mich. gen. 12. t. 10. f. 1. 2. (v. s.)

† † CAPSULA SEXLOCULARIS.

II. STRATIOTES L. gen. 687.


Spatha compressa persistens profundè bipartito-carinata 1-flora; perigonium tubulosum limbo 6-partito, laciniis 3 exterioribus minimis virescentibus, 3 interioribus magnis coloratis; stamna circiter 20, apici tubi vel ovarii margini inserta; styli 6 bifidi; capsula carnosa apicibus attenuata 6-gona 6-locularis; semina subangulosa valvarum segmentis alligata.


1. *S. ALLOIDES* (L. sp. 754.) foliis ensiformi-triangularibus ciliato-aculeatis. $\frac{3}{4}$ circâ Burdigalam ex Laterr. — Fl. fr. 3. p. 266. eng. bot. t. 379. (v. s. ex Belgio.)

III. HYDROCHARIS L. gen. 1126.

Dioica. *Masc.* Spatha 2-partita 3-flora; perigonium 6-partitum peltaoideum, laciniis tribus interioribus majoribus; stam. 12 abortu 9, trino ordine ovario abortivo imposta. *Fem.* Spatha sessilis uniflora, perigonium masculi ovario adnatum, intus appendicibus 6 filiformibus instructum; stigmata 6 cuneiformia 2-fida; capsula coriacea ovoidea 6-locularis polysperma.

1. *H. MORSUS-RANAÆ* (L. sp. 1466.) in aquis stagnantibus Parisiorum, Abbavillæ, Aureliæ, Andegaviæ, Arelatis, Lugduni, Bressiæ. — Fl. fr. 3. p. 266. eng. bot. t. 808. — Tourn. act. acad. 1705. t. 4. Folia petiolata orbicularia. (v. v.)





Ordo XCVI. ALISMACEÆ Juss. dict. sc. nat. I. p. 474. —
Alismoideæ DC. fl. fr. 3. p. 188.

Perigonium liberum 6-partitum coloratum; stamina 6-9 raro plura. Ovaria 3-6-∞, styli et stigmata totidem. Capsulæ indehiscentes 1-spermæ aut ∞-spermæ 2-valves. Embryo rectus aut incurvus. Albumen o. — Herbæ aquatice; foliis radicalibus alternis vaginantibus. Flores spicati vel umbellati, hermaphroditi, rariū monoici.

Trib. I. BUTOMEÆ Rich. mém. du mus. 2. p. 365.

Perigonii segmenta 3 interna petaloidea. Semina plurima venis per totam capsularum parietem reticulatim discurrentibus adnexa ascendentia; embryo in directione seminis.

I. BUTOMUS Tourn. inst. 143. L. gen. 507. Rich. l. c.

Stamina 9, 3 interiora; pistilla 6 longissimè rostrata; capsulæ intenso margine dehiscentes salvo lateralí connexu; semina lineari-oblonga recta longitudinaliter striata.

1. **B. UMBELLATUS** (L. sp. 532.) ♀ secùs aquas lentè fluentes passim. — Fl. fr. 3. p. 191. Lam. ill. t. 324. — B. floridus Gærtn. fruct. I. t. 19. f. 3. (v. v.)

Trib. II. ALISMOIDEÆ. — Alismaceæ Rich. mém. du mus. 2. p. 365.

Perigonii segmenta 3 interna petaloidea, capsulæ indehiscentes. Semina 1-2 suturæ annexa, erecta s. ascendentia, embryo flexus; radicula ad hylum versa.

II. ALISMA L. gen. 460.

Stamina 6; ovaria 6-25; capsulæ distinctæ sèpiùs 1-spermæ caducæ, non dehiscentes.

Sect. I. ALISMOIS. — Alisma Juss. gen. p. 46.

Capsulæ numerosæ 1-2-spermæ.

1. **A. RANUNCULOIDES** (L. sp. 487.) foliis linear-lanceolatis, capsulis angulatis subpentagonis incurvis acutis globoso-aggregatis. ♀ in aquosis. — Fl. fr. 3. p. 189. — Lob. ic. t. 300. f. 2. (v. v.)

f. repens, caule decumbente radicante, scapis paucifloris. — In arenosis humidis provinciarum occidentalium. — A. repens Cav. ic. I. t. 55. Fl. fr. 5. p. 312. (v. v.)

2. **A. NATANS** (L. sp. 487.) foliis ellipticis obtusis, pedunculis solitariis, capsulis striatis. ♀ in aquis Galliae mediae et occidentalis. — Fl. fr. 3. p. 189. eng. bot. t. 775. — Vaill. act. t. 4. f. 9. (v. v.)

3. **A. PLATYPODIA** (L. sp. 486.) foliis acutis oblongo-ovatis lanceolatisve 5-nerviis, capsulis compressis muticis obtuse 3-gonis. ♀ in fossis aquaticis, stagnis. — Fl. fr. 3. p. 189. Lam. ill. t. 272. — Barr. ic. t. 1157. (v. v.)

4. **A. PARNASSIFOLIA** (L. mant. 371.) foliis cordatis nervis longitudinalibus 9 notatis, capsulis aristatis. ♀ in Delphin., Bressiâ ex Latourr. — Fl. fr. 3. p. 189. — Till. pis. t. 46. f. 1. (v. s. c.)

Sect. II. DAMASONIUM Juss. gen. p. 46.

Capsulæ 6, 2-spermæ.

5. A. DAMASONIUM (L. sp. 486.) foliis cordato-oblongis, capsulis 6 stellatim patentibus subulatis. ♀ in stagnorum oris passim. — Fl. fr. 3. p. 188. Damasonium stellatum Rich. — Lob. ic. t. 301. f. 1. (v. v.)

III. SAGITTARIA L. gen. 1067.

Monoica. Perigonium 6-partitum lacinii 3 exterioribus persistentibus calycinis, 3 interioribus coloratis petaloideis. *Masc.* Stamina circiter 24. *Fem.* Ovaria numerosa receptaculo globoso imposita; capsulæ compressæ marginatæ 1-spermæ.

1. S. SAGITTÆFOLIA (L. sp. 1410.) foliis lanceolatis acuminatis sagittatis, lobis lanceolatis rectis, scapo simplici. ♀ in stagnis, fossis et ad oras fluminum Galliæ australis, mediae et occidentalis. — Fl. fr. 3. p. 190. Lam. ill. t. 776. Specimina 5-8-pedalia foliis ovatis plerumquæ obtusis in Garumna propè Burdigalam observavit cl. Des Moulins. (v. v.)

Trib. III. JUNCAGINEÆ Rich. l. c.

Perigonium subuniforme raro nullum, semen 1 aut 2 basi approximata erecta. Embryo rectus, radiculâ ad hylum seminis versâ. — Folia linearia rigida; flores spicati non colorati.

IV. SCHEUCHZERIA L. gen. 452.

Stamina 6, antheris longis; ovaria 3-6; capsulae compressæ inflatae 2-valves 1-2-spermæ.

1. S. PALUSTRIS (L. sp. 482.) in paludosis turfosis Vogesorum, Jurassi et Alpium. — Fl. fr. 3. p. 191. Lam. ill. t. 268. (v. v.)

V. TRIGLOCHIN L. gen. 453.

Perigonium caducum; stamina 6 brevissima; antheræ extrorsæ sessiles; stylæ nulli; ovaria 3-6 conniventia; capsulae 3-6 erectæ 1-spermæ conniventes.

1. T. MARITIMUM (L. sp. 482.) capsulis strictis 6-locularibus sulcatis ovatis. ♀ in maritimis, et Lotharingiæ pratis salsis. — Fl. fr. 3. p. 192. Lam. ill. t. 270. f. 2. — Lob. ic. t. 16. f. 2. (v. v.)
2. T. PALUSTRE (L. sp. 482.) radice fibrosâ, scapo foliis subduplici longiore, capsulis strictis 3-locularibus levibus ovato-linearibus basi attenuatis. (2) in paludibus et pratis humidis. — Fl. fr. 3. p. 192. Lam. ill. t. 270. f. 1. — Lob. ic. t. 17. f. 1. (v. v.)
3. T. BARRELIERI (Lois. gall. 2. p. 725.) radice bulbosâ, scapo foliis longiore, capsulis 3-locularibus levibus linearibus subpatentibus basi non attenuatis. ♀ in salsis Mediterranei et Oceani propè la Teste de Buch (Des Moulins). — Fl. fr. 5. p. 313. T. palustre ♂. Fl. fr. 3. p. 192. — Barr. ic. t. 271. (v. v.)

00.01 - 2013



Ordo XCVII. POTAMEÆ *Juss. dict. sc. nat. t. 43. p. 93.* —
Fluviales Vent. tabl. 2. p. 80. Rich. mém. du mus. 2. p. 365.

Flores hermaphroditæ aut diclines. Spatha perigonii vicem gerens, aut perigonium plus minus profundè divisum. Ovaria numero definita receptaculo communi aut spadici centrali inserta. Stylus 1 aut nullus; stigma simplex. Stamina numero definita receptaculo aut spadici inserta. Capsulæ indehiscentes 1-loculares 1-spermæ. Semen inversum pendulum. Albumen o. Embryo rectus aut incurvus. Radicula ad punctum hylo seminis contrarium versa. — Herbæ aquatice; foliis simplicibus alternis aut rariis oppositis. Flores axillares aut terminales, solitarii aut spicati.

I. POTAMOGETON *Tourn. inst. 103. L. gen. 174.*

Flores hermaphroditæ inserti spadici spathis 2 basi instructo; perigonium 4-partitum; antheræ 4 sessiles perigonii laciñiis alternae; ovaria 4; nuces 1-spermæ sessiles.

1. *P. NATANS* (L. sp. 182.) foliis natantibus petiolatis ellipticis lanceolatisve acutis aut obtusis basi rotundatis subcordatis, stipulis membranaceis lanceolato-linearibus acuminatis, spicis densis, nucibus laevibus ovato-compressis acutis. \mathcal{U} in aquis stagnantibus. — Fl. fr. 3. p. 183. Lam. ill. t. 89. (v. v.)
fluitans, foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis. — *P. fluitans* Roth
 germ. 1. p. 72. Fl. fr. 5. p. 310. non fl. fr. 3. p. 184. (v. s.)
2. *P. OBLONGUM* (Viv. fragm. t. 2.) foliis omnibus petiolatis ovato-oblongis utrinque acutis, stipulis linear-lanceolatis membranaceis acuminatis, spicis densis. \mathcal{U} in pratis humidis nec inundatis Andegaviae, Solonie, Vogesorum. — Fl. fr. 5. p. 310. *P. plantago* Bast. An satis à priore distinctum? (v. s.)
3. *P. LUCENS* (L. sp. 183.) foliis immersis ovato-lanceolatis planis subsessilibus nitidis venosis acutis acuminatis, stipulis linear-lanceolatis subobtusis internodio æqualibus, spicis densis. \mathcal{U} in lacubus et fluminibus. — Fl. fr. 3. p. 185. fl. dan. t. 195. — J. Bauh. hist. 3. p. 769. ic. (v. v.)
4. *P. OBSCURUM* (DC. fl. fr. 5. p. 311.) foliis alternis subsessilibus obtusis ovalioblongis multinerviis, summis subcoriaceis subemersis, omnibus fusco-rufescens, spicis densis cylindraceis, nucibus ovatis subcompressis sublaevibus breviter obtuse rostratis. \mathcal{U} in rivis Palatinatus et probabiliter Alsatiæ. — *P. rufescens* Koch. ined. (v. s.)
5. *P. PERFOLIATUM* (L. sp. 182.) foliis immersis ovatis oblongis obtusis cordatis amplexicaulibus nitidis nervosis, spicis densis brevibus. \mathcal{U} in stagnis, lacubus et fluviis. — Fl. fr. 3. p. 185. — J. Bauh. hist. 3. p. 778. ic. (v. v.)
6. *P. CRISPUM* (L. sp. 183.) foliis immersis lanceolatis alternis oppositis undulatis, stipulis apice lacero-ciliatis. \mathcal{U} in fossis, rivis. — Fl. fr. 3. p. 186. eng. bot. t. 1012. — Lob. ic. t. 286. f. 2. (v. v.)
7. *P. DENSUM* (L. sp. 182.) foliis immersis ovatis lanceolatis sessilibus acuminatis oppositis confertis, caulinis dichotomis, spicâ pauciflorâ, nucibus ovatis subcompressis rostratis. \mathcal{U} in rivis et fluminibus. — Fl. fr. 3. p. 185. eng. bot. t. 397. — J. Bauh. hist. 3. p. 777. ic. (v. v.)
8. *P. OPPOSITIFOLIUM* (DC. fl. fr. 3. p. 186.) foliis ovatis lanceolatis oppositis sessilibus obtusis subundulatis, stipulis minimis integris, spicâ pauciflorâ

440 MONOCOTYL. SEU ENDOGENÆ.

- densâ, canibus longè ramosis. \mathcal{U} in rivis passim. — *P. serratum* L. sp. 183. An satis à priore distinctum? (v. s. sine fructu.)
9. *P. HETEROPHYLLUM* (Schreb. spic. p. 21.) foliis superioribus natantibus petiolatis ellipticis oblongo-acutis membranaceis utrinque attenuatis, inferioribus immersis confertis sessilibus sublinearibus aut oblongo-lanceolatis acuminatis, stipulis linear-lanceolatis acuminatis, spicis densis, nucibus striatis ovatis subcompressis acutis. \mathcal{U} in aquis stagnantibus circâ Parisios, Andegaviae. — Fl. fr. 3. p. 184. *P. palustre* Teesd. trans. linn. 5. p. 43. (v. s.)
10. *P. VARIFOLIUM* (Thore chl. 47.) foliis superioribus natantibus longè petiolatis lanceolatis basi attenuatis acuminatis, inferioribus axillaribusque linearibus, spicâ densâ. \mathcal{U} in rivulis ericetorum Vasconiae. — Fl. fr. 5. p. 310. *P. fluitans* Fl. fr. 3. p. 184. excl. syn. Roth. et Willd. (v. s.)
11. *P. COMPRESSUM* (L. sp. 183.) caule compresso ramoso, foliis linearibus sessilibus apice rotundatis obtusis, spicis paucifloris breviter pedunculatis foliis breviribus, ovariis confertis ovatis subcompressis obtusè breviter rostratis. \mathcal{U} in aquis stagnantibus. — eng. bot. t. 418. *P. gramineum* L. sp. 184. Fl. fr. 3. p. 184. eng. bot. t. 2253. — Ray. syn. ed. 3. t. 4. f. 3. (v. v.)
- P. cuspidatum*, foliis cuspidatis, spicis 3-4-floris. — *P. cuspidatum* Schrad. germ. v. 2. ex Sm. eng. flora t. 1. p. 234. *P. compressum* Fl. fr. 3. p. 186. — Lœs. pruss. t. 66. An distincta species? (v. s.)
12. *P. PUSillum* (L. sp. 184.) caule tereti tenuissimo ramoso, foliis linearibus oppositis alternisque distinctis basi patentibus, spicis interruptis, nucibus ovatis laevibus breviter obtusè rostratis. (I) in paludibus. — Fl. fr. 3. p. 187. eng. bot. t. 215. — Vaill. bot. t. 32. f. 4. (v. v.)
13. *P. PECTINATUM* (L. sp. 183.) foliis setaceis approximatis parallelis basi vaginantibus alternis, 2 superioribus oppositis, spicâ florum pedunculatâ gracili valde interruptâ, nucibus sublaevibus ovatis compressis brevissimè rostratis. \mathcal{U} in fossis, paludibus, fluminibus passim. — Fl. fr. 3. p. 187. eng. bot. t. 32. f. 5. (v. v.)

II. RUPPIA L. gen. 175.

Flores hermaphroditæ distichi in spadice solitario; perigonium cædum 2-valve; antheræ 4 sessiles reniformes 1-loculares; ovaria 4 per anthesin pedicello non visibili, post anthesin pedicello longissimo imposita; capsulæ 1-spermæ ovatae stigmate persistente coronatae.

1. *R. MARITIMA* (L. sp. 184.) (I) in stagnis et fossis maritimis. — Fl. fr. 3. p. 183. Gærtn. carp. 2. t. 84. f. 6. — Mich. gen. t. 35. Folia linearia basi vaginantia, flores axillares et terminales. (v. v.)

III. ZANNICHELLIA Mich. gen. t. 34. f. 1. 2. L. gen. 1034.


Flores solitarii monoici. *Masc.* Stamen 1 nudum ad basin externam perigonii fl. feminei situm. *Fem.* Perigonium campanulatum; ovaria 2-6; capsulæ 1-spermæ sessiles compressæ gibbosæ extus crenulatae.


1. *Z. PALUSTRIS* (L. sp. 1375.) antherâ 4-loculari, stigmatibus integerimis, seminibus dorso denticulatis. (I) in rivis et fossis aquaticis. — Fl. fr. 3. p. 182. Gærtn. carp. 1. t. 19. f. 6. (v. v.)


IV. ZOSTERA DC. fl. fr. 3. p. 154. — *Zosteræ* sp. L.

Flores monoici aut dioici, nidulantes in folio spathæ vicem gerente, unilateraliter dispositi; spadix inclusus; stylus 2-fidus, nuces monospermæ.

1. *Z. MARINA* (L. sp. 1374.) caule tertiusculo, foliis integerimis, floribus









monoicis, staminibus et pistillis in duas series dispositis, antheris sessilibus.
Z. in Oceano et mari Mediterraneo. — Fl. fr. 3. p. 154. Lam. ill. t. 737. Z.
 maritima Gærtn. carp. 1. t. 19. (v. v.)

2. *Z. MEDITERRANEA* (DC. fl. fr. 3. p. 154.) caule teretiusculo, foliis integerrimis,
 floribus dioicis, antheris filamento exerto insertis. *Z.* in mari mediterraneo
 propè Monspelium. — Phucagrostis major. Caul. in ann. Ust. 10. p. 42. t. 3.
 (v. v. DC.)

V. CAULINIA DC. fl. fr. 3. p. 156. — *Zosteræ sp. L.*

Flores hermaphroditi; perigonum nullum; stam. 3; filamenta dilata
 tata persistentia basi extus antherifera; ovarium 1-spermum; stigma
 subsessile; fructus baccatus; semen unicum altero parieti adnatum
 exalbuminosum; radicula maxima infera.

1. *C. OCEANICA* (DC. l. c.) *Z.* in Oceano et mari Mediterraneo sub aquâ florens.
 — *Zostera Oceanica* L. mant. 123. Caul. in ann. Ust. 6. p. 66. t. 4. Posidonia
 Caulini Konig in ann. bot. 2. p. 96. Kernera oceanica Willd. — Lob. ic.
 t. 248. f. 2. (v. v. sine flore.)

VI. NAYAS L. gen. 1096.

Flores monoici. *Masc.* Perigonum bilobum aut nullum, stamen uni
 cum apice quadrivalve. *Fem.* Perigonum nullum; ovarium ovoideum;
 stylus 1; stigmata 2-3; capsula ovoidea 1-sperma.

1. *N. MINOR* (Roth. germ. II. 2. p. 500.) foliis linearibus ad apicem caulis confer
 tis recurvis, perigonio florum masculorum nullo. (I) in lacubus et fluminibus.
 — Fl. fr. 2. p. 587. Lam. ill. t. 799. f. 2. Caulinia fragilis Willd. sp. 4. p. 182.
 — Mich. gen. t. 8. f. 3. (v. v.)
2. *N. MAJOR* (Roth. germ. II. 2. p. 499.) foliis lanceolatis planis, perigonio
 florum masculorum bilobo. (I) in fluminibus et paludibus submersa. — Fl.
 fr. 2. p. 587. *N. marina* L. sp. 1441. *N. monosperma* Willd. — Lam. ill.
 t. 799. f. 1. — Mich. gen. t. 8. f. 1. 2. (v. v.)

Ordo XCVIII. ORCHIDÆ Juss. gen. p. 64. R. Brown prod.
nov. holl. p. 310. Rich. in ann. mus. IV.

Perigonum 1-sepalum petaloideum ovario adhærens, sex-partitum laciniis irregularibus, 3 exterioribus superiore galeâ nominatâ, 3 interioribus, 5 superioribus florem quasi verè constituentibus, inferiore (*labello*) formâ semper directione sæpius diversâ. Ovarium simplex; stylus columnaris simplex, stigma viscosum plus minus orbiculare ad basin latus aut apicem styli. Stam. filamenta 3 ovario inter stylum et perigonii lobos superiores inserta; lateralia (excepto Cypripedio) sterilia, mox plus minus elongata, mox brevissima aut nulla; filamentum medium styli dorso plus minus adnatum antheriferum, raro (et tunc filamenta lateralia antherifera) sterile. Anthera 2-locularis loculis vel discretis et lateribus styli sæpè ultrà producti adnatis, vel approximatis et tunc anthera mox stigmati parallela immobilis persistens, mox columnam terminans sæpiusque mobilis operculiformis decidua. Pollen granulosum granulis nunc materia glutinosâ elasticâ cohærentibus, nunc facile solubilibus, nunc homogeneis et sic coëuntibus in massas, post dehiscentiam loculorum, alterâ extremitate sæpius attenuatâ corpusculo glandulari-viscido (*retinaculo*) subpeltatim insertas et per hoc stigmati affixas, vel immediate, vel ope processûs filiformis, à stigmate oriundi. Capsula unilocularis trivalvis tricarinata inter nervos lateraliter dehiscens. Semina numerosa scobiformia placentis tribus valvis adnatis imposita. Embryo ad basin albuminis carnosí. — Herbæ, radicibus nunc fasciculatis nunc tuberosis, tuberibus ovatis aut palmatis, caulinibus rarius divisus, mox squamis foliisque instructis, mox nudis, foliis integris amplexicaulibus, floribus bracteatis spicatis aut solitariis.

I. ORCHIS Swartz act. holm. 1800. DC. fl. fr. 3. p. 245. — Orchidis et Satyrii sp. L.

Perigonum personatum, 6-partitum, suprà fornicatum seu galeatum, rarissimè patens, labello basi calcarato; stigma convexum anticum; anthera 2-locularis terminalis; pollinis massulæ 2 profundè in partículas numero indefinitas angulatas divisæ, basis extremitate attenuatâ retinaculo adfixâ stigmati adnexæ.

§. 1. Radice tuberculis palmatis vel fibris cylindricis constante.

(^{*} *Nigritella* Rich. de orch. annot. p. 19.—Perigonum patens, labellum scrofuliformi-calcaratum indivisum; massæ pollinicae retinaculis 2 instructæ.)

1. O. NIGRA (All. ped. n. 1845.) foliis linearibus tenuissimè glanduloso-ciliatis,


- spicâ densâ ovatâ, bracteis inferioribus flores longè superantibus, superioribus subæquantibus, perigonii segmentis linearibus acutis patentibus, labello ovato acuminate indiviso, calcare obtuso scrotiformi. ♀ in pratis montosis. — Fl. fr. 3. p. 253. *Satyrium nigrum* L. sp. 1338. *Nigritella angustifolia* Rich. p. 34. — Hall. helv. t. 27. Fl. atropurpurei aut rosei. (v. v.)
2. O? *SUAVEOLENS* (Vill. dauph. 2. t. 1.) foliis linearibus, spicâ densâ ovatâ, floribus semirespinatis, perigonii segmentis patentibus, labello semi-ovato bidentato, calcare ovarii longitudine. ♀ in montibus Delphinatûs propè Gratianopolim ex Vill. — Fl. fr. 5. p. 331. Fl. rubelli. (v. s. DC. in herb. Vill.) †
 (** *Gymnadenia* Rich. p. 20. — *Perigonium fornicatum* seu *galeatum*, labellum calcaratum 3-fidum; retinacula 2; stigma sursùm non excavatum sed in processum fissum angustatum.)
3. O. *VIRID.S* (All. ped. n. 1846.) foliis obtusis inferioribus ovatis, superioribus lanceolatis, spicâ cylindricâ elongatâ laxâ, bracteis inferioribus florem superantibus, perigonii galeati segmentis ovato-oblongis obtusis, labello linearî apice 3-dentato dentibus exterioribus longioribus, calcare obtuso scrotiformi. ♀ in pratis humidis. — Fl. fr. 3. p. 253. *Sat. viride* L. sp. 1337. eng. bot. t. 94. *Gymnadenia viridis* Rich. — Hall. helv. t. 26. Fl. viridescentes. (v. v.)
4. O. *ALBIDA* (All. ped. n. 1838.) foliis ovatis mucronatis, spicâ cylindricâ elongatâ densâ, bracteis ovatis acuminatis ovario longioribus, perigonii galeati segmentis ovatis obtusis, labello 3-partito, lacinias linearibus acutis, intermedia obtusâ, calcare obtuso ovario duplò triplò breviore. ♀ in pratis humidis Vogesorum, Jurassi, Alpium, montium Arverniæ, Pyren., Neustriæ ex cl. Le Prév. et de Bréb. — Fl. fr. 3. p. 253. *Sat. albidum* L. sp. 1338. *Gymnadenia albida* Rich. — Hall. helv. n. 1270. t. 26. (v. v.)
5. O. *ODORATISSIMA* (L. sp. 1335.) foliis linearibus acutis, spicâ cylindricâ elongatâ laxâ à foliis distante, bracteis ovarium superantibus, perigonii fornicati segmentis lateralibus patentibus, labello obtusè 3-lobo, calcare recurvo ovario breviore. ♀ in pratis montosis prov. austral. propè Gratianopolim ex Vill., Monspeliacum ex Gouan, in Pyr. centr. ex cl. Benth., circa Parisios ex Mérat, Château-Gaillard juxta flumen Ain (cl. Auger). — Fl. fr. 3. p. 252. *Gymnadenia odoratissima* Rich. — Hall. helv. n. 1274. t. 29. — Seg. ver. 3. t. 8. f. 6. Fl. purpurei. (v. v. in Ital. D.)
6. O. *CONOPSEA* (L. sp. 1335.) foliis linear-lanceolatis aut lato-linearibus, superioribus acuminatis, spicâ cylindricâ elongatâ laxâ à foliis distante, bracteis ovarium superantibus, perigonii fornicati segmentis lateralibus patensim, labello obtusè 3-lobo, calcare cornuto subulato ovario duplò longiore. ♀ in pratis montosis. — Fl. fr. 3. p. 252. Fl. dan. t. 224. *Gymnadenia conopsea* R. Br. kew. 5. p. 191. — Hall. helv. n. 1287. t. 29. — Vaill. bot. t. 30. f. 8. Fl. purpurei. (v. v.)
 (*** *Morio*. — *Orchis* Rich. p. 19. — *Perigonium fornicatum* seu *galeatum*; labellum calcaratum; retinacula 2 in apice stigmatis sursùm excavati nidulantia.)
7. O. *MACULATA* (L. sp. 1335.) foliis inferioribus linear-lanceolatis subobtusis, superioribus linearibus acuminatis, bracteis ovarium superantibus, spicâ brevi densâ conico-cylindricâ, perigonii segmentis superioribus conniventibus, lateralibus patentibus, labello subplano 3-lobo, lobis lateralibus dentatis, medio integro acuminato, calcare cylindraceo ovario breviore. ♀ in pratis montosis et sylvis. — Fl. fr. 3. p. 252. Rich. l. c. — Hall. helv. t. 32. — Vaill. bot. t. 31. f. 9 et 10. Folia sèpè maculis nigris adspersa. Fl. rosei aut purpurei. (v. v.)
8. O. *LATIFOLIA* (L. sp. 1334.) canle folioso, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis, spicâ cylindricâ densâ, bracteis inferioribus florem superantibus, superioribus subæquantibus, perigonii segmentis superioribus ovato-lanceolatis subobtusis conniventibus, labello vix 3-lobo lateribus reflexo dentato, calcare conico ovario breviore. ♀ in pratis humidis frequens. — Fl. fr. 3. p. 251. Fl. dan. t. 266. — Hall. helv. n. 1279. t. 32. — Vaill. bot. t. 31. f. 1-5. Folia inferiora sèpè maculata. Fl. purpurei. (v. v.)

9. *O. SAMBUCINA* (L. sp. 1334.) foliis lanceolatis linearis - lanceolatis acutis, spicâ coarctatâ ovato-cylindricâ, bracteis flores subsuperantibus, perigonii segmentis obtusiusculis patulis, labello leviter 3-lobo erenato, calcare conico ovario breviore. ♀ in montosis provinciarum austral., Pyren., Arverniae, Alsatiae, propè Abbavillam ex Bouch. — Fl. fr. 3. p. 151. *O. incarnata* L. sp. 1335. Fl. ochroleuci aut rubescentes. (v. v.)

§. 2. *Radice tuberculis duobus integris instructâ.*

10. *O. PALLENS* (L. mant. 292.) foliis ovatis subobtusis, spicâ coarctatâ ovato-cylindricâ, bracteis ovarium superantibus, perigonii segmentis ovatis obtusis lateralibus patentibus, labello lato obovato subtrilobo lobis obtusis, medio subemarginato, calcare conico ovarium subæquante. ♀ in sylvaticis Pyren., Alpium Galloprov., Delph., circa Parisios? ex Thuin., Aureliam? ex Dub. — Fl. fr. 3. p. 250. — Hall. helv. n. 1281. t. 30. — Seg. ver. 3. t. 8. f. 3. Fl. ochroleuci. (v. v.)
11. *O. PROVINCIALIS* (Balb. misc. alt. p. 20. t. 2.) foliis lanceolatis, spicâ laxâ, bracteis ovarium subæquantibus, perigonii segmentis erectis subpatentibus lanceolatis apice callosis obtusis, labello ovato-cuneato lato 3-lobo pubescente, laciniis 2 lateralibus deflexis, intermediâ minore emarginatâ, calcare ascendentे ovarium superante. ♀ in Galloprovinciâ ad sylvam de l'Esterel. — Fl. fr. 5. p. 329. Fl. ochroleuci. (v. s.)
12. *O. PAPILIONACEA* (L. sp. 1331.) foliis lanceolato-linearibus acutis, superioribus vaginantibus, spicâ brevi laxâ pauciflorâ, bracteis membranaceis coloratis ovario longioribus, perigonii segmentis nervosis conniventibus lanceolato-ovatis subobtusis, labello obovato lato indiviso dentato subemarginato, calcare subulato ovario breviore. ♀ in Corsicâ sylvis et pratis sterilibus. — Fl. fr. 3. p. 249. Fl. purpurei. (v. s.)
β. rubra, labello trapeziformi acuto. — in Corsicâ et propè Lugdunum. *O. rubra* Jacq. coll. 1. p. 60. (v. s.)
13. *O. LAXIFLORA* (Lam. fl. fr. 3. p. 504.) foliis lanceolatis lanceolato-linearibus acuminatis, bracteis ovarium subæquantibus, spicâ elongatâ laxissimâ, perigonii segmentis ovatis obtusis apice patentibus, labello 3-partito cuneato lato, laciniâ mediâ subemarginatâ, 2 lateralibus crenulatis longioribus, calcare apice subemarginato ovario duplò breviore. ♀ in prov. australibus, mediis occidentalibusque. — Fl. fr. 3. p. 246. — Vaill. bot. t. 31. f. 33-34. — Tab. ic. 667. Fl. purpurei. (v. v.)
14. *O. MASCULA* (L. sp. 1333.) foliis lanceolato-linearibus lanceolatis acuminatis, spicâ elongatâ laxâ, bracteis ovarium superantibus, perigonii segmentis obtusis, 2 superioribus erectis patentibus, labello cuneato lato trifido crenulato, laciniis lateralibus ovatis obtusis, intermediâ longiore subbilobâ, calcare obtuso suberecto ovario subbreviore. ♀ in pratis. — Fl. fr. 3. p. 247. Fl. dan. t. 457. *O. parvifolia* Chaub. in St.-Am. agen. 369. t. 7. — Hall. helv. n. 1283. t. 33. — Vaill. bot. t. 31. f. 12. Fl. purpurei rarius albi. Folia sæpe maculata. (v. v.)
15. *O. PALUSTRIS* (Jacq. ic. rar. t. 181.) foliis oblongo-lineariibus acuminatis, spicâ brevi laxâ, bracteis ovarium superantibus, perigonii segmentis ovatis subacutis patentibus, labello obovato latissimo leviter trilobo, lobis subæqualibus obtusis, intermediâ vix emarginato, calcare ovario subbreviore. ♀ in pratis paludosis Jurassi, Vogesorum et propè Falaise ex cl. de Brébisson. — Fl. fr. 5. p. 330. Fl. purpurei. An satis à priore distincta? (v. s.)
16. *O. MORIO* (L. sp. 1333.) foliis linearis-lanceolatis obtusis, superioribus vaginantibus acutis, spicâ laxâ, bracteis ovarium subæquantibus, perigonii segmentis ovatis obtusis ascendentibus, labello ovato-cuneato latissimo sub 4-lobo, laciniis 2 lateralibus crenulatis reflexis, calcare conico ascendentे ovario subbreviore. ♀ in graminosis et collibus aridis. — Fl. fr. 3. p. 246. Fl. dan. t. 253. — Hall. helv. n. 1282. t. 33. — Vaill. bot. 31. f. 13 et 14. Fl. purpurei rarius rosei aut albi. (v. v.)





17. *O. VARIEGATA* (Lam. dict. 4. p. 592.) foliis lanceolatis obtusiusculis, spicâ brevi subovatâ densâ, bracteis scariosis ovarium subæquantibus, perigonii segmentis lanceolatis acuminatis conniventibus, labello tripartito lœvi, laciñiis lateralibus acutis, intermediâ oblongâ bifidâ serratâ cum mucrone interjecto, calcare recto subulato ovario duplò breviore. ♀ in pratis. — Fl. fr. 3. p. 248. — Hall. helv. n. 1275. t. 30. Fl. rosei, purpureo punctati. (v. v.)
18. *O. MILITARIS* (L. sp. 1333. excl. var.) foliis lato-lanceolatis oblongis obtusis, superioribus vaginantibus acutis, spicâ laxiusculâ cylindricâ, bracteis membranaceis ovario multò brevioribus, perigonii segmentis ovatis conniventibus acutis, labello 3-partito punctato-scabro, laciñiis lateralibus integris linearibus, mediâ cuneatâ latâ bifidâ lobis obsoletè 4-angularibus aut rotundatis integris vel crenulatis cum mucrone interjecto, calcare saccato ovario duplò breviore. ♀ in memoribus et pratis umbrosis. — Fl. fr. 3. p. 248. Jacq. ic. rar. 3. t. 598. *O. fusca* Jacq. aust. 4. t. 307. — Hall. helv. n. 1276. t. 31. Fl. rubri aut fusci. (v. v.)
19. *O. GALEATA* (Lam. dict. 4. p. 593.) foliis lato-ovatis obtusis, superioribus vaginantibus, spicâ conicâ densâ, bracteis membranaceis obtusis ovario multò brevioribus, perigonii segmentis conniventibus acutis, labello 3-partito lœvi, laciñiis lateralibus integris sublinearibus obtusis, mediâ cuneatâ latâ 2-fidâ, lobis valde divergentibus obsoletè 4-angularibus subintegris cum mucrone interjecto, calcare ovario duplò breviore. ♀ in pratis submontosis Lutetiæ, Monspelii. — Fl. fr. 3. p. 249. — Hall. helv. n. 1277. t. 28. Fl. rubelli. (v. s.)
20. *O. LONGIBRACTEATA* (Biv. sic. n. 66. t. 4.) foliis infimis lato-ovatis obtusis, superioribus membranaceis vaginantibus acuminatis, bracteis membranaceis acuminatis florem superantibus, perigonii segmentis conniventibus ovatis obtusis, labello 4-fido, laciñiis oppositis oblongis integris obtusis, calcare ovario duplò breviore. ♀ in collibus siccis Arelatis, Telouis, Niceæ. — Fl. fr. 5. p. 330. *O. Robertiana* Lois. gall. t. 21. Perig. rubellum punctatum, labellum atropurpureum. (v. s.)
21. *O. SIMIA* (Lam. fl. fr. 3. p. 507.) foliis lato-lanceolatis obtusis, superioribus vaginantibus acutis, spicâ ovatâ densâ demùm cylindricâ laxâ, bracteis ovario brevioribus obtusis, perigonii segmentis ovatis conniventibus acutis, labello 4-partito laciñiis omnibus gracilibus linearibus obtusis, mucrone linearis interdum apice projecto, calcare ovario duplò breviore. ♀ in pratis et sylvis siccis. — Fl. fr. 3. p. 249. *O. tephrosanthos* Vill. — Hall. helv. n. 1275. t. 30. — Vaill. bot. t. 31. f. 25 et 26. (v. s.)
22. *O. CORIOPHORA* (L. sp. 1332.) foliis lanceolato-linearibus linearibus acutis, spicâ cylindricâ subdensâ, bracteis ovarium subæquantibus superantibusve, perigonii segmentis ovatis lanceolatis acuminatis conniventibus, labello 3-partito, laciñiis 2 lateralibus crenatis obtusis aut mucronatis, calcare conico ascendente ovario duplò triplò breviore. ♀ in pratis humidis circâ Falaise ex cl. de Breb., Parisios, Burdigalam ex cl. Later., in Pyren., prov. austr. et circâ Mimatem' (Mende). — Fl. fr. 3. p. 246. Jacq. aust. t. 122. *O. divaricata* Thui? — Hall. helv. t. 34. f. 2. — Vaill. bot. t. 31. f. 30-31-32. Fl. rubello et viridi conspersi. (v. v.)
23. *O. USTULATA* (L. sp. 1333.) foliis lanceolatis, spicâ ovato-cylindricâ, bracteis ovarium subæquantibus, perigonii segmentis erectis acutis apice subconniventibus, labello 3-partito, laciñiis obtusis, lateralibus linearibus punctato-scabris, mediâ latiore subbilobâ, calcare scrotiformi ovario triplò quadruplicò breviore. ♀ in pratis. — Fl. fr. 3. p. 247. — Fl. dan. t. 103. — Hall. helv. n. 1273. t. 28. — Vaill. bot. t. 31. f. 35-36. Spica primum atropurpurea densa, demùm basi laxa. Fl. parvi albo et purpureo variegati. (v. v.)
24. *O. GLOBOSA* (L. sp. 1332.) foliis lanceolatis, spicâ densâ ovato-globosâ, perigonii segmentis apice aristato-clavatis, labello 3-partito, laciñiâ mediâ emarginatâ, calcare ovario duplò breviore. ♀ in pascuis Vogesorum, Jurassi,

Alpium, Pyren. ad *Port de Paillères ex Lapeyr.* — Fl. fr. 3. p. 245. Jacq. aust. t. 265. — Hall. helv. t. 27. f. 1. Fl. rosei. (v. v.)

(**** *Anacamptis* Rich. p. 19. — *Perigonum fornicatum*; labellum calcaratum; retinaculum 1 binis pollinis massulis commune in apice stigmatis sursūm excavati nidulans.)

25. O. PYRAMIDALIS (L. sp. 1332.) foliis lanceolato-linearibus acutis, superioribus vaginantibus, spicā densā ovatā aut ovato-oblongā, bracteis linearibus acuminatis ovarium subæquantibus, perigonii segmentis subovatis acutis æqualibus, labello 3-partito laciniis integris obtusis, lateralibus latioribus, calcare ovarium subæquante. ♀ in pascuis siccis passim. — Fl. fr. 3. p. 246. eng. bot. t. 110. *Anacamptis pyramidalis* Rich. — Hall. helv. t. 35. f. 1. Fl. rubelli rariū albi. (v. v.)

(**** *Platanthera* Rich. p. 20. — *Perigonum galeatum* seu *fornicatum*, labellum calcaratum indivisum lineari-ligulatum; anthera loculi ab invicem valde distantes; retinacula 2 nuda.)

26. O. BIFOLIA (L. sp. 1331.) foliis caulinis vaginantibus brevissimis, radicalibus binis ovato-oblongis acutis basi attenuatis, spicā elongatā laxissimā, bracteis ovarium subæquantibus, labello lineari integerrimo obtuso, calcare incurvo cornuto ovario duplō longiore. ♀ in nemorosis humidis et pratis umbrosis. — Fl. fr. 3. p. 245. O. alba Lam. *Platanthera bifolia* Rich. — Hall. helv. t. 35. f. 2. Fl. albi odori. (v. v.)

(***** *Loroglossum* Rich. p. 16. — *Perigonum galeatum*, labellum lineari-tripartitum, basi breviter saccato-calcaratum, retinaculum unicum binis massulis commune, in apice stigmatis sursūm excavati nidulans.)

27. O. HIRCINA (Crantz fasc. 6. p. 484.) foliis lauceolato-ovatis, spicā elongatā laxiusculā, bracteis linearibus florem superantibus, perigonii segmentis conniventibus ovatis obtusis, labello lineari-tripartito, laciniā intermediā prælongā bifidā, calcare conico brevissimo scrotiformi. ♀ in pratis montanis, ad marginem sylvarum passim. — L. sp. 1337. eng. bot. t. 34. *Loroglossum hircinum* Rich. — Vaill. bot. t. 30. f. 6. — Moris. s. 12. t. 12. f. 11. n. 9. Fl. viridescente et purpureo striati. (v. v.)


28? O. SECUNDIFLORA (Bert. rar. it. dec. 2. p. 42.) foliis inferioribus ovato-lanceolatis mucronatis, superioribus linearibus vaginantibus, spicā densā cylindricā elongatā, floribus secundis, bracteis ovario duplō brevioribus, perigonii galeati segmentis lanceolatis acuminatis, labello lineari 3-partito, laciniā mediā subtridentatā aut integrā, calcare conico brevissimo. ♀ in pinetis Corsicæ et Massiliae (cl. Solier). — *Ophrys densiflora* Desf. ann. mus. 10. t. 16. Fl. viridescentes. (v. s.)


II. OPHRYS Sw. l. c. DC. fl. fr. 3. p. 254. — *Ophrydis* sp. L.

Perigonum 6-partitum, segmentis patentibus aut galeatis; labellum ecalcaratum; stigma convexum anticum; anthera 2-locularis terminalis; pollinis massulae 2 profundè in particulas numero indefinitas angulatas divisæ, basis extremitate attenuatâ retinaculo adfixâ stigmati adnexæ.

(* *Aceras* R. Brown in hort. kew. ed. 3. t. 5. p. 191. — *Loroglossi* sp. Rich. — *Perigonum galeatum*; labellum lineari-tripartitum, laciniā intermediā bifidā, basi gibbosum; retinacula 2 in apice stigmatis sursūm excavati nidulantia.)

i. O. ANTHROPOPHORA (L. sp. 1343.) caule folioso, foliis ovato-lanceolatis, spicā cylindricā laxiusculā, bracteis ovario paulò brevioribus, perigonii segmentis conniventibus, 3 externis ovato-lanceolatis, 2 internis linearibus, labello ovario longiore lineari-tripartito, laciniā mediā elongatā 2-fidā. ♀ in pratis. — Fl. fr. 3. p. 255. Fl. dan. t. 103. *Loroglossum anthropophorum* Rich. p. 32. — Hall. helv. n. 1264. t. 23. — Vaill. bot. t. 31. f. 19. 20. *Perigonum albo-lutescens*, labellum sulfureo et ferrugineo variegatum. (v. v.)





(** *Entomea* -- Ophrys Brown. prod. 313. Rich. p. 19. — Perigonium patens; labellum prorsus ecalcaratum, convexum; retinacula 2 in apice stigmatis sursùm excavata nidulantia.)

2. *O. LUTEA* (Cav. ic. 2. t. 160.) caule folioso, foliis ovali-oblongis, spicâ laxâ pauciflorâ (3-5), bracteis ovarium æquantibus superantibusve, perigonii segmentis obtusis, 3 exterioribus ovato-ellipticis, binis interioribus linearilanceolatis duplò brevioribus, labello pubescente obovato apice sub 3-lobo, lobis subæqualibus medio majore emarginato. ♀ in pratis Corsicæ, Mons-pelii, Arelatis, Massiliæ, Niceæ. — Fl. fr. 5. p. 331. — Moris. s. 12. t. 13. f. 9. n. 15. Labellum in ambitu et subtûs ameniacum, in medio fascum sub 2-lineatam. (v. v.)
3. *O. PSEUDO-SPECULUM* (DC. fl. fr. 5. p. 332.) caule folioso, foliis ovali-oblongis, spicâ 2-4-florâ, bracteis ovarium superantibus, perigonii segmentis obtusis patentibus, 3 exterioribus ovato-ellipticis, binis interioribus linearilanceolatis brevioribus, labello tridentato medio glaberrimo margine villosa reflexo. ♀ in pratis Monspelii rariùs. — Labellum margine flavum medio fascum. An à priore distincta species? (v. v. DC.)
4. *O. MYODES* (Jacq. ic. rar. t. 71.) caule folioso, perigonii segmentis patentibus, 3 exterioribus lanceolatis obtusis, 2 interioribus linearibus brevissimis, labello pubescente 3-partito, laciniis lateralibus linearilanceolatis, mediâ oblongâ bilobâ longiore. ♂ in pascuis montosis. — Fl. fr. 3. p. 255. *O. muscifera* eng. bot. t. 64. — Hall. helv. n. 1265. t. 24. Labellum cæruleo maculatum. (v. v.)
5. *O. ARANIFERA* (Sm. brit. 939.) caule folioso, foliis ovali-oblongis, superioribus acutis, spicâ laxâ pauciflorâ, perigonii segmentis patentibus, 3 exterioribus oblongis obtusis, 2 interioribus lanceolatis acutis brevioribus, labello lato obovato villosa cum lineis 2 glabris vix 3-lobo, lobo medio obovato emarginato. ♀ in pascuis cretaceis glareosis. — Fl. fr. 5. p. 332. eng. bot. t. 65. *O. arachnites* ♂ Fl. fr. 3. p. 155. — Vaill. bot. t. 31. f. 15 et 16. Labellum fuscum. (v. v.)
6. *O. ARACHNITES* (Hoffm. germ. 318.) caule folioso, foliis ovali-oblongis, superioribus acutis, spicâ laxissimâ pauciflorâ, perigonii segmentis patentibus, 3 exterioribus oblongis obtusis, 2 interioribus linearilanceolatis brevissimis, labello villosa 3-lobo, lobo medio obovato apice brevissime 3-lobo. ♀ in pratis et pascuis montanis. — Fl. fr. 5. p. 332. non 3. p. 255. — Hall. helv. n. 1266. t. 24. f. 1. — Vaill. bot. t. 30. f. 10. 11. 12. 13. Perigonii segmenta albescentia, labellum fuscum basi striatum. (v. v.)
7. *O. APIFERA* (Sm. brit. 938.) caule folioso, foliis ovali-oblongis acutis, perigonii segmentis patentibus, 3 exterioribus ellipticis obtusis, 2 internis linearibus brevissimis, labello villosa 3-lobo, lobis lateralibus oblongis medio obovato elongato 3-lobo, laciniâ terminali recurvata subulata. ♀ in pratis et pascuis cretaceis. — Fl. fr. 5. p. 333. eng. bot. t. 383. — Vaill. bot. t. 30. f. 9. Perigonium roseum, labellum purpureo-fuscum, flavo-striatum. (v. v.)
- (*** *Chamorchis* Rich. p. 20. — Perigonium galeatum; labellum indivisum; retinacula 2; stigma sursùm non excavatum, sed in fissum processum angustatum.)
8. *O. ALPINA* (L. sp. 1342.) caule nudo, foliis subradicalibus linearilanceolatis, spicâ pauciflorâ abbreviatâ, bracteis ovario longioribus, labello lanceolato indiviso obtuso utrinque unidentato. ♀ in Alpibus Delphinatûs. — Fl. fr. 3. p. 254. Jacq. vind. t. 9. *Chamorchis alpina* Rich. — Hall. helv. t. 22. f. 1. Fl. viridescentes. (v. s.)
- (**** *Herminium* Brown. hort. kew. 5. p. 191. — Perigonium subcampanulatum laciniis interioribus manifeste longioribus dissimilibus, labellum basi saccatum plurisidum; retinacula 2, nuda.)
9. *O. MONORCHIS* (L. sp. 1342.) caule nudo, foliis 2-3 subradicalibus lanceolatis, spicâ elongatâ tenuissimâ laxâ, bracteis ovarii longitudine, perigonii segmentis lanceolato-ovatis obtusis, labello tripartito, laciniis linearibus latera-

libus divaricatis. ♀ in pratis montanis. — Fl. fr. 3. p. 254. Fl. dan. t. 102. *Herminium monorchis* Br. Rich. — Hall. helv. n. 1262. t. 22. Fl. viridescenes. (v. v.)

III. SERAPIAS Sw. l. c. DC. fl. fr. 3. p. 257. Rich. de Orch. ann. p. 19. — *Serapiadis* sp. L.

Perigonum 6-partitum, segmentis 5 superioribus cucullato-coalitis, 3 exterioribus majoribus, 2 mediis tenuissimis, labellum concavum acutum ecalcaratum, columna longè cuspidata; stigma concavum anticum; anthera 2-locularis terminalis; pollinis massulae 2 profundè in particulas numero indefinitas angulatas divisæ, basis extremitate attenuatâ retinaculo unico binis massulis communi adfixâ stigmati annexæ.


1. S. *LINGUA* (L. sp. 1344.) radice tuberosâ, tuberculo altero pedicellato, foliis linearibus oblongis, floribus 2-4, bracteis flore brevioribus, labello tripartito, laciniis lateralibus ovatis obtusissimis erectis conniventibus, mediâ oblongâ lanceolatâ acuminatâ glaberrimâ dependente, callo plano. ♀ in pratis provinc. austral. et austro-occident. usque ad Nannetes. — Fl. fr. 3. p. 256 et 5. p. 333. — Seg. veron. 3. t. 8. f. 4. (v. v.)
2. S. *CORDIGERA* (L. sp. 1345.) tuberculis 2 sessilibus, foliis oblongo-lanceolatis, bracteis flore longioribus, floribus 4-8, labello tripartito, laciniis lateralibus obtusis erectis conniventibus, mediâ ovatâ acuminatâ disco pilosâ dependente, callo 2-gibboso. ♀ in pratis prov. austr. et austro-occident. usque ad Nannetes. — Fl. fr. 3. p. 256 et 5. p. 233. S. *lancifera* et *cordigera* St. Am. fl. agen. p. 278 et 279. t. 9. — Rudb. elys. 2. p. 240. f. 20. (v. v.)


IV. NEOTTIA Sw. l. c. p. 226. DC. fl. fr. 3. p. 257. — *Satyrii* et *Orchidis* sp. L.

Perigonum 6-partitum, laciniis superioribus basi conniventibus apice liberis; labellum ventricosum canaliculato-amplexans; columna acute appendiculata; stigma anticum obliquum; anthera 2-locularis postica; pollinis massæ sessiles; retinacula nulla.

(* *Goodyera* Brown in hort. kew. ed. 3. t. 5. p. 197. — Labellum inclusum indivisum infernè insigniter concavo-gibbum; pollinis massulae in particulas angulatas divisæ.)

1. N. *REPENS* (Sw. l. c. p. 226.) foliis radicalibus ovatis petiolatis reticulatis obtusis, superioribus vaginantibus acutis caule terminali floribusque pubescentibus, floribus secundis, bracteis linear-lanceolatis acuminatis, labello segmentisque lanceolatis. ♀ in sylvaticis montanis. — Fl. fr. 3. p. 258. *Satyrium repens* L. *Goodyera repens* Br. Rich. — Hall. helv. t. 22. f. 3. (v. v.)
(** *Spiranthes* Rich. p. 20. — Ovarium apice obliquatum; perigonum in oblongum connivens; labellum inclusum obovale indivisum; stigma in processum angustum; pollen granulosum.)
2. N. *SPIRALIS* (Sw. l. c.) foliis radicalibus ovato-oblongis acutis subpetiolatis, scapo radicali axillari, spicâ spirali, floribus secundis, bracteis ovatis acuminatis ovarium superantibus, labello ovato margine crispato. ♀ in graminosis et collibus siccis. — Fl. fr. 3. p. 257. *Ophrys spiralis* L. *Spiranthes autumnalis* Rich. *Orchidastrum autumnale* Michel. gen. 30. t. 26. — Lob. ic. t. 186. f. 1. Autumno floret. (v. v.)
3. N. *AESTIVALIS* (DC. fl. fr. 3. p. 258.) foliis sublinearibus, canle florifero foliolo, spicâ spirali, floribus secundis, bracteis ovatis acuminatis ovarium superantibus, labello ovato margine crispato. ♀ in pratis humidis passim. — *Spiranthes aestivalis* Rich. — Hall. helv. t. 38. — Mich. gen. t. 26. f. 2. Æstate floret. (v. v.)





V. EPIPACTIS Sw. l. c. DC. fl. fr. 3. p. 258. — Serapiadis et Ophrydis sp. L.

Perigonium erecto-patens 6-partitum, labello integro vel lobato ecalcarato; stigma obliquum terminale antheræ anticum; anthera opercularis 2-locularis ovata margini postico styli adnata, post pollinis emissionem persistens; pollinæ massulæ granulosæ sessiles.

§. 1. *Labello lobato.*

(** Listera* Br. kew. ed. 3. t. 5. p. 201.—*Neottia* Rich. p. 20 non Sw.—*Perigonum in globum laxe connivens*; *labellum patens*; *stigma in processum angustum*; *anthera intra cavitatem columnæ stipitata*.)

1. *E. CORDATA* (All. ped. n. 1851.) caule bifolio, foliis cordatis oppositis, labello 3-fido, laciiniis lateralibus brevissimis, intermediâ longissimâ 2-partitâ linearis. ♀ inter muscos et pinetos Vogesorum, Jurassi, Arverniæ, Pyren. — Fl. fr. 3. p. 261. eng. bot. t. 358. *Neottia cordata* Rich. *Listera cordata* Br. — Hall. helv. t. 22. f. 4. (v. v.)
2. *E. OVATA* (All. ped. n. 1850.) caule bifolio, foliis ovatis oppositis, labello 2-fido linearis segmentis obtusis triplò longiore. ♀ in sylvis et pratis umbrosis. — Fl. fr. 3. p. 261. *Neottia ovata* Rich. *Listera ovata* Br. — Moris. s. 12. t. 11. f. 1. (v. v.)
3. *E. NIDUS-AVIS* (All. ped. n. 1849.) caule aphylo squamis membranaceis acutis vaginato, labello obcordato segmentis obtusis duplò longiore. ♀ in umbrosis et sylvis passim. — Fl. fr. 3. p. 260. *Neottia nidus-avis* Rich. — Hall. helv. n. 1290. t. 37. — Lob. ic. t. 195. f. 1. Fl. fuscæ. (v. v.)

§. 2. *Labello apice integro.*

(*** Cephalanthera* Rich. p. 21.—Ovarium sessile; perigonium erecto-connivens; labellum genitalia amplectens interruptum; stigma in processum non angustum; anthera subrotunda imâ tantum parte dorso stigmatis incumbens, cætera aperte supereminens; pollen granulis simplicibus.)

4. *E. PALLENS* (Sw. l. c. p. 232.) foliis oblongo-lanceolatis sessilibus, bracteis ovario longioribus, floribus erectis, labello obtuso segmentis perigonii breviore, ovariis glabris. ♀ in sylvis passim. — *E. lancifolia* Fl. fr. 3. p. 261. *Serapias grandiflora* eng. bot. t. 271. *Cephalanthera pallens* Rich. Fl. ochroleuci. (v. v.)
5. *E. ENSIFOLIA* (Sw. l. c. p. 232.) foliis lanceolatis acuminatis subdistichis, bracteis minutissimis subulatis, floribus erectis, labello obtuso segmentis perigonii duplò breviore, ovariis glabris. ♀ in sylvis et pascois montosis. — Fl. fr. 3. p. 269. eng. bot. t. 494. *Cephalanthera ensifolia* Rich. Fl. albescentes; labellum purpureo-striatum. (v. v.)
6. *E. RUBRA* (All. ped. n. 1857.) foliis lanceolatis sessilibus, bracteis ovarium subsuperantibus, floribus erectis, labello acuto lineis elevatis undulatis perigonii segmentis breviore, ovariis glabris. ♀ in umbrosis montanis. — Fl. fr. 3. p. 260. eng. bot. t. 437. *Serapias rubra* L. mant. 490. — Hall. helv. n. 1299. t. 42. Fl. rubri. (v. v.)

(**** Helleborine*.—*Epipactis* Rich. l. c.—Ovarium pedicellatum; perigonum partum interruptum; stigma in processum apiculare angustatum; antheræ subcordata postica; pollen granulis veluti 4 globulosis.)

7. *E. LATIFOLIA* (All. n. 1855.) foliis ovatis amplexicaulibus, bracteis inferioribus flore longioribus, floribus pendulis, labello acuminato perigonii segmentis breviore, ovariis pubescentibus. ♀ in umbrosis et sylvis. — Fl. fr. 3. p. 259. eng. bot. t. 269. *Serapias latifolia* L. mant. 490. — Hall. helv. n. 1297. t. 40. Fl. purpurei aut viridescentes. (v. v.)
♂. *microphylla*, foliis angustioribus internodiis brevioribus. — In collibus siccis Monspelii, Andegaviae, Parisiorum, etc. — Fl. fr. 5. p. 334. *Serapias microphylla* Ehr. *S. parvifolia* Pers. — Clus. hist. 1. p. 273. f. 1. n. III. (v. s.)

8. E. PALUSTRIS (Crantz austr. 6. p. 462. t. 1. f. 5.) foliis lanceolatis amplexicaulis, bracteis flore brevioribus, floribus pendulis, labello ovato crenato obtuso perigonii segmentis aequali, ovarii pubescentibus. ♀ in pratis paludosis frequens. — Fl. fr. 3. p. 259. eng. bot. t. 270. Serapias longifolia L. — Hall. helv. n. 1296. t. 39. Fl. viridescentes purpureo-variegati. (v. v.)

VI. MALAXIS Sw. in act. holm. 1800. p. 233. DC. fl. fr. 3. p. 261. — Liparis Rich. p. 21.

Perigonium 6-partitum inversum, segmenta 5 laxe patula; labellum posticum concavum columnam basi amplectens; columna gibbosa ante excavata; anthera superposita marginalis caduca hemisphaerica 2-locularis loculis simplicibus; pollen solidum massis bimassulatis.

1. M. LOESELII (Sw. l. c. p. 235.) foliis binis ovato-lanceolatis, scapo trigono, labello apice ovato recurvato. ♀ in paludibus circâ Parisios, Falaise, Béthune, Dunkerque, Lille et Haguenau ex Nestl. — Fl. fr. 3. p. 262. Ophrys Lœselii L. Liparis Lœselii Rich. p. 38. — Lœs. pruss. 180. t. 58. (v. v. in Helv.)

VII. CORALLORHIZA Hall. hist. 2. p. 159. R. Br. in hort. kew. ed. 3. t. 5. p. 209. Rich. l. c. p. 21. — Cymbidii sp. Sw. DC.

Ovarium breviter pedicellatum; perigonium in oblongum fornicatum; labellum ecalcaratum obovale infernè canaliculatum marginibus infernè crenulâ interruptis, introrsum prominentiis longitudinalibus percursum, supernè recurvo-patens; columna libera; anthera marginalis superposita subglobosa didyma 2-locularis, loculis bilocellatis subtransversim dehiscentibus; pollen solidum, massulis 4 distinctis.

1. C. HALLERI (Rich. l. c. p. 39.) caule vaginato aphylo, perigonii segmentis lanceolatis, binis inferioribus linearibus deflexis, labello oblongo acuto. ♀ in sylvis Jurassi, Galloprov., Occitaniae. — C. innata Brown l. c. Cymbidium Corallorrhiza Sw. l. c. Fl. fr. 3. p. 263. Ophrys Corallorrhiza L. — Hall. helv. n. 1301. t. 44. (v. v.)

VIII. LIMODORUM Tourn. inst. 250. Rich. l. c. p. 20. — Limodori sp. Sw. l. c.

Ovarium pedicellatum non contortum; perigonium laxiuscule erecto-connivens; labellum ascendens longè calcaratum, partis inferioris marginibus imæ columnæ adnatum; columna longissima; anthera marginalis subcordata cernua; pollen granulosum sessile.

1. L. ABORTIVUM (Sw. l. c. p. 243.) aphyllum, caule vaginato, labello ovato undulato, calcare subulato ovarii longitudine. ♀ in umbrosis montanis. — Fl. fr. 3. p. 263. Orchis abortiva L. — Hall. helv. n. 1288. t. 36. (v. v.)

IX. EPIPOGIUM Gmel. sib. 1. t. 2. f. 2. Brown prod. 330. Rich. l. c. p. 20. — Limodori sp. Sw. DC.

Ovarium pedicellatum non contortum; perigonium deorsum patens; labellum posticum vesicario-calcaratum iuerruptum, parte inferiore veluti in binas auriculas obtusas porrectas antrorsum desinente; anthera stipitata marginalis ferè superposita subrotunda; pollinis massæ 2 oblongo-ovoideæ in subulam solidam sensim desinentes.

1. E. GMELINI (Rich. l. c. p. 36.) aphyllum, caule vaginato paucifloro, floribus pendulis, labello concavo, calcare ascendentē ovato. ♀ in faginetis Jurassi, Delphin., Monspelii. — Limodorum epipodium Sw. l. c. p. 243. Fl. fr. 3. p. 264. Satyrium epipodium L. sp. 1338. (v. v. in Helv.)





X. CYPRIPEDIUM L. gen. 1015.

Ovarium non contortum; perigonum laxe et subcruciatim patens; labellum maximum obtusum inflatum calceolatum; columnæ appendiculata stigma obtegens, antheræ 2 distinctæ laterales basi appendice lancolato instructæ; pollen granulosum.

1. *C. CALCEOLUS* (L. sp. 1346.) caule folioso, columnæ lobo elliptico obtuso, labello perigonii segmentis breviore compresso. ♀ in pratis umbrosis aut montanis passim. — Fl. fr. 3. p. 264. liliac. t. t. 19. — Hall. helv. t. 43. (v. v.)
-

Ordo XCIX. IRIDEÆ Juss. gen. 57.

Perigonum basi tubulosum, ovario adhaerens, petaloideum, sexfidum aut sexpartitum, sœpè irregulare. Stamina 3 segmentorum perigonii externorum basi inserta. Antheræ lineares extrorsum dehiscentes. Ovarium unicum triloculare multi-ovulatum, ovulis 2-seriatis; stylus unicus aut nullus; stigmata 3 simplicia aut laciniata, membranacea aut petaloidea. Capsula 3-locularis, trivalvis, valvulis medic septiferis, polysperma. Semina angulo loculorum interno adfixa. Embryo intrà albumen carnosum aut corneum. — Herbae radicibus tuberosis, foliis alternis ensiformibus aut linearibus, spathis membranaceis bivalvibus unifloris.

I. ~~IRIS~~ L. gen. 59.

Perigonum sexpartitum, laciniis tribus externis majoribus patulis, tribus interioribus minoribus erectis; stamina distincta; stylus brevis lacinias tres maximas petaloideas sœpius emarginatas gerens; stigmata 3 duplicaturæ laciniarum petaloidearum facie infera sitæ.

§. I. *Lacinia floris exterioribus intùs basi barbatis.*

1. *I. GERMANICA* (L. sp. 55.) barbata, foliis ensiformibus acuminatis glabris falcatis caule multifloro brevioribus, spathis scariosis, tubo ovario longiore, segmentis externis rotundo-orbicularibus. ♀ ad muros et tecta passim. — Fl. fr. 3. p. 236. Bull. herb. t. 141. — Moris. s. 4. t. 5. f. 10. n. 4. Fl. violacei. (v. v.)
2. *I. FLORENTINA* (L. sp. 55.) barbata, foliis ensiformibus glabris, scapo 1-3-floro, floribus subsessilibus, segmentis externis obovatis integris obtusis. ♀ in muris Galloprovinciæ orientalis. — Fl. fr. 5. p. 328. Red. lil. t. 23. — J. Bauh. hist. 2. p. 719. ic. — Lob. ic. t. 59. Fl. albi. (v. s.)
3. *I. FUCIFERA* (L. sp. 56.) barbata, scapo unifloro foliis ensiformibus glabris acutis mucronatibus breviore, tubo extrâ spatham exerto. ♀ in sterilibus montosis provinciæ australium, ad muros Fontiblandi. — Fl. fr. 3. p. 237. — Lob. ic. t. 63. f. 1. et t. 65. f. 1. Clus. hist. 1. p. 226. Fl. violacei aut pallidi. Floret ineunte vere. (v. v. DC.)
4. *I. LUTESCENS* (Lam. dict. 3. p. 297.) barbata, scapo subunifloro foliis ensiformibus acutis glabris longiore, tubo spathis scariosis inclusa, segmentis

exterioribus oblanceolato-ovatis. ♀ in maritimis propè Olbias, in Occitanâ ex cl. Benth., in agro Ruscinonensi ex Lapeyr., propè Fontembleaudi ex Mérat. — Fl. fr. 3. p. 237. Fl. lutescentes. Floret ad finem veris. (v. v. ex Valesiâ D.)

§. 2. *Lacinius floris externis imberibus.*

5. I. *PSEUDATORUS* (L. sp. 56.) imberbis, foliis ensiformibus caulem multiflorum æquantibus superantibusve, spathis viridibus, perigonii segmentis alternis stigmate minoribus, externis obovatis obtusissimis. ♀ in stagnorum oris et fossis aquaticis. — Fl. fr. 3. p. 237. Bull. herb. t. 137. — Moris. s. 4. t. 6. f. 6. n. 11. Fl. lutei. (v. v.)
6. I. *FÄTIDISSIMA* (L. sp. 57.) imberbis, foliis ensiformibus acuminatis caulem uniangulatum subsuperautibus, ovario trigono, angulis sulco bifidis, semi-nibus rubris carnosis bacciformibus. ♀ in dumetosis ad vias passim. — Fl. fr. 3. p. 238. Black. t. 158. — Lob. ic. t. 70. f. 1. Fl. atropurpurei. (v. v. DC.)
7. I. *XYPHOIDES* (Ehr. heit. 7. p. 140.) imberbis, foliis ensiformibus canaliculato-subulatis, caule bifloro, spathis viridibus, ovario trigono acutè angulato, perigonii segmentis exterioribus obovato-rotundis. ♀ in Pyrenæis editioribus. — Fl. fr. 3. p. 238. Red. lil. t. 212. Fl. cærulei. (v. v.)
8. I. *GRAMINEA* (L. sp. 58.) imberbis, foliis linearibus acuminatis caule compresso subbifloro longioribus, spathis viridibus, segmentis externis spathulatis, ovariis hexagonis. ♀ in collibus circâ Narbonam, Carcassonam, inter Rupellam et Rochefort ex Bon., in Vogesis propè Colmars ex Nestl. — Fl. fr. 3. p. 239. Jacq. aust. t. 2. — Lob. ic. t. 69. f. 1. Fl. violaceo-cærulei, segmentis exterioribus flavo striatis. (v. v. c.)
9. I. *PRATENSIS* (Lam. dict. 3. p. 300.) imberbis, caule subtrifloro tereti fistuloso subnudo foliis radicalibus linearibus angustissimis acuminatis longiore, spathis scariosis, perigonii segmentis externis oblanceolatis, ovariis trigonis. ♀ in pratis humidis Delphinatûs, Alsatiæ. — Fl. fr. 3. p. 239. I. sibirica L. sp. 57. Jacq. aust. t. 3. — Moris. s. 4. t. 6. f. 8. n. 13. Fl. cærulei. (v. s.)
10. I. *SISYRINCHIUM* (L. sp. 59.) imberbis, foliis linearis-canaliculatis contortis caulem 3-5-florum superantibus, spathâ scariosâ, segmentis extérnis ovatis. ♀ in Corsicâ propè Bonifacio reperiit cl. Soleiro. — Cav. ic. 2. t. 193. Moræa Sisyrinchium bot. mag. t. 1407. I. fugax Ten. neap. p. 15. t. 14. non Pers. Spata dilutè cærulea basi flavo notata. (v. s.)
11. I. *SPURIA* (L. sp. 59.) imberbis, caule subtrifloro tereti folioso, foliis linearibus acuminatis, spathis viridibus, perigonii segmentis externis spathulatis, ovariis hexagonis. ♀ in pratis Occitanæ, circâ Narbonam et Elne in agro Ruscinonensi ex Benth. — Fl. fr. 3. p. 239. Jacq. aust. t. 4. — Lob. ic. t. 68. f. 2. Flores cæruleo, violaceo et albo variegati. (v. v. DC.)
12. I. *TUBEROSA* (L. sp. 58.) imberbis, caule unifloro foliis tetragonis breviore, perigonii segmentis externis lanceolatis obtusissimis medio dilatatis scariosis. ♀ circâ Telonem, Aginnum, in Pictaviâ superiore ex cl. Desvaux. — Fl. fr. 5. p. 328. Red. lil. t. 48. Curt. bot. mag. t. 531. — Lob. ic. 98. Fl. viridi-squalidi, laciniis exterioribus apice atropurpureis velutinis. (v. s.)


II. *GLADIOLUS* Tourn. inst. 190. L. gen. 57.

Perigonium infundibuliforme, limbo 6-fido inæquali bilabiato; stigma trilobatum patens; semina arillata.

1. G. *COMMUNIS* (L. sp. 52.) flore subringente, spathis tubo longioribus, foliis secundis, foliis ensiformibus nervosis. ♀ in arvis Galliæ australis, ad radices Pyrenæorum, in Aquitaniâ ex Laterr., Audegaviâ ex Bast. — Fl. fr. 3. p. 240. — Lob. ic. t. 99. f. 1. (v. v.)

Health

Health



III. IXIA L. gen. 56.

Perigonium tubo plus minusve elongato, limbo patente 6-partito æquali; stigma 3-partitum, laciniis filiformibus patulis sæpè bifidis.

1. I. *BULBOCODIUM* (L. sp. 51.) foliis linearibus canaliculatis angulatis, scapo unifloro, floribus campanulatis, tubo brevissimo. ♀ in maritimis Corsicæ, Occitanie, Vasconia, Armoraciæ, Neustriæ (cl. Le Prévost). — Fl. fr. 3. p. 241. Lam. ill. t. 31. f. 1.

a. grandiflorum, scapis subgeminatis, stylo staminibus longiore, floribus majoribus. — I. Bulbocodium B. Red. lil. t. 88. Romulea Bulbocodium Seb. et Mauri. fl. rom. p. 17. — Col. eph. 2. t. 7. f. 1. Lob. ic. 141. Fl. ex albo ad roseum et rubro-violaceum variant. (v. v.)

β. parviflorum, scapo subsolitario, stylo staminibus breviore, floribus minoribus. — I. Bulboc. A. Red. lil. 88. Rom. Columnæ Seb. et Mauri rom. 18. — Col. ephr. 1. p. 327. Lob. ic. 142. Flores ex albo-lutescentes. (v. v.)

- IV. *CROCUS* Tourn. inst. 183. L. gen. 55. Gay in Féru. bull. sc. nat. jul. 1827. p. 346.

Perigonii tubus gracilis limbo duplò longior, limbis 6-partitus æqualis erectus; stigmata 3 crassa convoluta sæpius cristata.

1. C. *SATIVUS* (All. ped. n. 310.) spathâ duplice, perigonii fauce densè barbatâ, stigmate tripartito longitudine perigonii pendulo, foliis cum flore nascentibus enerviis margine revolutis ciliolatis. ♀ ex Oriente ortus, in agris cultus. — Fl. fr. 3. p. 241. C. sativus *α* L. Lam. ill. t. 30. f. 1. C. *autumnalis*. eng. bot. t. 343. (v. v. c.)
2. C. *MULTIFIDUS* (Ram. bull. phil. n. 41. t. 8. f. 1.) stigmate trifido multifido erecto perigonio subæquali, foliis ante flores nascentibus revolutis. ♀ in Corbariensibus, Pyrenæis, in agro Syrtico propè Dax. — Fl. fr. 3. p. 242. C. *nudiflorus* Smith. eng. bot. t. 491. Fl. violacei. (v. s.)
3. C. *VERNUS* (All. ped. n. 309.) spathâ simplici, perigonii fauce pilis longis barbatâ, stigmate trifido erecto perigonio breviore, foliis cum flore nascentibus linearibus planis. ♀ in pratis Alpium, Cebennarum, Pyrenæorum. — Fl. fr. 3. p. 242. excl. var. *γ*. eng. bot. t. 344. C. sativus *β*. L. sp. 50. Fl. albi aut violacei. (v. v.)
4. C. *MINIMUS* (Red. lil. 2. t. 81.) spathâ plerumque simplici, perigonii fauce glabrâ, stigmate trifido erecto perigonio breviore, foliis ante flores nascentibus angustissimis filiformibus. ♀ in Corsicâ. — Fl. fr. 3. p. 243. C. *nanus* DC. syn. gall. p. 168. Fl. violacei albo variegati. (v. s.)
5. C. *VERSICOLOR* (Gawl. in bot. mag. t. 1110.) spathâ duplice, perigonii fauce glabrâ, stigmate erecto, foliis cum flore nascentibus canaliculatis nervosis, capsulâ sex-striatâ. ♀ circa Nioçam et in Galloprovinciâ orientali ex cl. Gay. l. c.

Ordo C. AMARYLLIDÆ R. Brown. prod. 296. — Narcissi Juss. gen. 54. excl. gen. — Liliacearum tribus 3^a DC. fl. fr. 3. p. 229. excl. gen.

Perigonium monophyllum tubulosum, ovario adhærens, 6-partitum, æstivatione imbricatâ, laciniis tribus exterioribus interiores equitantibus. Stamina 6 filamentis liberis aut coali-tis; antheræ introrsæ. Ovarium inferum 3-loculare, loculis polyspermis; stylus simplex; stigma trilobum. Capsula trivalvis, valvis medio septiferis, polysperma; aut bacca 1-3-sperma. Albumen carnosum. Embryo rectiusculus. Radicula umbili-cum spectans. — Radices bulbosæ aut fibrosæ. Flores umbel-lati aut solitarii.

I. AMARYLLIS L. gen. 400.

Perigonium infundibuliforme 6-partitum, fauce squamulis 6 instruc-tum; stigma trifidum; stamina 6 sæpius declinata aut inæqualia.

1. A. LUTEA (L. sp. 420.) spathâ indivisâ obtusâ, flore sessili, perigonio campanu-lato erecto basi breviter tubuloso, staminibus erectis, alternis brevioribus. \mathcal{U} in pratis Monspelii, insulæ Nigri-Monasterii. — Fl. fr. 3. p. 229. lil. 3. t. 148. — Lob. ic. t. 147. f. 2. (v. s.)

II. PANCRATIUM L. gen. 404.

Perigonium infundibuliforme, limbo patente 6-partito; stamina 6 apici tubi inserta, filaments coalita ope coronæ seu membranæ sub-cylindricæ; stigma simplex.

1. P. MARITIMUM (L. sp. 418.) foliis linear-lanceolatis, spathâ multiflorâ, corona sinubus bidentatis. \mathcal{U} in arenosis et rupibus maritimis prov. Mediter-ranearum et austro-occidentalium. — Fl. fr. 3. p. 230. lil. 1. t. 8. Salish. trans. linn. 2. t. 9. (v. v.)
2. P. ILLYRICUM (L. sp. 418.) foliis lanceolatis, spathâ multiflorâ, corona sinu-bus dentatis, dentibus acutis bifidis patentibus. \mathcal{U} in Corsicâ, et arenosis maritimis oræ meridionalis insulæ Rè ex Moris. — Fl. fr. 5. p. 319. bot. mag. 718. Red. lil. t. 153. — Clus. hist. 1. p. 168. f. 1. (v. s.)


III. NARCISSUS L. gen. 403.


Perigonium infundibuliforme, limbo patente 6-partito; corona (nec-tarium L.) ad faucem petaloidea cylindrica vel campanulata, integra aut divisa; stamina 6 tubo inserta, intrâ coronam latitantia.

Sect. 1. *Pseudo-Narcissi* DC. fl. fr. 5. p. 319.

Folia plana glaucescentia, scapus uniflorus; tubus brevis obconicus, corona campanulata dentata.

1. N. PSEUDO-NARCISSUS (L. sp. 414.) foliis planisculis glaucescentibus lato-li-nearibus obtusis, scapo striato subpresso ancipiti unifloro, flore in spathâ subsessili, coronæ campanulatae limbo patulo undulato inciso laciniis peri-gonii concoloris planas ovatas pateentes æquante. \mathcal{U} in sylvis pratisque. — Fl. fr. 3. p. 231. N. major Curt. bot. mag. 51 et 1301. Fl. fr. 5. p. 320. (v. v.)





2. *N. MINOR* (L. sp. 415.) foliis planiusculis glaucescentibus lato-linearibus obtusis, scapo ancipiū exstriato unifloro, flore in spathā longē pedicellato, coronā obconīca subsexfidā dentatā lacinis oblongo-lanceolatis paulò longiore. \mathcal{L} in Pyrenæis et ericetis circū Dax. — Fl. fr. 5. p. 320. Curt. bot. mag. t. 6. — Barr. ic. 975. — Rudb. elys. 2. p. 82. f. 11. (v. s.)
3. *N. MOSCHATUS* (L. sp. 415.) foliis planiusculis glaucescentibus lato-linearibus obtusis, scapo ancipiū exstriato unifloro, flore in spathā subsessili, coronā cylindricā limbo erecto repando-crenato perigonii cernui lacinias ovatas lanceolatasve æquante. \mathcal{L} Hispaniae et Lusitaniæ indigenus, in hortis cultus. — Fl. fr. 5. p. 320. bot. mag. 1300. N. candidissimus Red. lil. 4. t. 188. N. bicolor L. sp. 415. N. Hispánicus Gou. ill. 23. — Barr. ic. t. 945. 946. 953. 954. — Moris. s. 4. t. 8. f. 9. — Lob. ic. t. 117. f. 1. 2. Variat flor. candidis, bicoloribus aut flavis. (v. v. c.)
4. *N. INCOMPARABILIS* (Mill. dict. n. 3.) foliis planiusculis glaucescentibus lato-linearibus obtusis, scapo subcylindrico ancipiū unifloro, flore in spathā subsessili, tubo subcylindrico, coronā campanulatā erectā margine crenulatā subsexlobatā laciñis ovatis dimidio breviore. \mathcal{L} in pratis Occitaniae, Galloprov. — Fl. fr. 5. p. 321. Curt. bot. mag. t. 121. N. Gouani Red. lil. 4. t. 220. — Barr. ic. t. 927. 928. 931. 932. — Moris. s. 4. t. 8. f. 8. (v. v.)

Sect. II. Poeticī DC. fl. fr. 5. p. 321.

Folia planiuscula glaucescentia, scapi 1-aut-multiflori; florū tubus cylindricus elongatus; corona brevis rotata margine scarioso crenato.

5. *N. POETICUS* (L. sp. 414.) foliis planiusculis glaucescentibus lato-linearibus obtusis obtusè carinatis, scapo subcylindrico striato ancipiū 1-floro, coronā brevissimā rotatā margine scarioso crenulato discolore, perigonii laciñis ovatis. \mathcal{L} in pratis. — Fl. fr. 3. p. 230. Bull. herb. t. 306. N. angustifolius bot. mag. t. 193. (v. v.)
6. *N. BIFLORUS* (Curt. bot. mag. t. 197.) foliis planiusculis glaucescentibus lato-linearibus acutè carinatis, scapo ancipiū 1-3-floro, coronā rotatā brevissimā crenulatā margine concolore criso, laciñis lato-ovatis. \mathcal{L} in pratis Armoracie, Andegaviae, Occitaniae, Galloprov. — Fl. fr. 5. p. 321. eng. bot. t. 276. N. orientalis L. mant. 62, non Ait. — Dod. pemp. 223. f. 2. (v. v.)

Sect. III. Tazettæ DC. l. c.

Folia planiuscula glaucescentia, scapus multiflorus; florū tubus tereti-elongatus, corona cupularis integra aut subdentata.

7. *N. TAZETTA* (L. sp. 416.) foliis planiusculis glaucescentibus lato-linearibus obtusis, scapo subcylindrico laevi subancipiū 3-10-floro, coronā cyathiformi integrā ore constrictā laciñis subtriplo breviore, perigonii discoloris laciñis lanceolato-ovatis acutis tubo brevioribus. \mathcal{L} in pratis prov. austral. — Fl. fr. 5. p. 322. 3. p. 231. excl. var. α . et γ . bot. mag. t. 925. — Dod. pemp. 224. f. 1. — Bar. ic. t. 943, 944, 918, 919. (v. v. DC.)
8. *N. POLYANTHOS* (Lois. narc. 36.) foliis planiusculis subvirescentibus lato-linearibus obtusis, scapo subcylindrico ancipiū 8-20-floro, coronā cyathiformi subintegerrimā laciñis ovatis alterne latioribus subtriplo breviore. \mathcal{L} in pratis circū Telonem, Nicæam ex cl. Spreng. — Fl. fr. 5. p. 323. — Lob. hist. 60. ic. — Barr. t. 915. — Moris. s. 4. t. 8. f. 2. (v. s.)
9. *N. STELLATUS* (DC. fl. fr. 3. p. 323.) foliis planiusculis glaucescentibus lato-linearibus obtusis, scapo compresso ancipiū 3-10-floro, pedicellis angulatis, coronā cyathiformi denticulatā ore vix constrictā laciñis oblongis triplo breviore. \mathcal{L} circū Telonem ex Lois. — N. niveus et N. subalbidus Lois. narc. 37. — Barr. ic. t. 916 et 962. — Rudb. elys. p. 50. f. 2. p. 52. f. IX. (v. s. ex Neap.)
10. *N. CHRYSANTHUS* (DC. fl. fr. 5. p. 323.) foliis planiusculis rigidis subglaucescentibus lato-linearibus obtusis, scapo 3-10-floro, coronā cyathiformi int-

gerrimâ ore subconstrictâ laciniis lanceolatis ovatis apiculatis discoloribus triplò breviore. ♀ circâ Grasse. — Barr. ic. t. 961. (v. s.)

11. *N. DUBIUS* (Gou. ill. 22.) foliis planiusculis glaucescentibus linearibus obtusis, scapo lœvi obtuse compressissimo 2-6-floro, coronâ cyathiformi denticulatâ ore vix constrictâ laciniis ovalibus obtusis duplò breviore. ♀ in rupes tribus Monspelii, Gallopr. infer. — Fl. fr. 5. p. 324. Red. lil. t. 429. *N. compressus* Haw. — C. Bauh. prod. 27. ic. — Rudb. elys. 2. p. 51. f. 2. (v. s.)

12. *N. PATULUS* (Lois. narc. 34.) foliis subcanaliculatis angustis glaucescentibus patulis, scapo subcylindrico 2-6 floro, coronâ cyathiformi integrâ laciniis ovatis alterne latioribus dimidio breviore. ♀ in Stæchadum insulis, circâ Massiliam (Solier.). — Fl. fr. 5. p. 324. — Rudb. elys. 2. p. 52. f. 2. (v. s.)

13. *N. CALATHINUS* (L. sp. 415.) foliis linearibus obtusis planiusculis glaucescentibus, scapo subcylindrico 2-4 floro, coronâ campanulatâ subintegrâ laciniis lanceolatas subreflexas tubo longiores æquante. ♀ in Armoraciæ insulis Glenans. — Fl. fr. 5. p. 324. Red. lil. t. 177. — Rudb. elys. 2. p. 60. f. 5. (v. s.)

Sect. iv. *Bulbocodii DC. fl. fr. 5. p. 325.*

Folia semi-cylindrica virentia, scapi uni-aut-multiflori; corona ampla obconica laciniis floris angustas æquans aut subsuperans.

14. *N. BULBODIUM* (L. sp. 417.) foliis semi-cylindricis angustissimis virentibus, scapo cylindrico lœvi unifloro, coronâ turbinatâ integrâ laciniis linearis lanceolatas acutas subsuperante. ♀ in Pyrenæis, ericetis Bayonæ, Aquarum - Tarbellicarum. — Fl. fr. 3. p. 231. lil. 1. t. 24. — Lob. ic. t. 118. f. 1, 2. (v. s.)

Sect. v. *Junquillæ DC. l. c.*

Folia subulata aut semi-cylindracea plus minusve canaliculata, scapi sèpissimè multiflori; corona campanulata segmentis duplò triplò brevior.

15. *N. SEROTINUS* (Clus. hist. 1. p. 162. L. sp. 417.) foliis subulatis, scapo gracili cylindrico 1-∞-floro, tubo elongato laciniis subduplicato longiore, coronâ suberectulatâ brevissimâ, laciniis oblongo-lanceolatis mucronatis. ♀ in Corsicâ propè Calvi (cl. Soleir.). — Desf. atl. 1. t. 82. — Lob. ic. 122. (v. s.)


16. *N. JUNQUILLÆ* (L. sp. 417.) foliis subulato-semicylindraceis viridibus, scapo cylindrico 2-6-floro, coronâ cyathiformi ore dilatatissima integra laciniis ovatis triplò breviore, tubo laciniis duplò longiore. ♀ in asperis Galloprov. et Occitanie. — Fl. fr. 3. p. 232 et 5. p. 325. Bull. herb. t. 334. — Moris. s. 4. t. 8. f. 6. (v. v. c.)

17. *N. INTERMEDIUS* (Lois. gall. 191. t. 7.) foliis canaliculatis basi subsemi-cylindraceis viridibus, scapo subcylindrico 1-3-floro, coronâ cyathiformi ore dilatata crispâ subintegrâ laciniis lato-ovatis quadruplò breviore. ♀ in Pyrenæis, Bayonæ. — Fl. fr. 5. p. 325. Red. lil. t. 427. — Moris. s. 4. t. 8. f. 5. (v. s.)

18. *N. OCHROLEUCUS* (Lois. narc. 38.) foliis canaliculatis dorso semi-cylindraceis, scapo subcylindrico lœvi 4-8-floro, coronâ cyathiformi integrerrimâ laciniis ovato-subrotundis alterne latioribus dimidio breviore. ♀ in agris circâ Telonem ex Lois. — Fl. fr. 5. p. 326. †

19. *N. ODORUS* (L. sp. 416.) foliis linearibus semi-cylindraceis canaliculatis viridibus, scapo cylindrico 1-5-floro, coronâ campanulatâ 6-lobatâ lœvi laciniis ovatis dimidio subbreviore. ♀ in pratis provinc. occid. et australium. — Fl. fr. 5. p. 326. Red. lil. t. 157. *N. calathinus* Gawl. bot. mag. t. 934. non L. — Clus. hist. 1. p. 158. f. 1. (v. v. DC.)

20. *N. LÆTUS* (Salisb. prod. 224.) foliis linearibus canaliculatis apice planiusculis viridibus, scapo 1-3-floro, coronâ campanulatâ subsexfidâ repandâ crispede-



laciñis lanceolato-ovatis dimidio ferè breviore. ♀ circà Grasse. — Fl. fr. 5. p. 327. Red. lil. t. 428. N. odorus bot. mag. t. 78, non L. (v. s.)

IV. LEUCOTIUM L. gen. 402.

Perigonum tubo brevi, limbo campanulato sexpartito æquali, laciñis apice crassiusculis; stigma simplex.

§. 1. *Stylo apice clavato.*

1. *L. VERNUM* (L. sp. 414.) spathâ uniflorâ. ♀ in pratis humidis et umbrosis montium. — Fl. fr. 3. p. 233. Lam. ill. t. 230. f. 1. (v. v.)
2. *L. ESTIVUM* (L. sp. 414.) spathâ multiflorâ. ♀ in pratis umbrosis Galliae australis. — Fl. fr. 3. p. 233. Lam. ill. t. 230. f. 2. eng. bot. t. 621. (v. v. DC.)

§. 2. *Stylo filiformi.*

3. *L. AUTUMNALE* (L. sp. 414.) spathâ monophyllâ biflorâ pedicello supremo breviore, perigonii lobis ovalibus obtusis, internis apice 3-dentatis stamina duplò triplò superantibus. ♀ in saxosis Corsicæ, Niceæ, Monspelii ex Gonan. — Fl. fr. 3. p. 233. lil. t. 150. f. 2. — Ren. spec. t. 100. (v. s.)
4. *L. HYEMALE* (DC. fl. fr. 5. p. 327.) spathâ diphyllâ 1-2-florâ pedicellis longiore, perigonii lobis lanceolatis acutis integris stamina paulò superantibus. ♀ in saxosis.
 - a. *alba*, flore albo. — Niceæ. (v. s.) *
 - β. *rosea*, flore roseo. — In Corsicâ. — *L. roseum* Lois. gall. t. 8. *L. trichophyllum* DC. syn. 1986*. Red. lil. t. 150. f. 1. non Schousb. (v. s.)

V. GALANTHUS L. gen. 401.

Perigonum sexpartitum, laciñis tribus interioribus externis duplò brevioribus emarginatis; stigma simplex.

1. *G. NIVALIS* (L. sp. 413.) ♀ in pratis umbrosis montanis. — Fl. fr. 3. p. 234. Lam. ill. t. 230. — Moris. s. 4. t. 9. f. 11. n. 23. Scapus 1-florus. Perigonii segmenta 3 externa oblonga alba, interna viridiania. (v. v.)

Ordo CI. ASPARAGEÆ *Juss. gen. 40. DC. fl. fr. 3. p. 172.* —
Asparagineæ *Ach. Rich. in dict. class. 2. p. 20.*

Flores hermaphroditæ monoici aut dioici. Perigonium peta-loideum, liberum aut ovario adhærens sæpius 6-partitum interdùm 6-fidum aut 4-8-partitum. Stamina tot quot perigonii laciniæ, iisdem basi adhærentia; filamenta libera, rarissimè (in Rusco) in urceolum coalita. Ovarium unicum 3-lo-culare 1-aut-∞-ovulatum, ovulis angulo interno adfixis. Stylus 1-4-5; stigmata 3-4. Bacca aut capsula sphærica 3-4-loocularis abortu aliquando unilocularis, loculis 1-3-spermis. Embryo in albumine carneo aut carnoso, sæpius minimus. — Herbæ aut suffrutices habitu vario; folia non vaginantia interdùm verticillata, rariū ad axillam stipulæ nascentia. Flores ad axillam bracteolæ siti, variè dispositi.

† FLORES HERMAPHRODITI; OVARIUM LIBERUM.


I. *ASPARAGUS Tourn. inst. 154. L. gen. 424.*

Perigonium liberum 6-partitum, stamina 6; bacca trilocularis loculis dispermis rariū abortu monospermis.

1. *A. OFFICINALE* (L. sp. 448. excl. var. β.) caule herbaceo tereti erecto ramosissimo, foliis setaceis fasciculatis, stipulis minimis ovatis acuminatis, floribus sæpius abortu diclinis, pedunculis medio articulatis. ♀ in arenosis maritimis Galliæ australis et austro-occidentalis, in hortisque cultus. — Fl. fr. 3. p. 173. — Black. t. 332. Fasciculi foliis 4-6 constant. (v. v.)
2. *A. AMARUS* (DC. cat. monsp. 81.) caule herbaceo tereti erecto subscabro, foliis rigidis setaceis fasciculatis, stipulis spinescentibus patulis subuncinatis, floribus abortu diclinis, pedunculis medio articulatis. ♀ in arenosis maritimis Monspelii, Aquarum - mortuarum. — Fl. fr. 5. p. 309. Red. lil. t. 446. — Clas. hist. 2. p. 179. ic. Fasciculi foliis 4-6 constant. (v. v. DC.)
3. *A. TENUIFOLIUS* (Lam. dict. 1. p. 294.) caule herbaceo tereti erecto ramosissimo, foliis tenuissimis fasciculatis, floribus hermaphroditis, pedunculis longis sub flore articulatis. ♀ in pratis umbrosis et montosis Cebennarum, Avenionis, Gratianopolis ex cl. Mirbel. — Fl. fr. 3. p. 173 et 5. p. 309. Fasciculi foliis 10-20 constant. (v. v. DC.)
4. *A. ACUTIFOLIUS* (L. sp. 449.) caule fruticoso inermi angulato, foliis aciformibus brevibus rigidulis perennantibus mucronatis æqualibus. ♀ in sterilibus et lapidosis Galliæ mediterraneæ. — Fl. fr. 3. p. 173. — Clas. hist. 2. p. 178. f. 1. (v. v.)
5. *A. ALBUS* (L. sp. 449.) caule fruticoso spinoso tereti flexuoso, aculeis solitariis rectis, foliis fasciculatis triquetris obtusis deciduis, floribus pedunculatis aggregatis, baccis 1-2-spermis. ♂ in Corsicâ propè Ajaccio detexit cl. Soleiro. — Clas. hist. 179. ic. — Moris. s. 1. t. 1. f. 3. (v. s.)

II. *STREPTOPUS Mich. fl. bor. amer. 1. p. 200. DC. fl. fr. 3. p. 174.* — *UVULARIAE* sp. L.

Perigonium 6-partitum, laciniis soveâ basi nectariferâ instructis; stamina 6; antheræ filamentis longiores; bacca lævis, cortice tenui-





1. **S. AMPLEXIFOLIUS** (DC. l. c.) foliis amplexicaulibus cauleque glabris. ♀ in Vogesis, Jurasso, Alpibus, montibus Arvernæ, Pyrenæis. — *Uvularia amplexifolia* L. *Convallaria dichotoma* Thib. in Pers. *ench.* 1. p. 373. *Fl. fr.* 5. p. 309. — Barr. t. 719 et 720. (v. v.)

III. PARIS Lin. gen. 500.

Perigonum expansum 8-partitum, laciniis 4 externis latioribus calycem, 4 internis angustioribus corollam mentientibus; stam. 8; antheræ mediis filamentis adnatæ; stigma 4; bacca 4-locularis, loculis 6-8-spermis.

1. **P. QUADRIFOLIA** (L. sp. 527.) ♀ in nemorosis. — *Fl. fr.* 3. p. 175. — Tourn. t. 117. — Moris. s. 13. t. 3. f. 11. n. 6. (v. v.)

- IV. **CONVALLARIA** Roth. *germ.* 1. p. 147. *DC. fl. fr.* 3. p. 175. — *Convallariæ* sp. L.

Perigonum globosum vel cylindricum 6-dentatum; stamina 6; bacca globosa antè maturitatem maculata 3-locularis loculis 1-spermis.

Sect. I. POLYGONATUM *Tourn. inst.* 14.

Flores cylindrici.

1. **C. VERTICILLATA** (L. sp. 451.) caule recto, foliis verticillatis ellipticis. ♀ in umbrosis. — *Fl. fr.* 3. p. 175. — Clus. *hist.* 1. p. 277. f. 1. (v. v.)

2. **C. POLYGONATA** (L. sp. 451.) glabra, caule auncipi, foliis ovato-lanceolatis alternis amplexicaulibus, pedunculis axillaribus subunifloris. ♀ in nemorosis et dumetis. — *Fl. fr.* 3. p. 176. *Fl. dan.* t. 377. (v. v.)

3. **C. MULTIFLORA** (L. sp. 450.) glabra, caule tereti, foliis alternis amplexicaulibus ovato-ellipticis, pedunculis axillaribus multifloris. ♀ in nemorosis et dumetis. — *Fl. fr.* 3. p. 176. *C. latifolia* Hoffm. *germ.* 3. p. 162. *Fl. fr.* 3. p. 176. non Jacq. — Clus. *hist.* 1. p. 275. f. 2. (v. v.)

£. *bracteata*, floribus bracteâ suffultis. — In Vogesis propè Thann ex cl. Rœper. (v. s. ex Helv.)

Sect. II. COLOCRINON. — *Lilium Convallium* *Tourn. inst.* 14.

Flores campanulati.

4. **C. MAYALTS** (L. sp. 451.) scapo nudo, foliis ovato-lanceolatis, floribus racemoso-spicatis, pedicellis nutantibus. ♀ ad sepes, in nemorosis. — *Fl. fr.* 3. p. 177. *Lam. ill.* t. 248. — *Cam. ep.* 618. *ic.* (v. v.)

- V. **MAYANTHEMUM** Roth. *germ.* 1. p. 70. *DC. fl. fr.* 3. p. 177. — *Smilacinae* sp. *Desf.* — *Convallariæ* sp. L.

Perigonum 4-partitum laciniis patentibus; stamina 4; bacca sæpiùs ante maturitatem maculata 2-locularis, loculis 1-spermis.

1. **M. ALPINUM** (DC. *fl. fr.* 3. p. 177.) foliis alternis cordatis subpetiolatis. ♀ in sylvis montanis. — **M. Convallaria** Roth. l. c. 2. p. 196. **Convallaria bifolia** L. sp. 452. *Fl. dan.* t. 291. — Moris. s. 13. t. 4. f. 10. n. 7. (v. v.)

† FLORES DIOICI; OVARIUM LIBERUM.

VI. SMILAX L. gen. 1120.

Perigonum campanulato-patens, 6-partitum. *Masc.* Stamina 6, distincta. *Fem.* Ovarium 1; styli 3; stigma 3; bacca globosa 3-locularis.

1. *S. ASPERA* (L. sp. 1458.) caule subdumoso spinoso hinc inde flexo, foliis cordiformibus dentato-aculeatis. ♂ in provinciis mediterraneis et propè Bayonam. — Fl. fr. 3. p. 178. — Clus. hist. 1. p. 112. f. 2. p. 113. f. 1. (v. v.)
2. *S. MAURITANICA* (Poir. itin. 2. p. 363.) caule scandente subspinoso, foliis cordatis subinermibus. ♂ in Corsicâ et insulis Stæchadum. — Fl. fr. 3. p. 179. *S. excelsa* Duh. arb. ed. nov. 1. t. 54. excl. syn. (v. s.)

VII. **RUSCUS** *Tourn. inst. 15. L. gen. 1139.*

Perigonium 6-partitum saepius expansum; filamenta coalita in tubum apud femineos flores nudum, apud mares antheras 6 gerentem; stylus 1; stigma 1; bacca globosa 3-locularis, loculis 2-spermis.

1. *R. ACUTIFERUS* (L. sp. 1474.) caule rigido ramoso, foliis supra floriferis nudis. ♂ in umbrosis. — Fl. fr. 3. p. 180. Lam. ill. t. 835. — Lob. ic. t. 637. f. 2. (v. v.)
2. *R. HYPOGLOSSUM* (L. sp. 1474.) caule flexuoso subramoso, foliis nitidis medio floriferis, glomerulis florum basi foliolo acuto instructis. ♂ in lapidosis et sterilibus circa Nicæam ex All. — Fl. fr. 3. p. 180. — Lob. ic. t. 638. f. 1. (v. s. c.)

††† FLORES DIOICI; OVARIUM ADHÆRENS.

VIII. **TAMUS** *Lin. gen. 1119. — Tamnus Tourn. inst. 28.*

Perigonium campanulatum 6-partitum, in maribus hexandris patens, in femineis ovario adhærens et supra constrictum; stylus 1; stigmata 3; bacca 3-locularis.

1. *T. COMMUNIS* (L. sp. 1458.) foliis cordatis indivisis. ♀ ad sepes et in nemorosis. — Fl. fr. 3. p. 181. Lam. ill. t. 817. (v. v.)



Salpazilla

Ordo CII. LILIACEÆ DC. *theor. elem. ed. 1. p. 249.* — Lilia et Asphodeli Juss. gen. — Liliacearum tribus I et II. DC. fl. fr. 3. p. 198.

Flores hermaphroditæ. Perigonium petaloideum liberum sæpè tubulosum 6-fidum aut 6-partitum, segmentis dupli-
serie dispositis. Stamina 6 perigonii laciniis opposita et cum iisdem sæpius adnata. Ovarium 1 liberum sessile trigonum multiovulatum, ovulis longitudinaliter 2-seriatis. Stylus unicus longitudinaliter trisulcatus, rarius nullus. Stigmata 3 aut 1 triquetrum. Capsula 3-locularis 3-valvis, valvulis medio septiferis. Semina plurima angulo loculi interno adfixa, tegumento crustaceo membranaceo aut spongioso instructa. Embryo intrà albumen carnosum aut cartilagineum. Radieula ad hylum versa. — Herbæ nunc bulbosæ, foliis radicalibus, nunc caulescentes foliis caulinis. Folia vaginantia aut sessilia, nervis sæpissimè parallelis simplicibus. Flores spathacei aut bracteati, racemosi aut umbellati.

Trib. I. TULIPACEÆ. — Liliaceæ Juss. gen. 48.

Semina plana, stigmata 3.

I. TULIPA Tourn. *inst. 199. L. gen. 415.*

Perigonium campanulatum 6-petalum aut 6-partitum laciniis basi non nectariferis; stigmata crassa sessilia; capsula oblonga trigona.

* *Bulbis lanuginosis.*

1. T. SUAVEOLENS (Roth. cat. 1. p. 45.) foliis lato-lanceolatis, caule unifloro foliorumque paginâ superiore pubescens, flore erecto, perigonii segmentis ovatis acutis glabris. ♂ in hortis culta. — Fl. fr. 3. p. 199. Red. lil. t. III. — Tulipa pumilio Loh. ic. t. 127. (v. v. c.)
2. T. GESSNERIANA (L. sp. 438.) foliis lanceolatis undulatis, caule unifloro glabro, flore erecto, staminum filamentis glabris, perigonii segmentis ob-ovatis obtusis glabris. ♂ in hortis culta, spontanea in montibus Niceæ (Stire). — Fl. fr. 3. p. 200. Lam. ill. t. 244. — Moris. s. 4. t. 17. f. 1, 2. Flores mirum in modum colore variant. (v. s. ex mont. Niceænsibus.)
3. T. OCULUS-SOLIS (St. Am. rec. soc. agric. agen. 1. p. 75. et fl. agen. p. 145. t. 3.) caule unifloro glabro, foliis oblongo-lanceolatis, inferioribus lato-lanceolatis undulatis, segmentis ovali-lanceolatis tribus exterioribus acuminatis apice glabris, interioribus apice obtusiusculis. ♂ in arvis cultis circâ Aginnum, Monspelium, in Galloprovinciâ et circâ Nicæam (Stire). — Fl. fr. 3. p. 200. Lil. 1. t. 60. Segmenta rubra basi maculâ atro-cæruleâ margine flavâ notata. (v. s.)
4. T. CLUSIANA (DC. in Red. lil. 1. t. 37.) caule unifloro glabro, foliis linearibus acuminatis glabris, infimo vaginante, flore erecto, perigonii segmentis lanceolatis exterioribus acutis. ♂ in vineis circâ Bordigalam ex cl. Des Moulins, Monspelium ex cl. Benth., Telonem, Grasse, Nicæam (Stire). — Fl. fr. 5. p. 314. — Clns. cur. post. p. 9. ic. Segmenta externa dorso purpurea margine albida, interna alba ungue purpureo. (v. s.)

** *Bulbis lanagine carentibus.*

5. T. CELSIANA (DC. in Red. lil. 1. t. 38.) caule unifloro glabro, foliis lanceolato-linearibus acuminatis canaliculatis, flore erecto, perigonii segmentis oblongo-lanceolatis acutis apice glabris, staminibus basi hirsutis. ♀ in pratis provinciarum mediterranearum. — Fl. fr. 5. p. 313. Fl. flavi. An sequentis varietas. (v. s.)
6. T. SYMESTRIS (L. sp. 438.) caule unifloro glabro, foliis lato-linearibus acuminatis, flore subnudante, segmentis lato-lanceolatis acutis apice barbatis, staminibus basi hirsutis. ♀ in pratis montanis passim. — Fl. fr. 3. p. 199. fl. dan. t. 375. Fl. flavi. (v. v.)

II. TRITILLARIA L. gen. 411.

Perigonium campanulatum 6-partitum, laciniis basi fovea nectarifera ovata excavatis.

Sect. I. MELEAGRIS. — *Fritillaria Lin. hort. cl. 119. Juss. gen. 49.*

Fovea nectarifera oblonga. — Radix 2-tuberulata, flores terminales.

1. F. MELEAGRIS (L. sp. 436.) foliis omnibus alternis linearibus canaliculatis, caule unifloro. ♀ in pascuis humidis provinciarum occidentalium, Alpium, Jurassi rariū. — Fl. fr. 3. p. 201. Lam. ill. t. 245. f. 1. — Moris. s. 4. t. 18. f. 1. 2 et 3. Fl. tesserati. (v. v.)
2. F. PYRENAICA (L. sp. 436.) foliis linearibus canaliculatis inferioribus oppositis, caule 2-3-floro rariū unifloro. ♀ in Pyrenæis, montibus Delphin. Gallop. — Fl. fr. 3. p. 201. Fl. violacei, minus tesserati. An satis à priore distincta? (v. v.)

Sect. II. PETILIUM *Lin. hort. cl. 119. — Imperialis Juss. gen. 49.*

Fovea nectarifera rotunda. — Radix tuberosa tunicata, caulis apice foliosis, flores axillares cernui.

3. F. IMPERIALIS (L. sp. 435.) racemo comoso infernè nudo, floribus reclinatis. ♀ ex Oriente orta, in hortis culta. — Fl. fr. 3. p. 201. Lam. ill. t. 245. f. 2. — Moris. s. 4. t. 19. f. 2 et 4. (v. v. c.)

III. FILIUM Tourn. inst. 195. L. gen. 410.

Perigonium campanulatum, laciniis 6 profundis rectis aut extus revolutis, supra sulco longitudinali fimbriato vel nudo ad basin excavatis.

Sect. I. LILIASTRUM.


Flores campanulati, segmentis sessilibus.

1. L. LACUNOSUM (L. sp. 433.) foliis lanceolatis sparsis undulatis, floribus pendiculatis terminalibus intus glabris. ♀ in hortis cultum, in Jurasso forte spontaneum. — Fl. fr. 3. p. 202. Black. herb. t. 11. — Moris. s. 4. t. 21. f. 1. (v. v. c.)
2. L. BULBIFERUM (L. sp. 433.) foliis sparsis linear-lanceolatis planis, floribus campanulatis erectis terminalibus intus scabris. ♀ in Alsatiæ, Delphin., Galloprov. montosis humidis, in Alpibus et Pyrenæis rariū, propè Noyon (cl. Graves). — Fl. fr. 3. p. 202. Jacq. aust. t. 226. Red. lil. t. 210. — Lob. ic. t. 164 et 165. Fl. crocei nigro maculati. (v. v.)

Sect. II. MARTAGON.

Perigonia revoluta.

3. L. POMERANUM (L. sp. 434.) foliis sparsis linear-subulatis, infimis lanceo-





- latis obtusis, floribus paucis intus papilloso-dentatis, segmentis linearis-lanceolatis acutis. ♀ in montibus Delph. ex Villars, Gallopr. ex Gér. — Fl. fr. 3. p. 202. lil. t. 7. Fl. coecinei. (v. s. ex mont. Nicæens.)*
4. *L. PYRENAICUM* (Gou. obs. 25.) foliis sparsis linearis-lanceolatis, floribus paucis subumbellatis, segmentis linearis-lanceolatis obtusis. ♀ in Pyrenæis rariis. — Fl. fr. 3. p. 203. — Clus. hist. app. p. 256. f. 1 et 2. Fl. flavi. (v. v. DC.)
5. *L. MONTANUM* (L. sp. 435.) foliis verticillatis ovato-lanceolatis, floribus cernuis. ♀ in sylvis montanis. — Fl. fr. 3. p. 203. Jacq. aust. t. 351. Red. lil. t. 146. — Moris. s. 4. t. 20. f. 2. n. 7. Fl. rubelli aut albicans maculati. (v. v.)

Trib. II. ASPHODELEÆ. Juss. gen. 51.

Semina rotundata vel angulosa, testâ crustaceâ.

† STIGMATA TRIA.

IV. ERYTHRIONIUM L. gen. 414. DC. fl. fr. 5. p. 313.

Perigonium campanulatum patentissimum 6-partitum, lacinias petaloideis, tribus interioribus basi intus bicallosis; stylus elongatus; stigmata 3; capsula globosa basi angustior; semina rotundata.

1. *E. DENS-CANIS* (L. sp. 437.) foliis lato-lanceolatis maculatis, perigonii segmentis oblongo-ellipticis integerimis. ♀ in umbrosis montanis Beugesiae, Cristæ-Deæ Vocontiorum, Niceæ (Stire), Monspelii, Pyrenæorum prope Bayonam ex Lois. — Fl. fr. 3. p. 197. Lam. ill. t. 244. f. 1. — Moris. s. 4. t. 5. f. 1 et 2. (v. v.)

†† STIGMA UNICUM.

V. ASPHODELUS Tourn. inst. 178. L. gen. 421.

Perigonium patens 6-partitum; staminum filamenta basi dilatata fornicato-recurvata ovarium obtegentia; capsula globosa, loculis monospermis.

1. *A. LUTEUS* (L. sp. 443.) caule folioso, foliis triquetris striatis linearis-subulatis, perigonii segmentis sublinearibus. (2) ex Siciliâ ortus, in hortis cultus. — Fl. fr. 3. p. 204. Jacq. vind. t. 7. (v. v. c.)
2. *A. FISTULOSUS* (L. sp. 444.) caule nudo supernè subramoso, foliis strictis subulatis striatis subfistulosis, perigonii segmentis linearis-ellipticis. ♀ in Galliâ australi. — Fl. fr. 3. p. 204. Cav. ic. 3. t. 201. (v. v.)
3. *A. RAMOSUS* (Willd. sp. 2. p. 133.) caule nudo ramoso ramis strictis erectis, foliis ensiformibus carinatis laevibus, floribus subsessilibus racemoso-spicatis confertis, bracteis membranaceis lanceolatis acuminatis pedicellis superantibus. ♀ in rupestribus provinc. Mediterranearum. — Fl. fr. 3. p. 204. A. ramosus & L. sp. 444. — Clus. hist. 1. p. 196. f. 2. (v. v.)
4. *A. ALBUS* (Willd. sp. 2. p. 133.) caule nudo simplici, foliis linearis-ensiformibus carinatis laevibus, floribus pedunculatis racemosis, pedicellis confertis longitudine bractearum, capsulis rugosis. ♀ in Alpibus Galloprovinciæ, Pyrenæis et in prov. occident. — Fl. fr. 3. p. 205. A. ramosus & L. — Clus. hist. 1. p. 197. f. 2. (v. v.)

VI. CZACKIA Andreiosky cz. mon.

Perigonium campanulatum 6-partitum, segmentis unguiculatis; filamenta declinata; stigma 3-lobum; capsula subhexagona; semina angulata.

1. C. LILIASTRUM (Andr. l. c.). \mathcal{U} in pasenis Alpium et Pyrenæorum. — Hemerocallis Liliastrum L. ed. 1. p. 324. Fl. fr. 3. p. 206. Anthericum Liliastrum L. sp. 445. — Moris. s. 4. t. 1. f. 7. n. 8. Flores subsecundi albi, folia plana scapum simplicem subæquantia. (v. v.)

VII. PHALANGIUM Tourn. inst. 193. Juss. gen. 52.

Perigonium sexpartitum plus minūsve patens; staminum filamenta recta filiformia sèpissimè glabra, laciniarum basi inserta; stigma simplex; capsula dorso 3-sulcata sub 3-gona ovato-globosa; semina 3-quetra 2-seriata. — Radices fasciculatae.

1. P. LILIAGO (Schreb. spic. 36.) caule simplicissimo monophyllo, foliis radicalibus planis canaliculatis angustis acuminatis basi scariosis vaginantibus, floribus racemosis, pedicellis bracteas lanceolatas subulatas superantibus subæquantibusve, pistillo declinato, perigonii patuli segmentis lanceolatis. \mathcal{U} in sylvis montosis herbosis. — Fl. fr. 3. p. 210. Lam. ill. t. 240. f. 2. Anthericum Liliago L. sp. 445. — Moris. s. 4. t. 1. f. 9. n. 10. (v. v.)
2. P. RAMOSUM (Lam. dict. 5. p. 250.) caule ramoso, foliis linearibus angustis acuminatis, floribus laxe paniculatis, bracteis subulatis minimis, perigonii patentis segmentis lanceolatis, pistillo erecto, capsulae loculis 2-spermis. \mathcal{U} in montanis sterilibus. — Fl. fr. 3. p. 210. Anthericum ramosum. L. — Lob. ic. t. 47. f. 2. (v. v.)
3. P. BICOLOR (DC. fl. fr. 3. p. 209.) caule nudo apice ramoso, foliis planis linearibus acutis scapum superantibus, floribus laxe paniculatis, bracteis pedicellis brevioribus, perigonii segmentis linear-ellipticis, filamentis pubescentibus, capsulae loculis 2-spermis. \mathcal{U} ad sepes, in arenosis Galliæ occident., Galloprovinc. circà Olbias ex Ziz. Cannas (Stire). — Anthericum bicolor Desf. atl. 1. t. 90. A. planifolium L. mant. 442. Fl. intùs albi, extùs purpurei. (v. v.)
β. canaliculatum, foliis canaliculatis tortilibus scapo brevioribus. — In agro Syrtico. (v. v.)
4. P. SEROTINUM (Lam. dic. 5. p. 241.) caule 1-floro 3-4-folio, foliis crassiusculis subulato-linearibus, radicalibus caulem superantibus, perigonii patentis segmentis ovato-lanceolatis, capsula oblonga, loculis polyspermis. \mathcal{U} in Alpibus Delphinatûs. — Fl. fr. 3. p. 210. Anthericum sérotinum L. — Ray. angl. t. 17. f. 1. (v. s.)


VIII. SCILLA Sm. brit. n. 174. DC. fl. fr. 3. p. 211.


Perigonium 6-partitum, sèpius patens et caducum; staminum filamenta glabra filiformia basi perigonii inserta; semina rotundata. — Radix bulbosa.

Sect. I. SCILLOIS.

Flores patentes.

1. S. AUTUMNALIS (L. sp. 443.) foliis filiformibus linearibus scapo brevioribus, floribus racemosis, racemo brevi, bracteis nullis, perigonii segmentis elliptico-lanceolatis obtusis stamina subæquantibus. \mathcal{U} in siccis arenosis aut gla- reosis Galliæ mediae, occidentalis australisque. — Fl. fr. 3. p. 212. Cav. ic. t. 274. f. 2. — Lob. ic. t. 102. f. 1. (v. v.)
2. S. UMBELLATA (Ram. bull. phil. n. 41. p. 130. t. 8. f. 6.) foliis linearibus crassiæculis subcarinatis erectis scapo cylindrico subbrevioribus, floribus paucis racemoso-umbellatis, pedicellis bracteam membranaceam lineare acuminatam æquantibus superantibusve, perigonii segmentis lanceolatis obtusiusculis. \mathcal{U} in Pyrenæis et sabuletis circà Aquas-Tarbellicas, Brivatem (Brest). — Fl. fr. 3. p. 213. lil. t. 165. S. verna Huds. angl. 142. — Rudb. elys. p. 36. f. 16. (v. s.)





3. *S. BERTOLONII* (Duby mss.) foliis linearibus angustis obtusis scapum subæquantibus, racemo brevi pauci-(4-10)-floro, pedicellis bracteas binas membranaceas subulatas æquantibus rarius superantibus, perigonii segmentis lanceolato-linearibus obtusis. ♀ circa Nicæam.—*S. Italica* All. Bertol. amæn. ital. 144. non L. nec Fl. fr. nec Red. lil. t. 304 nec Curt. bot. mag. t. 663. (v. s.)
4. *S. BIFOLIA* (L. sp. 443.) foliis lanceolato-linearibus subbinis scapo vix longioribus basi vaginantibus, racemo paucifloro, floribus ebracteatis, pedicellis inferioribus longioribus, perigonii segmentis linearis-lanceolatis obtusis staminæ superantibus. ♀ in umbrosis et pascuis. — Fl. fr. 3. p. 212. eng. bot. t. 24.— Moris. s. 4. t. 12. f. 1. n. 15. (v. v.)
5. *S. HYACINTHOIDES* (L. f. supp. 201.) foliis lato-linearibus acutis, racemo longissimo multifloro, bracteâ minimâ obtusâ, pedicellis ante florescentiam erectis confertis, florentibus patulis laxis, perigonii segmentis lanceolatis obtusis stamina subsuperantibus. ♀ in siccis circa Grasse detexit cl. A. Richard. — bot. mag. t. 1440. malè. — Clus. hist. 1. p. 172. ic. Fl. intense cœrulei. (v. s.)
6. *S. UNDULATA* (Desf. atl. 1. p. 300. t. 88.) foliis linearis-lanceolatis undulatis scapo brevioribus, racemo elongato laxo, bracteâ linearis-subulataâ minimâ pedicello multò breviore, perigonii segmentis linearis-spathulatis obtusis. ♀ in Corsicâ. — Fl. purpurei. (v. s.)
7. *S. LILIO-HYACINTHUS* (L. sp. 442.) bulbo squamato, foliis lato-lanceolatis acutis humi adpressis scapo brevioribus, floribus paucis racemosis, pedicello bracteam membranaceam linearem superante subæquanteve, perigonii segmentis linearibus obtusis. ♀ in Galliâ australi, Pyrenæis, sabuletis circa Aquas-Tarbellicas, Areliam ex Dub. — Fl. fr. 3. p. 213. — Moris. s. 4. t. 12. f. 9. n. 21. Fl. cœrulei. (v. v. DC.)
8. *S. AMÆNA* (L. sp. 443.) foliis lanceolatis obtusis, scapo angulato paucifloro, floribus laxis subcernuis, bracteis obtusis brevissimis, perigonii segmentis lanceolatis obtusis staminibus subduplicè longioribus. ♀ in sterilibus et arenosis propè Marençin in agro Syrtico ex Thore. — Fl. fr. 3. p. 212. lil. t. 130. bot. mag. t. 341. non Jacq. (v. s. c.)
9. *S. MARITIMA* (L. sp. 442.) foliis lato-lanceolatis, racemo conico elongato multifloro, bracteis linearibus refractis subtus calcaratis pedicello multò brevioribus. ♀ in littoribus arenosis utriusque maris ex Lois. — Fl. fr. 3. p. 214. Black. t. 59r. — Moris. s. 4. t. 16. f. 11. n. 1. (v. v. c.)

Sect. III. LYCORIS. DC. herb.

Floris lacinia in tubum basi conniventes.

10. *S. PATULA* (DC. fl. fr. 5. p. 209.) foliis elongato-lanceolatis acutis basi attenuatis scapum superantibus patulis, racemo conico brevi recto, floribus 6-9 confertis, bracteis membranaceis binis inæqualibus linearis-lanceolatis linearibus acuminatis, floribus campanulatis, laciinis lanceolatis obtusis basi coalitis. ♀ in Galliâ australi? colitur nunc in hortis. — Fl. fr. 3. p. 211. lil. t. 225. *Hyacinthus patulus* Desf. *Scilla hyacinthoides* Jacq. ic. rar. t. 65. non L. f. (v. s. ex agro Florentino.)
11. *S. NUTANS* (Sm. brit. 1. p. 367.) foliis lato-linearibus basi attenuatis sub-acutis scapum subæquantibus, racemo immaturo cernuo, florente erecto laxo 3-10-floro, bracteis binis membranaceis inæqualibus linearis-lanceolatis subulatis, floribus campanulatis, laciinis obtusis lanceolato-linearibus apice revolutis basi coalitis. ♀ in pratis et nemoribus Galliæ mediae et occidentalis passim. — Fl. fr. 3. p. 211. eng. bot. t. 377. S. non-scripta. Red. lil. t. 224. *Hyacinthus non-scriptus* L. sp. 453. (v. s.)
12. *S. FASTIGIATA* (Viv. cors. app. 1.) foliis linearibus angustis scapum filiformem superantibus, racemo brevi denso 3-8-floro, bracteis amplexantibus ovato-acuminatis, perigonii tubo urceolato pellucido, laciinis lanceolatis obtusis stamina superantibus. ♀ in montibus Corsicæ. (v. s.)

IX. HYACINTHUS *Tourn. inst. 180. Desf. atl. 1. p. 307.*

Perigonium tubulosum 6-fidum, laciniis patulis; stamna circa medium perigonii longitudinem inserta; capsula obtusè trigona, loculis polyspermis.

1. H. ORIENTALIS (L. sp. 454.) foliis linearibus obtusis scapo brevioribus, racemo laxe erecto 4-10-floro, bracteis membranaceis geminatis lanceolatis pedicello brevioribus, floribus infundibuliformibus basi ventricosis vix 6-fidis, laciniis oblongis obtusis. ♀ in Galloprovincia orientali et circa Aquas Tarbellicas (cl. Grateloup) spontaneus, in hortis frequenter colitur. — Fl. fr. 3. p. 207. — Moris. s. 4. t. 11. f. 9 et 10. n. 10 et 11. (v. s. s.)
2. H. ROMANUS (L. mant. 224.) foliis linearibus canaliculatis scapum longè superantibus, bracteis refractis obtusis, racemo ovato-cylindrico multifloro, floribus ovato-cylindricis ultrà medium 6-fidis, lobis ovato-lanceolatis apice callosis. ♀ in pratis circa Tolosam, Castres, Agatham, Telonem. — Fl. fr. 5. p. 314. Red. lil. 6. t. 334. Bellevalia operculata Lapeyr. journ. phys. dec. 1808. p. 425. t. 1. — Clus. hist. 1. p. 180. f. 2. — Lob. ic. t. 107. f. 1. (v. s. s.)
3. H. AMETHYSTINUS (L. sp. 454.) foliis linearibus angustis, floribus laxe racemosis, bracteis solitariis linearibus membranaceis pedicello sublongioribus, perigonis campanulatis basi cylindricis 6-lobis, lobis ovatis obtusis. ♀ in Pyrenæis centralibus. — Fl. fr. 3. p. 206. liliac. t. t. 14. (v. s.)
4. H. SEROTINUS (L. sp. 453.) foliis linearibus canaliculatis scapo brevioribus, floribus racemosis secundis, bracteis ovatis acuminatis pedicello longioribus, perigonis campanulatis ultrà medium 6-partitis, laciniis oblongis exterioribus longioribus patulis, interioribus connatis. ♀ in lapidosis provinc. mediterran. passim, Pyren. propè Valletriam. — Fl. fr. 3. p. 207. lil. t. 202. Cav. ic. t. 30. H. lividus Pers. Lachenalia serotina Willd. (v. v.)

X. MUSCARI *Tourn. inst. 180. Desf. atl. 1. p. 308.*


Perigonium ovatum medio inflatum, sexdentatum; capsula trigona, angulis prominulis, loculis 2-spermis.

1. M. AMBROSIACEUM (Mœnch. meth. 633.) foliis sublinearibus caule sublongioribus, floribus confertis ovatis omnibus æqualibus subsessilibus apice callosis hexagonis. ♀ Monspelii, Nemausi cultum. — Fl. fr. 3. p. 200. lil. t. 132. M. moschatum bot. mag. t. 734. Hyacinthus muscari L. sp. 454. — Lob. ic. t. 109. f. 2. (v. s. c.)
2. M. RACEMOSUM (Mill. dict. n. 3.) foliis laxis dependentibus carinatis linearibus scapum superantibus, floribus confertis ovatis, summis sessilibus. ♀ in cultis. — Fl. fr. 3. p. 208. lil. t. 232. Hyacinthus racemosus L. — Clus. hist. 1. p. 181. f. 1. — Lob. ic. t. 107. f. 2. (v. v.)
3. M. BOTRYOIDES (Mill. dict. n. 1.) foliis strictis lato-linearibus basi angustatis scapum superantibus, floribus globosis inferioribus remotioribus. ♀ in Gallia australi. — Fl. fr. 3. p. 208. Hyac. botryoides L. — Clus hist. 1. p. 181. f. 2. — Lob. ic. t. 108. f. 1. (v. v. DC.)
4. M. COMOSUM (Mill. dict. n. 2.) foliis lato-linearibus scapum superantibus, racemo elongato, floribus angulato-cylindricis, summis sterilibus longius pedicellatis. ♀ in arvis et cultis. — Fl. fr. 3. p. 208. Hyac. comosus L. Jacq. aust. t. 126. — Lob. ic. t. 106. f. 2. (v. v.)

XI. GAGEA *Salisb. in ann. of bot. 2. p. 555.*

Perigonium calyciforme 6-partitum persistens basi connivens superne patens; stamna 6, filamentis basi non dilatatis; stigma hiulcum; capsula trigona. — Flores corymbosi lutei, bracteæ foliaceæ.





1. *G. LUTEA* (Gawl. in bot. mag. p. 1200. excl. ic.) bulbo **aggregato**, foliis radicalibus 1-2 linearibus scapum angulatum aphyllum longè superantibus, floribus paucis corymbosis, pedicellis solitariis, bracteis lanceolatis lanceolatolati-linearibusve acuminatis pedicellos superantibus, perigonii segmentis lanceolatis obtusis. ♀ in cultis, pratis et hortis. — *G. bracteolaris* Salisb. l. c. *Ornithogalum luteum* L. sp. 440. Fl. fr. 3. p. 214. *O. pratense* Pers. in Ust. ann. 5. p. 3. t. 2. f. 1. (v. v.)

♂. *sylvatica*, bulbo solitario, folio radicali solitario linear-lanceolato. — In sylvis provinc. orientalium. — *G. lutea* Gawler in bot. mag. t. 1200. *G. fascicularis* Salisb. l. c. excl. syn. *Ornithogalum sylvaticum* Fl. fr. 5. p. 315. (v. s.)

2. *G. VILLOSA* (Dub. mss.) foliis radicalibus 2 linearibus angustissimis scapum longè superantibus, floribus numerosis corymbosis, pedicellis subramosis villosis, bracteis ciliatis linear-lanceolatis linearibusve pedicellos superantibus, perigonii segmentis elliptico-lanceolatis subacutis dorso pubescens. ♀ in locis cultis et arvis. — *G. stellaris* Salisb. l. c. *O. villosum* Willd. enum. 368. *O. minimum* Fl. fr. 3. p. 215. an L² sp. 440. *O. arvense* Pers. in Ust. ann. 5. p. 8. t. 1. f. 2. (v. v.)

3. *G. FISTULOSA* (Dub. mss.) foliis radicalibus filiformibus fistulosis scapum superantibus, corymbo 1-4-floro, bracteis lato-lanceolatis lanceolatisve pedicellis pubescens brevioribus, perigonii segmentis lanceolatis obtusiusculis glabris. ♀ in Alpium et Pyrenæorum uidis. — *G. pygmæa* Salisb. l. c. *Ornithogalum fistulosum* Ram. in DC. fl. fr. 3. p. 215. *O. bohemicum* Zeuchm. act. boh. 2. p. 121. ic. (v. v.)

XII. ORNITHOGALUM. — *Ornithogali* sp. L. DC.

Perigonium petaloideum sexpartitum marcescens basi connivens supernè patens; stamena 6, 3 extenorū filamenta basi dilatata; stigma minimum capitatum; ovarium obtusè trigonum. — Flores racemosi albi aut viridescentes; bracteæ membranaceæ.

1. *O. UMBELLATUM* (L. sp. 441.) foliis linearibus angustissimis, racemo subcorymbo paucifloro, bracteis membranaceis lanceolatis linearibus acuminatis pedicellis duplò triplò brevioribus, perigonii segmentis elliptico-lanceolatis obtusis, filamentis subulatis. ♀ in arvis et pratis. — Fl. fr. p. 217. Jacq. aust. t. 343. Flores sequentis, sed minores. (v. v.)

2. *O. NUTANS* (L. sp. 441.) foliis linearibus canalem subsuperantibus, floribus racemosis secundis pendulis, racemo paucifloro, bracteis lanceolato-linearibus acuminatis pedicellis duplò triplò longioribus, segmentis lanceolatis obtusis, filamentis staminum alternis majoribus bicornibus. ♀ in pratis Alsatiæ, Lugduni, Gratianopolis, Aureliæ, Abbavillæ, Nemausis. — Fl. fr. 3. p. 218. Jacq. aust. t. 301. — Clus. app. 2. p. 9. t. 9. — Moris. s. 4. t. 13. f. 6 et 7. n. 8 et 9. Flores magni albi, segmentis dorso viridescentibus. (v. v.)

3. *O. NARBONENSE* (L. sp. 440.) foliis lato-linearibus canle longioribus, racemo longissimo, bracteis membranaceis lanceolatis acuminatis pedicellis patentibus multò brevioribus, perigonii segmentis patentibus linear-lanceolatis obtusis staminibus duplò ovario triplò longioribus. ♀ in provinciis australibus usque ad Tolosam. — Fl. fr. 3. p. 218. — Moris. s. 4. t. 13. f. 5. n. 6. fl. albi. (v. v.)

4. *O. PYRENAICUM* (L. sp. 440.) foliis linearibus, racemo longissimo, bracteis membranaceis basi dilatatis acutissimis, perigonii segmentis linearibus obtusis stamna superantibus ovario duplò longioribus. ♀ — Fl. fr. 3. p. 216. Flores ochroleuci.

♂. *flavescens*, floribus remotis, bracteis pedicello brevioribus, staminibus æqualibus. — In provinc. orientalibus, mediis occidentalibusque passim.

— Jacq. aust. 2. t. 103. *O. flavescens* Lam. ill. t. 242. f. 2. (v. v.)

♂. *stachyoides*, floribus subconfertis, bracteis pedicellum aequalibus, sta-

minibus inæqualibus. — In prov. australibus et Pyrenæis. — *O. stachyoides* Ait. kew. p. 441. — Ren. spec. t. 90. (v. v.)

5. *O. ARABICUM* (L. sp. 441.) foliis lanceolato-linearibus caule brevioribus, rameo subcorymboso multifloro, bracteis membranaceis basi dilatatis acuminateis pedicello duplò brevioribus, perigonii segmentis obovato-lanceolatis obtusis staminibus duplò ovario triplò longioribus, filamentis subulatis. \mathcal{U} in agro Corsico, Nicæensi, Ruscinonensi propè Prades (Coder). — Fl. fr. 3. p. 217. lil. 2. t. 63. — Clus. hist. 166. ic. (v. s.)

XIII. ALLIUM L. gen. 409.


Perigonium 6-partitum sæpiùs patens; stigma simplex; capsula triquetra, loculis profundè bipartitis, axi filiformi post valvularum dehiscentiam superstite. — Flores umbellati, terminales, è spathâ bivalvi orti.

§. 1. Foliis planis, staminibus alternis tricuspidatis.

1. *A. PORRUM* (L. sp. 423.) bulbo tunicato, caule tereti, foliis crassiusculis lanceolatis acutis subcarinatis, umbellâ capsulifera globosâ. (1) (2) ex Helvetiæ vineis ortum, in hortis cultum. — Fl. fr. 3. p. 219. — Black. t. 421. — Lob. ic. t. 154. f. 2. Flores albidi aut purpurei. (v. v. c.)
2. *A. AMPELOPRASUM* (L. sp. 423.) bulbo sobolifero, caule tereti, foliis crassiusculis linearibus carinatis acutis, umbellâ capsulifera globosâ. \mathcal{U} in provinciis australibus ex Lam. — Fl. fr. 3. p. 219. Præcedenti nimium affine. (v. v. c.)
3. *A. ROTUNDUM* (L. sp. 423.) bulbo ovato tunicato, foliis planis linearibus angustis, umbellâ capsulifera globosâ, spathâ brevi, perigonii segmentis lanceolatis subacutis stamina pistillumque subæquantibus, externis dorso crenulatis. \mathcal{U} in aridis Gallop., Delph., Niceæ ex All. — Fl. fr. 5. p. 315. Fl. purpurei. (v. v. DC.)
4. *A. ACUTIFLORUM* (Lois. not. 55?) foliis planis linearibus angustis, umbellâ capsulifera subglobosâ, spathâ ovato-lanceolatâ acutâ, perigonii segmentis lanceolatis acuminatis stamina ciliata pistillumque superantibus. \mathcal{U} in aridis Niceæ, Galloprov. orientalis et insulæ Ratoneau propè Massiliam (DC.) — Fl. fr. 5. p. 316. Fl. rosei. (v. v. DC.)
5. *A. SATIVUM* (L. sp. 425.) bulbo sobolifero, foliis linearibus integerrimis, umbellâ bulbiferâ globosâ, spathâ ovato-rotundâ, perigonii segmentis ovatis obtusis, pistillo staminibusque exsertis. \mathcal{U} in hortis cultum, forsitan in Gallo-provinciæ maritimis spontanem. — Fl. fr. 3. p. 219. — Lob. ic. t. 158. f. 1. Flores albido-purpurascentes. (v. v. c.)
6. *A. SECALEPUSUM* (L. sp. 425.) foliis linearibus undulato-subcrenatis, caule antè maturitatem contorto, umbellâ bulbiferâ globosâ spatham subæquante. \mathcal{U} in provinciis australibus spontaneum, in hortis cultum. — Fl. fr. 3. p. 220. *A. arenarium* L. ex Trevir. all. 5. — Moris. s. 4. t. 15. f. 2. n. 10. (v. v. c.)
7. *A. MULTIFLORUM* (DC. fl. fr. 5. p. 316.) foliis planis lato-linearibus acutis, umbellâ capsulifera subglobosâ 3o-6o-florâ, floribus longè pedicellatis, perigonii segmentis elliptico-lanceolatis obtusiusculis stamina non ciliata pistillumque superantibus. \mathcal{U} in arenosis et cultis Niceæ, Telonis, Narbonæ, agri Ruscinonensis, Tolosæ. — Fl. purpurei. (v. v.)

§. 2. Foliis teretibus, staminibus alternis tricuspidatis.

8. *A. AACANTHICUM* (L. sp. 429.) scapo tereti, foliis subulatis, umbellâ capsulifera globosâ, spathâ bivalvi, perigonii segmentis linearibus acutis pistillum stamineaque superantibus. \mathcal{U} ex Oriente ortum, in hortis cultum. — Fl. fr. 3. p. 228. — Moris. s. 4. t. 14. f. 3. (v. v. c.)
9. *A. SPHEROEDHALUM* (L. sp. 426.) caule tereti in parte inferiori foliifero, foliis semi-teretibus, spathâ 2-valvi, valvis ovatis acutis umbellâ capsulifera glo-





bosâ brevioribus, perigonii segmentis elliptico-lanceolatis obtusis, staminibus pistilloque exsertis. ♀ in montanis et arvis sterilibus passim. — Fl. fr. 3. p. 228. — Clus. hist. 1. p. 195. f. 1. — Moris. s. 4. t. 14. f. 4. Fl. purpurei. (v. v.)

10. A. VINEALE (L. sp. 428.) caule tereti, foliis teretibus fistulosis, umbellâ bulbiferâ globosâ spathâ acuminatâ breviore, perigonii segmentis lanceolato-linearibus stamina subæquantibus pistilloque brevioribus. ♀ in vineis et sepius passim. — Fl. fr. 3. p. 228. — Lob. ic. t. 155. f. 2. et t. 156. f. 2. Fl. rubelli. (v. v.)

11. A. CEREA (L. sp. 431.) canle fistuloso infernè ventricoso foliis teretibus fistulosis longiore, umbellâ capsuliferâ globosâ, perigonii segmentis linear-ellipticis obtusis pistillo staminibusque brevioribus. ♂ in hortis cultum. — Fl. fr. 3. p. 225. — Lob. ic. t. 150. f. 1 et 2. — Moris. s. 4. t. 14. f. 1 et 2. (v. v. c.)

§. 3. *Foliis teretibus, staminibus omnibus simplicibus.*

12. A. OLERACEUM (L. sp. 429.) caule foliifero tereti, foliis semiteretibus sulcatis, umbellâ bulbiferâ laxâ, spathâ 2-valvi, valvis ovatis fistuloso-acuminatis umbellam superantibus, perigonii segmentis lanceolatis obtusis stamina superantibus stylo brevioribus. ♀ in vineis et cultis. — Fl. fr. 3. p. 226. eng. bot. t. 480. A. virens Lam. — Hall. all. n. 27. t. 2. f. 2. — Moris. s. 4. t. 14. f. 6. n. 4. Fl. viridescente. (v. v.)

13. A. SOTTILENTICUM (L. sp. 432.) foliis teretibus subulatis scapos subnudos æquantibus, spathâ 2-valvi, valvis ovato-rotundis acutis umbellam capsuliferam confertam subæquantibus, perigonii segmentis lanceolatis acutis stamina pistillumque subduplicò superantibus. ♀ in Alpibus et Pyrenæis, in hortis frequenter cultum. — Fl. fr. 3. p. 227 et 5. p. 319. A. foliosum Clar. in fl. fr. 3. p. 725. — Lob. ic. t. 154. f. 1. Fl. rosei. (v. v.)

14. A. INTERMEDIUM (DC. fl. fr. 5. p. 318.) caule foliifero, umbellâ laxâ interdum bulbiferâ, pedicellis capillaribus effusis, spathâ bivalvi, valvis linearibus acuminato-fistulosis umbellam duplò triplò superantibus, perigonii segmentis lanceolatis obtusis stamina subæquantibus, stylo brevissimo. ♀ in agris et aridis Delph., Corsicæ, Narbonæ et præsertim provinc. occidentalium. — A. paniculatum Vill. Lapeyr. non L. Fl. rubelli. (v. s.)

15. A. PALLENS (L. sp. 427.) caule foliifero, foliis semiteretibus, spathâ 2-valvi, valvis lanceolatis fistuloso-acuminatis umbellâ capsuliferâ laxâ duplò-quadruplò longioribus, floribus pendulis, segmentis lanceolato-linearibus subtruncatis mucronulatis stamina subsuperantibus, stylo brevissimo. ♀ in collibus et cultis passim præsertim in provinc. austr. et occidentalibus. — Fl. fr. 3. p. 227. — Col. ephr. 2. p. 6. t. 7. f. 2. Flores pallide flavescentes. (v. v.)


16. A. FLAVUM (L. sp. 428.) canle foliifero, foliis semiteretibus, spathâ 2-valvi, valvis lanceolatis fistuloso-acuminatis umbellam capsuliferam laxam superantibus, floribus pendulis, segmentis lanceolatis obtusis, pistillo staminibusque exsertis. ♀ in arvis sepiibus et dumosis Galliæ australis, mediae occidentalisque passim. — Fl. fr. 3. p. 226. Jacq. austr. t. 181. Red. hil. t. 119. Fl. flavi. (v. s.)

17. A. MOSCHATUM (L. sp. 427.) caule tereti, foliis subulato-setaceis, spathâ 2-valvi, valvis lanceolatis ovatis acuminatis umbellâ capsuliferâ planâ pauciflorâ brevioribus, perigonii segmentis oblongo-linearibus acutis stamina pistillumque superantibus. ♀ in siccis et editioribus prov. Mediterran. — Fl. fr. 3. p. 226. — C. Bauh. prod. p. 28. ic. Fl. albo-rosei. (v. v.)

18. A. PARCIFLORUM (Viv. cors. app. 2.) caule foliifero, foliis setaceo-filiformibus, spathâ 2-valvi, valvis ovato-lanceolatis acutis umbellâ capsuliferâ laxâ pauci-(3-7)-florâ brevioribus, pedunculis capillaribus inæqualibus erectis, perigonii segmentis sublinearibus acutis stamina pistillumque superantibus. ♀ in Corsicâ. — Fl. carnei dorso lineâ sanguineâ exarati. (v. s.)

§. 4. *Foliis planis; staminibus omnibus simplicibus.*

19. *A. CARINATUM* (L. sp. 426.) caule foliifero, foliis linearibus carinatis, spathâ 2-valvi, valvis ovato-lanceolatis acuminatis umbellam bulbiferam paucifloram longè superantibus, perigonii segmentis linear-lanceolatis obtusis stamina subæquantibus pistillo subduplicè brevioribus. ♀ in agris et vineis Galliæ australis, Andegaviæ, propè Falaise ex cl. de Bréb., Parisios ex cl. Lois. — Fl. fr. 3. p. 220. — Hall. all. n. 27. t. 2. f. 2. — Lob. ic. t. 156. f. 1. Flores roseo-viridescentes. (v. s.)
20. *A. SUAVEOLENS* (Jacq. ic. rar. 2. t. 364.) caule basi foliifero, foliis linearibus obtusis caule brevioribus, spathâ 2-valvi, valvis lanceolatis acuminatis umbellâ capsuliferâ globosâ brevioribus, perigonii segmentis linear-lanceolatis obtusis pistillo staminibusque brevioribus. ♀ in Pyrenæis, agro Syrtico propè Dax et Burdigalam (cl. Des Moulins). — *A. AMBIGUUM* Fl. fr. 3. p. 220. *A. ERICETORUM* Thore land. 123. Lapeyr. abr. suppl. 47. *A. SEROTINUM* Lap. abr. 179. supp. 48. Fl. albescentes aut rosei, odori. (v. v.)
21. *A. SENESCENS* (L. sp. 430.) scapo nudo ancipiti folia obtusa linearia subtus convexa superante, spathâ ovatâ umbellâ capsuliferâ hemisphæricâ breviore, perigonii segmentis ovatis obtusis stamina pistillumque subæquantibus. ♀ in humidis Alpium Delph., Gallopr., montium Ligeris (Prost), Pyren. — bot. mag. t. 150. *A. ANGULOSUM* Fl. fr. 3. p. 222. an L? — Gmel. sib. t. 11. f. 2. Fl. rosei. (v. v.)
22. *A. PEDEMONTANUM* (Willd. sp. 2. p. 77.) scapo subtetragono folia linearia obtusa radicalia superante, spathâ 2-4-valvi, valvis ovatis acutis umbellâ capsuliferâ convexâ pauciflorâ brevioribus, perigonii segmentis ovatis obtusis stamina pistillumque superantibus. ♀ in montibus Arverniæ ex Lam. — Fl. fr. 3. p. 223. *A. NIGRUM* All. ped. t. 25. f. 1. non L. Fl. rosei. (v. s. ex Pedem.)
23. *A. ALBUM* (Santi montam. 1. t. 7.) scapo subtriquetro, foliis radicalibus glabris linear-lanceolatis carinatis, spathâ 1-2-valvi, valvis ovatis acuminatis umbellâ capsuliferâ brevioribus, perigonii segmentis obovatis obtusis subenerviis stamina pistillumque superantibus. ♀ circâ Nicæam, Telonem ex cl. Robert. — Fl. fr. 5. p. 317. Red. lil. t. 300. Fl. carnei. (v. s. ex Italia.)
24. *A. ROSEUM* (L. sp. 432.) bulbo sèpè tunica punctulatâ vestito, scapo tereti, foliis subradicalibus linearibus lato-linearibusve acuminatis, spathâ vaginante 4-lobâ, lobis ovato-lanceolatis acutis umbellâ capsuliferâ (rariùs bulbiferâ) planiusculâ subduplicè brevioribus, perigonii segmentis lanceolatis ovato-lanceolatisve obtusissimis stamina pistillumque superantibus. ♀ in agris et vineis provinc. Mediterr., Burdigalæ (Des Moulins). — Fl. fr. 3. p. 221. — Magn. bot. monsp. p. 10. ic. A. carneum Bertol. Fl. rosei. (v. v.)
25. *A. GRANDIFLORUM* (Lam. dict. 1. p. 68.) foliis linear-subulatis scapo tereti brevioribus, umbellâ capsuliferâ planâ, perigonii segmentis mucronatis erectis. ♀ in saxosis Alpium Delph. ex Vill., Gallopr. ex Lam. — Fl. fr. 3. p. 222. *A. narcissifolium* Vill. dauph. 2. t. 6. Fl. albo-rosei. †
26. *A. SUBHIRSUTUM* (L. sp. 424.) scapo tereti, foliis linearibus acuminatis subhirsutis glabrisve subradicalibus, spathâ 2-valvi, valvis ovatis acutis umbellâ capsuliferâ planâ laxâ brevioribus, perigonii segmentis linear-lanceolatis obtusis stamina pistillumque superantibus. ♀ in maritimis Corsicæ, Monspelii et Narbonæ? — Fl. fr. 3. p. 221. *A. graminifolium* Lois. gall. 724. — Lob. ic. t. 160. f. 1. Fl. lactei. (v. s.)
27. *A. TRIQUETRUM* (L. sp. 431.) scapo triquetro, foliis carinatis basi vaginatis acutis scapum superantibus aut subæquantibus radicalibus, spathâ bivalvi, valvis lanceolatis linearibusve acuminatis umbellam capsuliferam planam pauci-(3-5)-floram subæquantibus, perigonii segmentis linear-lanceolatis oblongis obtusis stamina pistillumque duplè superantibus. ♀ in Corsicâ, circâ Telonem, Narbonam, Collioure ex cl. Benth. — Fl. fr. 3. p. 222. — Rudb. elys. 2. p. 159. f. 16. — Moris. s. 4. t. 16. f. 8. n. 9. Flores albi. (v. s.)



28. A. MOLY (L. sp. 43a.) scapo tereti, foliis radicalibus oblongo-lanceolatis acutis basi vaginantibus, spathâ bivalvi, valvis ovatis acutis umbellâ capsuliferâ planâ brevioribus, perigonii segmentis ovatis acutis stamina pistillumque superantibus. ♀ Monspelii et in Pyrenæis ex L., in Andegaviâ ex Bast, circâ Parisios ex Mer., Abbavillam ex Bouch. — Fl. fr. 3. p. 224. lil. 2. t. 97. — Moris. s. 4. t. 16. f. 2 et 3. n. 4 et 5. Fl. lutei. (v. v. c.)
29. A. CHAMÆMOLY (L. sp. 433.) foliis lato-linearibus ciliatis scapum basi vaginantibus multòque superantibus, spathâ 2-3-valvi, valvis ovatis acuminatis umbellam capsuliferam subradicalem paucifloram subæquantibus, perigonii segmentis linearibus obtusis stamina pistillumque superantibus. ♀ in Corsicâ, circâ Arelatem (Suffren), Massiliam (Solier). — Fl. fr. 3. p. 224. Cav. ic. 3. t. 207. f. 1. — Col. ecphr. t. 326. — Moris. s. 4. t. 16. f. 7. n. 8. Fl. albi. (v. s.)
30. A. NIGRUM (L. sp. 430.) bulbo sobolifero, scapo tereti, foliis lato-lanceolatis oblongis radicalibus, spathâ bivalvi, valvis lato-ovatis acutis umbellam capsuliferam convexam multifloram subæquantibus, perigonii patentis segmentis linear-lanceolatis obtusis stamina pistillumque superantibus, staminibus basi dilatatis in urceolatum monadelphum coalitis. ♀ in arvis Monspelii ex Gou. et Benth., Gallopr. ex L. — Fl. fr. 3. p. 223. lil. 2. t. 102. A. Monspesulanum Gou. ill. 24. t. 16. — Besl. eyst. aëst. 4. t. 11. f. 1. Fl. pallidi. (v. s. c.)
31. A. MAGICUM (L. sp. 424.) foliis lato-lanceolatis scapo multò longioribus, interiori filiformi basi vaginante apice intùs bulbifero, umbellâ omnino bulbis aggregatis constante. ♀ circâ Aginnum ex S.-Am. — Fl. fr. 5. p. 317. S.-Am. mem. agr. ag. 1. p. 79. bouq. t. 10. — J. Bauh. hist. 2. p. 569. fig. infer. An deformatio præcedentis aut species propria? †
32. A. URSINUM (L. sp. 431.) scapo subtriquetro, foliis radicalibus ovato-lanceolatis petiolatis basi vaginantibus, spathâ 1-valvi, valvâ ovato-lanceolatâ acutâ umbellam capsuliferam planam subsuperante, perigonii segmentis linearibus acutis stamina pistillumque superantibus. ♀ in sepibus et pratis nimbrosis. — Fl. fr. 3. p. 224. fl. dan. t. 757. — Lob. ic. t. 159. f. 1. Fl. albi. (v. v.)
33. A. VICTORIAE (L. sp. 424.) radice oblongâ, caule tereti basi foliifero, foliis ovali-oblongis obtusis sessilibus, spathâ umbellam capsuliferam globosam subæquante, perigonii segmentis lanceolatis obtusis staminibus pistilloque brevioribus. ♀ in Vogesis, Jurasso, montibus Foresii, Delph., Arverniæ, Occitaniæ, Pyr. orient. — Fl. fr. 3. p. 224. Jacq. austr. t. 216. — Moris. s. 4. t. 15. f. 7. n. 16. Fl. ochroleuci. (v. v.)

Trib. III. HEMEROCALLIDEÆ R. Brown. prod. 295.

Perigonium tubulosum marcescens. Semina testâ nec atrâ nec crustaceâ sæpè spongiosa et dilatata vel alata. Albumen carnosum.

XIV. *HEMEROCALLIS* L. gen. 433.

Perigonium magnum marcescens monophyllum segmentis basi in tubum coalitis; stigma simplex; stamina declinata, capsula trigona; semina rotunda.

1. H. FULVA (L. sp. 462.) foliis linearibus carinatis, floris laciniis tribus interioribus obtusis undulatis, nervis exterioribus ramosis. ♀ in Galloprovinciâ, propè Tarbas, Bayonam, Burdigalam, Cœnomanum. — Fl. fr. 3. p. 205. Red. lil. 1. t. 16. — Lob. ic. t. 93. f. 1. (v. s.)
2. H. RUFVA (L. sp. 462.) foliis linearibus carinatis, floris laciniis planis acutis, nervis indivisis. ♀ in hortis culta. — Fl. fr. 3. p. 205. Jacq. vind. t. 139. Red. lil. 1. t. 15. (v. v. c.)

XV. POLYANTHES L. gen. 426.

Perigonium infundibuliforme, limbo sexido patulo; stamina 6 perigonii fauci inserta; ovarium liberum perigonio obtectum; stigma 3-fidum.

- I. P. TUBEROSA (L. sp. 453.) foliis linearibus scapo brevioribus. \mathcal{U} ex Americâ meridionali orta, in hortis culta. — Fl. fr. 3. p. 234. Lam. ill. t. 243. Red. lil. t. 147. (v. v. c.)
-


Ordo CIII. BROMELIACEÆ Juss. gen. 49. dict. sc. nat. 5.
p. 347.

Perigonium tubulosum mox cum ovario adhærens, mox liberum, 6-fidum aut 6-partitum laciniis duplii serie dispositis, 3 externis brevioribus persistentibus calyciformibus, 3 internis majoribus sèpè caducis petaloideis. Stam. 6 imo perigonio inserta. Ovarium 3-loculare ∞ -ovulatum. Stylus simplex. Stigma 3-lobum. Fructus baccatus 3-locularis, aut capsularis. Albumen farinosum basi embryonem elongatum recurvum fœvens. — Folia alterna sèpissimè ad basin scapi fasciculata, in margine dentato-spinosa.

I. AGAVE L. gen. 431.

Perigonium tubulosum infundibuliforme ovario adhærens sexpartitum; stamina 6 exserta; autheræ versatiles; capsula ovata utrinque attenuata obtusè trigona 3-locularis polysperma.

- I. A. AMERICANA (L. sp. 461.) acaulis, foliis dentato-spinosis, scapo ramoso, tubo perigonii medio angustato, stylo staminibus longiore. \mathcal{U} ex Americâ meridionali orta, nunc spontanea in provinciis Mediterraneis. — Fl. fr. 3. p. 235. Lam. ill. t. 235. f. 1. (v. v.)
-





Ordo CIV. COLCHICACEÆ DC. fl. fr. 3. p. 192. — Melanthaceæ Brown prod. 272. — Juncorum gen. Juss. gen.

Flores sèpiùs hermaphroditi. Perigonum coloratum, 6-fidum aut 6-partitum, laciñiis æstivatione sèpè involutis. Stamina 6 perigonii laciñiis adnata; antheræ extrorsæ. Ovaria 3 mox subdistincta, mox plus minùs coalita et ovárium unicum 3-loculare loculis semina plurima angulo interno adfixa continentibus constituentia, stylo mox longissimo mox subnullo terminata; stigma glandulosum. Fructus mox folliculi 3 distincti uniloculares interne longitudinaliter dehiscentes; mox folliculis coadunatis capsula 3-valvis 3-locularis, valvularum marginibus introrsùm inflexis dissepimenta constituentibus; folliculis maturitate disjunctis. Semina plurima margini valvularum interiori adfixa; testa membranacea. Embryo intrà albumen carnosum. — Herbae habitu vario.

I. BULBOCODIUM L. gen. 407.

Perigonum 6-partitum, laciñiarum unguibus angustis conniventibus apice staminiferis; ovarium 1; stylus simplex elongatus; stigma 3.

1. B. VERNUM (L. sp. 422.) ♀ in Alpibus Delph., Gallop., circà Nicæam, in editoribus Pyrenæis ex Lapeyr. — Fl. fr. 3. p. 197. Vill. dauph. 2. t. 2. Folia lanceolata cum floribus prodeuntia. (v. s.)

II. MERENDERÀ Ramond bull. phil. n. 47. DC. fl. fr. 3. p. 196.

Perigonum 6-partitum, laciñiis unguiculatis staminiferis; antheræ erectæ hastatæ; ovarium 1; styli 3 elongati apice erecti; capsula 3-follicularis, folliculis erectis minimè inflatis.

1. M. BULBOCODIUM (Ram. l. c. t. 12. f. 2.) ♀ in graminosis editorum Pyrenæorum. — Fl. fr. l. c. Red. lil. r. t. 25. Bulbocodium autumnale Lapeyr. abr. pyr. 202. — Clus. hist. r. p. 201. f. 2. Folia linearia patula cum flore subprodeuntia. (v. v.)

III. COLCHICUM Tourn. inst. 181. L. gen. 457.

Perigonum tubulosum longum bulbo innascens, limbo campanulato 6-partito; stamina apici tubi inserta; antheræ oblongæ versatiles; ovarium 1; styli 3 longissimi; stigma totidem adunca; capsula 3-follicularis, folliculis inflatis erectis basi coalitis polyspermis.

1. C. MONTANUM (L. sp. 485.) bulbo multifloro, foliis cum flore prodeuntibus sublinearibus, perigonii laciñiis lineari-ellipticis. ♀ in montibus Corsicæ. — Fl. fr. 3. p. 195. excl. syn. Hall. et Clus. Autumno floret. (v. s.)

2. C. ALPINUM (DC. fl. fr. 3. p. 195.) bulbo unifloro, foliis linear-lanceolatis obtusis strictis post flores prodeuntibus, perigonii laciñiis lanceolato-ellipticis. ♀ in pratis humidis Alpium Delphinatūs? — C. montanum All. ped. t. 74. f. 2. excl. syn. (v. s. ex Alp. Pedem.)

3. C. AUTUMNALE (L. sp. 485.) bulbo submultifloro, foliis planis lato-lanceolatis post flores longè prodeuntibus, perigonii laciñiis ovato-ellipticis. ♀ in pratis humidis frequens. — Fl. fr. 3. p. 195. Bull. herb. t. 19. — Moris. s. 4. t. 3. f. 1. (v. v.)

IV. VERATRUM Tourn. inst. 145. L. gen. 1144.

Perigonum 6-partitum; ovaria 3 basi juncta in plurimis floribus

474 MONOCOTYL. SEU ENDOGENÆ.

abortiva; styli 3 breves; capsulae oblongæ 2-valves polyspermæ; semina margine membranacea. — Caules foliosi.

1. *V. ALBUM* (L. sp. 1479.) racemo suprà-decomposito, ramulis patentibus, perigonis subpatentibus (albo-virescentibus). ♀ in pascuis montanis. — Fl. fr. 3. p. 194. Lam. ill. t. 843. Bull. herb. t. 155. (v. v.)
2. *V. NIGRUM* (L. sp. 1479.) racemo composito, ramulis strictis, perigonis patentissimis (nigricantibus). ♀ in pascuis montium Niceæ, Arvernæ ex Lois., Burgundiæ ex Dur., Alsatiæ ex Mapp. — Fl. fr. 3. p. 194. Bull. herb. t. 149. — Moris. s. 12. t. 4. f. 9. n. 2. (v. s.)

V. TOFIELDIA Huds. ang. 157. DC. fl. fr. 3. p. 193. — Antherici sp. L.

Perigonum 6-partitum, involucro minimo 3-partito basi cinctum; stamna glabra; capsula 3-6-locularis, loculis polyspermis basi junctis. — Caules infernè foliosi, foliis gramineis.

1. *T. PALUSTRIS* (Huds. l. c.) foliis linear-ensiformibus nervosis. ♀ in humidis Jurassi, Alpium, montium Corsicæ, Pyrenæorum. — Fl. fr. 3. p. 193. eng. bot. t. 536. — Narthecium calyculatum Lam. ill. t. 268. *Helonias borealis* Willd. — Fl. lapp. t. 10. f. 3. (v. v.)

**Ordo CV. JUNCEÆ DC. fl. fr. 3. p. 155. Brown prod. p. 25.
De La Harpe in mem. soc. hist. nat. paris. t. 3. p. 87. —
Juncorum gen. Juss.**

Flores hermaphroditæ. Perigonum liberum saepius glumaceum sexpartitum, laciniis dupli serie dispositis. Stamina 3 seu 6, perigonii laciniis opposita; filamenta subulata; antheræ 2-loculares. Ovarium 1; stylus 1; stigmata 3 filiformia aut stigma unicum 3-lobum. Capsula 3-valvis, 1-aut 3-locularis, valvulis nunc medio septiferis et polyspermis, nunc septo destitutis et semen unicum basi gerentibus. Embryo subcylindricus, albumen carnosum. — Herbæ cyperaceis habitu similes. Folia vaginantia. Flores paniculati aut corymbosi rariùs spicati, bracteis scariosis glumaceis instructi.

- I. *ABAMA* Adans. fam. 2. p. 47. DC. fl. fr. 3. p. 171. — *Narthecium* Lam. non Juss. — Antherici sp. L.


Perigonum 6-partitum; stamna 6; filamenta lanuginosa persistentia; ovarium pyramidale; stylus brevis; capsula 3-locularis, 3-valvis; semina numerosa, ovato-oblonga, utrinque appendiculata.

1. *A. OSSIFRAGA* (DC. l. c.) foliis ensiformibus, floribus laxè spicatis subsessilibus. ♀ in locis humidis Pyrenæorum, Galliæ occidentalis septentrionalisque. — *Narthecium ossifragum* Lam. — Lob. ic. t. 92. f. 1. (v. v.)

II? APHYLLANTHES Tourn. inst. 430. L. gen. 408.

Perigonum 6-partitum, laciniis basi in tubum coalitis, limbis patentibus; stamna 6; capsula turbinata, 3-locularis, 3-valvis, polysperma. — Genus ex cl. de La Harpe è Junceis expellendum et ad Liliacearum trib. II. (Asphodeleas) amandandum.

1. *A. MONSPELIENSIS* (L. sp. 422.) ♀ in lapidosis Galliæ mediterraneæ. — Fl. fr. 3. p. 170. Lam. ill. t. 252. — Moris. s. 5. t. 25. f. 9. n. 12. Scapi nudi. Flores 1-2 sessiles basi squamis scariosis cincti. (v. v.)





III. JUNCUS Michel. gen. p. 37. t. 31. DC. fl. fr. 3. p. 162. De La Harpe l. c. p. 104.

Perigonum 6-partitum, glumaceum; stamina 3 vel 6; capsula 3-lo-
cularis 3-valvis, valvulis medio septiferis; semina numerosa septo ad-
fixa. — Folia teretia glabra.

§. 1. *Foliis nullis.*

1. J. FILIFORMIS (L. sp. 465.) culmo nudo filiformi debili, paniculâ laterali brac-
teatâ subsimplici, perigonii segmentis lanceolatis acutis capsulam subrotundam obtusam subæquantibus. ♀ in paludibus turfosis Alpium, montium Li-
geris (cl. Prost), Pyrenæorum. — Fl. fr. 3. p. 164. eng. bot. t. 1175. J. arcticus Lapeyr. non L. — Pluck. t. 40. f. 8. (v. s.)

2. J. COMMUNIS (E. Meyer junc. mon. spec. p. 20.) scapo tereti sublævi ri-
gidiusculo, paniculâ laterali, staminibus 3, perigonii segmentis sublineari-
bus acuminatis capsulam obovatam retusam subæquantibus. ♀ in palu-
dosis.

α. *conglomeratus* (Mey.) paniculâ conglobatâ. — **J. conglomeratus** L.
sp. 464. Fl. fr. 3. p. 163. — Cam. epit. 780. ic. — Moris. s. 8. t. 10. f. 4.
n. 7. (v. v.)

β. *effusus* (Mey.) paniculâ effusâ suprà-decompositâ. — **J. effusus** L.
sp. 464. Fl. fr. 3. p. 163. — Lob. ic. t. 84. f. 2. t. 85. f. 1. (v. v.)

3. J. CLAVUCUS (Sm. brit. 575.) culmo nudo tereti striato glauco apice inflexo,
paniculâ laterali effusâ erectâ, staminibus 6, perigonii segmentis angustè
lanceolatis acuminatis capsulâ ellipticâ obtusâ mucronatâ obsoletè trigonâ
subbrevioribus. ♀ in humidis passim. — Fl. fr. 5. p. 307. eng. bot. t. 665. J.
inflexus Lam. dict. 3. p. 265. Fl. fr. 3. p. 164. non L. J. tenax Poir. J. lon-
gicornis Bast. — Barr. ic. 208. — Moris. s. 8. t. 10. f. 5. n. 13. (v. v.)

4. J. RIGIDUS (Desf. atl. 1. p. 312.) culmo tereti lævi nudo? ultrà paniculam pro-
ducto pungente, floribus solitariis sessilibus pedicellatis in paniculam
elongatam erectam suprà-decompositam digestis, pedunculis inæqualibus
compressis nodosis multifariam decompositis fasciculatis, perigonii segmen-
tis lanceolatis acutis. ♀ in arenosis maritimis Monspelii propè Maguelonne
detexit cl. Dunal. (v. s. sinè fructu nec radice.)

§. 2. *Foliis radicalibus.*

5. J. ACUTUS (Lam. dict. 3. p. 264.) culmo lævi nudo tereti, foliis teretibus pun-
gentibus, floribus paucis capitatis in paniculam densam terminalem prolifera-
ram digestis, spathâ diphyllâ spinosâ erectâ, bracteis capitulum subæquantibus,
perigonii segmentis lanceolato-ovatis, exterioribus acutis interioribus
obtusis, capsulâ oblongâ ovoideâ mucronatâ duplò brevioribus. ♀ in palu-
dosis maritimis maris Mediterranei et Oceani propè Brest et Cherbourg. — Fl.
fr. 3. p. 163. — C. Bauh. prod. p. 21. ic. — Moris. s. 8. t. 10. f. 7. n. 15. (v. v.)

6. J. MARITIMUS (Lam. dict. 3. p. 264.) culmo nudo tereti sublævi, foliis teretibus pun-
gentibus, floribus capitatis, capitulis paucifloris in paniculam ter-
minalem proliferam digestis, spathâ diphyllâ spinosâ erectâ, bracteis capitulo
brevioribus, staminibus 6, perigonii segmentis lanceolatis acutis capsulas
ovato-rotundas obtusè trigonas mucronatas æquantibus. ♀ in arenosis ma-
ritimis. — Fl. fr. 3. p. 162. J. acutus & L. — Moris. s. 8. t. 10. f. 6. n. 14.
(v. v.)


7. J. SQUARROSUS (L. sp. 465.) culmo subnudo rigido, foliis setaceis subcarina-
tis culmo triplò brevioribus, floribus solitariis in paniculas 2-3 laterales ter-
minalesque digestis bracteis scariosis stipatis, perigonii segmentis lanceo-
latis subobtusis margine squarrosis capsules ovatas obtusas æquantibus. ♀
in humidis et paludosis passim. — Fl. fr. 3. p. 165. J. Sprengelii Willd.
prod. t. 4. f. 8. — Lob. ic. t. 18. f. 1. (v. v.)


8. J. ERICETORUM (Poll. pal. n. 350.) culmo nudo filiformi striato, foliis filifor-

mibus canaliculatis, capitulis 1-3 terminalibus subrotundis sessilibus involueratis, bracteis inæqualibus unâ capitulum superante, staminibus 3, perigonii segmentis lanceolatis acuminatis capsulam ovatam obsolete trigonam mucronatam superantibus. (I) in glareosis subudis Galliæ australis occidentalisque, circa Parisios. — Fl. fr. 3. p. 164. J. triandrus Gou. J. gracilis Roth. J. capitatus Willd. J. mutabilis Cav. ic. t. 296. f. 2. excl. syn. (v. v.)

§. 3. *Caulibus foliosis.*

9. *J. SUPINUS* (Roth. germ. 1. p. 156.) culmo striato erectiusculo ramoso, foliis linearibus canaliculatis, capitulis tribracteatis, bracteis capitulum superantibus, staminibus 3, perigonii segmentis lanceolatis acutis capsulâ triangulare obtusâ brevioribus. ♀ in paludibus semiexsiccatis passim, præsertim in provinciis occidentalibus. — Fl. fr. 3. p. 168. Fl. dan. t. 1099 excl. syn. J. subverticillatus / Willd. — Moris. s. 8. t. 9. f. 10 et 11. n. 3 et 4. (v. v.)
10. *J. FLUITANS* (Lam. dict. 3. p. 270.) culmo bulboso tenui radicante subanguato, foliis setaceis subnodoso-articulatis, floribus capitatis, capitulis paucis subproliferis 3-6-floris in paniculam simplicem laxissimam dispositis, staminibus tribus, perigonii segmentis anguste lanceolatis subacutis capsulâ ovato-oblongâ breviter mucronatâ brevioribus. ♀ in fossis et paludibus aquaticis passim. — Fl. fr. 3. p. 169. eng. bot. 301. J. uliginosus Roth. J. subverticillatus Hoffm. — Scheuchz. gram. 330. t. 7. f. 10. (v. v.)
11. *J. PYGMÆUS* (Thuil. fl. par. II. 1. p. 178.) culmo erecto tenui ramoso laevi paucifolio, foliis linearibus canaliculatis, capitulis terminalibus bracteis minimis scariosis stipatis, infimo folio suffulto, staminibus 3, perigonii segmentis sublinearibus acuminatis capsulam elongatam trigonam acutam superantibus. (I) in pratis subturfosis Galiæ australis, occidentalisque et propè Parisios. — Fl. fr. 3. p. 168. (v. v.)
12. *J. BICEPHALUS* (Viv. cors. 5.) culmo ascendentē tereti laevi, foliis linearifiliformibus subcanaliculatis, floribus capitatis, capitulis a uno terminali altero laterali bracteis scariosis minimis stipatis, perigonii segmentis sublinearibus acuminatis capsulam oblongo-prismaticam acutam superantibus. (I) in Corsicâ circa Bonifacio (cl. Viviani). (v. s.)
13. *J. BUFONIUS* (L. sp. 466.) culmo angulato striato racemoso-paniculato versus apicem foliis 1-2 setaceis instructo, floribus sessilibus solitariis in paniculam laxissimam racemosam dichotomam digestis, perigonii segmentis lanceolatis acuminatis capsulam ovato-oblongam obtusam superantibus. (I) in pratis paludosis, ad vias et in humidis frequens. — Fl. fr. 3. p. 167. eng. bot. t. 802. — Lob. ic. t. 18. f. 2. (v. v.)
14. *J. TENAGEYA* (L. f. supp. 208.) culmo tereti ramoso paniculato foliis 2-3 erectis setaceis subcanaliculatis instructo, floribus solitariis sessilibus in paniculam laxissimam dichotomo-divaricatam dispositis, perigonii segmentis lanceolato-ovatis acutis capsulam ovato-rotundam retusam subæquantibus. (I) in paludibus exsiccatis passim. — Fl. fr. 3. p. 167. Fl. dan. t. 1160. — Vaill. bot. t. 20. f. 1. — Barr. ic. t. 747. f. 2. (v. v.)
15. *J. TRIFIDUS* (L. sp. 465.) culmo tereti laevi superè foliis 1-2 setaceis subcanaliculatis instructo, floribus 1-3 subcapitatis sessilibus lateralibus, perigonii segmentis lanceolatis acuminatis, staminibus 6, capsulâ ovatâ obtusâ trigonâ acuminatâ. ♀ in glareosis Alpiam et Pyrenæorum. — Fl. fr. 3. p. 165. Fl. dan. t. 107. J. monanthos Jacq. vind. obs. t. 4. f. 1. — Lightf. scot. t. 9. f. 1. (v. v.)
16. *J. GERARDI* (Lois. not. 60.) culmo tereti sublaevi, foliis linearibus canaliculatis, summo paniculam superante, floribus subsolitariis in paniculam terminalem laxam erectam paucifloram digestis, perigonii segmentis lanceolatis subobtusis apice callosis capsulam ovatam mucronatam superantibus. ♀ in pratis secùs rivulos Burgundiæ (Babey), Galloprov., Corsicæ, Mimatis (Prost), Burdigalæ (Des Moul.). — Fl. fr. 5. p. 308 excl. syn. Barr. J. attenuatus Viv. cors. 5. An satis à sequente distinctus. (v. s.)






17. *J. BULBOSUS* (L. sp. 466.) culmo compresso sublævi, foliis linearibus canaliculatis, floribus subsolitariis in paniculas decompositas cymosas multifloras digestis, perigonii segmentis lanceolatis obtusis capsula ovato-rotundâ trigonâ mucronatâ duplò brevioribus. ♀ in paludibns et humidis. — Fl. fr. 3. p. 167. eng. bot. t. 934. *J. nitidiflorus* L. Duf. in ann. sc. nat. 5. p. 86. — Moris. s. 8. t. 9. f. 14. n. 11. (v. v.)
18. *J. LAMPOCARPUS* (Ehr. gram. p. 126.) culmo nodoso tereti lævi, foliis compressis nodoso-articulatis, floribus capitatis, capitulis sessilibus pedunculatisque in paniculam simplicem compositam terminalē erectam digestis, perigonii segmentis lanceolatis, tribus interioribus obtusiusculis exterioribus acuminatis, capsula acutâ triquetrâ nitidissimâ subduplicata brevioribus. ♀ in humidis. — eng. bot. t. 2143. *J. articulatus* L. sp. 465. *J. sylvaticus* var. Fl. fr. 3. p. 169. — Moris. s. 8. t. 9. f. 9. n. 2. Capsula atra. (v. v.)
J. heterophyllus, foliis immersis elongatis filiformi-setaceis tenuissimè articulatis. — In fossis aquosis agri Syrtici, Corsicæ. — *J. heterophyllus* L. Duf. in ann. sc. nat. 5. p. 88. (v. s.)
19. *J. ALPINUS* (Vill. danph. 2. p. 233.) culmo erecto tereti lævi, foliis compressis subarticulatis, floribus capitatis, capitulis paucis paucifloris in paniculam simplicem digestis, perigonii segmentis lanceolatis acutis capsula trigonâ ovatâ mucronatâ brevioribus. ♀ in Alpibus et Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 170. *J. ustulatus* Hoppe? Sequentis varietatem esse vult. cl. Gaudin agrost. 2. p. 223. an meritò? (v. v. DC.)
20. *J. ACUTIFLORUS* (Ehr. gram. 66.) culmo nodoso tereti lævi, foliis compressis nodoso-articulatis, floribus capitatis, capitulis sessilibus pedunculatisve in paniculam terminalē erectam suprà-decompositam digestis, perigonii segmentis lanceolatis acuminatis capsulam ovato-oblongam acuminatam subæquantibus. ♀ in fossis et humidis. — *J. articulatus* eng. bot. t. 238 non L. *J. sylvaticus* var. Fl. fr. 3. p. 169. — Moris. s. 8. t. 9. f. 8. n. 1. Capsula fusca. (v. v.)
21. *J. REPENS* (Req. vaucl. 2. p. 253.) culmo repente, ramis extra axillas ortis, foliis teretibus nodoso-articulatis ad ramorum axillas sitis, floribus capitatis in paniculam simplicem digestis, perigonii segmentis lanceolatis acuminatis. ♀ in humidis propè Avenionem secùs Druentiam (cl. Requier), propè Cherbourg (cl. Le Prév.). — Fl. fr. 5. p. 308. An præcedentis var? (v. s. sine fructu.)
22. *J. OBTUSIFLORUS* (Ehr. gram. 76.) culmo tereti lævi, foliis teretibus nodoso-articulatis, floribus capitatis, capitulis sessilibus pedunculatisve in paniculam suprà-decompositam divaricatam digestis, perigonii segmentis ellipticis obtusis capsulam ovatam triquetram acuminatam subæquantibus. ♀ in fossis et aquosis. — *J. articulatus* Fl. fr. 3. p. 169 an L? eng. bot. 30. t. 2144. (v. v.)
23. *J. MULTIFLORUS* (Desf. atl. 1. p. 313. t. 91.) culmo tereti lævi, foliis teretibus fistulosis acuminatis culmum subæquantibus, floribus solitariis sessilibus pedicellatisve in paniculam elongatam suprà-decompositam erectam digestis, pedunculus inæqualibus multifariam decompositis fasciculatis, perigonii segmentis lanceolatis acuminatis capsulam ovatam trigonam breviter mucronatam subæquantibus. ♀ in maritimis circà Telonem detexit cl. Requier, in Corsicâ ex Viv. Planta 3-pedalis et ultra. (v. s.)
24. *J. JACQUINI* (L. mant. 63.) culmo læviusculo foliis 1-2 instructo basi squamoso, foliis subulatis cylindricis fistulosis, capitulo terminali spathâ subulatâ breviore squamis ovatis imbricatis (nigris) nitidis cincto, perigonii segmentis lanceolatis acuminatis capsulam ovoideam ohtusam mucronatam subsuperantibus. ♀ in Alpibus Delphinatis. — Fl. fr. 3. p. 166. *J. biglumis* Jacq. vind. t. 4. f. 2. anstr. 3. t. 221. non L. — Scheuchz. gram. 323. t. 7. f. 9. (v. s.)
25. *J. TRIGLUMIS* (L. sp. 467.) culmo tereti striato basi folioso, foliis flexuosis subcanaliculatis culmo duplò brevioribus, capitulo trifloro terminali erecto


aphyllo bracteato, perigonii segmentis lanceolatis subobtusis capsula tumidiusculâ ovato-oblongâ obtusâ mucronatâ brevioribus. ♀ in Alpibus Delph., Galloprovinciæ. — Fl. fr. 3. p. 166. L. lapp. t. 10. f. 5. Fl. dan. t. 132. (v. s.)

IV. LUZULA DC. fl. fr. 3. p. 158. — Junci sp. L. — Juncoïdes Michel. gen. t. 51.

Perigonium 6-partitum glumaceum; stamna 6; capsula 1-locularis, 3-sperma, 3-valvis, valvulis septo destitutis. — Folia plana hinc inde pilosa.

1. L. NIVEA (DC. l. c.) radice repente, culmo lævi, foliis linearibus pilosis, corymbo composito, pedunculis sub-5-floris, perigonii segmentis angustè lanceolatis acutis, interioribus duplò longioribus. ♀ in Alpibus et montanis. — Juncus niveus L. — Scheuchz. gram. 320. t. 7. f. 7. — Moris. s. 8. t. 9. f. 7. n. 39. Fl. albi. (v. v.)
2. L. ALBIDA (DC. fl. fr. 3. p. 159.) radice fibrosâ, culmo striato, foliis linearibus pilosis, corymbo decomposito, pedunculis subquadrisfloris, perigonii segmentis angustè lanceolatis acutis, interioribus paulò longioribus, capsula ovatâ trigonâ acuminatâ perigonio paulo breviore. ♀ in nemorosis passim. — Junc. albida Hoffm. J. niveus Leers herb. t. 13. f. 6. non L. J. pilosus s. L. Fl. albidi. (v. v.)
3. L. LUTEA (DC. l. c.) foliis glabris lato-linearibus acuminatis, corymbo composito conferto, pedunculis multifloris, perigonii segmentis lanceolatis mucronatis subæqualibus splendentibus capsulam ovato-rotundam trigonam obtusam mucronatam æquantibus. ♀ in summis Alpium et Pyrenæorum pratis. — J. luteus All. Vill. dauph. 2. t. 6. Fl. lutei. (v. v.)
4. L. VERNALIS (DC. l. c.) foliis linear-lanceolatis linearibusve acutis pilosis, corymbo subsimplici laxissimo, pedunculis unifloris nutantibus, perigonii segmentis lanceolatis acutis æqualibus capsula globosâ obtusâ brevioribus. ♀ in sylvis vere frequens. — J. vernalis Ehr. J. pilosus Leers. herb. t. 13. f. 10. Fl. spadicei. (v. v.)
5. L. FORSTERI (DC. ic. gall. rar. 1. t. 2.) foliis linearibus angustis acuminatis pilosis, corymbo subsimplici laxissimo, pedunculis unifloris erectis, perigonii segmentis lanceolatis acuminatis æqualibus capsulam ovatam acutè trigonam mucronatam æquantibus. ♀ in montosis passim. — Fl. fr. 5. p. 304. J. Forsteri eng. bot. t. 1293. Fl. spadicei. (v. v.)
6. L. FLAVESCENS (Gaud. agrost. 2. p. 239.) foliis angustissimis parcè pilosis, corymbo umbellato eretto paucifloro, pedunculis subunifloris subæqualibus erectis, perigonii segmentis lanceolatis acuminatis æqualibus capsulam ovatam acutè trigonam acuminatam æquantibus. ♀ in sylvis montanis Jurassi et Pyren. orientalium. — Fl. fr. 5. p. 304. L. Hostii Desv. journ. 1. t. 6. f. 2. J. flavescentes Host. gram. 3. t. 94. An satis à priore distincta? Fl. flavescentes. (v. s.)
7. L. GLABRATA (Desv. journ. 1. t. 5. f. 3.) foliis lanceolato-linearibus acuminatis glabris, corymbo decomposito divaricato multifloro ereto laxo, pediculis 2-4-floris, floribus pedicellatis, perigonii segmentis lanceolatis acuminatis capsulam ovato-rotundam nitidam mucronatam subsuperantibus. ♀ in passuis humidis Montis-Aurei, Pyren. orient. (Ph. Thomas). — Fl. fr. 5. p. 304. J. intermedias Host. gram. 3. t. 99. Fl. spadicei. (v. v. DC.)
8. L. PARVIFLORA (Desv. journ. 1. p. 144.) foliis lanceolato-linearibus ad vaginæ faucenti parcè pilosis cæterum glabris, corymbo composito divaricato erecto multifloro, pedicellis omnibus unifloris, perigonii segmentis lanceolatis acuminatis capsulam subsuperantibus. ♀ in montosis Pyrenæorum et Alpium raro. — Fl. fr. 5. p. 305. J. parviflorus Rostk. junc. t. 1. f. 1. Præcedenti nivium affinis. (v. s. s. fructu.)





9. *L. SPADICEA* (DC. fl. fr. 3. p. 159.) foliis glabris linearibus acuminatis, vaginis fauce pilosis, corymbo decomposito divaricato laxo, pedunculis subquadrifloris, perigonii segmentis lanceolatis acuminatis capsulam ovato-rotundam trigonam breviter mucronatam æquantibus. ♀ in pratis humidis Alpium, montium Arverniæ et Pyrenæorum. — *J. spadiceus* All. Vill. dauph. 2. t. 6. f. 3. Fl. spadicei. (v. v.)
10. *L. MAXIMA* (DC. fl. fr. 3. p. 160.) foliis lanceolato-linearibus acutis pilosis, corymbo decomposito multifloro erecto laxo, pedunculis elongatis divaricatis subtrifloris, perigonii segmentis lanceolatis acuminatis capsulâ ovatâ trigonâ acuminatâ subbrevioribus. ♀ in montosis sylvaticis. — *J. pilosus* & *L. J. maximus* Retz. Willd. Fl. nitidi fusco et albo variegati. (v. v.)
11. *L. MULTIFLORA* (Lej. spa 169.) radice fibrosâ, foliis angustis pilosis, floribus capitatis, capitulis ovatis multifloris in corymbum umbellatum erectum dispositis, spiculis longè pedicellatis, perigonii segmentis lanceolatis acuminatis capsulâ ovatâ trigonâ mucronatâ subbrevioribus. ♀ in sylvis et paludosis passim. — Fl. fr. 5. p. 306. *J. multiflorus* Hoffsm. An satis à *L. campestris* distincta? (v. v.)
12. *L. CAMPESTRIS* (DC. fl. fr. 3. p. 161.) radice repente, foliis angustis plus minus pilosis, floribus capitatis, capitulis multifloris in corymbum simplicem brevem coarctatum dispositis, spiculis pedunculatis, perigonii segmentis lanceolatis acuminatis capsulâ ovato-globosâ trigonâ acutâ longioribus. ♀ in pascuis, nemorosis, montanis. — *J. campestris* L. Leers. herb. t. 13. f. 5. Capsula flava. Flores fusco et albo variegati. (v. v.)
β. congesta, floribus capitatis, capitulis in corymbum simplicem capitatum congestis. — *L. congesta* Lej. spa 163. Fl. fr. 5. p. 305. *L. campes-tris* β. Fl. fr. 3. p. 161. (v. v.)
13. *L. SUDETICA* (DC. fl. fr. 5. p. 306.) radice repente, foliis linearibus angustis ad faucem pilosis cæterum glabris, floribus capitatis, capitulis ovato-rotundis in corymbum simplicem erectum coarctatum folio florali breviorē congestis, perigonii segmentis lanceolatis mucronatis capsulâ ovato-rotundâ trigonâ obtusâ nitidâ subbrevioribus. ♀ in humidis torfaceis montanis Alsatiæ, Alpium, Arverniæ, Cebennarum, Pyrenæorum. — *L. nigricans* Desv. journ. 1. p. 158. *J. spicatus* Krock. sil. t. 52. Nimiūm præcedenti affinis. (v. v.)
14. *L. SPICATA* (DC. fl. fr. 3. p. 161.) foliis linearibus angustissimis glabris fauce pilosis, spicâ racemosâ nutante basi compositâ, perigonii segmentis lanceolatis acuminatis capsulam ovato-globosam obsoletè trigonam obtusam brevissimè mucronatam subæquantibus. ♀ in summis pratis Jurassi supra Gex (Babey), Alpium, Montis-Aurei (DC.), Pyrenæorum ex Benth. — *Juncus spicatus* L. lapp. t. 10. f. 4. fl. dan. t. 270. (v. v.)
15. *L. PEDIFORMIS* (DC. fl. fr. 3. p. 162.) foliis linearibus pilosis, spicâ racemosâ nutante basi compositâ et lobatâ, perigonii segmentis lanceolatis acuminatis capsulam ovato-globosam obsoletè trigonam acutam subsuperantibus. ♀ in montibus Delph., Gallop., Pyren. orient. — *Juncus pediformis* Vill. danph. 2. t. 6. (v. v.)

Ordo CVI. PALMÆ *Lin. ord. nat. n. 1. Juss. gen. 37.*

Perigonium sexpartitum persistens. Stamina sæpiùs 6, imis perigonii laciniis inserta. Ovarium 1 superum. Styli 1 aut 3. Fructus baccatus aut drupaceus, 1-3-locularis, 1-3-spermus. Semina ossea, Embryo minimus in cavitate albuminis magni demùm cornei. — Caulis fruticosus. Folia petiolata, basi vaginantia, pinnato-aut-palmato-lobata. Spadix inter folia nascentes, spathâ maximâ involutus. Flores numerosi sæpiùs abortu diclini.

I. CHAMÆROPS *L. gen. 1219.*

Spatha univalvis; flores nunc masculi nunc hermaphroditi; perigonii laciniæ 3 externæ minores bracteiformes; stamina 6, filamentis crassis coalitis; styli 3; baccæ 3 monospermæ.

I. *C. HUMILIS* (*L. sp. 1657.*) frondibus palmatis plicatis, caudicibus spinosis. ♂ circà Nicæam loco dicto St.-Hospice. — Fl. fr. 3. p. 724. Lam. ill. t. 900. (v. v.)

Ordo CVII. AROIDEÆ *Juss. gen. p. 23.*

Flores monoici sessiles circà spadicem simplicem sæpiùs spathâ monophyllâ involutum, mox nudi mox squamis stipati. Perigonium nullum. *Masc.* Stamina definita aut indefinita. Antheræ 1-aut-2-loculares. *Fem.* Ovaria nunc staminibus commixta, nunc ab iisdem segregata, 1-locularia rariùs 3-locularia polysperma; styli stigmataque totidem. Fructus baccatus rotundatus aut rariùs capsula aliquando abortu monosperma. Embryo rectus in centro albuminis carnosus aut farinacei; radicula infera. — Herbæ acaules aut caulescentes. Folia alterna aut radicalia, basi subvaginantia, interdùm pedata aut basi cordata.

Trib. I. *AROIDEÆ VERÆ* *Brown prod. p. 234.*


Flores squamis destituti. Fructus baccatus.

I. ~~ARUM~~ *L. gen. 1028.*

Spadix apice nudus; antheræ multiseriales ad dimidiā spadicis longitudinem; ovaria basi spadicis inserta; bacca unilocularis monosperma.

Sect. I. *DRACUNCULUS* *Tourn. inst. t. 70.*

Spatha basi non tubulosa, glandulæ acutæ (stamina abortiva) cirrhiformes 2-3-seriales suprà antheras spadici insertæ.



1. A. MUSCIVORUM (Linn. f. suppl. 410.) foliis radicalibus pedatis integrerimis, spadice cylindraceo apice crinito spathâ ovatâ planâ internâ pilosâ breviore. ♀ in Corsicâ propè Calvi et insulis circumiacentibus (cl. Soleiro). — A. crinitum Willd. sp. 4. p. 477. (v. s.)
2. A. DRACONIUS (L. sp. 1367.) foliis radicalibus pedatis, lobis integris, spadice lanceolato spathâ ovatâ planâ glabratâ longiore. ♀ in umbrosis incultis Galliae meridionalis, Aginni ex St.-Am., Andegaviae propè Sanctum-Macarium ex Bast. — Fl. fr. 3. p. 151. Lam. ill. t. 740. f. 2. — Lob. ic. t. 600. f. 1. (v. v.)
3. A. VINCENS (Lam. fl. fr. 3. p. 537.) foliis radicalibus hastato-sagittatis, lobis deflexis, spadice clavato spathâ breviore. ♀ ad sepes et sylvas. — Fl. fr. 3. p. 152. A. maculatum L. A. Pyrenaeum Lapeyr. ex cl. Benth. — Tab. ic. 746. — Lob. ic. 597. Variat foliis maculatis immaculatisve. (v. v.)
4. A. ITALICUM (Mil. dict. n. 2.) foliis radicalibus albo-venosis hastato-sagittatis, lobis auriculatis divaricatis, spadice clavato spathâ breviore. ♀ in sylvaticis et submontanis Galliae australis et austro-occidentalis. — Fl. fr. 3. p. 152. — Sabb. hort. rom. 2. t. 75. (v. v.)
5. A. PICTUM (L. f. suppl. 410.) foliis radicalibus cordatis crassiusculis venis canaliculatis et interdum albidis insculptis, spadice clavato spathâ breviore. ♀ in Corsicâ propè Ajaccio. — Fl. fr. 5. p. 303. (v. s.)

Sect. II. ARISARUM *Tourn. inst. t. 70.*

- Spatha basi tubulosa, glandulæ cirrhiformes nullæ; ovarium stylo coronatum.
6. A. ARISARUM (L. sp. 1370.) foliis radicalibus hastato-sagittatis mucronatis, lobis deflexis oblongis obtusis, spadice cylindraceo incurvato spathâ cucullata breviore. ♀ in umbrosis et petrosis Corsicæ, Niceæ, Galloprovinciæ. — Fl. fr. 3. p. 152. Arisarum vulgare Rich. — Barr. ic. t. 573. 1130. (v. s.)

II. CALLA L. gen. 1030.

Spadix undique tectus staminibus et ovariis intermixtis; bacca multilocularis polysperma.

1. CANTUARIA (L. sp. 1373.) foliis cordatis, spathâ planâ, spadice undique antheris ovariisque tecto. ♀ in fossis aquosis Alsatiæ, Lotharingiæ, Vogesorum. — Fl. fr. 3. p. 153. Lam. ill. t. 739. f. 1. — Lob. ic. t. 600. f. 2. — Barr. ic. t. 574. (v. s.)

Trib. II. ORONTIACEÆ Brown prod. 337.

Flores squamis perigoniformibus stipati. Fructus capsularis.

III. ACORUS L. gen. 434.

Spatha nulla; perigonium persistens globosum 6-partitum; stam. 6 perigonii laciinis opposita; ovarium globosum 3-loculare polyspermum; stigma sessile; capsula perigonio stipata.

1. A. CALAMUS (L. sp. 462. excl. var. a.) scapi mucrone longissimo foliaceo. ♀ in fossis aquaticis Alsatiæ, Delphinatûs, propè Beauvais (cl. Graves), Rennes ex cl. de Bréb. — Fl. fr. 3. p. 157. Lam. ill. t. 252. — Moris. s. 8. t. 13. f. 11. n. 4. (v. v.)

Ordo CVIII. TYPHACEÆ Juss. gen. 25.

Flores monoici in amenta unisexualia aggregati. Perigonum triphyllum aut obsoletum. *Masc.* Stamina 3. *Fem.* Ovarium unicum liberum monospermum, ovulo pendulo; stylus 1; stigmata 1-2. Fructus monospermus. Embryo rectus in centro albuminis carnosí aut farinacei. Radicula infera. — Herbæ enodes aquaticæ; folia alterna ensiformia subvaginantia.

I. *TYPHA* Tourn. inst. 301. L. gen. 1040.


Amenta cylindrica. *Masc.* Perigonum triphyllum obsoletum; stamina 3 infernè in filamentum unicum coalita. *Fem.* Perigonum nulum, fructus pedicellatus, pedicello basi pilis longis pappi instar cincto.

1. *T. GLADIOLINA* (L. sp. 1377.) foliis linearibus planis, spicâ masculâ femineâque approximatis, utrâque cylindricâ. ♀ in paludibus. — Fl. fr. 3. p. 148. Lam. ill. t. 748. f. 1. — Lob. ic. t. 81. f. 1. (v. v.)
2. *T. ANGUSTIFOLIA* (L. sp. 1377. var. α.) foliis linearibus canaliculatis, spicâ masculâ femineâque remotis, utrâque cylindricâ. ♀ in paludibus. — Fl. fr. 3. p. 148. Lam. ill. t. 748. f. 2. Fl. dan. t. 815. (v. v.)
3. *T. MEDIA* (Schl. cat. 59.) foliis linearibus angustis planis, spicâ masculâ femineâque remotis utrâque cylindraceâ. ♀ in paludosis passim. — Fl. fr. 5. p. 302. — Moris. s. 8. t. 13. f. 9. n. 2. (v. v.)
4. *T. MINIMA* (Hoppe exs. Hofsm. germ. 4. p. 251.) foliis setaceo-linearibus canaliculatis, spicâ masculâ femineâque remotis, femineâ ellipticâ. ♀ in arenosis uidis Alsatiæ, Delphin., Lugd., Arelatis, Avenionis, Niceæ. — Fl. fr. 3. p. 148. excl. syn. Sm. Lin. — Lob. ic. 81. t. 2. — Moris. s. 8. t. 13. f. 10. n. 3. (v. v.)

II. *SPARGANIUM* Tourn. inst. 302. L. gen. 1041.

Amenta globosa; perigonum triphyllum; fructus sessilis turbinatus setulis basi destitutus.

1. *S. RIVULARE* (L. sp. 1378.) foliis decumbentibus planis, pedunculo communi simplici, stigmate ovato brevissimo, capitulo masculino subsolitario. ♀ in rivulis stagnis et lacubus passim. — Fl. fr. 3. p. 150. eng. bot. t. 273. (v. v.)
2. *S. SIMPLEX* (Roth. germ. 3. p. 469.) foliis basi triquetris lateribus planis, pedunculo communi simplici, stigmate lineari. ♀ in stagnis. — Fl. fr. 3. p. 149. eng. bot. t. 745. *S. erectum* ♂. L. — Lob. ic. t. 80. f. 2. (v. v.)
5. *S. FOSSILE* (C. Bauh. pin. 153.) foliis basi triquetris lateribus concavis, pedunculo communi ramoso, stigmate lineari. ♀ in fossis et ad ripas fluviorum. — Fl. fr. 3. p. 149. eng. bot. t. 744. *S. erectum* α. L. — Lob. ic. t. 80. f. 1. (v. v.)





Ordo CIX. CYPERACEÆ *Juss. gen. 26.*

Flores glumacei spicati, hermaphroditi aut diclini. Gluma aut squama univalvis. Perigonum proprium nullum. Stamina 3, filamentum capillare; antheræ apice acuminatae basi cor-datæ. Ovarium liberum simplex; stylus unicus; stigmata 2-3. Fructus (akenium) triangularis aut compressus monospermus non dehiscens. Albumen farinaceum; embryo minimus ad basin albuminis. — Herbæ perennes gramineis similes sed plerumque enodes; folia vaginantia, vaginâ integrâ.

I. *CYPERUS*. *Tourn. inst. 299. L. gen. 66.*

Flores hermaphroditi; glumæ paleaceæ distiche imbricatæ carinatæ; spiculæ compressæ; stylus deciduus; semen basi upidum.

1. *C. MONTI* (L. supp. 102.) culmo triquetro basi folioso, involucro umbellam decompositam paniculatam superante, foliolis 3-6 carinato-plicatis inæquilibus, pedunculis longis nudis, spiculis alternis lanceolato-linearibus laxis, stigmatibus 2, glumis demùm distinctis obtusis, seminibus ovato-rotundidis subcompressis breviter mucronatis. ♀ secus Varum (Stire), Rhodanum inferiorem, ad ripas Aturis inferioris. — Fl. fr. 3. p. 146. et 5. p. 302. — Monti gram. 12. t. 1. f. 2. (v. v.)
2. *C. LONGUS* (L. sp. 67.) culmo triquetro folioso, involucro foliolis 3-4 linearibus planis plicatis umbellam foliosam supra-decompositam longe superantibus, pedunculis nudis longissimis, spiculis alternis linearibus angustis laxiusculis, stigmatibus 3, glumis densè imbricatis retusis, seminibus oblongis trigonis submucronatis. ♀ in paludesis Galliae occidentalis australisque rarius, Lotharingiæ ex Vill., circa Parisios ex Mérat. — Fl. fr. 3. p. 145. Jacq. ic. rar. 2. t. 297. — Lob. ic. t. 75. f. 2. — Moris. s. 8. t. 11. f. 7. n. 13. (v. v.)
3. *C. ROTUNDUS* (L. sp. 67.) radicum fibrillis hinc indè in tuberculos ovatos inflatis, culmo triquetro nudo, involucro foliolis 3-4 linearibus planis plicatis umbellam decompositam paniculatam superantibus, spiculis alternis elongato-linearibus laxiusculis, stigmatibus 3, glumis acutiusculis, seminibus ovoideis 3-gonis obtusis. ♀ in omni regione mediterraneâ. — Fl. fr. 3. p. 146. et 5. p. 301. *C. olivaris* Targ. *C. esculentus* Gou. — Scheuchz. gram. t. 9. f. 3. — Camer. epit. p. 10. ic. (v. v.)
4. *C. ESCULENTUS* (L. sp. 67.) radicum tuberibus subrotundis terminalibus, culmo triquetro nudo, umbellâ foliosâ. ♀ in Galloprovinciâ cultus. — Fl. fr. 3. p. 146. — Lob. ic. t. 78. f. 1. 2. — Moris. s. 8. t. 11. f. 6. n. 10. (v. s. c. sine flore.) †.
5. *C. FUSCUS* (L. sp. 69) culmo triquetro, involucro 3-phyllo, foliolis planis umbellam subcompositam longè superantibus, spiculis linearibus confertis, stigmatibus 3, glumis acutiusculis, seminibus acutè triquetris. (I in paludosis. — Fl. fr. 3. p. 145. — Moris. s. 8. t. 11. f. 14. n. 38. — J. Baulh. hist. 2. p. 471. ic. (v. v.)
6. *C. FLAVESCENS* (L. sp. 68.) culmo triquetro, involucro triphyllo, foliolis planis plicatis umbellam subcompositam superantibus, spiculis lanceolatis confertis, stigmatibus 2, glumis obtusis, seminibus rotundatis subcompressis mucronatis. (I in paludosis. — Fl. fr. 3. p. 145. Lam. ill. t. 34. f. 1. — Moris. s. 8. t. 11 f. 13. n. 37. (v. v.)
7. *C. FASCICULARIS* (Rottb. cyp. 39. t. 11. f. 1.) culmo triquetro basi foliis 2-3 carinato-plicatis instructo, involucro polyphyllo umbellam longè superante.

- spiculis linearis-lanceolatis corymboso-capitatis confertissimis, glumis obtusis, seminibus lanceolato-ovatis breviter mucronatis. \mathcal{L} circa Nicæam secùs Varum. — Fl. fr. 3. p. 722. Lam. ill. t. 38. f. 2. — Pluck. t. 416. f. 6. (v. s.)
8. C. JUNCIFORMIS (Cav. ic. t. 204. f. 1.) culmo subtereti, spiculis linearis-lanceolatis sessilibus aggregatis, spathâ diphylli foliolo altero spiculis breviore, glumis mucronatis. \mathcal{L} in humidis circa Nicæam. — Fl. fr. 3. p. 144. Desf. atl. t. t. 7. f. 1. C. distachyos All. anct. t. 2. f. 5. (v. v. DC.)

II. SCHÆNUS L. gen. 65.

Flores hermaphroditi; glumæ paleaceæ undique imbricatæ, inferiores steriles; semen nudum aut setulis glumâ brevioribus basi cinctum.

Sect. I. SCHÆNIS. — Schænus Vahl. enum. 2. p. 207.

Stylus deciduus.

* Semine setulis basi cincto.

1. S. FERRUGINEUS (L. sp. 64.) culmo tereti nudo, capitulo linearis-elliptico, spiculis 2-3, involucri diphylli valvulis subæqualibus spicas non superantibus. \mathcal{L} in montibus Jurassi et Galloprovinciæ. — Fl. fr. 3. p. 142. excl. syn. Moris. Schrad. germ. 1. t. 1. f. 4. (v. v.)
2. S. NIGRICANS (L. sp. 64.) culmo tereti nudo, capitulo ovato, spiculis numerosis, involucri diphylli valvula alterâ subulata longiore capitulum superante. \mathcal{L} in paludibus et inundatis. — Fl. fr. 3. p. 142. eng. bot. t. 1121. — Scheuchz. agr. t. 7. f. 13. 14. 15. — Magn. monsp. p. 144. ic. (v. v.)
3. S. COMPRESSUS (L. sp. 65.) culmo teretiusculo basi folioso, foliis planis, spiculis numerosis sessilibus in spicam oblongam disticho-compressam approximatis. \mathcal{L} in pratis humidis passim. — eng. bot. t. 791. Poll. pal. t. 1. f. 3. Scirpus caricus Retz. Fl. fr. 3. p. 137. Host. gram. 3. t. 57. Gluma infima plurimque sterilis. (v. v.)


** Semine basi nudo.

4. S. MUCRONATUS (L. sp. 63.) culmo tereti nudo, foliis canaliculatis, spiculis ovatis sessilibus dense fasciculatis, involucro polyphyllo patente umbellam longè superante. \mathcal{L} in maritimis meridionalibus. — Fl. fr. 3. p. 144. — Lob. ic. t. 87. f. 1. (v. v.)
5. S. MARISCUS (L. sp. 62.) culmo tereti folioso, foliis margine dorsoque aculeato-serratis, spiculis bifloris ovato-acutis sessilibus capitatis, capitulis pedicellatis sessilibus in corymbos numerosos simplices decompositos digestis. \mathcal{L} in paludibus passim. — Fl. fr. 3. p. 143. eng. bot. t. 950. Cladium germanicum Schrad. germ. 1. t. 5. f. 7. — Lob. ic. t. 76. f. 1. — Moris. s. 8. t. 11. f. 12. n. 24. (v. v.)

Sect. II. RHYNCHOSPORA Vahl. enum. 2. p. 229.

Semen coronatum stylo persistente indurato, basi latitudine seminis, setulis basi cinctum.

6. S. ALBUS (L. sp. 65.) radice fibrosa, culmo trigono folioso diviso, foliis carinatis angustissimis, floribus fasciculatis (albis), fasciculis terminalibus subcorymbosis involucrum subæquantibus. \mathcal{L} in turfosis et paludosis passim. — Fl. fr. 3. p. 143. eng. bot. t. 985. Rhynchospora alba Vahl. l. c. — Scheuchz. agr. t. 11. f. 11. (v. v.)
7. S. FUSCUS (L. sp. 1664.) radice repente, culmo teretiusculo folioso diviso, foliis canaliculato-setaceis, floribus fasciculatis (fuscis), fasciculis terminalibus subgeminatis involucro longe minoribus. \mathcal{L} in pratis humidis Galliae occidentalis et boreali-occidentalis. — Fl. fr. 3. p. 143. eng. bot. t. 1575. Rhynch. alba & fusca Vahl. R. fusca Roem. et Schult. 2. p. 88. — Moris. s. 8. t. 11. f. ult. n. 40. (v. s.)





III. SCIRPUS L. gen. 67.

Flores hermaphroditæ; glumæ paleaceæ undique imbricatae, omnes fertiles; semen nudum aut setulis glumâ brevioribus basi ciustum.

Sect. I. FIMBRISTYLIS Vahl. enum. 2. p. 285.

- S**tylus bifidus basi bulbosus compressus margine ciliatus, setæ hypogynæ nullæ.
1. **S. ANNUUS** (All. ped. t. 88. f. 5.) culmo triquetro nudo basi folioso, foliis setaceis pubescentibus, paniculâ corymbosâ terminali foliacâ, spiculis oblongis acutis pedunculatis, intermediâ sessili, glumis ovatis mucronatis. (I) Nicææ secus Varum (Stire). — Fl. fr. 3. p. 141. Fimbristylis dichotoma Vahl. F. annua Rœm. et Sch. 2. p. 95. — Pluck. t. 119. f. 3. (v. s.)

Sect. II. ELEOCHARIS R. Brown prod. 1. p. 224.

Setæ hypogynæ (4-12) denticulatæ raro nullæ; fructus basi styli dilatata in durata coronatus.

2. **S. PALUSTRIS** (L. sp. 70.) radice repente, culmo tereti basi vaginâ aphyllâ instructo, spicâ ovato-oblongâ nudâ terminali, glumis imbricatis obtusis, seminibus ovato-globosis subcompressis. ♀ in paludibus et fossis. — Fl. fr. 3. p. 133. eng. bot. t. 131. — Lob. ic. t. 86. f. 1. Eleocharis palustris Rœm. et Sch. 2. p. 151. — Scheuchz. gram. t. 7. f. 17. (v. v.)
3. **S. MULTICAULIS** (Sm. brit. 1. p. 48.) radice repente, culmo tereti striato basi vaginâ aphyllâ instructo, glumis obtusis externis aequalibus spicâ terminali sæpè viviparâ brevioribus, floribus triandris, seminibus ovato-globosis trigonis. ♀ in aquosis propè Lutetiam, Rothomagum, in agro Soloniensi, Monte-Aureo, Lozerâ, Corsicâ. — Fl. fr. 5. p. 299. St.-Hil. in journ. bot. 1804. 3. t. 21. An satis à sequente distinctus? (v. v.)
4. **S. BXOTHYRON** (L. supp. 103.) radice fibrosâ, culmo tereti striato basi vaginâ aphyllâ instructo, glumis obtusis, externis spicâ terminali ovatâ brevioribus inæqualibus, seminibus ovatis 3-gonis. ♀ in paludosis. — Fl. fr. 3. p. 135. **S. campestris** Roth. Fl. fr. 3. p. 156. **S. Halleri** Vill. **S. pauciflorus** eng. bot. t. 1122. — Scheuchz. gram. t. 7. f. 21. (v. v.)
5. **S. OVATUS** (Roth. cat. 1. p. 5.) radice fibrosâ, culmo tereti filiformi basi vaginâ aphyllâ instructo, spicâ ovatâ nudâ, floribus diandris, glumis arcte imbricatis obtusissimis, seminibus obovato-globosis subcompressis. (I) in humidis passim. — Fl. fr. 3. p. 134. et 5. p. 299. Eleocharis ovata Rœm. et Sch. 2. p. 152. **S. turgidus** Pers. — Moris. s. 8. t. 10. f. 19. n. 34. (v. s.)

Sect. III. ISOLEPIS R. Brown prod. 1. p. 221.

Setæ hypogynæ nullæ; stylus deciduus.

* *Spiculis terminalibus solitariis.*

6. **S. FLUITANS** (L. sp. 71.) culmo tereti folioso flaccido, foliis setaceis planis, in pedunculis alternis uudis, spicis ovato-globosis, glumis ovatis obtusis. ♀ in fossis et stagnis Paris., Andeg., Monsp. ex Gouan, Galloprovinciæ ex Ger. — Fl. fr. 3. p. 139. Isolepis fluitans R. Br. l. c. — Moris. s. 8. t. 10. f. 13. n. 31. — Pluck. t. 35. f. 1. (v. v. DC.)
 7. **S. ACICULARIS** (L. sp. 71.) culmo simplici quadrangulo gracili basi vaginâ aphyllâ instructo, spicâ ovatâ acutâ terminali, glumis acutis exterioribus acuminatis majoribus. ♀ in paludibus et inundatiis passim. — Fl. fr. 3. p. 138. eng. bot. t. 749. Eleocharis acicularis Rœm. et Sch. 2. p. 154. — Moris. s. 8. t. 10. f. 21. n. 37. — Pluck. t. 40. f. 7. (v. v.)
- ** *Spiculis lateralibus aggregatis raro solitariis.*
8. **S. SETACEUS** (L. sp. 73.) culmo setaceo gracili simplici nudiusculo, spicis ad apicem culmi lateralibus subgeminis sessilibus ebracteatis, glumis ovatis obtusis rariis mucronulatis, semiuibus obovato-globosis longitudinaliter

- striatis. (I) in inundatis passim. — Fl. fr. 3. p. 139. *Isolepis setacea* Br. I. p. 221. — Moris. s. 8. t. 10. f. 10. n. 23. (v. v.)
9. *S. SUPINUS* (L. sp. 73.) culmo tereti simplici nudo, spicis 3-6 ovatis sessilibus in capitulum laterale in medio culmo sessile glomeratis, glumis ovatis mucronulatis, seminibus obovato-globosis 3-gonis breviter mucronatis transverse rugulosis. (I) in inundatis circâ Argentoratum (cl. Nestler), Parisios. — Fl. fr. 3. p. 140. *Isol. supina* Br. I. c. (v. v. D. ad lacum Genev.)

* * * *Spiculis terminalibus aggregatis.*

10. *S. HOLOSCHÆNUS* (L. sp. 72.) culmo elongato tereti nudo basi vaginis 2-3 acuminatis instructo, capitulis subglobosis pluribus pedunculatis sessilibus que in paniculam umbellatam simplicissimam digestis, involucro diphylo inaequali mucronato, seminibus minutissimis. ♀ in pratis humidis provinc. austr. occidentaliisque. — Fl. fr. 3. p. 140. *Isolepis holoschænus* Rœm. et Sch. 2. p. 115. — Moris. s. 8. t. 10. f. 8. n. 17. — Pluck. t. 40. f. 4. (v. v.)

♂. *Romanus*, capitulo lateralí sessili. — *S. Romanus* L. sp. 73. Fl. fr. 3. p. 140. — Barr. t. 255. f. 3. (v. v.)

11. *S. MICHELIANUS* (L. sp. 76.) culmo triquetro basi folioso, foliis planis, spiculis in capitulum globosum aggregatis, involucro polyphylo capitulum longè superante, seminibus sublinearibus compressis acutis. (I) in pratis et arenis humidis Galliae occidentalis, agri Ruscinonensis ex Lapeyr., Monspeiliensis ex Gou. — Fl. fr. 3. p. 141. *Isol. Micheliana* Rœm. et Sch. 2. p. 114. — Till. pis. t. 21. f. 5. (v. v.)

12. *S. PUBESCENS* (Desf. atl. 1. t. 10.) culmo triquetro apice pedunculis spicisque pubescentibus, spicis confertis ovatis, glumis latè ovatis aristato-mucronatis, seminibus globosis trigonis retusis. ♀ in humidis Corsicæ propè Ajaccio. — Fl. fr. 5. p. 301. *Isol. pubescens* Rœm. et Sch. 2. p. 118. (v. s.)

Sect. IV. SCIRPOIS. — *Scirpus R. Br. I. c.*

Setæ hypogynæ squamis breviores; stylus deciduus.

* *Spicis solitariis.*

13. *S. CESPITOSUS* (L. sp. 71.) radice fibrosâ, culmo tereti sulcato rigido basi vaginis mucronatis instructo, glumis obtusiusculis externis maximis spicam ovali-oblongam terminalem subæquantibus, seminibus ovato-globosis trigonis brevissimè mucronatis. ♀ in paludosis montanis et ericetis turfosis. — Fl. fr. 3. p. 135. eng. bot. t. 1029. — Scheuchz. gram. t. 7. f. 18. — Pluck. t. 40. f. 6. (v. v.)


* * *Spicis pluribus.*


14. *S. TRIQUETER* (L. mant. 29.) radice repente, culmo triquetro nudo ultra cymam producto erecto, cynâ laterali confertâ, spiculis ovato-globosis in capitula sessilia pedunculatae digestis, glumis ovatis breviter mucronatis, seminibus obovatis breviter mucronatis. ♀ in palustribus rariùs. — Fl. fr. 3. p. 136. *S. mucronatus* Poll. Roth. non L. — Pluck. t. 40. f. 2. — Moris. s. 8. t. 10. f. 9. n. 20. (v. s.)

15. *S. LITTORALIS* (Schrad. germ. 1. t. 5. f. 7.) culmo triquetro apice rectiusculo basi vaginis 1-2 foliiferis instructo, spiculis oblongo-ovatis pedicellatis in cymam lateralem decompositam congestis, stigmatibus 2, glumis latè ovatis breviter mucronatis, seminibus oblongo-bovatis breviter mucronatis. ♀ in paludosis arenosis subsalsis secùs Mediterraneum passim. — Fl. fr. 5. p. 300. (v. v. DC.)

16. *S. MUCRONATUS* (L. sp. 73.) culmo triangulo nudo apice ultra capitulum producto subpatulo, spiculis ovatis in capitulum sessile laterale conglomératis, glumis lato-ovatis obtusis vix mucronatis, stigmatibus 3, seminibus obovato-globosis compresso-trigonis breviter mucronatis. ♀ in pratis humidis rariùs. — Fl. fr. 3. p. 137. — Scheuchz. gram. t. 9. f. 14. (v. s.)

17. *S. LACUSTRIS* (L. sp. 72.) culmo tereti elongato nudo ad basin vaginis 2-3





scariosis instructo, cymâ terminali decompositâ, spiculis ovatis sessilibus pedunculatisque in capitula pedicellata agglomeratis, glumis lato-ovatis breviter mucronatis, seminibus ovato-globosis subcompressis breviter mucronatis. ♀ in paludibus et lacubus. — Fl. fr. 3. p. 136. eng. bot. t. 666. — Lob. ic. t. 85. f. 2. — Moris. s. 8. t. 10. f. 1. (v. v.)

18. *S. TENUIFOLIUS* (DC. fl. fr. 5. p. 300.) radice repente, culmo triquetro laevi basi foliis 1-2 planis apice triquetris instructo ultra capitulum producto erecto, spiculis 1-3 sessilibus in capitulum laterale sessile conglobatis, glumis lato-ovatis aristato-mucropatis externis apice trifidis, stylo bifido, seminibus ovato-globosis compressis breviter mucronatis. ♀ in paludibus maritimis pagi dicti Teste de Buch propè Burdigalam. (v. v. DC.)

19. *S. MARITIMUS* (L. sp. 74.) culmo triquetro folioso, foliis linearibus planis, spiculis ovato-oblongis sessilibus in capitula sessilia pedunculatae aggregatis, capitulis in paniculam cymosam simplicem terminalem conglobatis, glumis mucronatis externis trifidis, dente intermedio subulato, seminibus obovatis trigonis breviter mucronatis. ♀ in lacubus et fossis. — Fl. fr. 3. p. 137. et 5. p. 301. eng. bot. t. 342. *S. tuberosus* Desf. — Scheuchz. gram. t. 9. f. 7-10. — Lob. ic. t. 20. f. 1. (v. v.)

20. *S. SYLVATICUS* (L. sp. 75.) culmo triquetro folioso, foliis lato-linearibus planis, paniculâ corymbosâ terminali suprà-decompositâ foliaceâ, spiculis ovatis sessilibus pedunculatis confertis, glumis ovatis obtusis, seminibus minimis triquetris. ♀ in nemorosis humidis. — Fl. fr. 3. p. 138. eng. bot. t. 919. Lam. ill. t. 38. f. 2. — Moris. s. 8. t. 11. f. 8. n. 15. (v. v.)

IV. ERIOPHORUM L. gen. 68.

Flores hermaphroditi; glumæ paleaceæ undique imbricatæ; semen basi setis longissimis cinctum.

§. 1. *Spicis pluribus pedunculatis.*

1. *E. POLYSTACHYUM* (L. sp. 76.) culmo tereti, foliis lato-linearibus planis apice triquetris, pedunculis matrnis nutantibus sæpè ramosis, glumis obtusis, seminibus trigonis ob lanceolatis basi attenuatis obtusis. ♀ in pratis palustribus frequens. — Fl. fr. 3. p. 131. eng. bot. t. 563. *E. latifolium* Hoppe, Gaud. fl. helv. 1. p. 129. *E. vulgare* Pers. ench. 1. p. 70. (v. v.)

β. *Vaillantii*, pedunculis abbreviatis spicâ brevioribus. — *E. Vaillantii* Poit. et Turp. t. 52. Fl. fr. 5. p. 298. *E. angustifolium* β *Vaillantii* Gaud. 1. c. (v. s.)

2. *E. GRACILE* (Roth. cat. 2. p. 259.) culmo triquetro, foliis canaliculato-plicatis triquetris, pedicellis simplicibus erectis, glumis obtusis, seminibus oblongo-linearibus acutè triquetris retusis. ♀ in pratis paludosis rariüs. — Fl. fr. 3. p. 132. eng. bot. t. 2402. *E. triquetrum* Hoppe. (v. s.)

3. *E. ANGUSTIFOLIUM* (Reich. manœfr. n. 34.) culmo tereti, foliis linearibus canaliculato-plicatis supernè triquetris, pedunculis matrnis nutantibus omnibus simplicibus, glumis oblongo-lanceolatis acuminatis, seminibus subacutis lanceolatis acutè triquetris. ♀ in pratis paludosis rariüs. — Fl. fr. 3. p. 131. eng. bot. t. 564. *E. intermedium* Bast. in journ. bot. 1814. 3. p. 19. Fl. fr. 5. p. 298. (v. v.)

§. 2. *Spicis solitariis terminalibus.*

4. *E. VAGINATUM* (L. sp. 76.) radice fibrosâ cespitosâ, culmo vaginato trigono, spicâ ovatâ scariosâ, antheris linearibus elongatis. ♀ in paludosis turfosis montosis. — Fl. fr. 3. p. 132. eng. bot. t. 873. *E. cespitosum* Host. gram. 1. t. 39. — Scheuchz. ag. t. 7. f. 1. 2. 3. (v. v.)

5. *E. CAPITATUM* (Hoffm. germ. 3. p. 26.) radice repente, culmo basi vaginato tereti, spicâ subglobosâ, antheris cordato-ovatis brevibus. ♀ in paludibus Alpium et Pyrenæorum. — Fl. fr. 3. p. 133. eng. bot. t. 2387. *E. Scheuchzeri* Hoppe. Pers. — Scheuchz. prod. t. 7. (v. v.)

6. *E. ALPINUM* (L. sp. 77.) radice subrepente, culmo angulato gracili nudin-

culo, spicâ ovato-cylindricâ, setis ad quodque semen subsenis crispis. \mathcal{U} in paludosis Vogesorum, Jurassi, Alpium, montium Ligeris. — Fl. fr. 3. p. 133. eng. bot. t. 311. — Scheuchz. prod. t. 8. f. 1. agr. t. 7. f. 4. (v. v.)

V. KOBRESIA Willd. sp. 4. p. 205. DC. fl. fr. 5. p. 298.

Flores monoici, masculi et feminei in iisdem spicis permixti et sæpius sub iisdem squamis geminati et squamulâ distincti; spiculæ bifloræ; semina triquetra in urceolo minime inclusa.

1. K. SCIRPINA (Willd. sp. 4. p. 205.) spicâ solitariâ simplici tereti. \mathcal{U} in summis Alpibus Delph. et Pyrenæis. — Fl. fr. 5. p. 298. Carex Bellardi All. ped. t. 92. f. 2. Fl. fr. 3. p. 103. C. myosuroides Vill. dauph. 2. t. 6. C. Dufourii Lapeyr. abr. supp. 140. Elyna spicata Schrad. (v. v.)

VI. CAREX Gærtn. carp. 1. p. 12. t. 2. Good. trans. lin. 2.


Flores monoici aut rarius dioici, spiculis nunc androgynis nunc unisexualibus; stigmata 2-3; urceolus persistens ovarium et postea semen includens apice perforatus, capsulaeformis.

§. 1. Spicâ unicâ simplici; stigmatibus 2.

- C. DIOICA (L. sp. 1379.) radice repente, foliis setaceis carinato-triquetris culmisque lœvibus, spicis dioicis cylindricis angustis, fructibus erectiusculis confertis ovatis striatis mucronatis margine supernè serrulatis. \mathcal{U} in pratis spongiosis montanis. — Fl. fr. 3. p. 100. eng. bot. t. 643. Schk. trad. n. 1. A. t. A. n. 4. C. linnæana Host. 3. t. 77. — Mich. gen. t. 32. f. 2. (v. v.)
- C. DAVALLIANA (Smith. trans. lin. 5. p. 266.) radice fibrosâ, foliis setaceis carinato-triquetris culmisque retrorsum scabris, spicis masculis androgynisve linearibus, fructibus recurvatis confertis oblongo-subulatis triquetris nervosis margine supernè scabris patulis demùm reflexis. \mathcal{U} in pratis spongiosis montanis. — Fl. fr. 3. p. 101. Schk. car. trad. n. 1. B. t. A. 2. W. n. 2. — Scheuchz. gram. t. 11. f. 10. (v. v.)
- C. PULICARIS (L. sp. 1380.) foliis setaceis convoluto-canaliculatis, spicâ androgynâ supernè masculâ, fructibus oblongis laxis teretiusculis glabris utrinque attenuatis demùm retroflexis squamâ persistenti longioribus. \mathcal{U} in pascuis limosis. — Fl. fr. 3. p. 101. Schk. car. trad. n. 13. t. A. n. 3. eng. bot. t. 105. — Mich. gen. t. 33. f. 1. (v. s.)
- C. MACROSTYLA (Lapeyr. abr. 562.) foliis setaceis convoluto-canaliculatis, spicâ linearis androgynâ supernè masculâ, fructibus oblongis teretiusculis glabris utrinque attenuatis erectis squamâ duplò longioribus, stylo longè exerto. \mathcal{U} in Pyrenæis editioribus. — Fl. fr. 5. p. 287. (v. s.)

§. 2. Spicâ unicâ simplici; stigmatibus 3.

- C. PYRENAICA (Wahl. act. holm. 1803. p. 139.) foliis linearibus canaliculatis, spicâ ovatâ androgynâ supernè masculâ, fructibus confertis oblongis acuminatis primùm erectis demùm patenti-reflexis squamâ caducâ vix longioribus. \mathcal{U} in Pyrenæis. — Fl. fr. 5. p. 287. C. Fontanesiana et C. Ramondiana Fl. fr. 3. p. 102. C. acutissima Degl. in Lois. gall. 628. C. Marchandiana Lapeyr. (v. v.)
- C. RUPESTRIS (All. ped. t. 92. f. 1.) culmo acutangulo, foliis rigidis linearibus striatis planiusculis, spicâ androgynâ supernè masculâ cylindricâ, fructibus laxisculis obovatis squamis obtusissimis brevioribus. \mathcal{U} in rupestribus editiorum Alpium Delphinatûs (DC.). — Fl. fr. 5. p. 288. C. petræa Gaud. agr. 2. p. 78. (v. v. DC.)
- C. PAUCIFLORA (Light. scot. 2. t. 6. f. 2.) foliis setaceis carinato-plicatis, spicâ subovatâ androgynâ, floribus 5-8 uno alterove superiori masculo, fructibus laxis utrinque subulatis divaricatis patulis squamas femineas caducas











- vix superantibus. ♀ in pratis paludosis Vogesorum, Jurassi et Alpinum. — Fl. fr. 3. p. 102. Schk. trad. t. A. n. 4. C. leucoglochin L. f. supp. 413. (v. v.)
- §. 3. *Spicis pluribus androgynis supernè masculis; stigmatibus 2.*
8. *C. ARENARIA* (L. sp. 1381.) foliis linearibus planiusculis striatis, culmo incurvo triquetro, spiculis plurimis ovatis alternis sessilibus approximatis, superioribus masculis, inferioribus feminis, intermediis androgynis, fructibus confertis ovato-oblongis marginatis acuminatis bifidis margine scabris squamas ovatas acuminatas æquantibus. ♀ in arenosis maritimis Oceanii et Corsicæ. — Fl. fr. 5. p. 288 et 3. p. 103. excl. syn. Bell. eng. bot. t. 928. Schk. trad. t. B et Dd. n. 6. (v. v.)
9. *C. DISTICHA* (Huds. ang. 403.) foliis linearibus planis, culmo erecto acute triquetro angulis scabro, spiculis plurimis ovatis alternis sessilibus in spicam ovato-cylindricam imbricato-congestis, inferioribus remotiusculis, superioribus et inferioribus feminis, intermediis androgynis, fructibus ovato-oblongis acuminatis marginatis bifidis ciliato-serratis squamas ovato-oblongas acuminatas æquantibus. ♀ in paludosis. — Fl. fr. 3. p. 104. C. intermedia Good. trans. lin. 2. p. 154. Schk. trad. t. B. n. 7. Gaud. agr. 2. p. 80. C. arenaria Leers. herb. t. 14. f. 2. non L. (v. v.)
10. *C. VULPINA* (L. sp. 1382.) foliis lato-linearibus planis acuminatis, culmo erecto acutissimè triquetro, bracteis serrulatis, spiculis ovatis numerosis sessilibus in spicam oblongam interruptam subapproximatis, fructibus ovatis acuminatis bidentatis compresso-triquetris divergentibus margine scabris squamas ovatas acuminatas subsuperantibus. ♀ in paludosis. — Fl. fr. 3. p. 105. eng. bot. t. 307. Schk. trad. t. 6. n. 10. — Mich. t. 33. f. 13. 14. (v. v.)
11. *C. DIVISA* (Huds. ang. 405.) radice repente, foliis linearibus carinato-plicatis scabris, culmo acutè trigono, bracteâ foliacè erectâ strictâ, spiculis 3-6 sessilibus oblongo-ovatis in spicam ovatam approximatis, fructibus ovatis subalatis acuminatis bidentatis adpressis squamas ovatas aristato-acuminatas subæquantibus. ♀ ad vias et in arenosis Galliae mediterraneæ, occidentalis et boreali-occidentalis. — Fl. fr. 3. p. 105 et 5. p. 289. Good. tr. lin. 2. t. 19. f. 2. eng. bot. t. 1096. C. schænoides Host. 1. t. 45. C. splendens Pers. C. Bertoloni Schk. app. (v. v.)
12. *C. DIVULSA* (Good. tr. lin. 2. p. 160.) foliis linearibus planis, culmo erecto acutè triquetro striato scabriusculo, spiculis ovatis superioribus approximatis, inferioribus distantibus, fructibus erectiusculis ovatis plano-convexis marginatis scabris acutis bidentatis glumas ovatas acutas superantibus. ♀ in nemorosis humidis. — Fl. fr. 3. p. 105. Schk. car. trad. t. Dd. n. 89. eng. bot. t. 629. — Mich. t. 33. f. 10. An satis à sequenti distincta? (v. v.)
13. *C. MURICATA* (L. sp. 1382.) foliis linearibus planis, culmo erecto acutè triquetro striato scabro, spiculis ovatis in spicam cylindricam interruptam subapproximatis, fructibus scabris divergentibus ovatis plano-convexis bidentatis basi marginatis glumas ovatas acuminatas superantibus. ♀ in nemorosis humidis. — Fl. fr. 3. p. 106. Schk. trad. t. E. n. 22. eng. bot. t. 1097. C. virens Lam. dict. 3. p. 384. Fl. fr. 3. p. 106. C. nemorosa Host. (v. v.)
14. *C. FÆTIDA* (All. ped. n. 2297.) foliis linearibus acuminatis planis aut carinato-plicatis, spiculis numerosis in capitulum ovato-globosum dense aggregatis, fructibus ellipticis teretusculis acuminatis bifidis, bracteis squamisque ovatis mucronatis. ♀ in humidis summarum Alpium et Pyrenæorum. — Fl. fr. 3. p. 106. Schk. car. trad. t. Hh. n. 96. — Schenckz. prod. t. 4. it. alp. f. 18. (v. v.)
15. *C. CHORDORHIZA* (Ehr. phyt. n. 77.) radice repente, culmo basi subramoso, foliis linearibus planiusculis acuminatis culmeis erectis, spiculis adpressis in capitulum ovatum densè congestis, fructibus ovatis acuminatis, bracteis lanceolato-ovatis acutis. ♀ in turfosis Jurassi. — Fl. fr. 3. p. 107. Schk. trad. t. G et J. n. 31. (v. s.)

16. *C. JUNCTIFOLIA* (All. ped. t. 92. f. 4. non Schk.) radice repente, culmo teretiusculo, foliis setaceis canaliculatis, spiculis in capitulum subrotundum densè aggregatis, fructibus ovatis semi-globosis lævibus rostratis ore subintegerrimis squamas ovatas obtusas aut submucronatas superantibus. ♀ in editioribus Pyrenæis ex Lapeyr. — Fl. fr. 3. p. 107. eng. bot. t. 927. C. incurva Lightf. scot. 2. t. 24. f. 1. Schk. car. trad. t. Hh. f. 95. (v. s. ex monte Cenisio.)
17. *C. LOBATA* (Schk. car. trad. t. D. f. 18. non Vill.) foliis linearibus planiusculis canaliculatis convolutis, culmo trigono erecto, spiculis 3 oblongis alternis in capitulum parvum trilobum densè congestis, fructibus ellipticis acuminatis nervosis. ♀ in Alpibus Galloprov. — *C. tripartita* Fl. fr. 3 p. 188. non All. nec Sut. (v. v.)
18. *C. PARADOXA* (Willd. mem. p. 32. t. 1. f. 1.) foliis linearibus carinato-plicatis, culmo eretto trigono-compresso striato, spiculis sessilibus parvis oblongis in spicas oblongas angustas congestis, spicis in paniculam angustam elongatam digestis, inferioribus remotiusculis, fructibus subrotundo-ovatis rostellatis bidentatis margine supernè ciliato-serratis, squamis ovatis acutis. ♀ in limosis secùs rivulos rariis. — Fl. fr. 3. p. 108. Schk. car. trad. t. E. f. 21. *C. canescens* Host. gram. t. 57. (v. s. ex Austrìâ.)
19. *C. TERETIUSCULA* (Good. tr. lin. 2. t. 19. f. 3.) radice repente, foliis linearibus carinato-plicatis, culmo eretto obtusè trigono subtereti, spiculis ovatis simplicibus raro compositis in spicam tereti-oblongam approximatis, fructibus trigonis plano-convexis apice attenuatis subbidentatis squamas ovatas acutas superantibus. ♀ in turfosis Jurassi, circa Tolosam secùs canalem Occitanicum ex Lapeyr. — Fl. fr. 5. p. 289. Schk. car. t. D. f. 19. (v. v.)
20. *C. PANICULATA* (L. sp. 1383.) foliis linearibus duris planis aut carinato-plicatis, culmo eretto triquetro scaberrimo, spiculis oblongo-ovatis 3-gonis adpressis in spicas oblongas congestis, spicis in paniculam plus minusve coarctatam digestis, fructibus ovatis supernè marginatis acuminatis bidentatis margine ciliato-serratis squamas ovatas acutas æquantibus. ♀ in paludibus. — Fl. fr. 3. p. 108. Schk. trad. t. D. f. 20. eng. bot. t. 1064. f. 1. — Mich. gen. t. 33. f. 7. — Scheuchz. prod. t. 8. f. 2. (v. v.)
- §. 4. *Spicis pluribus androgynis apice femineis; stigmatibus 2.***
21. *C. CYPEROIDES* (L. supp. 413.) foliis linearibus, culmo triquetro striato, spiculis ovato-oblongis aggregatis globoso-capitatis involucratis, fructibus lanceolatis bicuspidiatis, squamis lanceolatis aristatis ciliato-scabris. ♀ in humidis arenosis propè Sézanne en Brie ex cl. Desfont. et Mér. — Fl. fr. 3. p. 109. Schk. car. trad. t. A. f. 5. *C. Bohemica* Schreb. gram. t. 28. f. 3. *Schelhameria capitata* Moench supp. 119. — Mich. gen. t. 33. f. 19. (v. s. ex Bohemiâ.)
22. *C. OVALIS* (Good. tr. lin. 2. p. 148.) foliis linearibus planis, culmo eretto obsoletè trigono fistuloso striato, spiculis subsenis sessilibus ovalibus alternis in spicam ovoideam subapproximatis, fructibus ovatis acuminatis marginatis bidentatis ciliato-serratis glumas ovato-lanceolatas subacutus subæquantibus. ♀ in pratis uidis. — Fl. fr. 3. p. 110. Schk. trad. t. B. f. 8. eng. bot. t. 306. *C. leporina* Huds. Leers. herb. t. 14. f. 6. an L? — Scheuchz. gram. t. 10. f. 15. (v. v.)
23. *C. APPROXIMATA* (Hoppe exs. Hoffm. germ. 4. p. 201.) foliis linearibus planis, culmo triquetro incurvo, spiculis tribus sessilibus subrotundo-ellipticis alternis approximatis, fructibus ellipticis compressis acuminatis ore integris margine glabris glumas ovatas obtusiusculas æquantibus. ♀ in editioribus Alpibus Delphinatūs, Pyrenæorum ex Lapeyr. — Fl. fr. 5. p. 290. *C. leporina* L. Iapp. 322. Schk. car. t. F. ff. f. 129. DC. syn. n. 1718. (v. s. ex monte Cenisio.)
24. *C. SCHREBERI* (Willd. mém. p. 22.) radice repente, foliis angustissimis planiusculis, culmo trigono angulis scabriuscule, spiculis 5-7 sessilibus ovato-cylindricis alternis in spicam ovatam confertis, fructibus ovatis bidentatis





- striatis acutis squamas ovato-lanceolatas acutissimas æquantibus. \mathcal{U} in arenosis graminosis siccis. — Fl. fr. 3. p. 110. Schk. car. trad. t. B. f. 9. C. tenella Thuil. — Seg. ver. 1. t. 1. f. 2. (v. v.)
25. *C. BRIZOIDES* (L. sp. 1381.) radice fibrosâ, foliis linearibus planis, culmo nudo triquetro gracillimo scabro, spiculis 5-7 sessilibus alternis subdistichis curvatis oblongo-lanceolatis approximato-contiguis, fructibus elongato-acuminatis divergentibus marginatis bifidis squamis ovato-oblongis obtusiusculis longioribus. \mathcal{U} secùs sylvas et sepes demissiorum Pyrenæorum, agri Syrtici et Jurassi circa Salins (Babey). — Fl. fr. 3. p. 111. Schk. car. t. C. U. n. 12. (v. s.)
26. *C. CURTA* (Good. tr. lin. 2. p. 145.) foliis linearibus planis carinatis plicatim, culmo triquetro striato scabriuscule, spiculis subsenis sessilibus alternis remotiusculis demùm ovato-cylindraceis, superioribus subapproximatis, fructibus ovatis plano-convexis acutiusculis lèvibus ore integris erectis squamas ovatas acutas superantibus. \mathcal{U} in graminosis subhumidis passim. — Fl. fr. 3. p. 111. Schk. car. trad. t. C. f. 13. — C. tenella Hoffm. germ. 1. p. 318. — Lœs. pruss. t. 32. (v. v.)
27. *C. STELLULATA* (Good. tr. lin. 2. p. 144.) foliis linearibus canaliculatis, culmo eretto obsoletè trigono lèviusculo, spiculis sessilibus ovato-globosis subquaternis remotiusculis, fructibus ovato-acuminatis bidentatis margine scabris stellatim divergentibus squamas ovatas acutas superantibus. \mathcal{U} in pratis humidis passim. — Fl. fr. 3. p. 112. eng. bot. t. 806. C. stellata Schk. trad. t. C. f. 14. — Schenckz. gram. t. 11. f. 3. (v. v.)
28. *C. REMOTA* (L. sp. 1383.) foliis linearibus planiusculis, culmis gracilibus obsoletè trigonis lèviusculis, spiculis sessilibus ovato-oblongis alternis remotis solitariis, bracteis foliaceis longissimis, fructibus ovatis acuminatis integris bidentatis compressiusculis margine scabris squamas lanceolatas acutas superantibus. \mathcal{U} in umbrosis subhumidis. — Fl. fr. 3. p. 112. eng. bot. t. 832. Schk. trad. t. E. f. 23. — Mich. gen. t. 33. f. 15. 16. (v. v.)
29. *C. ELONGATA* (L. sp. 1383.) foliis linearibus planis carinato-plicatim, culmo triquetro asperrimo, spiculis sessilibus subduodenis alternis cylindricis remotiusculis, fructibus ovato-acuminatis emarginatis integris nervosis patulis margine subscabris squamas ovatas acutas obtusasve superantibus. \mathcal{U} in nemorosis humidis. — Fl. fr. 3. p. 112. Schk. car. trad. t. 5. f. 25. — Schenckz. gram. t. 11. f. 4. (v. v.)
- §. 5. *Spiculis pluribus androgynis, stigmatibus 3.*
30. *C. CURVULA* (All. ped. t. 92. f. 3.) foliis subsetaceis canaliculatis duris curvulis, spiculis adpressis sessilibus in capitulum oblongum densissimè aggregatis, fructibus ovatis compressis acuminatis, squamis ovatis mucronatis. \mathcal{U} in summis Alpibus et Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 109. Schk. car. trad. t. D. Hh. f. 17. (v. v. DC.)
31. *C. GYNOMANE* (Bert. dec. 2. p. 43.) foliis setaceis planiusculis debilibus, bracteis foliaceis infimâ scapum superante, spiculis 2-3 sessilibus linearibus gracilibus distantibus, fructibus 3-5 laxiusculis erectis triquetris ovato-acuminatis squamis lanceolatis acuminatis brevioribus. \mathcal{U} secùs vias et in montosis agris Ruscinonensis, Monspelii, Telonis et Corsicæ. — Fl. fr. 5. p. 289. C. tuberosa Degl. in Lois. gall. 2. p. 629. C. Liuckii Schk? (v. v.)
32. *C. ATRATA* (L. sp. 1386.) foliis lato-linearibus acuminatis planis striatis, culmo acutè triquetro, spiculis tribus quinvis ovatis approximatis, fructiferis nutantibus, fructibus subrotundo-ovatis breviter rostratis bidentatis squamis ovatis acutis brevioribus. \mathcal{U} in Alpium et Pyrenæorum pascuis. — Gaud. agrost. 2. p. 114. — Schenckz. gram. t. 11. f. 1 et 2.
- a. pedunculata*, spicis androgynis sublonge pedunculatis demùm pendulis, culmo elatiore. — C. atrata Fl. fr. 3. p. 113. Schk. trad. t. X. f. 77. (v. v.)

- β. dubia* (Gaud.) spicâ supremâ masculâ (paucioribus intermixtis femineis floribus) reliquis merè femaleis, fructibus atro-purpureis. (v. v.)
γ. nigra (Gaud.) spicis confertis subsessilibus erectis, terminali masculâ solitariâ, inferioribus femaleis, culmo humiliori. — *C. nigra* All. ped. 2310. Fl. fr. 3. p. 113. (v. v.)

- *§. 6. Spicis pluribus sexu distinctis; stigmatibus 2.*

33. *C. MUCRONATA* (All. ped. n. 2318.) foliis setaceis canaliculatis, culmo flexuoso vix trigono laeviusculo, spicâ masculâ solitariâ sessili, femaleâ sub-solitariâ approximatâ elliptico-subrotundâ sessili, fructibus ovato-oblongis placo-convexis incurvato-rostratis bidentatis margine ciliatis glumas ovato-oblongas subacutas subæquantibus. ♀ in pascuis summis Alpium Delphin. ex Vill., Jurassi ex Hall. — Fl. fr. 3. p. 114. Schk. trad. t. K. f. 44. (v. v. D. in Italia.)
34. *C. CESPITOSA* (L. sp. 1388.) foliis linearibus planis glaucescentibus patulis, culmo eretto acutè trigono laeviusculo, spicâ masculâ subsolitariâ, spicis femaleis 3-4 sessilibus cylindraceis attenuatis distantibus, fructibus dense imbricatis glabris compressis ellipticis obtusis ore pertusis squamas oblongas obtusas aut brevissimè mucronatas superantibus. ♀ in limosis. — Fl. fr. 3. p. 114. Good. tr. lin. 2. t. 21. f. 8. Schk. trad. 1. Aa Bb. n. 85. (v. v.)
35. *C. TRINERVIS* (Degl. in Lois. gall. 731.) radice repente, foliis rigidis carinato-triquetris canaliculatis culmum erectum incurvum 3-gonum laevem superantibus, spicis masculis 1-2, femaleis 3-4 ovato-cylindricis sessilibus subdistantibus, mediis interdum apice masculis, fructibus densissimè imbricatis compressis ovatis extùs trinerviis glabris nitidis pellucido-punctatis ore integris squamas oblongas subacutas superantibus. ♀ in arenis uliginosis maritimis Vasconia, Picardiæ. — Fl. fr. 5. p. 291. (v. v. DC.)
36. *C. STRICTA* (Good. tr. lin. 2. t. 21. f. 9.) foliis linearibus glaucis planis aut carinato-plicatis strictis reticulo basi connexis, culmo eretto acutè triquetro superne scabriuscule, spicâ masculâ subsolitariâ elongatâ, spicis femaleis 2-3 cylindraceis sessilibus attenuatis distantibus, fructibus dense imbricatis glabris glaucis ovatis compressis acutiusculis ore pertusis squamas lanceolatas acutiusculas superantibus. ♀ in paludibus. — Fl. fr. 3. p. 114. eng. bot. t. 914. Schk. trad. t. V. f. 73. (v. v.)
37. *C. ACUTA* (L. sp. 1388.) foliis linearibus planis margine scabris, culmo eretto acutè trigono, spicis masculis binis ternis elongatis, femaleis subquaternis subpedunculatis subnutantibus cylindraceis filiformi-elongatis remotis, fructibus superne dense imbricatis inferne laxioribus oblongo-ovatis glabris nitidis nervosis brevissimè rostellatis ore integro pertuso squamas oblongas acutas subæquantibus. ♀ in pratis paludosis passim. — eng. bot. t. 580. Schk. car. trad. t. Ee Ff. f. 92. *C. gracilis* Curt. Fl. fr. 3. p. 115. Spicæ femaleæ superiores sæpè androgynæ. (v. s.)


§. 7. Spicis pluribus sexu distinctis; stigmatibus 3; fructu pubescente aut villoso.


* *Spicâ masculâ solitariâ.*

38. *C. TOMENTOSA* (L. mant. 123.) foliis linearibus angustis planis aut margine revolutis, culmo eretto trigono, spicis femaleis subgeminatis ovato-cylindraceis subapproximatis sessilibus, fructibus subrotundis tomentosis squamam ovatam acuminatam subæquantibus. ♀ in pratis umbrosis et sylvis. — Fl. fr. 3. p. 116. Schk. trad. t. F. f. 28. (v. v.)
39. *C. MONTANA* (L. suec. 845.) foliis linearibus planis, culmo obsoletè trigono laeviusculo, spicis femaleis subgeminis approximatis ellipticis sessilibus, fructibus ovato-oblongis brevissimè rostratis pubescentibus squamas ovato-rotundas obtusas superantibus. ♀ in nemorosis montanis passim. — Fl. fr. 3. p. 116. Schk. trad. t. F. f. 29. *C. conglobata* All. non Willd. *C. globularis*

- Willd. act. ber. 1794. p. 45. t. 2. f. 1. — Schenckz. gram. t. 10. f. 8 et 9. (v. v.)
40. *C. PILULIFERA* (L. sp. 1385.) foliis linearibus planiusculis, culmo triquetro laeviusculo, spicis femineis subternis approximatis elliptico-subrotundis sessilibus, fructibus subrotundis breviter rostratis pubescentibus squama oblonga acutâ brevioribus. ♀ in nemorosis. — Fl. fr. 3. p. 117. eng. bot. t. 885. Schk. trad. t. 1. f. 39. (v. s.)
41. *C. ERICETORUM* (Poll. pal. n. 886.) foliis duris linearibus planis, culmo incurvo laevi obtusè trigono, spicis femineis subgeminis approximatis oblongo-sessilibus, fructibus subrotundo-obovatis pubescentibus brevissimè mucronatis squamas obovatas obtusissimas margine scariosas superantibus. ♀ in collibus siccis et ericetis Palatinatus, Alpiam, Pyren. orientalium (DC.) rarius. — Fl. fr. 3. p. 117. *C. ciliata* Schk. trad. t. J. f. 42. Gaud. agr. 2. p. 133. — Scheuchz. gram. t. 10. f. 10. (v. s.)
42. *C. PRÆCOX* (Jacq. aust. t. 446.) foliis duris linearibus planis, culmo erecto laeviusculo obsoletè trigono, spicis femineis subternis oblongo-ovatis subsessilibus, fructibus subgloboso-triquetris pubescentibus breviter obtusè mucronatis squamam ovatam acutam æquantibus. ♀ in siccis sterilibus montosis. — Fl. fr. 3. p. 115. Schk. trad. t. F. f. 27. *C. filiformis* Leers. herb. t. 16. f. 5. (v. v.)
43. *C. UMBROSA* (Host. gram. t. 69.) cespitosa, foliis linearibus planis erectis scapum subsuperantibus, culmo erecto laevi compresso-trigono, spicis femineis subgeminis oblongis subsessilibus remotiusculis, fructibus ovato-triquetris pubescentibus rostratis ore bidentatis squamas ovatas mucronatas dorso ciliato-asperas æquantibus. ♀ Circâ Burdigalam (cl. Des Moul.). — Fl. fr. 3. p. 723. *C. præcox* L. Gaud. agr. 2. t. 131. (v. s.)
44. *C. GYNOBASIS* (Vill. dauph. 2. p. 206. excl. syn.) foliis linearibus firmis carinatis margine scabris subrevolutis, culmo gracili trigono, spicis femineis 3-5-floris rotundis, superioribus breviter pedunculatis approximatis, una radicali longissimè pedunculata, fructibus obovatis vix pubescentibus nervosis breviter mucronatis mucrone apice truncato squamas ovato-lanceolatas acutiusculas subæquantibus. ♀ in collibus et humilioribus montibus Galliae meridionalis et Jurassi. — Fl. fr. 3. p. 118. *C. diversiflora* Host. gram. t. 70. *C. Halleriana* Ass. arr. t. 9. f. 2. (v. v.)
45. *C. HUMILIS* (Leyss. hall. n. 952.) foliis setaceo-canaliculatis scabriusculis culmum longè superantibus, spicis femineis binis subtrifloris remotis subsessilibus subinclusis bracteis margine membranaceis obliquis vaginatis, fructibus obovatis obtusis breviter pubescentibus squamam scariosam obovatam mucronatam subæquantibus. ♀ in collibus siccis et rupibus. — Fl. fr. 3. p. 117. *C. clandestina* Good. Schk. trad. t. k. f. 43. Gaud. agr. 2. p. 140. — Scheuchz. gram. t. 10. f. 1. (v. v.)
46. *C. DIGITATA* (L. sp. 1384.) foliis lato-linearibus planis acutis striatis, culmo erecto teretiusculo laeviusculo, spicis femineis subternis linearibus subdigitatis subapproximatis, inferioribus pedicellatis, bracteis vaginatis pedicellis dimidiò brevioribus, fructibus obovatis breviter rostratis triquetris pubescentibus squamam obovatam brevissimè mucronatam æquantibus. ♀ in nemorosis umbrosis. — Fl. fr. 5. p. 291. et 3. p. 119. — Mich. t. 32. f. 9. (v. v.)
- β. ornithopoda*, spicis femineis digitatis subsessilibus, fructibus squamas superantibus. — *C. ornithopoda* Willd. *C. pedata* Fl. fr. 3. p. 119. non L. — Mich. t. 32. f. 14. (v. v.)
- ** *Spicis masculis duabus aut plurimis.*
47. *C. FILIFORMIS* (L. sp. 1385.) foliis prælongis erectis linearibus planis canaliculatisse margine scabris, culmo erecto teretiusculo basi laevi, spiculæ masculâ subsolitariâ longissimâ, femineis geminis ovato-oblongis sessilibus distantibus, fructibus confertis ellipticis bifurcatis lanatis squamam oblongo-


- lanceolatam mucronatam superantibus aut subæquantibus. ♀ in paludibus circā Parisios et in Alpibns. — Fl. fr. 3. p. 119. eng. bot. t. 904. Good. tr. lin. 2. t. 20. f. 5. C. lasiocarpa Ehr. Gaud. agr. 2. p. 127. (v. s.)
48. C. GLAUCA (Scop. carn. n. 1157.) radice repente, foliis linearibus planis glaucescentibus margine scabris, culmo erecto obtusè trigono, spicis masculis geminis, feminis 2-3 distantibus cylindricis pedunculatis pendulis rariū sessilibus, fructibus confertis ovatis obovatissimis ciliato-scabriusculis brevisimè rostratis rostro retuso squamam ovatam obtusam cuspidatamve subæquantibus. ♀ in humidis et paludosis vulgatissima. — Fl. fr. 3. p. 120. C. flacca Schk. trad. t. O. P. f. 57. a. b. C. recurva Huds. — Mich. t. 32. f. 5. Planta polymorpha. (v. v.)
49. C. HIRTA (L. sp. 138g.) foliis linearibus carinato-plicatis subhirtis, culmo obtusè trigono læviusculo, spicis masculis 2-3 hirtis inæqualibus, feminis 3 remotis cylindricis breviter pedunculatis, fructibus oblongis acuminatis hirtis bicuspidatis squamâ oblongâ aristata majoribus. ♀ in sabulosis. — Fl. fr. 3. p. 121. Leers. herb. t. 16. f. 3. Schkr. trad. t. Uu. f. 108. — Moris. s. 8. t. 12. f. 6. n. 10. (v. v.)
- §. 8. *Spicis pluribus sexū distinctis, stigmatibus tribus, fructibus glabris aut ad angulos tantum ciliato-scabris.*
- * *Spicâ masculâ solitariâ.*
50. C. FLAVA (L. sp. 1384.) foliis lato-linearibus planis aut carinato-plicatis, culmo erecto teretiisculo lævi, spicis feminis subternis ovato-ellipticis inclusè pedunculatis, superioribus subapproximatis, fructibus ovatis reflexis longè rostratis rostro curvato bidentato squamâ ovato-lanceolatâ acuminatâ longioribus. ♀ in pratis humidis. — Fl. fr. 3. p. 121. Schk. trad. t. H. f. 36. (v. v.)
- ♂. *Oederi* (Gaud.) spicis feminis subquaternis, omnibus approximatis. — C. Ederi Ehr. Schk. trad. t. F. f. 26. non Retz. (v. v.)
51. C. NITIDA (Host. gram. 1. t. 71.) foliis linearibus planis striatis, culmo erecto triquetro scabro, spicis feminis 2-3 ovatis subdistantibus, imâ exsertè pedunculatâ, fructibus subrotundo-ovatis nitidis brevissimè rostratis ore obliquo squamam ovatam obtusam æquantibus. ♀ in siccioribus montanis. — Fl. fr. 5. p. 294. C. alpestris Fl. fr. 3. p. 122. excl. syn. Hall. All. Sut. C. verna Schk. trad. t. L. f. 46. (v. v.)
52. C. EXTENSA (Good. tr. lin. 2. t. 21. f. 7.) foliis linearibus carinato-plicatis striatis subconvolutis rigidis, culmo erecto stricto subtrigono lævi, spicis feminis subternis elliptico-cylindricis subsessilibus, superioribus subapproximatis, fructibus ovatis nervosis rostro brevi recto bidentato squamas obovatas mucronatas superantibus. ♀ in udis maritimis Oceani et Mediterranei. — Fl. fr. 5. p. 292. Spica mascula aliquando gemina. (v. v.)
53. C. BASTARDIANA (DC. fl. fr. 5. p. 293.) foliis lato-linearibus planis striatis, culmo erecto acutè trigono, spicis feminis binis ovatis parvis approximatis, infimâ bracteâ foliacea spicam masculam æquante, fructibus ovato-triquetris margine hispidis squamâ lanceolatâ sublongioribus. ♀ in paludosis Andegaviae septentrionalis (cl. Bastard). (v. s. specimen imperf.) †.
54. C. FIRMA (Host. aust. 509 et gram. 1. t. 75.) foliis brevibus firmis patulis linearibus planis striatis, culmo lævi teretiisculo, spicis feminis subtribus ovato-cylindricis distantibus, infimâ exserte pedunculatâ, fructibus oblongis acutè trigonis margine hispidis rostratis ore obliquo squamâ lanceolatâ mucronatâ longioribus. ♀ in editoribus Pyrenæis (DC.). — Fl. fr. 3. p. 122. Schk. trad. t. O. Y. f. 54. (v. v. DC.)
55. C. SEMPERVIRENS (Vill. dauph. 2. p. 214.) foliis linearibus firmis planis striatis margine scabriusculis, culmo obsoletè trigono lævi, spicis feminis subternis oblongis erectis distantibus, binis inferioribus pedunculatis, fructibus oblongis compresso-triquetris angulis ciliatis longè rostratis rostro apice






- scarioso bilobo*, squamâ ovatâ longioribus, spicâ masculâ acutâ. ♀ in Jurasso, Alpibus et Pyrenæis. — *C. ferruginea* Schk. trad. t. M. f. 48. Fl. fr. 3. p. 123. excl. syn. Vill. *C. erecta* Fl. fr. 3. p. 120. *C. varia* Host. gram. 1. t. 80. *Fructus facies supernè pilis nonnullis adpressis conspersæ*. (v. v.)
56. *C. SCOPOLIANA* (Willd. sp. 4. p. 292.) foliis longissimis linearibus carinato-plicatis planisve scabriusculis, culmo erecto obsoletè trigono læviusculo apice nutante, spicis femineis tribus distantibus subteretibus pedicellatis subnuntantibus, fructibus ovatis obsoletè trigonis angulis ciliatis mucronatis ore colorato bilobo squamâ ovali-snbacutâ longioribus. ♀ in Jurassi monte Dole et Alpium umbrosis. — Gaud. agr. 2. p. 168. *C. spadicea* Fl. fr. 3. p. 120. non Schk. *C. ferruginea* Host. gram. 1. t. 81. non Willd. *C. Mielichhoferi* Willd. Schk. — Sheuchz. gram. t. 10. f. 6. (v. v.)
57. *C. BRACHYSTACHYS* (Schranck bav. 294.) foliis linearibus angustissimis convolto-setaceis canaliculatisve, culmo erecto filiformi lævi obsoletè trigono, spicis femineis 2-4 oblongo-cylindricis distantibus pedunculatis, fructibus lanceolatis glabris rostratis bidentatis squamâ oblongâ mucronatâ longioribus. ♀ in Alpibus, montibus Ligeris (cl. Prost). Pyrenæis orientalibus ex Lapeyr. — Fl. fr. 3. p. 123. Schk. trad. t. P. f. 58. — Scheuchz. gram. t. 10. f. 7. (v. v.)
58. *C. STRIGOSA* (Good. tr. liu. 2. t. 20. f. 4.) foliis linearibus planis, culmo triquetro lævi, spicis femineis 3-4 pendulis filiformibus distantibus, inferioribus exsertè pedunculatis, fructibus oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis nervosis glabris ore oblique truncatis squamam ovato-lanceolatam acutam subaequantibus. ♀ in sylvaticis uidis Alsatiæ secùs Rhenum. — Fl. fr. 5. p. 295. Schk. trad. t. N. f. 53. non All. *C. leptostachys* L. f. supp. 414. (v. s.)
59. *C. FULVA* (Good. trans. lin. 2. p. 177.) foliis linearibus planis striatis scabris, culmo trigono erecto scabriuscule, spicis femineis subternis ovato-oblongis distantibus, supremâ sessili, reliquis pedunculatis, fructibus densè imbricatis glaberrimis subglobosis nitidis longè rostratis bidentatis squamâ ovatâ longioribus. ♀ in pratis humidis rariüs. — Fl. fr. 3. p. 126. Schk. trad. t. T. f. 67. eng. bot. 1295. *C. trigona* All. ped. t. 89. f. 4. (v. v.)
60. *C. PUNCTATA* (Gaud. agr. 2. p. 152.) foliis linearibus planis lævibus, culmo trigono erecto lævi, spicis femineis 2-3 oblongo-cylindricis distantibus, inferioribus breviter exerto-pedunculatis erectis, fructibus ovato-globosis nitidis lævissimis pellucido-punctatis binerviis breviter rostratis rostro lævisimo bidentato squamâ ovatâ mucronatâ longioribus. ♀ in agro Syrtico circè S.-Sever reperiit cl. Dufour, circè la Teste de Buch cl. Des Moulins, propè Nicæam D. Stire. (v. s.)
61. *C. BILIGULARIS* (DC. cat. monsp. 88.) foliis lato-linearibus planis striatis, ligulis 2 oblongis aliâ liberâ oppositifoliâ, alterâ disco folii adnatâ, culmo trigono lævi, spicis femineis tribus oblongo-cylindricis distantibus, superioribus inclusè inferioribus exsertè pedunculatis, infimâ nutante, fructibus ovatis acuminatis nervosis glabris rostratis rostro bicuspido-margine subciliato-scabro squamâ ovatâ acuminatâ vix longioribus. ♀ in nemoribus humidis circâ Falaise ex cl. de Bréb., Cœnomanum, Andegavum. — Fl. fr. 5. p. 296. (v. s.)
62. *C. BINERVIS* (Smith. brit. 993.) foliis linearibus planis, culmo erecto acutè triquetro lævi, spicis femineis tribus ovato-cylindricis valde distantibus, supremâ inclusè reliquis exsertè pedunculatis, stigmatibus tribus, fructibus ovato-ellipticis glabris nervosis nervis 2 prominentibus rostratis rostro bicuspido-margine ciliato-scabro squamâ obovatâ obtusa mucronatâ longioribus. ♀ in pratis humidis Parisiorum et provinc. occidentalium passim. — Fl. fr. 5. p. 296. An satis à sequente distincta (v. s.)
63. *C. DISTANS* (L. sp. 1387.) foliis linearibus planis, culmo erecto acutè triquetro lævi, spicis femineis tribus erectis oblongo-ovatis valde distantibus, supremâ sessili, reliquis breviter inclusè pedunculatis, fructibus ovatis angulosis glabris rostratis rostro bicuspido-margine ciliato scabro squamam

- ovatam acuminatam mucronatamve superantibus. ♀ in sepiibus et pratis. — Fl. fr. 3. p. 126. Schk. trad. t. Yy. f. 78. eng. bot. 1234. — Moris. s. 8. f. 10. n. 18. (v. v.)
64. *C. BREVICOLLIS* (DC. fl. fr. 5. p. 295.) foliis linearibus planis margine scabris , culmo erecto acutè triquetro laevi , spicā masculā erectā , femineis 1-3 cylindricis 6-10-floris pedicellatis bracteis vaginatis , fructibus obovatis ventricosis glabris sublaevibus rostro brevissimo truncato aut 2-dentato squamis oblongis acuminatis subbrevioribus. ♀ ad rupes Rhodano proximas in monte Parve propè Belley. (cl. V. Auger). (v. s.)
65. *C. MICHLII* (Schk. tab. P et Vv. f. 59.) foliis firmis linearibus planis striatis , culmo triquetro laeviusculo , spicā masculā clavatā , femineis subbinis 3-5-floris remotis , infimā exserte pedunculatā , fructibus grossis laxis sublaevibus glabris globosis ventricosis longè rostratis rostro bicuspidato apice ciliato-scabro squamam scariosam oblongam acuminatam subsuperantibus. ♀ in pratis montosis circā Parisios ex cl. Merat. — Fl. fr. 5. p. 295. Host. gram. t. t. 72. — Mich. gen. t. 32. f. 5. (v. s. ex Austrā.)
66. *C. DEPAUPERATA* (Good. tr. linn. 2. p. 181.) foliis linearibus planis , culmo erecto 3-gono laevi , spicā masculā gracili , spicis femineis 2-3, 2-5-floris remotis , binis inferioribus exserte pedunculatis , fructibus grossis laxis ovato-globosis nervosis inflatis glabris longè rostratis ore obliquo squamatā oblongā scariosā acuminatā longioribus. ♀ in sylvis circā Parisios , Andegavum et in Pictaviā superiore. — Fl. fr. 5. p. 294. *C. triflora* Willd. phyt. 2. t. 1. f. 2. (v. s.)
67. *C. FRIGIDA* (All. ped. n. 2334.) foliis linearibus planis laevibus margine scabris , culmo erecto trigono laeviusculo , spicā masculā obtusā , spicis femineis ternis ovato-cylindricis distantibus , 2 inferioribus pedunculatis nutantibus , fructibus (nigris) lanceolatis triquetris angulis ciliatis acuminatis bicuspidatis squamatā oblongā longioribus. ♀ in humidis summarum Alpium et Pyrenaeorum. — Fl. fr. 3. p. 124. (v. v.)
68. *C. LIMOSA* (L. sp. 1386.) radice repente , foliis linearibus angustis carinato-plicatis , culmo erecto acutè triquetro laeviusculo , spicis femineis binis ovatis pedunculatis pendulis , bracteis amplexicaulibus , fructūs confertos ellipticos compresso-triquetros nitidos striatos brevissimè rostellatos ore integro squamis subrotundo-ovatis cuspidatis subæquantibus superantibus. ♀ in paludosis turfosis rariis. — Fl. fr. 3. p. 127. Schk. trad. t. X. f. 78. — Scheuchz. gram. t. 10. f. 13. (v. v.)
69. *C. ALBA* (Scop. carn. 1148.) foliis setaceo-canaliculatis scabriusculis , culmō erecto obsolete trigono scabriusculo , bracteis membranaceis vaginatis hyalinis , spicis femineis 1-2 pedunculatis sub-5-floris distantibus scariosis masculam subæquantibus , fructibus laxis obovatis glabris sulcatis breviter rostratis oblique truncatis squamas membranaceas obtusas superantibus. ♀ in montosis sylvaticis Alpium , Jurassi. — Fl. fr. 3. p. 124. Schk. trad. t. O. f. 55. — Scheuchz. gram. t. 10. f. 3. 4. 5. — Pluck. t. 91. f. 2. (v. v.)
70. *C. PANICEA* (L. sp. 1367.) foliis firmis planis glaucis scabris , culmō trigono laeviusculo , spicis femineis subbinis cylindricis distantibus , supremā subincluse infimā breviter exserte pedunculatā , fructibus laxis ovatis glabris laevibus vix mucronatis mucrone retuso squamatā ovatam acutam superantibus. ♀ in pratis uidis. — Fl. fr. 3. p. 127. Schk. trad. t. Ll. f. 100. — Mich. gen. t. 34. f. 11. Variat spicā infimā radicali longissimè pedunculatā. (v. v.)
71. *C. PALLESCENS* (L. sp. 1386.) foliis linearibus planis subpubescentibus , culmo erecto acutè triquetro scabriusculo , spicis femineis subternis ovato-oblongis subdistantibus , fructiferis sèpè cernuis , inferioribus pedunculatis , fructibus confertis obovato-oblongis subventricosis obtusis glabris nitidis squamatā ovato-oblongam cuspidatam subæquantibus. ♀ in pratis humidis. — Fl. fr. 3. p. 127. Schk. trad. t. Kk. f. 99. — Mich. gen. t. 33. f. 13. (v. v.)
72. *C. PILOSA* (All. ped. n. 2323.) foliis lato-linearibus striatis margine pilosis





scabrisque, culmo erecto obtusè trigono striato læviuscule, spicis femineis 2-3 gracilibus distantibus binis inferioribus remotis, fructibus laxis glabris ovatis rostratis, ore membranaceo obliquo emarginato squamâ ovatâ acuminate longioribus. ♀ in sylvis circâ Parisios ex Mérat, Arbois (Babey), in Pyrenæis ex Lapeyr. — Fl. fr. 3. p. 123. (v. s.)

73. C. PATULA (Scop. caru. n. 1160. t. 59.) foliis linearibus planis margine scabris, culmo erecto triquetro lævi, spicis femineis quaternis remotis filiformibus pedunculatis cernuis, fructibus laxiusculis oblongo-ovatis rostratis bifidis squamam ovato-lanceolatam membranaceam acuminatam subæquantibus. ♀ in sylvis vulgô. — Fl. fr. 3. p. 128. C. sylvatica Huds. Schk. trad. t. II. f. 101. eng. bot. t. 995. C. drymeia L. f. supp. 1414. — Moris. s. 8. t. 12. f. 13. n. 9. (v. v.)

74. C. CAPILLARIS (L. sp. 1386.) foliis linearibus angustis planis margine læviusculis, culmo erecto subtrigono lævissimo, spicis femineis subternis longè pedunculatis cernuis subsexfloris superioribus approximatis masculam superantibus, fructibus laxis ovatis glabris lævibus rostratis ore obliquo, squamâ membranacea ovatâ obtusâ longioribus. ♀ in pratis udis summarum Alpium ex Vill. et Pyrenæorum ex Ram. — Fl. fr. 3. p. 125. Scop. carn. n. 1152. t. 59. Schk. trad. t. O. f. 56. — Seg. véron. 3. t. 3. f. 1. (v. s. ex Alpibus Helveticis.)

75. C. PSEUDO-CYPERUS (L. sp. 1387.) foliis lato-linearibus planis margine scabris, culmo erecto trigono scabro, spicis femineis quaternis geminatis pedunculatis pendulis cylindricis, fructibus deusè imbricatis ovato-lanceolatis nervosis divergentibus bicuspidatis squamam lanceolatam aristatam subæquantibus. ♀ in udis et fossis passim. — Fl. fr. 3. p. 128. Schk. trad. t. Mm. f. 102. eng. bot. t. 242. — Lob. ic. t. 76. f. 2. (v. v.)

76. C. LÆVIGATA (Sm. brit. 3. p. 1005.) foliis glaucescentibus firmis longissimis lato-linearibus carinato-canaliculatis inferne subrevolutis, culmo erecto acutè triquetro lævi, spicâ masculâ subsolitariâ, femineis 2-4 distantibus elongato-cylindricis erectis, inferioribus breviter pedunculatis, fructibus ovato-triquetris glabris rostro brevissimo 2-dentato squamam ovatam mucronatam subæquantibus. ♀ in Corsicæ paludosis. — Schk. car. t. Sss. f. 162. C. patula Schk. car. n. 97. t. Bbb. f. 116. C. æthiopica Schk. car. n. 91. t. Z. f. 83. Variat spiculis masculis binis. (v. s.)

77. C. MAXIMA (Scop. carn. 2. p. 1166.) foliis linear-lanceolatis planis margine scabris, culmo erecto triquetro lævi, spicis femineis subquinis elongato-cylindricis curvato-pendulis sessilibus, infimâ exsertè pedunculatâ, fructibus minimis densè imbricatis lævibus ellipticis brevissimè rostratis ore bidentatis squamam ovatam submucronatam æquantibus. ♀ in sylvaticis udis. — Fl. fr. 3. p. 125. C. pendula Huds. Schk. trad. t. 2. f. 60. C. agastachys L. f. supp. 414. — Barr. ic. t. 45. (v. v.)

* * Spicis masculis duabus aut pluribus.

78. C. HORDEISTICHOS (Vill. dauph. 2. t. 6.) foliis linearibus planis calnum erectum teretiusculum superantibus, spicis masculis 2-3 oblongo-ovatis, femineis tribus oblongo-ovatis remotiusculis, infimâ subradicali, fructibus imbricatis ovatis compressis acuminatis bidentatis angulis ciliato-serratis squamam ovatam scariosam superantibus. ♀ in paludosis Delphiniacis et agri Parisiensis. — Fl. fr. 3. p. 129. C. hordeiformis Thuil. Host. gram. 1. t. 76. (v. s.)

79. C. VESICARIA (L. sp. 1388. a.) foliis longissimis linearibus planis margine scabris, culmo erecto acutè triquetro, spicis masculis 2-3 gracilibus, femineis 2-3 pedunculatis erectis cylindraceis, fructibus imbricatis nervosis oblongo-conicis inflatis rostratis bicuspidatis squamâ lanceolatâ majoribus. ♀ in paludosis sylvaticis. — Fl. fr. 3. p. 129. Schk. trad. t. Ss. f. 106. eng. bot. t. 779. (v. v.)

80. C. AMPULLACEA (Good. tr. lin. 2. p. 207.) foliis longissimis linearibus an-

- gustis subcanaliculatis, culmo erecto obtusè triquetro lœvi, spicis masculis 2-3 gracillimis, femineis binis cylindraceis breviter pedunculatis erectis, fructibus imbricatis subglobosis inflatis rostratis, rostro filiformi bifurco, squamam lanceolatam acutam superantibus. ♀ in paludibus montosis. — Fl. fr. 3. p. 130. Schk. trad. t. Ft. f. 107. eng. bot. 780. (v. v.)
81. *C. PALUDOSA* (Good. tr. lin. 2. p. 202.) foliis longissimis glaucescentibus planis lato-linearibus, culmo stricto acutè triquetro, spicis masculis 3-4 inæqualibus, femineis 3-4 erectis cylindraceis attenuatis inferioribus pedunculatis, fructibus glabris densissimè imbricatis ovatis nervosis breviter mucronatis emarginatis squamam lanceolatam acuminatam latioribus sublongioribusque. ♀ in paludibus. — Fl. fr. 3. p. 130. Schk. trad. t. Oo Vv. f. 103. eng. bot. t. 807. *C. acuta* Curt. lond. 4. t. 61. (v. v.)
82. *C. KOCHIANA* (DC. cat. monsp. 89.) foliis longissimis glaucescentibus planis lato-linearibus seberrimis, culmo stricto acutè triquetro angulis scabro, spicis masculis 2 inæqualibus, femineis 3-5 erectis cylindraceis, inferioribus pedunculatis, fructibus glabris densissimè imbricatis nervosis oblongo-acuminatis apice bidentatis squamam lanceolatam acuminato-aristatam subæquantibus. ♀ ad fossas et rivulos Galliae boreali-orientalis et propè Mimatem (cl. Prost.). — Fl. fr. 5. p. 297. (v. s.)
83. *C. RIPARIA* (Curt. lond. 4. t. 60.) foliis longissimis planis lato-linearibus asperrimis, culmo stricto acutè triquetro scaberrimo, spicis masculis 4-5 subæqualibus, femineis 3-4 erectis cylindraceis attenuatis inferioribus pedunculatis, fructibus glabris imbricatis oblongo-ovatis rostratis multinerviis bifurcatis, latitudine et longitudine squame lanceolatae aristatae. ♀ ad fluviorum ripas. — Fl. fr. 3. p. 130. Schk. trad. t. 29. R. f. 105. eng. bot. t. 579. — Mich. t. 32. f. 6. 7. (v. v.)
84. *C. SOLEIROLII* (Duby mss.) foliis glaucescentibus firmis longis planis lato-linearibus lœvibus margine scabris, culmo stricto acutè triquetro lœvissimo, spicis masculis 3-4, femineis 3-4 cylindricis oblongis sessilibus erectis, fructibus ovato-rotundis compressis marginie superne ciliatis brevissimè rostellatis ore bidentato, squamam lineari-lanceolatam obtusiusculam brevioribus. ♀ in Corsicâ circa Bonifacio reperiit cl. Soleirol. — Affinis *C. longearistata* Biv. Bern. sic. manip. IV. p. 8. t. 2, sed squamæ non aristatae. (v. s.)

J - Bicolor
inquinata
Californica

Ordo CX. GRAMINEÆ Juss. gen. 28. — Gramina L.

Flores glumacei, hermaphroditi aut rariū dielini. Gluma exterior sæpius bivalvis, uniflora aut flores plurimos distiche spicatos includens. Singulo flori perigonum (glumella) glutinæ analogum, plerumque bivalve. Stamina sæpius 3 hypogyna. Ovarium 1 liberum; stigmata 2. Fructus siccus monospermus semen nudum simulans. Embryo parvus monocotyledoneus, ad basin albuminis farinacei. — Culmi cylindrici, nodis hinc indè distincti, herbacei sæpius simplices; folia alterna vaginantia, vaginis longitudinaliter fissis, plerumque ad basin internam membranâ (ligulâ) instructa; flores paniculati aut spicati.

† FLORES SEXU DISTINCTI NEMPE MASCULI ET FEMINEI IN DIVERSIS SPICULIS.

I. MAYS Tourn. inst. 353. Gærtn. carp. 1. p. 6.

Spiculæ masculæ bifloræ paniculatæ terminales; femineæ unifloræ spicatae laterales; stigmata longissima; semina subrotunda lœvia seriatim disposita.

1. **M. ZEA** (Gærtn. fruct. 1. p. 6. t. 1.). (I) colitur passim. — Fl. fr. 3. p. 98. Zea Mays. L. sp. 1133. — Moris. s. 8. t. 13. f. 1. 2. — Fuchs. hist. 473. ic. (v. v. c.)

II. HOLCUS Schreb. gram. 129. t. 18. DC. fl. fr. 3. p. 97. — Holci sp. L.

Spiculæ 1-2-floræ, aliæ masculæ membranaceæ muticæ, aliæ hermaphroditæ coriaceæ aristatæ. — Flores paniculati.

1. **H. ALEPPENSIS** (L. sp. 1485.) paniculâ laxâ, spiculis subglabris, aristis è receptaculo ortis. $\frac{1}{2}$ ex Oriente ortus, in Galliâ meridionali nunc indigenus. — Fl. fr. 3. p. 98. Host. gram. 1. t. 1. Sorghum Aleppense Pers. — Pluck. t. 32. f. 1. (v. v. c.)
 2. **H. SORGHUM** (L. sp. 1484.) paniculâ sublaxâ ovatâ, spiculis villosis, aristis ex apice glumarum ortis. (I) in Galliâ meridionali passim cultus. — Fl. fr. 5. p. 286. Sorghum vulgare Pers. ench. 1. p. 101. Host. gram. t. 4. t. 2. — Fuchs. hist. 771. ic. (v. v. c.)

III. ANDROPOGON L. gen. 1145.

Spiculæ unifloræ, aliæ masculæ pedicellatæ muticæ, alteræ hermaphroditæ sessiles ex apice perigonii aristatæ; gluma basi extus pilosa. — Flores spicato-digitati aut subpaniculati.

1. **A. GRYLLUS** (L. sp. 1480.) paniculâ laxâ, spiculis ternis pilis flavescentibus basi circumdatis, intermediâ hermaphroditâ biaristatâ. $\frac{1}{2}$ in siccis provinciis australium, Arvernia ex Delarb. — Fl. fr. 3. p. 95. Apluda Gryllus P. de Beauv. Pollinia Gryllus Spreng. — Lam. ill. t. 840. f. 1. — Scheuchz. gram. t. 6. f. 1. (v. v.)
 2. **A. ISCHÆMUM** (L. sp. 1483.) foliis pilosis, spicis 6-10 erectis subdigitatis, pedicellis villosis, spiculis geminis (purpurascensibus), alterâ hermaphroditâ uniaristatâ, glumis obtusiusculis glabriusculis basi et apice pilorum fasci-

- culo instruetis. ♀ in siccis. — Fl. fr. 3. p. 95. Host. gram. 2. t. 3. A. angustifolium Smith. græc. prod. 1. p. 47. Spicæ aliquando ternæ. (v. v.)
3. A. PROVINCIALE (Lam. dict. 1. p. 376.) foliis glaberrimis, spicis 4-5 erectis subdigitatis, pedicellis villosis, spiculis geminis (virescentibus), alterà hermaphroditâ uniaristatâ, glumis acuminatis margine et dorso ciliato-scabris basi pilorum fasciculo involutis. ♀ in Galloprovinciæ montosis ex Ger. — Fl. fr. 3. p. 97. A. Ischaemum Rœm. et Sch. 2. p. 822. — Ger. gallop. t. 4. (v. s. c.)
4. A. DISTACHYON (L. sp. 1481.) foliis glancescentibus pubescentibus planiusculis scabris, ligulâ pilosâ, spicis 2 erectis subterminalibus, pedicellis villosis, spiculis geminis, masculo breviter aristato, glumis acuminatis glabris. ♀ in siccis et lapidosis Niceæ, Galloprovinciæ. — Fl. fr. 3. p. 96. Pollinia distachya Spreng. pug. 2. p. 12. Ger. gallop. t. 3. f. 2. (v. v.)
5. A. HIRTUM (L. sp. 1482. excl. syn. Scheuchz.) foliis glancescentibus glabris aut hinc indè pilosulis convolutis scaberrimis, ligulâ glabrâ, spicis 2 erectis, paniculâ ramosâ, pedicellis villosis, spiculis geminis, masculâ breviter aristatâ, glumis acutis hirtis. ♀ in locis sterilibus et lapidosis provinc. Mediterran. — Fl. fr. 3. p. 96. Host aust. t. 4. t. 1. — Pluck. t. 92. f. 1. (v. v.)
6. A. ALLIONII (DC. fl. fr. 3. p. 97.) spicâ solitariâ erectâ terminali, flosculis geminis, hinc masculis glabris muticis, indè femineis pubescentibus longè aristatis, aristis villosis contortis. ♀ in collibus saxosis Niceæ. — A. contortum All. ped. t. 91. f. 4. Heteropogon glaber Pers. enh. 2. p. 533. H. Allionii Humb. et Bonpl. (v. v. DC.)

†† FLORES HERMAPHRODITI, SPICATO-DIGITATI, AUT IN PANICULAM SÆPÈ SPICIFORMEM DIGESTI, SPICULE UNIFLORE PEDICELLATÆ.

IV. SACCHARUM Schreb. gen. n. 104. DC. fl. fr. 3. p. 29. — Sacchari et Laguri sp. L.

Gluma uniflora bivalvis, valvulis extùs lanugine sericeâ onustis; perigonum bivalve glabrum.

Sect. I. ERIANTHUS P. de Beauv. agr. p. 14. t. 5. f. 11.

Panicula laxa.

1. S. RAVENNÆ (Murr. syst. 88.) paniculâ laxâ ramosissimâ, rachi lanatâ, foliis planis. ♀ secùs rivulos in Galloprovinciâ, propè Arelatem, Cettam. — Fl. fr. 3. p. 29. Andropogon Ravennæ L. Erianthus Ravennæ P. de Beauv. — Moris. s. 8. t. 8. f. 7. n. 32. (v. s.)

Sect. II. IMPERATA Cyr. ic. rar. 2. t. 11.

Panicula cylindrica spiciformis.

2. S. CYLINDRICUM (Lam. ill. t. 40. f. 2.) paniculâ spiciformi cylindricâ, foliis convolutis. ♀ in arenosis maritimis provinc. mediterranearum. — Fl. fr. 3. p. 29. Lagurus cylindricus L. Imperata arundinacea Cyr. — Bar. ic. t. 11. (v. v.)

V. LAGURUS Lam. ill. n. 102. t. 41. DC. fl. fr. 3. p. 28. — Laguri sp. L.

Gluma uniflora bivalvis, valvulis villosis acutissimis; perigonum bivalve coriaceum triaristatum, aristis duabus terminalibus, tertia dorsali.

1. L. OVATUS (L. sp. 119.) ① in arvis provinc. mediter., circâ Lugdunum (cl. Gilibert), Brivatem (cl. Bonnem.), Cherbourg. — Fl. fr. 3. p. 28. Lam. ill. t. 41. — Moris. s. 8. t. 4. f. 6. n. 1. (v. v.)





VI. CYNODON Rich. in Pers. encycl. 2. p. 85. — Paspali sp. DC.

Gluma 2-valvis patens lanceolata perigonio brevior; perigonium 2-valve, valvula exteriore maximâ ovoideâ. — Spicæ 4-5 digitatæ; spiculæ unilaterales, unicâ serie imbricatæ solitariae.

1. C. DACTYLON (Pers. l. c.) stolonibus repentibus, foliis margine ciliatis, spicis patentibus, glumâ patentissimâ scabré. $\frac{1}{2}$ in arenosis frequens. — Paspalum dactylon. Fl. fr. 3. p. 16. Panicum dactylon L. eng. bot. t. 85d. Digitaria stolonifera Schrad. germ. t. 3. f. 9. — Moris. s. 8. t. 3. f. 9. n. 4. (v. v.)

VII. DIGITARIA Hall. helv. 2. p. 244. Rich. in Pers. encycl. 1. p. 84. — Panici sp. L. — Paspali sp. DC.

Gluma 2-3-valvis concava, valvulis adpressis, extimâ minutissimâ quandoque subinconspicuâ, secundâ variabili, intimâ longitudine corollæ; perigonium 2-valve, oblongo-ovatum muticum. — Spicæ digitatæ, spiculæ unilaterales geminatae.

1. D. PASPALODES (Mich. bor. amer. 1. p. 46.) culmis repentibus patulis, foliis rectè patentibus vaginarumque glabrarum collo villosis, spicis geminis, rachi latiusculâ glabellâ, spiculis ovatis glabris. $\frac{1}{2}$ ex Americâ boreali orta, in humidis circâ Burdigalam nunc indigena (cl. Des Moulins). — Paspalum Digitaria Poiret. (v. s.)
2. D. FILIFORMIS (Kœl. gram. p. 26.) foliis vaginisque glabris, spicis digitatis basi interiore nodosis, spiculis oblongis pubescentibus, glumæ valvulis subæqualibus. (1) in cultis rariüs. — D. humifusa Pers. Paspalum ambiguum Fl. fr. 3. p. 16. Panicum glabrum Gaud. agr. 1. p. 22. Syntherisma glabrum Schrad. germ. t. 3. f. 6. (v. v.)
3. D. SANGUINALIS (Kœl. gram. p. 23.) vaginis foliisque papilloso-pilosis, spicis digitatis basi interiore nodosis, spiculis oblongis glabris, glumæ valvulis valde inæqualibus. (1) in cultis frequens. — Paspalum sanguinale Lam. DC. fl. fr. 3. p. 16. Panicum sanguinale L. eng. bot. t. 849 — Scheuchz. gram. t. 2. f. 2. (v. v.)
4. D. CILIARIS (Kœl. gram. p. 27.) foliis vaginisque pilosis, spicis digitatis, spiculis oblongis pubescentibus, glumæ valvulis valde inæqualibus. (1) in agris et arenosis propè Avenionem (cl. Requier). — Paspalum ciliare Fl. fr. 5. p. 250. Syntherisma ciliare Schrad. germ. 1. t. 3. f. 7. (v. s.)

VIII. TRAGUS Haller helv. 2. p. 203. Desf. atl. 2. p. 388. — Cenchrus sp. L.

Gluma 2-valvis uniflora, valvula externâ oblongo-lanceolata muriçatâ, internâ minutissimâ membranaceâ triquetra; perigonium bivalve glumâ brevius. — Panicula simplex spicato-racemosa.

1. T. RACEMOSUS (Desf. l. c.). (1) in arenosis. — Fl. fr. 3. p. 12. Cenchrus racemosus L. Lappago racemosa Willd. Host. gram. 1. t. 36. — Barr. t. 718. (v. v.)

IX. LEERSIA Schreb. gen. n. 105. — Phalaridis sp. L.

Gluma nulla; perigonium bivalve clausum, valvulis compresso-navicularibus muticis. — Panicula composita laxa.

1. L. ORYZOIDES (Swartz. prod. p. 21.) paniculâ effusâ, floribus triandris, perigonii valvulis oblongo-ovalibus carinâ ciliatis. $\frac{1}{2}$ in pratis humidis et oris sylvarum paludosis passim. — Fl. fr. 3. p. 11. Asprella oryzoides Lam. — Schreb. gram. 2. t. 22. (v. v.)


X. CALAMAGROSTIS Roth. germ. 1. p. 33. DC. fl. fr. 3. p. 24. — Arundinis sp. Sm. Schrad. Gaud.

Gluma uniflora bivalvis; perigonium bivalve, extus basi aut dorso vallis longis sericeis onustum. — Flores paniculati.

1. C. EPIGEIOS (Roth. germ. 2. p. 1. p. 91.) foliis scabris, paniculâ angustâ strictâ subpatente, spiculis laxè imbricatis, glumis acuminatis ciliato-scabris perigonio subduplicè longioribus, aristâ dorsali rectâ pilis glumam subæquantibus breviori. ♀ in siccis humidisque. — Fl. fr. 5. p. 257. Arundo epigeios L. sp. 120. Schrad. germ. 1. t. 4. f. 1. — Scheuchz. prod. 21. t. 5. (v. v.)
2. C. LANCEOLATA (Roth. germ. 1. p. 34.) culmo subramoso, foliis angustis laeviusculis, paniculâ laxâ diffusâ, spiculis subsparsis, glumis acuminatis perigonio subduplicè longioribus, perigonii basi pilosi valvulâ exteriore apice aristatâ, aristâ rectâ exigua, pilis glumellâ longioribus glumâve subbrevioribus. ♀ in sylvis et pratis humidis rariis, — Fl. fr. 5. p. 259. 3. p. 26. var. a. Arundo Calamagrostis L. sp. 121? Schrad. germ. 1. t. 4. f. 4. (v. s. ex Arduenisi.)
3. C. LITTOREA (DC. fl. fr. 5. p. 255.) foliis linearibus margine scabris, paniculâ laxâ diffusâ, glumis acuminatis perigonio longioribus, aristâ terminali brevi pilisque glumam subæquantibus. ♀ in arenosis humidis secùs flumina passim. — Arundo littorea Schrad. germ. 1. t. 4. f. 2. A. pseudo-phragmites Gaud. non Schrad. (v. v.)
4. C. MONTANA (DC. fl. fr. 5. p. 254.) foliis planis lato-linearibus margine scabris, paniculâ erectâ laxâ diffusâ, glumis acutis perigonium subæquantibus, aristâ subbasilari geniculatâ glumam excedente, glumellâ basi pilosâ, pilorum penicillo ad valvulae interioris basin erecto glumellâ subæquali. ♀ in montosis. — C. arundinacea Fl. fr. 3. p. 25. C. acutiflora Fl. fr. 5. p. 255. Arundo montana Gaud. A varia et acutiflora Schrad. germ. p. 216. t. 4. f. 6. et p. 217. (v. v.)
5. C. SYLVATICA (DC. fl. fr. 5. p. 253.) foliis angustis scabriusculis, paniculâ erectâ plus minusve contractâ, spiculis laxè imbricatis, glumis acutis perigonium æquantibus, aristâ dorsali geniculatâ glumam excedente, pilorum penicillo ad valvulae interioris basin erecto glumellâ subduplicè breviori. ♀ in sylvaticis montosis Jurassi, agri Mimatensis (cl. Prost), Pyrenæorum. — Arundo sylvatica Schrad. germ. 1. t. 4. f. 7. Agrostis arundinacea L. sp. 91? Gaud. agr. helv. 1. p. 73. (v. s.)
- + 6. C. ARGENTEA (DC. fl. fr. 3. p. 25.) culmo sèpius ramoso, foliis linearibus laevibus, paniculâ laxâ diffusâ, spiculis sparsis, glumis acuminatis perigonio longioribus perigonii extus lanati valvulâ exteriore apice aristatâ, aristâ geniculatâ glumâ duplè triplò longiore, pilis glumam subæquantibus. ♀ in siccis et calidis Alpium inferiorum, Monspelii, Pyrenæorum. — Fl. fr. 5. p. 253. Agrostis calamagrostis L. Gaud. agr. Stipa Calamagrostis Wahlemb. Gaud. helv. 1. p. 172. Arundo speciosa Schrad. germ. t. 5. f. 8. (v. v.)
- + 7. C. ARENARIA (Roth. gerin. 1. p. 34.) radice repente, foliis involutis mucronato-pungentibus, paniculâ spicæformi elongatâ, glumis nitidis acutis perigonium muticum basi villosum æquantibus, pilis glumellâ triplò brevioribus. ♀ in arenosis maritimis. — Fl. fr. 3. p. 24. Arundo arenaria L. Amomphila arundinacea Host. gram. 4. t. 41. Psamma arenaria P. de Beauv. — Scheuchz. gram. t. 3. f. 1. (v. v.)

XI. AGROSTIS L. gen. n. &c. — Agrostidis sp. Lam. DC.

Gluma uniflora bivalvis; perigonium 2-valve aut (abortu?) univalve, caducum, glabrum aut puberulum, valvulâ alterâ interdum dorso aut basi aristatâ; semen liberum. — Flores paniculati.





Sect. I. VILFA Adans. Pal. de Beauv. 16. t. 5. f. 8. — Decandollia Bast. ess. p. 28.

Perigonium 2-valve valvulis muticis.

1. A. PUNGENS (Schreb. gram. 2. t. 27. f. 3.) culmo ramoso repente, foliis involutis rigidis distichis, ligulis pubescentibus, paniculâ contractâ, pedunculis ramosis, glumæ valvulis inæqualibus lævibus perigonio subbrevioribus. ♀ in arenosis maritimis à Nicæâ ad Hispaniam. — Fl. fr. 3. p. 23. Cav. ic. t. III. (v. v.)
2. A. ~~MONTANA~~ (Lam. dict. 1. p. 61.) foliis involutis rigidis, ligulis glabris, paniculâ contractâ, glumæ valvulis æqualibus carinâ hispidiusculis perigonium paulò superantibus. ♀ in arenosis maritimis Narbonæ, Vasconia. — Fl. fr. 3. p. 23. et 5. p. 253. (v. v.)
3. A. STOLONIFERA (L. sp. 93. non DC.) culmo ramoso repente, foliis planis margine scabris, ligulâ brevi truncatâ fimbriato-lacerâ, paniculâ coarctatâ, spiculis congestis, glumis æqualibus obtusiusculis breviter ciliatis pubescensque perigonum superantibus. ♀ in humidis arenosis provinc. australium et Burdigalæ (Des Moul.). — Eng. bot. t. 1532. A. verticillata Vill. (v. v.)
4. A. DECUMBENS (Gaud. agr. 1. p. 78.) culmo repente ramoso, foliis planis striatis scabris, ligulâ oblongâ truncatâ, paniculâ (dessiccatione) contractiori, glumis acuminatis ciliato-scabris æqualibus perigonum paulò superantibus, perigonii valvulâ internâ duplò minore emarginatâ. ♀ in agris humidis et ad fossas. — A. stolonifera Fl. fr. 3. p. 23 non L. A. alba decumbens Gaud. helv. 1. p. 187. Nimum 2 subsequentibus affinis. (v. v.)
5. A. ALBA (L. sp. 93.) culmo basi repente, foliis margine scabris, ligulâ oblongâ truncatâ, paniculâ laxâ, glumæ valvulis acutis æqualibus carinâ subhispidis perigonum superantibus, perigonii valvulâ interiore subduplò minore retusâ. ♀ in humidis. — Fl. fr. 3. p. 22. An reverâ à sequente distincta? (v. v.)
6. A. VULGARIS (Hoffm. germ. 3. p. 36.) culmo erectiusculo, foliis planis angustis, ligulâ brevi truncatâ bifidâ, paniculâ laxâ subtrichotomâ, glumæ valvulis acuminatis dorso hispidiusculis æqualibus, perigonii valvulâ interiore duplò breviore retusâ. ♀ in pratis, arvis et sylvis. — Gaud. agr. 1. p. 82. Scheuchz. gram. t. 3. f. 3. B.
 - α . elongata, culmo elongato ascendentе, paniculâ capillari erecto-patente. — A. vulgaris Fl. fr. 3. p. 22. et 5. p. 252. eng. bot. t. 1671. A. capillaris Vill. Fl. dan. t. 163 non L. (v. v.)
 - β . pumila (Gaud.) culmis fasciculatis erectis humilibus. — A. pumila L. mant. 31. Fl. fr. 3. p. 22. (v. v.)
 - γ . dubia, perigonio interdùm aristâ dorsali brevi instructo. — A. dubia Leers herb. t. 4. f. 4. Fl. fr. 3. p. 21. A. compressa Willd. (v. v.)

Sect. II. TRICHODIUM Mich. fl. bor. amer. 1. p. 41. Schrad. germ. 1. p. 198.

Perigonium 1-valve.

* Perigonii valvulâ muticâ.

7. A. ELEGANS (Thore in Lois. not. t. 1. f. 1.) foliis involuto-subulatis; culmo erecto simplici, paniculâ laxâ capillari, pedicellis lævibus tenuissimis, glumis lævibus acutis, perigonio obtuso 1-valvi. (I. in ericetis circâ Aquas-Tarbelicas. — Fl. fr. 5. p. 252. Trichodium elegans Thore in Rœm. et Sch. 2. p. 283. (v. s.)

** Perigonii valvulâ aristatâ.

8. A. RUBRA (L. sp. 92. excl. syn. Pluck.) culmo erecto, foliis planis angustissimis margine scabriusculis, ligulâ oblongâ obtusâ, paniculâ per anthesin patente ante et post eam contractâ, pedunculis scabris, glumæ valvulis acuminatis, externâ dorso ciliato-scabrà perigonum superante, perigonii valvulâ

apice retusâ himenocronulatâ, aristâ dorsali geniculatâ spiculam paulò superante. (I) in pratis et ad vias. — Fl. fr. 3. p. 19. A. vinealis Bast. ess. — Schenck. gram. t. 3. f. 11. C. Non diversam à sequente nec veram A. rubram Linnæi volunt cl. Wahleberg Willd. etc. (v. s.)

9. A. CANINA (L. sp. 92.) culmo prostrato, foliis inferioribus fasciculatis setaceis, superioribus planis, ligulâ obtusâ fimbriato-lacerâ, paniculâ per anthesin patente, antè et post eam contractâ, glumæ valvulis acuminatis inæqualibus externâ dorso hispido-scabré, perigonii valvula breviter 2-aristatâ, aristâ dorsali spiculam superante. 2 in pratis subhumidis. — Fl. fr. 3. p. 20. Hoffm. germ. 3. t. 6. eng. bot. t. 1856. Trichodium caninum Schrad. (v. v.)

10. A. GLAUCINA (Bast. suppl. 25.) foliis angustissimis planis glaucis, paniculâ contractâ, pedunculis scabris, glumæ valvulis acuminatis subæqualibus perigonium paulò superantibus, glumellâ apice 2-mucronulatâ, aristâ basili geniculatâ spiculam paulò superante. 2 in ericetis Andegaviæ. — Fl. fr. 5. p. 251. Trichodium glaucinum Rœm. et Sch. 2. p. 281. (v. s.)

11. A. VASCONICA (Curt. lond. 6. t. 12.) foliis setaceis, ligulâ oblongâ acuminatâ, culmo erecto stricto, paniculâ contractâ, pedicellis scabris, glumæ valvulis acuminatis inæqualibus perigonium paulò superantibus, glumellâ apice breviter 2-aristatâ, aristâ basili geniculatâ spiculam paulò superante. 2 in ericetis Vasconiaæ, Armoraciæ. — Fl. fr. 5. p. 251. eng. bot. t. 188. Trichodium setaceum Rœm. et Sch. 2. p. 280. (v. v. D.)

12. A. ALPINA (Leyss. hal. n. 67.) culmo erecto, foliis setaceis, paniculâ primo coaretatâ demum patulâ, pedunculis lœvibus, glumæ valvulis acuminatis subæqualibus perigonium superantibus, glumellâ apice 2-mucronulatâ dorso aristatâ, aristis spiculâ longioribus. (I) in pratis Alpium, montium Corsicæ, Arverniæ, Pyrenæorum. — Fl. fr. 5. p. 20. Host. gram. 3. t. 49. Trichodium alpinum Schrad. germ. t. 3. f. 4. (v. v.)

13. A. RUPESTRIS (All. ped. n. 2161.) culmo erecto, foliis setaceis, paniculâ patulâ, pedunculis scabris, glumæ valvulis acuminatis subinæqualibus perigonium superantibus, glumellâ apice breviter 2-aristatâ basi externâ aristatâ, aristis spiculâ duplò longioribus. (I) in pratis siccioribus Alpium, montium Mimatis (Prost), Pyrenæorum. — Fl. fr. 3. p. 21. A. filiformis Vill. Fl. fr. 3. p. 20. Trichodium rupestre Schrad. germ. t. 3. f. 5. Schenck. prod. t. 4. f. 1. (v. v.)


14. A. PALLIDA (DC. fl. fr. 5. p. 251. non Schk. Hoffm.) culmo erecto geniculatove, foliis planis angustissimis, ligulâ oblongâ 2-dentatâ, paniculâ ramosissimâ, glumæ valvulis subæqualibus acuminatis, externâ dorso subciliato-scabré, perigonio duplò longioribus, glumellâ obtusâ brevissimè 2-mucronulatâ, aristâ dorsali rectâ glumâ duplò longiore. (I) in Corsicâ et Galloprovinciâ circa Forum-Julii. (v. s.)


15. A. INTELLUGENS (L. sp. 92.) culmo erecto basi geniculato, foliis planis angustis scabris, paniculâ elongatâ coaretatâ strictâ subinterruptâ, glumæ valvulis acuminatis inæqualibus dorso ciliato-scabris perigonum vix superantibus, glumellâ subciliato-scabré infrâ apicem aristatâ, aristis rectis longissimis. (I) in agris arenosis passim. — Fl. fr. 3. p. 19. Host. gram. 3. t. 48. — Vaill. par. t. 17. f. 4. (v. v.)

Sect. III. ANEMOCHLOA DC. herb.

Perigonium 2-valve, valvula externâ aristatâ.

16. A. SPICA-VENTE (L. sp. 91.) foliis planis scabris, paniculâ elongatâ patulâ multiflorâ, glumæ valvulis æqualibus acuminatis glabris perigonum superantibus, perigonii valvula externâ acuminata infrâ apicem aristatâ, aristis rectis strictis longissimis, internâ paulò breviore breviter 2-mucronulatâ. (I) inter segetes. — Fl. fr. 3. p. 18. Leers herb. t. 4. f. 1. — Lob. ic. t. 3. f. 1. (v. v.)









XII. MILIUM Linn. gen. 79. Schrad. germ. 1. p. 194. — Agrostidis sp. DC. fl. fr.

Gluma 2-valvis uniflora ventricosa; perigonum 2-valve glumâ minus persistens glabrum aut puberulum, valvula externâ sub apice aristatâ rarius muticâ internam involvente; semen perigonio corticatum. — Fl. paniculati.

* *Perigonio aristato.*

1. M. ~~P~~ LENDIGERUM (L. sp. 91.) foliis planis scabris linearibus, paniculâ coarctatâ spiciformi ovato-cylindrica, glumæ valvulis nitidis basi ventricosis aristato-acuminatis margine scabris perigonium longè superantibus, perigonii valvula externâ pilosâ infrâ apicem aristatâ aristâ glumam subsuperante. (1) in arvis Galliae australis, occidentalis, mediae usque ad Parisios passim. — eng. bot. t. 1107. Schreb. gram. t. 23. f. 3. Agrostis lendigera Fl. fr. 3. p. 18. Gastridium australe P. de Beauv. — Pluck. t. 33. f. 6. An reverâ Milii species aut potius genns distinctum? (v. v.)
2. M. MULTIFLORUM (Cav. dem. hot. p. 36.) foliis planis margine scabris, ligulis brevioribus truncatis, paniculâ elongatâ laxâ diffusâ multiflorâ, pedicellis semiverticillatis, glumæ valvulis glabris acuminatis subæqualibus, aristâ terminali rectâ strictâ spiculâ vix duplò longiore. (1) in arenosis Galliae mediterraneæ. — Agrostis miliacea L. sp. 91. Fl. fr. 3. p. 19. Host. gram. 3. t. 45. Piptatherum multiflorum P. de Beauv. (v. v.)
3. M. THOMASII (Dub. mss.) culmo stricto basi geniculato glauco, foliis convolutis lævibus linearibus angustis, ligulâ brevi truncatâ, paniculâ elongatâ laxâ subcoarctatâ, pedicellis semiverticillatis, glumæ valvulis glabris acuminatis subæqualibus, aristâ terminali rectâ spiculam pañlò superante. 2 in rupestribus Corsicæ ad promontorium Capo-Corso dictum reperiit Ph. Thomas. — Semiverticillorum inferiorum flosculi plerūmque abortiunt et panicula involucro setiformi cincta videtur. (v. s.)
4. M. PARADOXUM (Schreb. gram. t. 28. f. 2.) foliis planis lato-linearibus scabris, ligulâ brevissimâ, paniculâ laxissimâ, pedicellis geminis, glumæ valvulis glabris subæqualibus acuminatis nitidis, perigonii valvula externâ breviter pubescente, aristâ terminali rectâ spiculâ subtriplo longiore. 2 in agro Nicæensi, in Galloprovinciâ et Delphin. australiori, circâ Monspelium. — Agrostis paradoxa L. sp. 62. Fl. fr. 3. p. 17. Piptatherum paradoxum P. de Beauv. — Pluck. t. 32. f. 2. (v. v.)
5. M. CÆRULESCENS (Desf. atl. 1. t. 12.) foliis convoluto-setaceis angustissimis glaucis, ligulâ oblongâ obtusâ, paniculâ laxissimâ, pedicellis solitariis geminisve ramosis, glumis acuminatis æqualibus glabris nitidis, perigonii valvula externâ nitidâ, aristâ terminali caducâ glumam subæquante. 2 in lapidosis apricis Nicaeæ, Telonis, Arelatis, agri Ruscinonensis. — Agrostis cœrulescens Fl. fr. 5. p. 250. Piptatherum cœrulescens P. de Beauv. (v. v. DC.)

** *Perigonio mutico.*

6. M. ~~M~~UTICUM (L. sp. 90.) foliis lato-linearibus planis lævibus, ligulâ oblongâ fimbriato-lacerâ, paniculâ laxissimâ, pedicellis semiverticillatis patulis, spiculis dispersis lævibus, glomæ valvulis ovatis acutis perigonio glabro paulò longioribus. 2 in sylvis. — eng. bot. t. 1106. Agrostis effusa Lam. DC. fl. fr. 3. p. 21. — Moris. s. 8. t. 5. f. et n. 10. (v. v.)

XIII. STIPA L. gen. 90.

Gluma uniflora bivalvis acuta; perigonum 2-valve, glumâ minus, valvula exteriore convolutâ apice aristam longam basi articulatam deciduum gerente. — Panicula subsimplex.

1. S. ~~P~~ ARISTELLA (All. anct. p. 39. t. 2. f. 4. an L? non Gouan.) foliis superioribus planis, aristis glabris flosculo vix duplò longioribus. 2 in locis seccis


- petrosis Galliæ-mediterraneæ passim. — Fl. fr. 3. p. 28. et 5. p. 258. *Agrostis bromoides* L. Gouan. ill. t. 1. f. 3. — An vera *Stipa*? (v. v.)
2. *S. JUNCEA* (L. sp. 116.) foliis convolutis filiformibus intus pubescentibus, paniculâ laxâ pallidâ, aristis longissimis basi subtortilibus pubescentibus. $\frac{1}{2}$ in collibus aridis provinc. australium. — Fl. fr. 3. p. 27. (v. v.)
 3. *S. CAPILLATA* (L. sp. 116.) foliis convolutis subfiliformibus intus villosis, paniculâ laxâ demum rufescente, aristis longissimis glabris basi rectis apice tortilibus. $\frac{1}{2}$ in collibus aridis passim. — Fl. fr. 3. p. 27. et 5. p. 257. Host gram. 3. t. 5. — Scheuchz. gram. t. 3. f. 13. A. (v. v.)
 4. *S. TORTILIS* (Desf. atl. 1. t. 31. f. 1.) foliis convolutis filiformibus, paniculâ spiciformi folio superiore spathæformi involutâ, aristis longissimis basi tortilibus pubescentibus. $\frac{1}{2}$ in apricis lapidosis Corsicæ, agri Nicæensis et Ruscinonensis. — Fl. fr. 5. p. 257. Desf. atl. t. 31. f. 2. — *Spartium*, etc. Bocc. mns. p. 138. t. 97. (v. v.)
 5. *S. TERRICOLA* (L. sp. 115.) foliis filiformibus, aristis longissimis plumosis basi glabris. $\frac{1}{2}$ in siccis montanis lapidosis passim. — Fl. fr. 3. p. 27. Lam. ill. t. 41. f. 1. — Moris. s. 8. t. 7. f. 21. n. 9. (v. v.)

XIV. *PANICUM* Juss. gen. 29. — Panici sp. L.

Gluma uniflora bivalvis, valvula tertia extus ad basin floris additâ; perigonium bivalve persistens; semen perigonio corticatum. — Panicula laxa aut spiciformis.

1. *P. CAPILLARE* (L. syst. veg. 106.) vaginis hirsutissimis, paniculâ capillari ramosissimâ patente, glumis acuminatis lævibus. (I) circâ Nicæam (Stire). — Fl. fr. 3. p. 15. (v. s.)
2. *P. REPENS* (L. sp. 87.) vaginis glabris, foliis in paginâ superiori et ad oras pubescentibus, paniculâ erectâ coarctatâ laxiflorâ. $\frac{1}{2}$ ad littora maris propè Olbias (cl. Robert). — Fl. fr. 5. p. 250. Cav. ic. 2. t. 110. (v. s.)
3. *P. MUCRONATUM* (L. sp. 36.) foliorum vaginis hirtis, paniculâ laxâ nutante, glumis mucronatis nervosis, seminibus lævissimis. (I) ex Indiâ ortum, in Galliâ frequenter cultum. — Fl. fr. 3. p. 15. — Lob. ic. t. 39. f. 1. (v. v. c.)
4. *P. CRUS-GALLI* (L. sp. 83.) paniculâ spiciformi decompositâ, spiculis alternis conjugatisque subdivisis, glumis aristatis hispidis, rachi subquinquangulari. (I) in arvis et cultis. — Fl. fr. 3. p. 14. eng. bot. t. 876. *Echinochloa crus-galli* Röm. et Sch. 2. p. 478. — Moris. s. 3. t. 4. f. 5. n. 16. (v. v.)
5. *P. ITALICUM* (L. sp. 83.) paniculâ spiciformi densâ basi interruptâ subramosâ, spiculis glomeratis, rachi hirsutâ, involucellis subbisetosis. (I) ex Indiâ ortum in Galliâ meridionali cultum. — Fl. fr. 3. p. 14. *P. germanicum* Willd. *Setaria Italica* Röm. et Sch. 2. p. 493. — Lob. ic. t. 42. f. 1. (v. v. c.)
6. *P. GLAUCUM* (L. sp. 83.) paniculâ spiciformi elongato-cylindricâ, spiculis confertis, involucellis bifloris multisetosis seabriusculis, semine transversim rugoso. (I) ad margines agrorum et viarum. — Fl. fr. 3. p. 13. Host. gram. 2. t. 16. *Setaria glauca* Röm. et Sch. 3. p. 490. — Lob. ic. t. 13. f. 2. (v. v.)
7. *P. VIRIDE* (L. sp. 83) culmis suberectis, paniculâ spiciformi cylindricâ, racemulis laxiusculis, involucellis bifloris multisetosis antrorsum seabriusculis, seminibus minutissimè muricatis. (I) in arvis. — Fl. fr. 3. p. 13. eng. bot. t. 875. *Pennisetum viride* R. Brown. *Setaria viridis* Röm. et Sch. — Moris. s. 8. t. 4. f. 1. n. 10. (v. v.)
8. *P. VERTICILLATUM* (L. sp. 82.) culmis subdiffusis, paniculâ spiciformi cylindricâ, spiculis verticillatis quaternis, involucellis unifloris bisetosis retrorsum sebris. (I) in arvis. — Fl. fr. 3. p. 13. Lam. ill. t. 43. eng. bot. t. 874. *Pennisetum verticillatum* R. Brown. *Setaria verticillata* Röm. et Sch. — Moris. s. 8. t. 4. f. 2. n. 11. (v. v.)





XV. PHALARIS Willd. sp. 1. p. 326. DC. fl. fr. 3. p. 8. — Phlei et Phalaris sp. L.

Gluma uniflora 2-valvis, valvulis æqualibus carinatis; perigonum bivalve, valvulis inæqualibus concavis acutis glumâ minoribus. — Panicula spiciformis.

§. 1. *Glumis carinatis dorso alato-appendiculatis nec ciliatis.*

1. P. ~~MINIMA~~ (L. sp. 80.) culmo striato, foliis lato-linearibus striatis margine scabris, paniculâ elongatâ plus minusve laxâ, pedunculis ramosis, glumæ valvulis trinerviis glabriusculis acutis, perigonio hirsuto. \mathcal{U} in pratis humidis. — Host. gram. 2. t. 33. Schrad. germ. t. 6. f. 5. Calamagrostis colorata Sibth. Fl. fr. 3. p. 26. — Schenckz. gram. t. 3. f. 4. A-C. (v. v.)
2. P. AQUATICA (L. amœn. 4. p. 264.) culmo lævi, paniculâ spiciformi oblongâ, glumâ glabrâ carinatâ acutâ dorso denticulatâ, perigonio adpressè sericeo villoso. (I) in aquaticis Niceæ, Telonis, Narbonæ. — Fl. fr. 5. p. 249. Host. gram. t. 39. (v. s.)
3. P. CAVARIA (L. sp. 79.) culmo læviusculo, paniculâ spiciformi ovatâ vaginâ superiore non involutâ, glumis navicularibus integris lato-ovatis acutis, perigonii inermibus. (I) in maritimis Galloprovinciæ et Occitanie, agri Ruscinonensis ex Lapeyr., circâ Aginnum ex St.-Am. — Fl. fr. 3. p. 10. eng. bot. t. 1310. — Moris. s. 8. t. 3. f. 15. n. 1. (v. v. c.)
4. P. BULBOSA (L. sp. 79.) culmo basi bulboso lævi, paniculâ laxâ spicatâ ovato-cylindraceâ sœpè basi vaginâ superiore involutâ, glumæ valvulis glabriusculis apice mucronulatis, perigonio glaberrimo. \mathcal{U} circâ Cannas et Antipolim reperiit cl. Balbis, in Corsica cl. Requier. — Fl. fr. 5. p. 249. Cav. ic. 1. t. 64. — Barr. ic. t. 700. f. 1. (v. s.)
5. P. ~~PROSTRATA~~ (L. dec. t. 18.) paniculâ arctè spicatâ oblongo-cylindrica è superiore vaginâ dilatatâ vix exsertâ, glumæ appendicibus acutis, flosculis in singulo ramo 5-7, intermedii hermaphroditæ glumæ valvulis acuminatis, reliquorum imperfectorum valvulis acutis. (I) in Galloprovinciâ, circâ Narbonam, in agro Ruscinonensi ex Lapeyr. — Fl. fr. 3. p. 10. Schreb. gram. t. 12. — Pluck. t. 33. f. 5. (v. s.)
6. P. CYLINDRICA (DC. fl. fr. 3. p. 11.) culmo ascendentæ lævi, paniculâ arctè spicatâ cylindricâ elongatâ, glumis glabris acutis nervosis integris margine membranaceis. (I) in maritimis Galloprovinciæ, agri Ruscinonensis ex Lapeyr. — Fl. fr. 5. p. 249. P. tenuis Host. gram. 2. t. 36. Achnodonton Bellardi P. de Beauv. — Barr. ic. t. 14. f. 1. (v. v. DC.)

§. 2. *Glumis dorso ciliatis nec appendiculatis.*

7. P. TRIGYNA (Host. gram. aust. 4. t. 20.) culmo erecto lævi, vaginis foliisque scabriusculis, paniculâ densè spicatâ cylindricâ elongatâ, glumis carinatis acuminatis dorso longè ciliatis. \mathcal{U} circâ Nicæam reperiit Stire. — Phleum cuspidatum Willd. supp. enum. p. 5. Chilochloa cuspidata Rœm. et Sch. 2. p. 409. (v. s.)
8. P. ALPINA (Hæncke in Jacq. coll. 2. p. 91.) culmo levissimo, paniculâ spicatâ basi laxiusculâ cylindricâ elongatâ, glumis carinatis acuminatis dorso longè ciliatis. \mathcal{U} in summo Jurasso ex Hall., alpibus Delphin. ex Vill. — Fl. fr. 3. p. 9. Phleum Michelii Allion. Schrad. germ. t. 1. f. 2. eng. bot. t. 226. Phleum hirsutum Gaud. (v. v. D. in Alpibus Italicis.)
9. P. PHLEOIDES (L. sp. 80.) culmo simplici, vaginis subventricosis, paniculâ arctè spicatâ elongato-cylindricâ, glumis glabriusculis dorso breviter ciliatis apice subtruncatis mucronatis. \mathcal{U} in pratis et sylvarum marginibus. — Fl. fr. 3. p. 9. excl. syn. Moris. Host. gram. 2. t. 34. Phleum phalaroides Gaud Chilochloa Boehmeri Rœm. et Sch. 2. p. 408. — Barr. ic. t. 21. f. 1. (v. v.)
10. P. ~~REVERAE~~ (Kœl. gram. 42.) culmo levissimo basi ramoso, vaginis ventri-

cosis, paniculâ densè spicatâ oblongo-obovatâ, glumis ciliatis acuminatis. (I) in arenosis præsertim maritimis. — Fl. fr. 3. p. 8. eng. bot. t. 222. *Phleum arenarium* L. *Chilochloa arenaria* Röm. et Sch. l. c. — Pluck. t. 33. f. 8. (v. v.)

XVI. PHLEUM Willd. sp. 1. p. 354. DC. fl. fr. 3. p. 6. — *Phlei* sp. L.

Gluma uniflora bivalvis, valvulis apice retusis, carinis in aristam prominentibus bicuspidata; perigonium 2-valve, glumâ minus inerme. — *Panicula spiciformis*.

1. *P. PRATENSE* (L. sp. 87.) paniculâ densè spicatâ cylindricâ, glumæ valvulis breviter pubescentibus carinâ ciliatis aristâ multò longioribus. $\frac{1}{2}$ in pratis ad margines viarum, etc. — Schreb. gram. 1. t. 14. Host. gram. 3. t. 9.
 - a. *elongatum*, radice minùs nodosâ, paniculâ elongatâ. — *P. pratense* Fl. fr. 3. p. 6. — Moris. s. 8. t. 4. f. 18. n. 1. (v. v.)
 - b. *nodosum* (Gaud.) radice nodosâ, paniculâ brevi. — *P. nodosum* L. Fl. fr. 3. p. 6. — Moris. s. 8. t. 4. f. 20. n. 3. (v. v.)
2. *P. ASPERUM* (Vill. dauph. 2. t. 2. f. 4.) culmo erecto basi ramoso, paniculâ spicatâ cylindricâ elongatâ basi subvaginatâ, glumæ valvulis glabris subcartilagineis apice incrassatis, aristâ brevissimâ. (I) in agris à Moguntiâ ad Galloprovinciam. — Fl. fr. 3. p. 7. *Phleum paniculatum* eng. bot. t. 1077. *Chilochloa aspera* Röm. et Sch. (v. v.)
3. *P. ALPINUM* (L. sp. 88.) ligulâ supremâ oblongâ acutâ, paniculâ densè spicatâ ovato-cylindricâ, glumæ valvulis pubescentibus carinâ ciliatis ferè aristæ retrorsum ciliatae longitudine. $\frac{1}{2}$ in pascais Jurassi, Alpium, Montis-Aurei, Pyrenæorum. — Fl. fr. 3. p. 7. Vill. dauph. 2. t. 2. f. 5. eng. bot. t. 519. (v. v.)
4. *P. COMMUTATUM* (Gaud. agr. 1. p. 40.) ligulâ supremâ brevissimâ, paniculâ densè spicatâ ovatâ, glumis pubescentibus subasperis carinâ ciliatis in aristas glabratas glumæ longitudine desinentibus. $\frac{1}{2}$ in summis Pyrenæis frequens, in Alpibus rarum. — Fl. fr. 5. p. 248. (v. v. DC.)

XVII. POLYPOGON Desf. atl. 1. p. 67. — *Alopecuri* sp. L.


Gluma uniflora bivalvis, valvulâ utrâque aristatâ; perigonium 2-valve glumâ minus, valvulâ alterâ aristatâ.

1. *P. LAGASCEÆ* (Röm. et Sch. 2. p. 326.) paniculâ coarctatâ elongatâ, glumæ valvulis acutis indivisis glabris dorso ciliatis aristâ terminali vix duplò brevioribus. (I) ad oras stagnorum circâ Monspelium rarissimè (Saltzmann). — *P. elongatum* Lag. non Humb. et Bonpl. (v. s.)
2. *P. MONSPELIENSE* (Desf. atl. 1. p. 67.) paniculâ subcoarctatâ, glumæ valvulis pubescentibus margine ciliatis apice emarginatis aristâ triplò brevioribus. (I) in maritimis incultis et humidis. — Fl. fr. 3. p. 5. *Alopecurus Monspeliensis* et *paniceus* L. sp. 90. — Barr. ic. t. 115. f. 1. et 2. (v. v.)
3. *P. MARITIMUM* (Willd. nov. act. nat. cur. t. 3.) paniculâ coarctatâ oblongâ, glumæ valvulis apice bifidis valde ciliatis aristâ è fundo fissuræ ortâ triplò brevioribus. (I) in maritimis Corsicæ, Occitaniae, Oceani rariùs. — Fl. fr. 5. p. 248. An satis à priore distinctum? (v. v.)
 - $\beta.$ *subspathaceum*, paniculis basi vaginâ folii supremi dilatatâ inclusis. — In insulâ Laveiro propè Bonifacio. — *P. subspathaceum* Req. in ann. sc. nat. 5. p. 386. (v. s.)

XVIII. ALOPECURUS Desf. atl. 1. p. 63. DC. fl. fr. 3. p. 4. — *Alopecuri* sp. L.

Gluma uniflora bivalvis inermis; perigonium glumam subæquans, univalve, valvulâ basi dorso aristatâ. — *Panicula spiciformis*.





1. *A. PRATENSIS* (L. sp. 88.) culmo lœvi, paniculâ spicatâ crassâ cylindricâ, glumæ valvulis villosis acutis basi connatis perigonii aristâ subduplicata brevioribus. ♀ in pratis. — Fl. fr. 3. p. 4. Lam. ill. t. 42. — Lob. ic. t. 8. f. 2. (v. v.)
2. *A. AGRESTIS* (L. sp. 89.) culmo erecto scabriuscule, paniculâ densè spicatâ elongatâ cylindricâ, glumæ valvulis glabris acutis basi connatis. ♀ in pratis, agris, vineis. — Fl. fr. 3. p. 4. Schreb. gram. t. 19. f. 2. — Lob. ic. t. 9. f. 2. (v. v.)
3. *A. DIRIGULATUS* (Pers. enc. 1. p. 80.) culmo erecto lœvi, folii supremi vaginâ ventricosâ, paniculâ densè spicatâ ovatâ, glumæ valvulis glabris acutis basi marginato-dilatatis perigonii aristâ multò brevioribus. (I) in pratis humidis Burgundiæ, Lugduni, Occitaniæ, agri Ruscinonensis ex Lapeyr. — Phalaris utricularia L. Fl. fr. 3. p. 10. Host. gram. 3. t. 7. — Moris. s. 8. t. 4. f. 11. n. 19. (v. v.)
4. *A. BULBOSUS* (L. sp. 1665.) culmo erecto lœvi basi bulboso, paniculâ densè spicatâ cylindricâ, glumis villosis obtusis. ♀ in pratis paludosis aut subsalsis. — Fl. fr. 3. p. 5. eng. bot. t. 1249. — Barr. ic. t. 699. f. 1. et 630. f. 1. et 2. (v. v.)
5. *A. GENICULATUS* (L. sp. 89.) culmo geniculato lœvi, paniculâ densè spicatâ cylindricâ elongatâ, glumæ valvulis liberis obtusis carinâ pubescentibus perigonii aristâ paulò brevioribus. ♀ in paludosis et fossis, interdùm natans. — Fl. fr. 3. p. 4. eng. bot. t. 1250. — Lob. ic. t. 13. f. 1. (v. v.)
6. *A. GERARDI* (Vill. dauph. 2. t. 2. f. 6.) foliorum vaginis ventricosis, paniculâ densè spicatâ subrotundâ, glumis lanceolatis villosis aristam superantibus. ♀ in editoribus Alpibus et Pyrenæis. — Phleum Gerardii All. Jacq. ic. rar. 2. t. 301. Fl. fr. 3. p. 7. (v. v.)

XIX. CRYPSIS Ait. Lam. ill. t. 42. — Phlei, Anthoxanthi et Schæni
sp. L.

Gluma uniflora bivalvis compressa; perigonium bivalve, valvulis inæqualibus lanceolatis inermibus glumâ longioribus; stamina 2 seu 3. — Panicula spiciformis.

1. *C. ALOPECUROIDES* (Schrad. germ. 1. p. 167.) culmis teretibus subsimplicibus, paniculâ oblongâ nudâ, floribus triandris. (I) in provinciis occidentalibus. — Fl. fr. 5. p. 248. Heleocholoa alopecuroides Host. gram. 1. t. 29. (v. s.)
2. *C. SCHÆNOIDES* (Lam. ill. t. 42. f. 1.) culmis ramosis subcanaliculatis, paniculâ ovatâ vaginâ foliaceâ cinctâ. ♀ in locis petrosis humidis Occitanie, Andegaviæ ex Bast. — Fl. fr. 3. p. 3. Phleum schænoides L. Cav. ic. t. 52. Heleocholoa schænoides Host. gram. 1. t. 30. (v. v.)
3. *C. ACULEATA* (Lam. ill. t. 42. f. 2.) culmis ramosis canaliculatis, paniculâ subrotundâ foliis vaginantibus brevibus punctatis cinctâ. ♀ in arenosis maritimis provinc. mediterranearum, secùs Ligerim ex Bast. — Fl. fr. 3. p. 3. Host. gram. 1. t. 31. Schoenus aculeatus L. Cav. ic. t. 52. (v. v.)

XX. ANTHOXANTHUM L. gen. n. 42.

Gluma uniflora bivalvis; perigonium bivalve, valvis acutis dorso aristulatis; stamina 2. — Panicula spiciformis.

1. *A. ALBORUM* (L. sp. 40.) paniculâ ovato-oblongâ spiciformi, flosculis aristâ longioribus. ♀ in pratis. — Fl. fr. 3. p. 2. et 5. p. 247. Lam. ill. t. 23. (v. v.)

††† FLORES PANICULATI HERMAPHRODITI, RARIUS POLYGAMI; SPI-
CULÆ MULTIFLORÆ.

XXI. LAMARCKIA *Mœnch. meth. 201. DC. fl. fr. 3. p. 30.* — Cynosuri
sp. L.

Spiculæ aliæ steriles pendulæ muticæ ad basin fertilium involucrum mentientes, aliæ fertiles geminatae; gluma 2-valvis, 2-3-flora; perigonum 2-valve, valvula exteriore longè aristatâ.

1. L. AUREA (*Mœnch. l. c.*) (I) ad rupes Niceæ, Galloprovinciae australioris, agri Ruscinonensis circâ Collioure (*Ph. Thomas*), Corsicæ. — Fl. fr. 3. p. 30. *Cynosurus aureus L. sp. 107. Chrysurus cynosuroides Pers. (v. v.)*

XXII. MELICA *Mœnch. meth. 172. DC. fl. fr. 3. p. 30.* — Meliceæ *sp. L.*

Gluma bivalvis scariosa 2-3-flora, floribus 1-2 hermaphroditis, 1 terminali abortivâ; perigonum bivalve subventricosum.

§. 1. Perigonio glabro.

1. M. UNIFLORA (*Retz. obs. 1. p. 10.*) foliis planis, vaginis oppositifoliis, paniculâ laxâ pauciflorâ ramosâ, spiculis erectis floribus hermaphroditis solitariis. ♀ in sylvis. — Fl. fr. 3. p. 30. eng. bot. t. 1058. *M. nutans Lam. ill. t. 44. non L. (v. v.)*
2. M. NUTANS (*L. sp. 98 excl. pl. syn.*) foliis planis, paniculâ nuntante secundâ simplici, spiculis pendulis, floribus hermaphroditis binis. ♀ in sylvis montanis. — eng. bot. t. 1059. *M. montana Huds. angl. 37. Fl. fr. 3. p. 31. (v. v.)*
3. M. RAMOSA (*Vill. dauph. 2. p. 91.*) foliis convolutis rigidis, paniculâ laxâ pyramidatâ, floribus hermaphroditis binis. ♀ ad rupes apricas Delphin, Galloprov., Narbouæ, agri Ruscinonensis. — Fl. fr. 3. p. 31. *M. aspera Desf. — Barr. t. 95. f. 1. (v. v.)*

§. 2. Perigonio extus villosa.


4. M. CILIATA (*L. sp. 97.*) paniculâ spiciformi elongatâ, perigonis ciliato-villosissimis. ♀ in collibus sterilibus saxosis. — Fl. fr. 3. p. 32. — Scheuchz. gram. t. 3. f. 16. (v. v.)
5. M. BAUHINI (*All. auct. p. 43.*) paniculâ laxâ subsecundâ ramulis inferis divaricatis, perigonis ciliato - villosis. ♀ ad rupes apricas Galliæ mediterraneæ passim. — Fl. fr. 3. p. 32. Host. gram. 4. t. 23. (v. v.)

XXIII. AIROPSIS *Desv. journ. bot. 1. p. 200. DC. fl. fr. 5. p. 262.*

Glumæ bifloræ bivalves nitentes concavæ obtusæ; flores ante matritatem inclusi mutici.

1. A. GLOBOSA (*Desv. l. c.*) culmis erectis filiformibus cespitosis, foliis setiformibus, vaginâ superiore subutriculosâ, paniculâ coarctatâ, perigonis ciliatis. (I) in ericetis circâ Aquas Tarbellicas, propè Forum-Julii (cl. Solier). — Fl. fr. 5. p. 262. *Aira globosa Thore journ. bot. 1. t. 7. f. 3. 4. Milium tenellum Cav. ic. 3. t. 274. f. 1. (v. v. D.)*
2. A. AGROSTIDEA (*DC. fl. fr. 5. p. 262.*) culmis ramosis basi geniculatis radicanibus, foliis planis, paniculâ expansâ laxâ, perigonis membranaceis glabris. ♀ in humidis herbosis secùs rivos et stagna Armoraciæ, Andegaviæ, Soloniæ. — *Poa agrostide aDC. ic. rar. t. 1. Airopsis Candolii Desv. (v. s.)*

ultimata -



XXIV. *AIRÆ* Mænch. meth. 182. DC. fl. fr. 3. p. 42. — *Airæ sp. L.*

Gluma biflora bivalvis; perigonum bivalve, valvula exteriore è basi aristam geniculatam emittente. — Flores paniculati nitentes.

1. *A. CHITONA* (L. sp. 96.) foliis planis nervosis, ligulâ bifidâ, paniculâ elongatâ ramosissimâ patente, glumæ valvulis acutis flosculos basi pilosos subæquantibus, flosculo altero pedicellato, aristis rectis glumâ vix longioribus. ♀ in pratis et sylvis. — Fl. fr. 3. p. 43. eng. bot. t. 1453. Deschampsia cespitosa P. de Beauv. — Scheuchz. gram. t. 2. f. 2 et 3. (v. v.)
2. *A. TENUOSA* (L. p. 96.) foliis setaceis, ligulâ bifidâ, paniculâ laxâ pauciflorâ flexuosa, glumæ valvulis subacutis flosculos basi villosos subæquantibus, flosculo altero pedicellato, aristis glumâ duplò longioribus. ♀ in sylvis et montanis. — Fl. fr. 3. p. 43. eng. bot. t. 1519. *Aira montana* L. — Scheuchz. prod. t. 4. f. 4. et t. 6. f. 1. (v. v.)
3. *A. CAPILLARIS* (Host. gram. 4. t. 35.) foliis setaceis, ligulâ oblongâ acuminatâ, paniculâ subcorymbosâ capillari patentissimâ, glumâ truncatâ mucronulata flosculos sessiles superante, flosculo superiore aristato aristâ glumam paululum excedente. (I) in Corsicâ et insulis Stæchadum (cl. Requien). — *A. elegans* Willd. ined. in Röm. et Sch. 2. p. 682. Variat mutica. (v. s.)
4. *A. CANTONVULSA* (L. sp. 97.) foliis setaceis, ligulis acuminatis integris, vaginis scabriusculis, paniculâ divaricatâ trichotomâ, glumæ valvulis acutis flosculos sessiles glabros superantibus, aristis glumâ paulò longioribus. ♀ in siccis et arenosis. — Fl. fr. 3. p. 44. Lam. ill. t. 44. eng. bot. t. 812. — Moris. s. 8. t. 5. f. 15. n. 11. (v. v.)
5. *A. ARTICULATA* (Desf. atl. 1. t. 13.) foliis planis siccitate convolutis, ligulâ oblongâ subacutâ, paniculâ primo coarctatâ demum patulâ, glumis acuminatis, aristis medio articulatis apice clavatis glumam subæquantibus. (I) in arenosis maritimis Corsicæ, Niceæ, Telonis, Narbonæ (cl. Requien), agri Ruscinonensis propè Prades (Ph. Thomas). — Fl. fr. 5. p. 261. *Corynephorus articulatus* P. de Beauv. (v. s.)
6. *A. CANESCENS* (L. sp. 97.) foliis setaceis involutis, ligulâ oblongâ truncatâ, paniculâ coarctatâ, glumis acuminatis, aristis medio articulatis apice clavatis glumam subæquantibus. (I) in arenosis passim. — Fl. fr. 3. p. 44. eng. bot. t. 1190. *Corynephorus canescens* P. de Beauv. — Moris. s. 8. t. 3. f. 2. n. 10. (v. v.)
7. *A? PRÆCOX* (Gou. ill. 3.) culmo eretto 2-3-folio, foliis glancis convoluto-setaceis, radicalibus fasciculatis, ligulâ oblongâ acuminatâ, paniculâ patente, glumis acutis perigonum truncatum basi pilosiusculum subæquantibus, aristâ dorsali recta glumâ subbreviore. (I) in aridis Monspelii, Galloprovinciæ propè Sisteron et Delphin. propè Vapincum ex Vill. — Fl. fr. 5. p. 261. Deschampsia media et D. juncea Röm. et Sch. 2. p. 687. — An vera *Aira?* (v. s.)
8. *A. PRÆCOX* (L. sp. 97.) culmo eretto pusillo, foliis setaceis involutis, paniculâ coarctatâ subspiciformi, glumæ valvulis acutis glumellam acuminatam subæquantibus, aristis medio articulatis apice filiformibus glumâ subduplò longioribus. (I) in arenosis Galliæ occidentalis, mediæ et australis. — Fl. fr. 3. p. 44. eng. bot. t. 1296. *Avena præcox* P. de Beauv. — Ray. ang. t. 22. f. 2. (v. v.)

XXV. *AVENÆ* Kœl. gram. 276. DC. fl. fr. 3. p. 34. — *Avenæ et Holci sp. L.*

Gluma 2-valvis 2-aut multiflora; flores omnes hermaphroditi aut interdum abortu masculi; perigonum 2-valve, valvula exteriore dorso aristam geniculatam gerente.

Sect. I. PSEUD'HOLCUS. — *Holcus Gaud. agrost.* I. p. 135. *Holci sp. L.*


Glumæ 2-3 floræ sèpiùs polygamæ, flosculis dissimilibus altero mutico altero aristato.


1. A. ~~odorata~~ (Köl. gram. 299.) foliis planis glabris, paniculâ laxâ, spiculis trifloris, flosculis glumæ valvulas ovatas subæquales membranaceas mucronatas æquantibus, lateralibus masculis intermedio hermaphroditio. ♀ in pratis humidis et fossis Arverniæ, Mimatis; Monspelii. — Fl. fr. 3. p. 42. *Holcus odoratus* L. *Hierochloa odorata* H. repens P. de Beauv. — Schenckz. gram. t. 4. f. 26. Variat flosculis 1-2-muticis aristatis, staminibus 2-3. (v. s.)
2. A. ~~moris~~ (Köl. gram. 301.) foliis planis, vaginis glabriusculis, nodis villosis, paniculâ contractâ cylindricâ, spiculis 2-floris, glumæ valvulis æqualibus carina ciliatis flosculos superantibus, glumellæ valvulâ externâ glabrâ basi pilosulâ. ♀ in pratis. — Fl. fr. 3. p. 41. *Holcus mollis* L. sp. 1485. eng. bot. t. 1170. — Schenckz. gram. t. 4. f. 25. (v. v.)
3. A. ~~lanata~~ (Köl. gram. 303.) foliis planis vaginisque lanuginosis, paniculâ contractâ cylindricâ, spiculis 2-floris, glumæ valvulis obtusis subæqualibus apice ciliatis, glumam superantibus, glumellæ valvulâ externâ glabrâ. ♀ in pratis. — Fl. fr. 3. p. 41. *Holcus lanatus* L. eng. bot. t. 1169. — Moris. s. 8. t. 7. f. 5. n. 34. (v. v.)
4. A. ~~avenaceus~~ (L. sp. 117.) radice repente, foliis planis nodisque glabris, paniculâ subcontractâ nutante, spiculis 2-floris, glumæ valvulis glabris lævibus acutis, internâ flosculos subæquante, externâ duplò minore, glumellæ valvulâ externâ 2-dentatâ basi pilosâ. ♀ in pratis. — Fl. fr. 3. p. 41. *Holcus avenaceus* Smith. eng. bot. t. 813. Gaud. *Arrhenatherum avenaceum* P. de Beauv. — Moris. s. 8. t. 7. f. 11. n. 37. (v. v.)
β. *bulbosa*, radice bulbiferâ, culmi nodis inferioribus plerumque pubescens. — A. *bulbosa* Willd. DC. fl. fr. 5. p. 261. A. *precatoria* Thunb. — Moris. s. 8. t. 7. f. 12. n. 38. (v. v.)
5. A. *Thorei* (Duby mss.) foliis angustis involutis rigidis longissimis inferioribus vaginis nodisque pubescentibus, paniculâ erectâ subcontractâ, spiculis 2-floris, flosculis glumam subæquantibus inferno aristato, superiore mutico, axi piloso, glumæ valvulis inæqualibus acuminatis, glumellæ valvulâ externâ pubescenti acuminatâ integrâ. ♀ in ericetis siccis et collibus circâ Aquas Tarbellicas. — A. *longifolia* Thore. (v. v. D.)

Sect. II. AVENASTRUM. — *Avena L.*

Glumæ 3-7 floræ, flosculis plerumque omnibus aristatis, perigonii valvulâ externâ integrâ, dentatâ aut bifidâ.

6. A. ~~flavescens~~ (L. sp. 118.) foliis planis mollibus, inferioribus pubescentibus, paniculâ subcontractâ (flavescente), spiculis 2-5-floris, flosculis glumam superantibus, axi pubescente, glumæ valvulis acuminatis, externâ subduplò minore, glumellæ valvulâ externâ glaberrimâ apice 2-fidâ. ♀ in collibus et pratis siccis. — Fl. fr. 3. p. 40. *Trisetum pratense* Pers. enc. 97. — Moris. s. 8. t. 7. f. 19. n. 42. (v. v.)
β. *alpestris*, radice fibrosâ, paniculâ contractiore purpurascente. — In Alpibus. — A. *Alpestris* Host. DC. fl. fr. 5. p. 260. A. *sesquitertia* Fl. fr. 3. p. 40. non L. (v. v.)
7. A. *tenuis* (Moench. meth. 195.) foliis glabris angustis brevibus, paniculâ tenui laxâ, spiculis 2-4-floris, flosculis glumam subsuperantibus, axi glabro, glumæ valvulis acuminatis externâ subduplò minore, flosculi inferioris glumellæ valvulâ externâ apice in aristam rectam desinente, cæterorum valvulâ externâ apice aristato-bifidâ basi breviter pilosâ. (I) in campus aridis Delphin., Mimatis (cl. Prost.). — Fl. fr. 3. p. 39. A. *triaristata* Vill. dauph. 2. t. 4. *Trisetum striatum* Pers. (v. s.)






8. *A. SETACEA* (Vill. dauph. 2. t. 5.) foliis convoluto-setaceis longissimis, vaginis tomentosis, paniculâ erectâ contractâ, spiculis 2-3-floris, glumæ valvulis subinæqualibus acuminatis flosculos subæquantibus, axi piloso, glumellæ valvulâ externâ 2-fidâ basi pilosâ. ♀ in Alpibus Delphinatûs. — Fl. fr. 3. p. 37. (v. s.)
9. *A. PANICEA* (Lam. ill. 117.) foliis planis mollibus vaginisque pilosis, paniculâ ovato-elongatâ densâ, spiculis 4-6-floris, glumæ valvulis inæqualibus acuminatis flosculos subæquantibus, axi glabro, glumellæ valvulâ externâ glaberrimâ apice aristato-bifidâ. (I) in arenosis maritimis Corsicæ. — *A. neglecta* Savi pis. 1. t. 1. f. 4. Spiculæ pro in genere minimæ. (v. s.)
10. *A. AIROIDES* (Koel. gram. 298.) culmo apice tomentoso, foliis planis augustis glabris, paniculâ erectâ cylindricâ spiciformi, spiculis 2-3-floris, glumæ valvulis subæqualibus acutis flosculos subæquantibus, axi parcè piloso, glumellæ valvulâ externâ glabrâ bidentatâ. ♀ in summis Alpibus et Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 37. *A. subspicata* Clairy. Gaud. fl. helv. *Aira subspicata* L. Jacq. coll. t. 19. f. 3. *Trisetum airoides* P. de Beauv. — Scheuchz. prod. t. 6. f. 2. (v. s. ex Helv.)
11. *A. FRAGILIS* (L. sp. 119.) foliis planis villosis, spicâ fragili articulatâ, spiculis 4-6-floris sessilibus adpressis alternis, glumæ valvulis valde inæqualibus obtusiusculis, glumellæ valvulâ externâ glabrâ brevissimè 2-dentatâ. (I) in provinciis orientalibus, australibus usque ad Tolosam, propè Nannetem (cl. Hectot). — Fl. fr. 3. p. 38. Schreb. gram. t. 24. f. 3. *Gandinia fragilis* P. de Beauv. — Scheuchz. gram. t. 1. f. 7. G. (v. v.)
12. *A. PRATENSIS* (L. sp. 119.) foliis subinvolutis glabris margine asperis, canulis brevissimis, paniculâ erectâ subspicatâ, pedicellis solitariis aut geminis, spiculis 5-8-floris, glumæ valvulis inæqualibus acutis flosculis brevioribus, axi parcè piloso, glumellæ valvulâ glabrâ ant basi pilosulâ apice 2-dentatâ. ♀ in pratis ad sylvarum margines. — Fl. fr. 3. p. 38. eng. bot. t. 1204. *A. bromoides* L. — Scheuchz. gram. t. 4. f. 21. 22. (v. v.)
13. *A. DISTICHOPHYLLA* (Vill. dauph. 2. t. 4.) culmo ascendente basi ramoso, foliis angustis planis plicatis, ramorum juniorum distichis, ligulâ brevissimâ truncatâ, paniculâ erectâ angustâ, spiculis 2-3-floris, glumæ valvulis subæqualibus acutis, flosculis glumam subæquantibus, axi villoso, glumellæ valvulâ externâ 2-dentatâ basi longè pilosâ. ♀ ad rupes in Alpibus. — Fl. fr. 3. p. 36. *Trisetum distichophyllum* P. de Beauv. (v. s.)
14. *A. PUBENS* (L. sp. 1665.) foliis planis inferioribus pubescentibus, ligulis superioribus oblongis obtusis, paniculâ erectâ subsimplici, spiculis 3-floris, flosculis glumam subæquantibus, glumæ valvulis acuminatis, externâ duplo minore, glumellæ valvulâ externâ glaberrimâ apice eroso-dentatâ. ♀ in pratis montanis et collinis. — Fl. fr. 3. p. 36. *A. amethystina* Fl. fr. 3. p. 37 et 5. p. 260. — Scheuchz. gram. t. 4. f. 20. (v. v.)
15. *A. VENETOR* (Vill. dauph. 2. t. 4.) foliis planis angustis, ligulâ oblongâ subacutâ, paniculâ laxâ erectâ angustâ, spiculis 5-6-floris, glumæ valvulis inæqualibus acuminatis flosculis brevioribus, axi piloso, glumellæ valvulâ externâ glaberrimâ acutâ. ♀ in Alpibus, montibus Lugduncusibus, Arverniciis, Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 36. *A. Scheuchzeri* Host. gram. 2. t. 52. — Scheuchz. prod. t. 3. (v. v.)
16. *A. SEMPERVIRENS* (Vill. dauph. 2. t. 5.) foliis longissimis angustis rigidis subinvolutis intus striatis, ligulâ brevissimâ vaginâque oris pilosis, paniculâ subpatulâ nutante, spiculis 3-floris, flosculis glumam subæquantibus, 2 inferioribus tantum aristatis, axi piloso, glumellæ valvulâ externâ bifidâ basi lanatâ. ♀ in moutosis apricis Delphin., Pyrenæorum. — Fl. fr. 3. p. 35. (v. s.)
17. *A. SEDENENSIS* (DC. fl. fr. 3. p. 719 et 5. p. 260.) foliis angustis involutis culmo multò brevioribus, ligulâ brevi truncatâ, paniculâ erectâ contractâ, pedicellis geminis, spiculis 2-3-floris, glumæ valvulis inæqualibus acuminatis flosculos subæquantibus, axi piloso, glumellæ valvulâ externâ 2-fidâ

- basi pilosâ. $\frac{1}{2}$ in Alpibus Galloprov., Delphin., monte Celticō, Pyrenæis. (v. v.)
18. A. ~~contracta~~ (Req. et DC. ined.) foliis angustis planis involutisve in paginâ superiore asperis, ligulâ oblongâ acuminatâ, paniculâ erectâ angustâ contractâ, pedicellis solitariis geminisve, spiculis 5-8-floris, glumæ valvulis inæqualibus acuminatis flosculis brevioribus, axi parcè piloso, glumellæ valvulâ externâ breviter bidentatâ basi pilosâ. $\frac{1}{2}$ inter pineta propè Narbonam reperiit cl. Requier. (v. s.)
19. A. ~~linearis~~ (Vahl. symb. 2. p. 24.) foliis linearibus planis, ligulâ brevi obtusâ, paniculâ laxâ erectâ angustâ, spiculis brevibus bifloris, glumæ valvulis lævibus inæqualibus externâ acutâ duplò minore, internâ obtusâ flosculos subæquante, flosculo altero mutico, glumellæ valvulâ externâ 7-nerviâ acuminatâ basi breviter pilosâ. $\frac{1}{2}$ in agro Ruscintonensi propè Prades (cl. Coder). — Fl. fr. 5. p. 259. (v. s.)
20. A. ~~linearis~~ (Willd. 1. p. 445.) radice fibrosâ, foliis linearibus planis, ligulâ brevi obtusâ, paniculâ secundâ, spiculis brevibus subbifloris, flosculus glumam æquantibus, glumellæ valvulâ externâ basi glabrâ apice pilosulâ bidentatâ. (I) in agris circâ Parisios ex Merat, Neustriae propè Vire ex cl. Le Prév. et Lenormand. — Fl. fr. 5. p. 258. Host. gram. 3. t. 52. (v. s. c.)
21. A. ~~linearis~~ (Schreb. spic. 52.) radice fibrosâ, paniculâ secundâ contractâ, spiculis bifloris, flosculis glumâ minoribus, altero mutico, axi glabro, glumellæ valvulâ externâ glabrâ breviter 2-dentatâ. (I) colitur frequenter. — Fl. fr. 5. p. 258. Host. gram. 3. t. 44. (v. v. c.)
22. A. ~~linearis~~ (L. sp. 118.) paniculâ laxâ, spiculis 3-floris, flosculo ultimo mutico, axi glabro, glumellæ valvulâ externâ glabrâ 2-fidâ, seminibus lævibus denu-datis. (I) in agris culta, interdùm abortu mutica. — Fl. fr. 3. p. 34. Moris. s. 8. t. 7. f. 2. n. 4. — Lob. ic. t. 32. f. 1. (v. v. c.)
23. A. ~~linearis~~ (L. sp. 118.) paniculâ laxâ, spiculis dispermis, axi glabro, glumellæ valvulâ externâ glabrâ aristato-2-fidâ, seminibus lævibus perigonio involutis. (I) in agris culta, interdùm abortu mutica. — Fl. fr. 3. p. 34. — Lob. ic. t. 31. f. 2. (v. v. c.)
24. A. ~~linearis~~ (L. sp. 118.) radice fibrosâ, foliis lato-linearibus vaginisque inferioribus glabris, ligulâ ovatâ acutâ, paniculâ secundâ, spiculis sub-5-floris, axi glabro, flosculis glumâ minoribus, inferioribus aristatis et pilosis, superioribus muticis glabrisque, glumellæ valvulâ externâ aristato-bifidâ. (I) inter segetes Occitaniae ex Lam. et Benth. — Fl. fr. 5. p. 259. Jacq. ic. rar. 1. t. 23. Host. gram. 2. t. 57. (v. v. c.)
25. A. ~~linearis~~ (L. sp. 118.) foliis linearibus planis vaginisque inferioribus pubescens, ligulâ ovatâ truncatâ, paniculâ iaxâ, spiculis 3-5-floris, flosculis glumam æquantibus, omnibus aristatis basi hirsutissimis, axi hirsuto, glumellæ valvulâ externâ apice fissâ biaristatâ. (I) in arvis. — Fl. fr. 3. p. 35. Schreb. gram. t. 45. Host. gram. 2. t. 58. (v. v.)
26. A. ~~linearis~~ (Schreb. spic. 52.) foliis glabris planis scabris, ligulâ ovatâ obtusâ, paniculâ tenui laxâ, spiculis 2-floris, flosculis glumam subæquantibus omnibus aristatis, axi glabriusculo, glumæ valvulis subæqualibus aristato-acuminatis, glumellæ valvulâ externâ apice striatâ et scabrâ, internâ duplò minore. (I) in provinciis australibus. — Fl. fr. 3. p. 40. eng. bot. t. 1266. Danthonia strigosa P. de Beauvois. (v. s.)

XXVI. DANTHONIA DC. fl. fr. 3. p. 32. — Danthonia et Triodia R. Brown.

Gluma multiflora bivalvis, valvulis maximis concavis; perigonium bivalve, valvulâ exteriore apice fissâ, et ex imâ fissurâ aristam nunc longam tortam; nunc ferè abortivam emittente.

I. D. PROVINCIALIS (DC. l. c.) foliis glabris ore pilosis, inferioribus convoluto-setaceis, spiculis 5-6-floris, aristâ longâ tortili. $\frac{1}{2}$ in Galloprovinciâ propè



Segesteronem, in Delphinatū propè Vapincum. — *Avena calycina* Vill.
dauph. 2. t. 2. f. 9. non Lam. — Monti prod. t. 2. f. 1. (v. s.)

2. *B. DECUMBENS* (DC. l. c.) foliis pubescentibus planis, spiculis 3-4-floris, aristâ subabortivâ. ♀ in collibus et sylvis siccioribus. — *Festuca decumbens* L.
Poa decumbens eng. bot. t. 792. *Triodia decumbens* P. de Beauv. (v. v.)


XXVII. BROMUS L. gen. 89.

Gluma multiflora bivalvis; perigonium bivalve; valvula exteriore majore concavâ, aristam sub apice gerente; interiore minore dupli ciliorum serie extus onustâ.

1. *B. canescens* (Desf. ined. in DC. fl. fr. 3. p. 68.) foliis firmis pubescentibus vaginis sulcatis, paniculâ laxâ subnudante, spiculis ovatis compressis pubescentibus 8-12-floris, flosculis demum laxis, glumæ valvulis ovatis externâ acutâ internâ mucronatâ, glumellæ valvula exteriâ ovata obtusâ 2-fidâ, aristâ rectâ glumellam subæquante. (I) in sterilibus secus vias. — Fl. fr. 5. p. 275. *B. velutinus* Schrad. (v. v.)
2. *B. hirsutus* (L. sp. 112.) foliis mollibus subpubescentibus, vaginis sulcatis inferioribus hirsutis, paniculâ laxissimâ nutante, spiculis ovatis glabris compressis 6-12-floris, flosculis demum laxissimis, glumæ valvulis ovatis externâ acuminatâ internâ mucronatâ, glumellæ valvula exteriâ subobtusâ bifidâ, aristâ rectâ glumellam subæquante. (I) in arvis. — Fl. fr. 3. p. 67. Lam. ill. t. 46. f. 2. eng. bot. t. 1171. — Moris. s. 8. t. 7. f. 4. n. 16. (v. v.)
3. *B. multiflorus* (Weig. obs. t. 1. f. 1.) foliis mollibus pubescentibus, vaginis præsertim inferioribus tomentosis, paniculâ laxâ suberecta, spiculis oblongo-lanceolatis adpressè pubescentibus 12-14-floris, flosculis imbricatis, glumæ valvulis ovatis subacutis, glumellæ valvula exteriâ obtusâ bifidâ, aristâ rectâ glumam subæquante. (I) in collibus et arvis ex Fl. fr. 3. p. 69. — *B. scelatus* Leers herb. t. 11. f. 2. — Scheuchz. gram. t. 5. f. 9. (v. s. ex Austria.)
4. *B. mollis* (L. sp. 112.) foliis lœvibus vaginisque molliissimè villosis, paniculâ contractâ erectâ, pedunculis ramosis, spiculis ovato-oblongis 8-10-floris pubescentibus, flosculis imbricatis, glumæ valvulis ovatis acutis, glumellæ valvula exteriâ ovata subobtusâ 2-dentatâ, aristâ rectâ glumellæ longitudine. (I) in pratis siccis secus vias. — Fl. fr. 3. p. 68. Lam. ill. t. 46. f. 1. eng. bot. t. 1078. — Scheuchz. gram. t. 5. f. 12. — Moris. s. 8. t. 7. f. 5. n. 18. (v. v.)
5. *B. squarrosum* (L. sp. 112.) foliis mollibus vaginisque pubescentibus, paniculâ laxâ nutante simplicissimâ, spiculis ovatis compressis 9-10-floris, flosculis densè imbricatis, glumæ valvulis ovatis obtusis, glumellæ valvula exteriâ obtusâ integrâ, aristis demum divaricatis glumellâ subbrevioribus. (I) ad agrorum margines imprimis in provinciis australibus. — Fl. fr. 3. p. 69. eng. bot. t. 1885. — Scheuchz. gram. t. 5. f. 11. Variat spiculis glabris velutinis. (v. v.)
6. *B. DIVARICATUS* (Rohde in Lois. not. 22.) foliis mollibus glabrinsculis, vaginis pubescentibus, paniculâ erectâ subcontractâ simplicissimâ, spiculis lanceolatis 10-15-floris pubescentibus, flosculis densè imbricatis, glumæ valvulis ovato-lanceolatis subacutis, glumellæ valvula exteriore bifidâ acutâ, aristis basi contortis demum divaricatis glumellâ subbrevioribus. (I) in aridis arenosis à Nicæâ ad Monspelium. — Fl. fr. 5. p. 276. *B. lanuginosus* Poiret. (v. v.)
7. *B. pilosus* (Huds. ang. 49.) foliis radicalibus angustissimis ciliato-pilosis, vaginis pilosis, superioribus latioribus glabris, paniculâ erectâ laxâ, pedicellis sub-simplicibus, spiculis lanceolato-oblongis 5-9-floris scabris, glumæ valvulis subæqualibus acuminatis, glumellæ valvula exteriâ acuminatâ bifidâ, aristâ rectâ glumellâ multò breviore. ♀ in pratis. — Fl. fr. 3. p. 69. et 5. p. 276. eng. bot. t. 471. — Vaill. bot. t. 18. f. 2. (v. v.)

8. *B. mucronatus* (L. sp. 113.) foliis firmis in paginâ superiore pilosis, vaginis sulcatis, paniculâ erectâ laxâ, pedunculis elongatis ramosis, spiculis lanceolatis glabriusculis 6-8-floris, flosculis imbricatis, glumæ valvulis ovatis obtusis mucronatis, glumellæ valvulâ externâ ovato-rotundâ obtusâ, aristâ rectâ glumellâ subbreviore. (I) in arvis. — Fl. fr. 3. p. 70. eng. bot. t. 1984. non Lam. — Scheuchz. gram. t. 5. f. 15. (v. v.)
9. *B. elongatus* (Ehr. gram. 116.) foliis mollibus vaginisque molliter pubescentibus, paniculâ erecto-patente, spiculis ovato-lanceolatis compressis 7-9-floris glabris, flosculis imbricatis, glumæ valvulis lanceolatis subobtusis, glumellæ valvulâ externâ ovatâ brevissimè 2-dentatâ, aristâ rectâ flosculi longitudine. ♀ in pratis et arvis. — Fl. fr. 3. p. 70. (v. v.)
10. *B. mucronatus* (L. sp. 114.) foliis mollibus vaginisque pubescentibus, paniculâ erectiusculâ diffusâ, spiculis ovatis 6-8-floris glabris, flosculis densè imbricatis, glumæ valvulis ovatis externâ acutâ internâ obtusâ aut mucronulata, glumellæ valvulâ externâ ovatâ obtusâ, aristâ rectâ glumellam subæquante. (I) in pratis et arvis passim. — Fl. fr. 5. p. 275. eng. bot. t. 1079. B. simplex Gaud. agr. t. p. 296. (v. v.)
B. elongatus, vaginis (exceptâ infimâ) glabris. — *B. elongatus* Gaud. agr. t. p. 305. Fl. fr. 5. p. 275. (v. v.)
11. *B. asper* (L. supp. 111.) foliis duris asperis lato-linearibus in paginâ inferiori pubescentibus, vaginis hispidis pilis deflexis, paniculâ laxâ ramosâ nutante, spiculis linear-oblongis 8-10-floris subpubescentibus, flosculis laxè imbricatis, glumæ valvulis inæqualibus externâ acuminatâ internâ mucronatâ, glumellæ valvulâ externâ acuminatâ bidentatâ, aristâ subterminali rectâ undulatâ glumellâ subduplicata longiore. ♀ in sepibus et umbrosis. — Fl. fr. 3. p. 71. eng. bot. t. 1172. (v. v.)
12. *B. sterilis* (L. sp. 114.) foliis lato-linearibus vaginisque glaberrimis, paniculâ nutante subsecundâ laxâ, spiculis linear-lanceolatis 4-5-floris glaberrimis, flosculis imbricatis, glumæ valvulis subæqualibus acuminatis, glumellæ valvulâ externâ acuminatâ bidentatâ, aristâ subterminali rectâ undulatâ glumellâ subduplicata longiore. ♀ in nemorosis et pratis umbrosis passim. — Fl. fr. 3. p. 71. Host. gram. t. t. 6. Vaill. bot. t. 18. f. 3. (v. v.)
13. *B. sterilis* (L. sp. 113.) foliis mollibus vaginisque inferioribus pubescentibus, paniculâ laxâ, spiculis oblongis nutantibus 5-9-floris glabris, flosculis laxis nervosis sileatis, glumæ valvulis inæqualibus acuminatis, glumellæ valvulâ externâ acuminatâ bifidâ, aristâ subterminali glumellâ longiore. (I) secùs sepes et muros, in locis sterilibus. — Fl. fr. 3. p. 71. eng. bot. t. 1030. — Moris. s. 8. t. 7. f. 8. n. 11. — Scheuchz. gram. t. 5. f. 14. (v. v.)
14. *B. multiflorum* (L. sp. 114.) foliis mollibus vaginisque pubescentibus, paniculâ laxâ subsecundâ semiverticillatâ, spiculis linearibus pendulis pubescentibus 5-7-floris, flosculis laxè imbricatis, glumæ valvulis inæqualibus acuminatis, glumellæ valvulâ externâ acuminatâ bifidâ aristâ subæquante. (I) ad tecta et in locis sterilibus. — Fl. fr. 3. p. 72. Leers. herb. t. 10. f. 2. — Piuck. t. 299. f. 2. (v. v.)
15. *B. multispicatus* (DC. fl. fr. 5. p. 276.) foliis mollibus ciliatis vaginisque inferioribus breviter pubescentibus, paniculâ patente, pedicellis fasciculatis simplicibus ramosis, spiculis linearibus 8-12-floris, flosculis laxis, glumæ valvulis inæqualibus acuminatis, glumellæ valvulâ externâ acuminatâ bifidâ, aristis rectis flosculi longitudine. (I) in versuris agri Mouspeliensis, Ruscinonensis, Burdigalensis, Naunetensis. — *B. multispicatus* Rœm. et Sch. Variat spiculis pubescentibus et glabris. (v. s.)
16. *B. Madritensis* (L. sp. 114.) foliis mollibus vaginisque pubescentibus, paniculâ erecto-patente coarctatâ subramosâ, pedicellis ciliato-scabris apice in-crassatis, spiculis linearibus retrorsum scabris 5-7-floris, flosculis plerumque diandris, glumæ valvulis acuminatis inæqualibns, glumellæ valvulâ externâ acuminatâ bifidâ aristâ rectâ duplò breviore. (I) in arvis Galloprovinciæ; circâ Manoscum, Avenionem, Massiliam, propè Monspelium,

Sympatrum
pulicinum
variegatum



Nannetem. — Fl. fr. 3. p. 72. et 5. p. 277. B. rigidus Roth. cat. 1. p. 17. Fl. fr. 5. p. 278. — Barr. ic. t. 76. f. 1. (v. v.)

β. maximus, pedicellis velutinis, aristis glumellâ subtriplo longioribus.
— In arenosis circa Aquæ Mortuas, secùs canalem Occitanicum ex cl. Benth. — *B. maximus* Desf. atl. 1. t. 26. Fl. fr. 5. p. 277. (v. v. DC.)

17. **B. RUBENS** (L. sp. 114.) foliis substrictis vaginisque glabrinculis aut brevissimè pubescentibus, paniculâ fasciculatâ simpli, spiculis breviter pedicellatis 5-7-floris villosis, glumæ valvulis acuminatis inæqualibus, glumellæ valvulâ externâ acuminatâ 2-fidâ aristâ recte subæquali. (I) in arenosis Galliæ mediterraneæ. — Fl. fr. 3. p. 73. et 5. p. 278. Cav. ic. 1. t. 45. f. 2. *Festuca rubens* Pers. — Variat spiculis glabris, ciliato-scabris aut villosis. (v. v.)

XXVIII. TESTUCA L. gen. 88.

Gluma bivalvis multiflora; perigonium bivalve, valvulis acutissimis, aristâ terminali sæpè donatis.

§. 1. *Glumæ valvulis inæqualibus, perigonii valvulis aristam iisdem longioribus gerentibus.*

1. **F. INVOLUTA** (Ait. kew. 1. p. 108.) foliis angustis involutis, paniculâ spiciformi erectâ, pedicellis compressis dilatatis, spiculis oblongis 4-6-floris glabris, glumæ valvulâ externâ brevissimâ, internâ aristato-acuminatâ, glumellæ valvulis subæqualibns acuminatis, externâ aristatâ, aristâ glumellâ duplo longiore. (I) in arenosis Galliæ australis, occidentalis rariùs, propè Parisios. — Fl. fr. 3. p. 55. eng. bot. t. 1430. — Ray. syn. t. 16. f. 2. *Stamina* 3. (v. v.)

2. **F. CILIATA** (Danth. in DC. fl. fr. 3. p. 55.) foliis angustis involutis, paniculâ elongatâ coarctatâ subnutante, spiculis 4-6-floris ciliato-hirsutis, flosculis monandris, glumæ valvulis brevissimis, externâ minimâ, glumellæ valvulis æqualibus acuminatis, externâ aristatâ aristâ subduplici breviore. (I) in rupestribus Galliæ mediterraneæ, Aginni ex St.-Am., Burdigalæ (Des Moulins). — Fl. fr. 3. p. 55. et 5. p. 268. Host. gram. 4. t. 65. — Scheuchz. gram. t. 6. f. 12. (v. v.)

3. **F. MYURUS** (L. sp. 109.) foliis angustis involutis, paniculâ elongatâ coarctatâ subnutante, spiculis 4-8-floris glabriusculis, flosculis monandris, glumæ valvulis inæqualibus acuminatis, glumellæ valvulis æqualibus acuminatis, externâ aristatâ aristâ duplo breviore. (I) ad muros, in locis glareosis et arenosis. — Fl. fr. 3. p. 54. eng. bot. t. 1412. *Vulpia Myurus* Gmel. — Barr. ic. t. 99. f. 1. 2. (v. v.)

4. **F. MONOIDES** (L. sp. 110.) foliis setaceis involutis, ligulis obsoletis, paniculâ simplicissimâ secundâ spiciformi erectâ, spiculis 3-4-floris scabris, flosculis monandris, glumæ valvulis inæqualibus acuminatis, externâ aristatâ aristâ subduplici breviore. (I) in campis et pratis arenosis passim. — Fl. fr. 3. p. 55. Lam. ill. t. 46. f. 4. eng. bot. t. 1411. *Vulpia sciuroidea* Gm. — Pluck. t. 33. f. 10. An satis à priori distincta? (v. s.)


§. 2. *Glumæ valvulis subæqualibus, perigonii valvulis aristam iisdem breviorem gerentibus.*

5. **F. STIPOIDES** (Desf. atl. 1. p. 90.) foliis linearibus convolutis, paniculâ subcontractâ secundâ, pedicellis apice dilatatis compressis, spiculis 3-5-floris lanceolatis, glumæ valvulis inæqualibus acuminatis, glumellæ valvulis subæqualibus internâ bidentatâ, externâ acuminatâ aristatâ aristâ longitudine. (I) in arenosis Corsicæ, inter Niceam et Telonem, propè Monspelium (Saltzmann). — Fl. fr. 5. p. 267. *Bromus stipoides* L. mant. 557. — Barr. ic. t. 76. f. 2. (v. s.)

6. **F. SABULICOLA** (L. Dufour in ann. sc. nat. 5. p. 85.) glauca, radice repente, foliis convolutis angustis erectis, paniculâ elongatâ subsecundâ laxiusculâ,

- spiculis compressis lanceolatis tomentosis 4-9-floris, glumæ glumellæque valvulis inæqualibus aristato-acuminatis. ♀ in sabulosis agri Syrtici. — F. arenaria Askel. diss. supp. scand. p. 4? non Lam. ? Schœnодорус phœnicoides Rœm. et Sch. 2. p. 699. (v. s.)*
7. *F. GLAUCA* (Lam. dict. 2. p. 459.) foliis glaucis filiformibus convolutis rigidis extùs lèvibus intùs vaginisque inferioribus pubescentibus, paniculâ glauca patente strictâ pyramidatâ, pedicellis scabris, spiculis 2-5-floris, glumæ valvulis inæqualibus, externâ acuminatâ, internâ mucronatâ apice ciliatâ, glumellæ valvulis æqualibus glabris aut apice pubescentibus, internâ 2-fidâ, externâ aristatâ, aristâ subduplicata longiore. ♀ in arenosis siccis passim. — Fl. fr. 3. p. 31. (v. v.)
8. *F. DURIUSCULA* (L. sp. 108.) radice fibrosâ, foliis strictis setaceis, inferioribus angulato-convolutis, superioribus laxius convolutis suprà glabris, paniculâ strictâ subsecundâ, axi pedunculisque lèvinsculis, spiculis 5-6-floris, glumæ valvulis inæqualibus acuminatis, glumellæ valvulis æqualibus acuminatis, externâ aristatâ aristâ triplò duplò longiore. ♀ in pratis siccis.
- α. *glabra*, spiculis glabris. — *F. duriuscula* DC. fl. fr. 3. p. 50. *F. stricta* α Gaud. agr. 1. 237. *F. curvula* Gaud. l. c. p. 239. (v. v.)
- β. *cinerea*, spiculis pubescentibus. — *F. cinerea* Vill. DC. fl. fr. 3. p. 51. *F. dumetorum* L. *F. dura* Host. gram. 2. t. 87. Fl. fr. 5. p. 266. *F. stricta* β Gaud. agr. 1. t. 237. (v. v.)
9. *F. TUBRA* (L. sp. 109.) radice repente, foliis inferioribus convoluto-setaceis, superioribus angustissimis planiusculis suprà pubescentibus, paniculâ erectâ angustâ sublaxâ, axi pedunculisque angulato-scabris, spiculis 5-7-floris glaberrimis, glumæ valvulis inæqualibus acuminatis, glumellæ valvulis æqualibus acuminatis externâ aristatâ aristâ triplò longiore. ♀ in siccis et sterilibus. — Fl. fr. 3. p. 50. *Nimium* var. α precedentis affinis. (v. v.)
10. *F. HETEROPHYLLA* (Lam. fl. fr. 3. p. 600.) foliis longissimis laxis capillaribus mollibus, superioribus planis interdum pubescentibus, paniculâ laxâ subpatulâ nutante subsecundâ, axi pedunculisque ciliato-scabris, spiculis 5-6-floris glabriusculis, glumæ valvulis inæqualibus acuminatis, glumellæ valvulis æqualibus internâ acutâ aut 2-fidâ, externâ aristato-acuminatâ aristâ longiore. ♀ in sylvaticis umbrosis.
- α. *Lamarchii*, aristâ glumellâ vix duplò breviore. — *F. heterophylla* Hæncke in Jacq. coll. Fl. fr. 3. p. 52. (v. v.)
- β. *Hostii*, aristâ glumellâ multò breviore. — *F. heterophylla* Host. gram. 3. t. 18. (v. s.)
11. *F. TENUIS* (L. sp. 108.) culmo subtetragono, foliis capillaribus scabris, paniculâ secundâ coarctatâ strictâ, pedunculis ciliato-scabris, spiculis 3-8-floris glaberrimis pubescentibusve, glumæ valvulis inæqualibus acuminatis, glumellæ valvulis æqualibus internâ breviter bifidâ, externâ acuminatâ brevissimè aristatâ. ♀ in pascuis siccioribus et apricis. — Fl. fr. 3. p. 50. et 5. p. 264. *Leers* herb. t. 8. f. 3. (v. v.)
- β. *tenuifolia*, foliis tenuissimis longioribus, spiculis muticis. — *F. tenuifolia* Smith ox. 138. Fl. fr. 5. p. 264. *Poa capillata* Merat paris. ed. 2. t. 2. p. 38. *P. setacea* Kœl. — *Moris*. s. 8. t. 3. f. 3. p. 13. (v. v.)
12. *F. TERETIS* (Bell. act. tur. 5. p. 217.) culmo tereti, foliis setaceis elongatis subpungentibus, paniculâ erectâ coarctatâ, spiculis 4-5-floris glaberrimis, glumæ valvulis inæqualibus externâ acuminatâ internâ subobtusâ, perigonii valvulis subæqualibus acuminatis margine membranaceis, externâ enerviâ acuminato-aristatâ. ♀ in editioribus Pyren. orientalium. — Fl. fr. 3. p. 719. et 5. p. 265. (v. v.)
13. *F. TENUIS* (Vill. dauph. 2. p. 102.) foliis setaceis duriusculis, paniculâ collectâ strictâ, pedicellis ciliato-scabris, spiculis 4-floris subteretibus oblongis scabris, glumæ valvulis inæqualibus acuminatis, glumellæ valvulis æqualibus,





- internâ 2-fidâ ciliatâ externâ acuminatâ brevissimè aristatâ. ♀ in Alpibus et Jurassi summo jugo Thoiry ex cl. Gaudin. — Fl. fr. 3. p. 52. Schœnodorus pumilus Rœm. et Sch. (v. v.)
14. F. HALLERI (All. ped. n. 2245.) culmo subnudo, foliis capillari-setaceis, paniculâ strictâ angustâ, axi pedunculisque angulato-scabris, spiculis 4-5-floris glabris teretiusculis oblongis, rachi glabrâ, glumæ valvulis inæqualibus acuminatis, glumellæ valvulis æqualibus acuminatis externâ aristatâ aristâ glumellam subæquante. ♀ in Alpibus, monte Pilato, Pyrenæis. — Fl. fr. 3. p. 53. (v. v.)
15. F. NIGRESCENS (Lam. dict. 2. p. 460.) radice fibrosâ, culmo stricto, foliis convoluto-setaceis, radicalibus longiusculis, culmeis brevibus extùs glabris intùs tenuissimè pubescensibus, paniculâ erectâ ramosâ laxiusculâ, spiculis 5-8-floris, glumæ valvulis inæqualibus acuminatis, glumellæ valvulis acuminatis apice tenuissimè ciliato-scabris, internâ bifidâ, externâ aristatâ aristam subæquante. ♀ in pratis montanis Alpium, montis Aurei ex Lam., Jurassi ex Gaud. — Fl. fr. 5. p. 266. Spiculæ atro violaceo et albo variegatae. (v. s.)
16. F. RHÆTICA (Sut. helv. 1. p. 52.) foliis involutis setaceis, paniculâ erectâ flexuosa, pedicellis semi-verticillatis, spiculis 4-5-floris oblongis glabris, rachi infrâ flosculos pilosâ, glumæ valvulis inæqualibus acuminatis, glumellæ valvulis subæqualibus, internâ ciliatâ breviter 2-fidâ, externâ acuminatâ sub apice brevissimè aristatâ. ♀ in Pyren. orient. monte Canigou, montibus Ligeris (cl. Prost), Corsicæ (cl. Requier). — Fl. fr. 3. p. 53. et 5. p. 267. F. pilosa Gaud. F. poæformis Host. gram. 2. t. 81. Poa violacea Bell. act. tur. 5. t. 3. Schœnodorus poæformis P. de Beauv. Sequenti affinis sed debilior. (v. s.)
17. F. ESKIA (Ram. in DC. fl. fr. 3. p. 52. et 5. p. 267.) foliis involuto-complacatis nitidis pungentibus, paniculâ erectâ collectâ, spiculis 6-10-floris compressis oblongis glabris, rachi puberulâ, glumæ valvulis inæqualibus acutis glumellæ valvulis subæqualibus internâ ciliatâ breviter 2-fidâ, externâ acuminatâ aut breviter aristatâ. ♀ in Pyrenæis. — F. lubrica Lapeyr. F. varia Lapeyr. (v. v.)
- §. 3. *Perigonii valvulis acutis aristâ destitutis.*
18. F. SEROTINA (L. sp. 111.) foliis convolutis rigidis patentibus pungentibus vaginisque glaberrimis, paniculâ primo erectâ demum divaricatâ, spiculis 3-5-floris, glumæ valvulis inæqualibus acuminatis, glumellæ valvulis subæqualibus, externâ aristato - acuminatâ. ♀ in siccis apricis Galloprovinciæ, propè Monspelium loco dicto Capouladoux ex cl. Bentham. — Fl. fr. 3. p. 46. Host. gram. 2. t. 42. Schœnodorus serotinus P. de Beauv. Molinia serotina Mert. et Koch. Gaud. fl. helv. 1. p. 217. Glumæ violaceæ. (v. v.)
19. F. MARITIMA (DC. fl. fr. 3. p. 47.) foliis convolutis erectis vaginisque glaberrimis, paniculâ subramosa erectâ strictâ, pedicellis angulatis primo erectis demum divaricatis incrassatis, spiculis 6-8-floris compressis lanceolatis glaucis, glumæ valvulis subæqualibus acutis, glumellæ valvulis subæqualibus acuminatis. (I) ? in arenosis secùs mare Mediterraneum. — Triticum maritimum L. sp. 128. Brachypodium maritimum Rœm. et Sch. — Bocc. mus. 2. t. 95. (v. v.)
20. F. SPADICEA (L. mant. 732.) foliis angustis lævibus subpungentibus, radicalibus involutis superioribus planiusculis, paniculâ erectâ laxiusculâ, pedunculis lævibus, spiculis 3-5-floris compressis ovatis, glumæ valvulis subæqualibus acuminatis, glumellæ valvulis subæqualibus internâ breviter 2-fidâ, externâ acuminatâ. ♀ in pratis montanis Arverniæ et Galliae meridionalis. — Fl. fr. 3. p. 47. Host. gram. 3. t. 20. Schœnodorus spadiceus P. de Beauv. — Ger. gallop. t. 2. f. 1. Spiculæ nitido-aureæ. (v. v. DC.)
21. F. LOLIACEA (Cart. lond. 6. n. 66.) foliis planis linearibus vaginisque glabris, paniculâ simplici erectâ, spiculis 7-11-floris remotis distichis alteruis subsessilibus, glumæ valvulis inæqualibus subacutis, glumellæ valvulis æqualibus

- acutis. ♀ in pratis humidis passim. — Fl. fr. 3. p. 48. eng. bot. t. 1821. Schœnodorus loliaceus P. de Beauv. (v. s.)
22. E. ~~loliaceus~~ (DC. fl. fr. 3. p. 49.) foliis planis lato-linearibus vaginisque glaberrimis, paniculâ erectâ laxâ demum diffusa, spiculis 10-15-floris linearibus compressis, glumæ valvulis inæqualibus acutis, glumellæ valvulis subæqualibus internâ retusa, externâ acuminata, aristis brevissimis subterminalibus saepius abortivis. ♀ in pratis secùs rivulos rariis. — Bromus inermis L. Gaud. Schreb. gram. 1. t. 13. Schœnodorus inermis Rœm. et Sch. (v. s.)
23. F. SYLVATICA (Vill. dauph. 2. t. 2. f. 8.) culmis collo squamatis, foliis planis lato-linearibus, vaginisque inferioribus margine scabris, paniculâ erectâ laxâ patente ramosissimâ, spiculis 3-5-floris oblongis, glumæ valvulis subæqualibus acuminatis, glumellæ valvulis subæqualibus internâ apice breviter bifida, externâ acuminata. ♀ in sylvis Delphinatûs, Jurassi, Vogesorum. — Fl. fr. 3. p. 48. et 5. p. 263. Poa trinervata Fl. fr. 3. p. 58. F. calamaria eng. bot. t. 1005. Schœnodorus calamarius Rœm. et Sch. (v. v.)
24. F. ARUNDINACEA (Schreb. spic. 57.) foliis lato-linearibus planis vaginisque glaberrimis, paniculâ ramosâ erectâ subdiffusa, spiculis 4-6-floris ovatis compressis glaberrimis, glumæ valvulis inæqualibus acuminatis, glumellæ valvulis subæqualibus acuminatis, externâ sub apice brevissimè aristata. ♀ secùs rivulos passim. — Fl. fr. 3. p. 49. F. elatior Schrader. L. sp. 111. non fl. suec. Bromus littoreus Host. gram. 1. t. 8. — Schenck. gram. 1. 5. f. 18. (v. v.)
25. F. ELATIOR (L. suec. 32. non sp.) foliis planis linearibus vaginisque glaberrimis, paniculâ erectâ secundâ subcontractâ, spiculis 7-9-floris subteretibus, glumæ valvulis inæqualibus acuminatis, glumellæ valvulis subæqualibus internâ acutâ, externâ acuminata muticâ aut sub apice breviter aristata. ♀ in pratis. — Fl. fr. 3. p. 48. Host. gram. 2. t. 79. F. pratensis eng. bot. t. 1592. Schœnodorus pratensis P. de Beauv. — Moris. s. 8. t. 2. f. 19. n. 15. (v. v.)
26. F. ~~loliaceus~~ (DC. fl. fr. 3. p. 46.) culmo subuninodi, foliis planis vaginisque glaberrimis, paniculâ ramosâ coartata, spiculis 2-3-floris cylindricis, glumæ valvulis inæqualibus ovatis obtusis mucronatis, glumellæ valvulis æqualibus subobtusis. ♀ in sylvis et pratis umbrosis. — Fl. fr. 3. p. 46. Aira cærulea L. sp. Molinia cernua Mœnch. Enodium cæruleum Gaud. agr. — Moris. s. 8. t. 5. f. 20. n. 22. (v. v.)

XXIX. ARUNDO Roth. germ. 1. DC. fl. fr. 3. p. 45. — Arundinis sp. L.

Gluma multiflora bivalvis; perigonium 2-valve extùs villosissimum.
— Flores paniculati.

Sect. I. PHRAGMITES Trin. fund. agrost. — Arundo P. de Beauv. t. 13. f. 2.

Glumæ 5-7-floræ; flosc. inferior masculus seu neuter; glumellæ valv. externa acuminata.

I. A. PHRAGMITES (L. sp. 120.) glumæ valvulis 5-7-floris, paniculâ laxâ, culmo herbaceo rigido. ♀ in lacubus, fluviis, stagnis puris, etc. — Fl. fr. 3. p. 45. Phragmites communis Trin. Gaud. fl. helv. 1. p. 203. — Lob. ic. t. 51. f. 1. (v. v.)

Sect. II. DONAX P. de Beauv. t. 16. f. 4 et 5. — Scolochloa Mert. et Koch. deut. fl. 1. p. 530.

Glumæ 3-7-floræ, flosc. omnibus hermaphroditis; glumellæ valv. externa triesta.

2. A. DONAX (L. sp. 120.) culmo suffruticoso, paniculâ densâ, spiculis 3-6-floris, glumæ valvulis æqualibus acuminatis flosculos æquantibus, glumellæ valvulis inæqualibus, externâ aristato-acuminata internâ duplò minore retusa. ♀ in collibus Galloprovincie, Occitanie, agri Ruscinonensis. — Fl. fr. 3. p. 44. Host. gram. 4. t. 38. Donax arundinaceus P. de Beauv. — Moris. s. 8. t. 8. f. 1. n. 5. (v. v.)

- + *Diospyros*
- + *Prunus*
- + *eugeniaefoliae*
- + *Osmunda*
- + *Cornus*
- + *Nigra*
- + *Fraxinus*
- + *Platanus*
- + *Hamamelis*
- + *Myrsinaceae* -







3. *A. MAURITANICA* (Desf. atl. 1. p. 106.) culmo fruticoso, paniculâ densâ, spiculis 1-3-floris, glumæ valvulis subæqualibus acuminatis flosculos subæquantibus, glumellæ valvulis subæqualibus, externâ aristulatâ internâ acutâ. ♂ in maritimis propè Antipolim reperiit cl. Gay, ad littus occidentale insulæ Sanctæ-Luciae propè Narbonam indicat cl. Bentham. — *Donax Mauritanica* P. de Beauv. Calamagrostis Plinii Gmel. — *Zannoni hist.* t. 19. f. 2. (v. s.)

XXX. DACTYLIS Mich. DC. fl. fr. 3. p. 73. — *Dactylis sp.* L.

Gluma multiflora bivalvis, valvulis inæqualibus carinatis acutis; perigonium bivalve, valvulis carinatis alterâ apice aristam brevissimam gerente. — *Panicula secunda* glomerata.

1. *D. GLOMERATA* (L. sp. 105.) culmo erecto, foliis linearibus planis margine scabris. ♀ in pratis ubique frequens. — Fl. fr. 3. p. 73. Lam. ill. t. 44. — Scheuchz. t. 6. f. 15. (v. v.)

2. *glaucescens*, foliis carinatis glaucescentibus rigidis. — In sylvaticis Galloprov. orientalis. — *D. glaucescens* Wild. en. ber. 1. p. 111. (v. s.)

γ. *Hispanica*, culmo humiliori, foliis angustis margine lăvibus. — In apricis maritimis. — *D. Hispanica* Roth. DC. fl. fr. 3. p. 278. (v. v.)

XXXI. KOELERIA Pers. enc. 1. p. 96. DC. fl. fr. 5. p. 268.

Gluma bivalvis compressa carinata 2-aut pauciflora; perigonium bivalve valvulâ exteriore carinatâ acuminatâ aut breviter aristatâ internâ angustam acutiusculam plicatam amplexante; semen nudum. — *Panicula contracta* spiciformis.

1. *K. MACILENTA* (DC. fl. fr. 5. p. 270.) foliis angustis convolutis culmisque velutinis, paniculâ angustâ sublaxâ, spiculis 3-4-floris, glumæ valvulis valdè inæqualibus, externâ lanceolatâ carinatâ acuminatâ, internâ quadruplò breviore subulatâ, glumellæ valvulâ externâ sub apice aristatâ, internâ duplò minore acutâ. (1) in arenosis maritimis Monspelii, Corsicæ (cl. Requier). (v. s.)

2. *K. CALYGINA* (DC. fl. fr. 5. p. 271.) foliis setaceis ad vaginam et collum pilosis, paniculâ laxiusculâ oblongâ subinterruptâ, spiculis linear-lanceolatis 2-5-floris, glumæ valvulis subæqualibus obtusiusculis margine membranaceis flosculos superantibus, glumellæ valvulis æqualibus obtusis, externâ nervosâ basi puberulâ. (1) in arvis Galloprov. et agri Ruscinonensis. — *Festuca calycina* Cav. ic. 1. t. 44. f. 2. *Schismus marginatus* P. de Beauv. (v. v. D.)

3. *K. VILLOSA* (Pers. enc. 1. p. 97.) foliis planis molliter villosis, paniculâ deusè spiciformi ovali vel cylindricâ, spiculis linearibus 2-floris, glumæ valvulis æqualibus acuminatis dorso villosis flosculos subæquantibus, glumellæ valvulis subæqualibus externâ acutâ infrâ apicem aristatâ, internâ acutâ aut hidentatâ. (1) in maritimis humidis secüs Mediterraneum. — Fl. fr. 5. p. 270. *Phalaris pubescens* Lam. dict. 1. p. 92. DC. fl. fr. 3. p. 81. — *Ger. gallop.* 77. t. 1. (v. v.)

β. *cinerea*, pusilla, foliis brevibus, spicâ ovatâ. — In arenosis Avenionis et Narbonæ (cl. Requier). (v. s.)

4. *K. PHLEOIDES* (Pers. enc. 1. p. 97.) culmo glabro, foliis planis pilosis, paniculâ spiciformi cylindricâ, spiculis lanceolatis 2-6-floris, glumæ valvulis inæqualibus glabris acuminatis flosculis brevioribus, perigonii valvulis æqualibus internâ acuminatâ externâ extus piloso-exasperata sub apice aristatâ, aristâ molli flosculo longiore. (1) in cultis arenosive provinc. mediterran. et austro-occidentalium. — Fl. fr. 5. p. 271. *Festuca phleoides* Vill. dauph. t. 2. f. 7. Fl. fr. 3. p. 54. — Scheuchz. gram. t. 5. f. 5. *Panicula interdùm ramosa*. (v. v.)

5. *K. BRACHYSTACHIA* (DC. cat. monusp. 120.) culmo glabro, foliis planis pilosis, paniculâ spiciformi ovato-cylindricâ, spiculis lanceolatis 6-9-floris, glumæ valvulis inæqualibus dorso ciliato-scabris acutis flosculis brevioribus, perigonii valvulis subæqualibus internâ acutâ externâ glabrâ sub apice aristatâ, aristâ molli flosculo breviore. ♀ secüs littora maris Mediterranei ex cl. Bentham. (v. s. c.)

6. *K. ALBESCENS* (DC. cat. monsp. 117. et fl. fr. 5. p. 269.) culmo pubescente, foliis angustis involutis inferioribus vaginisque pubescens, paniculâ elongatâ spiciformi hinc indè subinterruptâ basi folio superiore subvaginata, spiculis 2-3-floris linearis-lanceolatis, glumæ valvulis subæqualibus acutis dorso scabris, glumellæ valvulis inæqualibus acutis. ♂ in sterilibus Tolosæ (DC.), Burdigalæ (Des Moulins), Andegaviae (DC.). (v. v. DC.)
7. *K. SETACEA* (Pers. enc. 1. p. 97.) culmo longè exerto apice velutino, foliis inferioribus convoluto-setaceis glaberrimis, paniculâ ovato-cylindricâ densè spicatâ, spiculis 2-3-floris linearis-lanceolatis, glumæ valvulis subæqualibus acuminatis dorso scabris, glumellæ valvulis subinaequalibus, externâ acuminatâ dorso subciliatâ internâ acutinerculâ. ♂ in montosis apricis Galloprov., Pyrenæorum. — Fl. fr. 5. p. 269. *K. tuberosa* Pers. *Poa pectinacea* Lam. (v. v.)
8. *K. CRISTATA* (Pers. enc. 1. p. 97.) culmo glabriusceno, foliis planis inferioribus pubescens, paniculâ elongatâ spiciformi basi interruptâ, spiculis 3-4-floris linearis-lanceolatis, glumæ valvulis inæqualibus lanceolatis acuminatis dorso scabris, glumellæ valvulis subæqualibus acuminatis. ♂ in collibus, pascais, sterilibus. — Fl. fr. 5. p. 268. *Aira cristata* L. *Poa cristata* a. Fl. fr. 3. p. 65. Host. gram. 2. t. 75. — Moris. s. 8. t. 4. f. 21. n. 7. (v. v.)

XXXII. POA Kæl. gram. p. 154. DC. fl. fr. 3. p. 56. — Poa et Airæ sp. L.

Gluma bivalvis multiflora; spiculae muticæ; perigonium bivalve, valvulis margine scariosis externâ carinatâ internam lineare plicatam amplexante. — Fl. paniculati.

Sect. 1. SCHLEROCHLOA.

Spiculae 2-5-floræ; glumæ obtusæ truncatæ flosculis breviores; glumellæ valvula interna integra; semen rostratum. — Panicula secunda spicato-congesta.

* *Glumellæ valvulâ externâ obtusâ*. — Schlerochloa P. de Beauv. t. 19. f. 4.

1. *P. PROCUMBENS* (Scop. carn. 1. p. 70.) culmo compresso, foliis planis vix acutis, paniculâ rigidâ secundâ congestâ spiciformi, spiculis 3-5-floris glabris adpressis subsessilibus erecto-patulis, valvulis inæqualibus obtusis margine scariosis, glumellæ valvulis subæqualibus obtusis, internâ subciliatâ. (I) in glareosis aridis Delphinatûs circâ Gratianopolim et Vapincum ex Vill. — Fl. fr. 3. p. 66. *Cynosurus durus* L. Poll. pal. t. 1. f. 1. *Eleusine dura* Lam. Gaud. agr. Schlerochloa dura P. de Beauv. Gaud. fl. helv. — Barr. ic. t. 50. (v. s. ex Valesiâ.)
2. *P. PROCUMBENS* (Smith. brit. 1. p. 98.) caule ascendentem, foliis planis acutis, paniculâ rigidâ secundâ congestâ, pedunculis scabris erecto-patulis, spiculis 5-floris glabris teretiusculis subimbricatis, glumæ valvulis inæqualibus obtusis 5-nerviis, glumellæ valvulis æqualibus obtusis, internâ ciliatâ. (I) in maritimis occidentali-borealibus usque ad Armoraciam meridionalem. — Fl. fr. 5. p. 275. eng. bot. t. 532. Schlerochloa procumbens P. de Beauv. (v. v. DC.)

** *Glumellæ valvulâ externâ acutâ*. — Dactylis et Sesleriae sp. P. de Beauv.

3. *P. DISTICHA* (Jacq. ic. rar. 1. t. 19.) culmo 1-2-phyllo, foliis radicalibus cespitosis involutis setaceis, paniculâ secundâ spiciformi compressâ ovatâ, spiculis imbricatis 4-5-floris patentibus subsessilibus distichis, glumæ valvulis subæqualibus ovatis truncatis, glumellæ valvulis æqualibus acutis basi pilosis, internâ ciliatâ. ♂ in pratis editioribus Pyreneorum. — Fl. fr. 3. p. 62. *Poa seslerioides* All. ped. t. 91. f. 1. non Lam. *Sesleria disticha* Pers. (v. v.)
4. *P. LITTORALIS* (Gou. monsp. 470.) culmo prostrato, foliis distichis apice involutis, paniculâ secundâ densè contractâ spiciformi, spiculis sessilibus confertis patentibus 4-8-floris teretiusculis, glumæ valvulis concavis æqualibus truncatis, glumellæ valvulis æqualibus externâ acutâ internâ truncatâ. ♂ in maritimis Monspelii et Galloprovincie. — Fl. fr. 3. p. 63. Lam. ill. t. 45. f. 5. *Dactylis littoralis* Willd. P. de Beauv. (v. v.)

Shubh



Sect. II. DIACHORISMOS. — Schlerochloë sp. P. de Beauv.

Spiculæ lanceolatæ; glumæ valvulæ valdè inæquales, externa brevissima trunca interna subacuta; glumellæ valvulæ obtusæ. — Panicula divaricata trichotoma.

5. *P. DIVARICATA* (Gou. ill. 4. t. 2. f. 1.) foliis filiformibus, paniculâ erectâ demum divaricatâ, pedicellis rigidis trichotomis apice incrassatis, spiculis 4-floris lanceolatis minimis, glumæ valvulis membranaceis valdè inæqualibus, glumellæ valvulis æqualibus obtusis. (I) in arenosis circâ Monspelium, Arelatem, Telonem. — Fl. fr. 3. p. 65. Schlerochloa divaricata P. de Beauv. (v. v. DC.)

Sect. III. POASTRUM. — Poa P. de Beauv. t. 14. f. 10.

Glomæ 2-12-floræ glumellam plerumque subæquantes, perigonii valvula interna breviter bifido-dentata; semen sulcatum. — Panicula composita plus minus ramosa et effusa.

6. *P. MARITIMA* (Huds. ang. 42.) culmo ascendentem, foliis angustis, ligulâ obtusâ brevi integrâ, paniculâ contractâ aut patulâ subsecundâ, spiculis 5-12-floris teretiusculis, flosculis demum laxis, glomæ valvulis inæqualibus obtusis, glumellæ valvulis æqualibus, externâ obtusissimâ internâ ciliatâ. (2) in arenosis maritimis. — Fl. fr. 3. p. 57. eng. bot. t. 1140. *P. arenaria* Retz. (v. v.)

P. distans, ligulâ 2-fidâ, paniculâ erectâ demum divaricatâ, spiculis 3-6-floris. — In pratis humidis salsis rariùs. — *P. distans* L. mant. 32. Fl. fr. 3. p. 58. eng. bot. t. 986. *P. salina* Poll. (v. v. DC.)

7. *P. COMPRESSA* (L. sp. 101.) radice repente, culmo ascendentem compresso, foliis carinato-plicatis vaginisque lœvibus, ligulis brevibus obtusissimis, paniculâ coaretatâ secundâ, spiculis ovatis 3-9-floris, flosculis laxis, glomæ valvulis subæqualibus acutis, glumellæ valvulis æqualibus, externâ obtusâ basi subpubescente internâ subacutâ. (2) in pratis siccioribus et muris. — Fl. fr. 3. p. 61. Leers. herb. t. 5. f. 4. — Vaill. bot. t. 18. f. 5. (v. v.)

8. *P. BULBOSA* (L. sp. 102.) culmo basi bulboso, foliis planis angustis, culmeis abbreviatis, ligulâ elongatâ acutâ, paniculâ brevi subsecundâ patentiusculâ subflexuosâ, spiculis ovatis 4-floris, glumæ valvulis subæqualibus acuminatis, glumellæ valvulis inæqualibus obtusis basi villo connexis. (2) in pratis. — Fl. fr. 3. p. 61. eng. bot. t. 1071. — Vaill. bot. t. 17. f. 8. Panicula sæpè vivipara. (v. v.)


9. *P. PRATENSIS* (L. sp. 99.) radice fibrosâ, foliis planis vaginisque scabris, ligulâ oblongâ lanceolatâ acutâ, paniculâ pyramidali diffusâ, pedunculis semi-verticillatis, spiculis 3-4-floris ovatis, glumæ valvulis acutis subæqualibus, glumellæ valvulis æqualibus internâ acutâ, externâ obtusâ basi pubescente. (2) in pratis frequens. — eng. bot. t. 1072. *P. scabra* Ehr. Fl. fr. 3. p. 59. *P. dubia* Leers. herb. t. 6. f. 5. (v. v.)

10. *P. SEROTINA* (Ehr. gram. 82.) foliis planis scabris, vaginis culmoque lœvibus, ligulâ oblongâ obtusâ, paniculâ pyramidali laxiusculâ, pedunculis semi-verticillatis, spiculis 3-4-floris ovatis, glumæ valvulis subæqualibus acuminatis, glumellæ valvulis æqualibus obtusiusculis, externâ basi pubescente. (2) in pratis paludosis rariùs. — *P. palustris* Fl. fr. 3. p. 60 et 5. p. 272. non L. (v. s.)

11. *P. PRATENSIS* (L. sp. 99.) radice repente, foliis superioribus planis plicatis ve. vaginis culmoque lœvibus, ligulâ abbreviatâ trunca, paniculâ diffusâ, spiculis 3-4-floris ovatis, glumæ valvulis subæqualibus acutis, glumellæ valvulis æqualibus basi villo connexis, externâ acutâ, internâ subobtusâ. (2) in pratis. — Host. gram. 2. t. 61.

a. vulgaris (Gaud.) foliis omnibus planis — *P. pratensis* Fl. fr. 3. p. 60. eng. bot. t. 1073. (v. s.)

- P. angustifolia* (Rœm. et Sch.) foliis inferioribus convoluto-setaceis. — *P. angustifolia* L. sp. 99. Fl. fr. 3. p. 60. (v. v.)
12. *P. nemoralis* (L. sp. 102.) foliis angustis basi plicatis, ligulis subnullis, paniculâ elongatâ attenuatâ, spiculis 2-5-floris linearis lanceolatis lanceolatis ovatisve, glumæ valvulis subæqualibus acuminatis, glumellæ valvulis subæqualibus. \mathcal{U} in nemoribus.
- a. *vulgaris* (Gaud.) spiculis pallidis linearis lanceolatis, glumellæ valvulis subacutis externâ basi glabrinusculâ. — *P. nemoralis* Fl. fr. 3. p. 61. eng. bot. t. 1265. — Scheuchz. prod. t. 2. f. 2. (v. v.)
 - b. *glauca* (Gaud.) spiculis ovatis 3-4-floris coloratis, glumellæ valvulis subobtusis, externâ basi villosâ. — In montibus. — *P. glauca* Fl. dan. t. 964. Fl. fr. 5. p. 273. *P. miliacea* Fl. fr. 3. p. 64. excl. syn. (v. v.)
 - c. *coarctata* (Gaud.) paniculâ coarctatâ strictâ, spiculis coloratis lanceolatis 3-5-floris, glumellæ valvulis subobtusis, externâ basi villosâ. — *P. coarctata* Fl. fr. 5. p. 273. (v. v.)
13. *P. annua* (L. sp. 99.) culmo obliquo compresso, foliis planis flaccidis obtusis, ligulâ oblongâ obtusâ, paniculâ brevi subsecundâ patulâ, pedunculis geminis divaricatis, spiculis 3-6-floris ovatis, flosculis laxis, glumæ valvulis subæqualibus ovatis acutis, glumellæ valvulis inæqualibus, externâ obtusiusculâ basi pubescente, internâ acutâ ciliatâ. (I) in ruderatis et cultis frequens. — Fl. fr. 3. p. 59. Lam. ill. t. 45. f. 3. eng. bot. t. 1141. — Scheuchz. gram. t. 3. f. 17. (v. v.)
14. *P. laxa* (Willd. sp. 1. p. 386. non Lam.) culmo erecto compresso, foliis plicatis acutis, ligulâ lanceolatâ elongatâ acutâ, paniculâ brevi flexuosa laxâ pauciflorâ, spiculis 3-floris ovatis, flosculis laxis, glumæ valvulis subæqualibus acuminatis, glumellæ valvulis subæqualibus, internâ angustissimâ, externâ ovatâ obtusiusculâ. \mathcal{U} in Alpibus Galloprov. et in Pyrenæis. — Host. gram. 3. t. 15. *P. elegans* DC. fl. fr. 3. p. 62. — Scheuchz. prod. t. 4. f. 2. Spiculæ ex viridi violaceo et albo variegatae. (v. v.)
15. *P. alpina* (L. sp. 99.) culmo erecto, foliis planis, ligulis infimis truncatis brevissimis, superioribus lanceolatis, paniculâ brevi contractâ demum diffusa, spiculis 4-6-floris ovato-cordatis, flosculis laxis, glumæ valvulis subæqualibus ovatis acutis, glumellæ valvulis subæqualibus, externâ ovatâ acutâ basi et margine pubescenti, internâ acuminatâ ciliatâ. \mathcal{U} in pratis montanis et Alpinis. — Fl. fr. 3. p. 62. eng. bot. t. 1003. — Scheuchz. prod. t. 3. f. 4. (v. v.)
- P. brevifolia* (Gaud.) foliis radicalibus rigidis, culmeis abbreviatis, paniculâ angustâ. — *P. brevifolia* DC. fl. fr. 3. p. 274. *P. collina* Host. gram. 2. t. 66. (v. v.)
16. *P. cenisia* (All. anet. p. 40) radice repente, culmo ascendentem compresso, foliis planis rigidis erecto-patentibus, culmorum sterilium distinctis, ligulis latis obtusis, paniculâ brevi subdiffusâ, spiculis 6-7-floris ovatis, flosculis laxis, glumæ valvulis subæqualibus acuminatis, glumellæ valvulis subæqualibus acutis, externâ basi et dorso pubescente. \mathcal{U} in Pyrenæorum summo jugo *Pic du Midi ex* cl. Ramond (mém. du mus. 7. p. 244.). — Fl. fr. 3. p. 720 et 5. p. 274. *P. distichophylla* Gand. (v. s. ex monte Ceniso.)
17. *P. sudetica* (Willd. sp. 1. p. 389.) culmo recto compresso, vaginis compressis carinatis, foliis planis lato-linearibus glaberrimis acutis, paniculâ diffusa patulâ, spiculis 4-5-floris lanceolatis acutis, glumæ valvulis lanceolatis inæqualibus acuminatis, glumellæ valvulis æqualibus externâ subacutâ sub 5-nerviâ, internâ subtruncatâ ad nervos ciliato-scabratâ. \mathcal{U} in sylvaticis Vogesorum, Jurassi, Alpium, montis Aurei, Pyren. — Fl. fr. 5. p. 272. *P. rubens* Willd. Fl. fr. 3. p. 59. *P. sylvatica* Vill. dauph. 2. t. 3. *Festuca compressa* DC. fl. fr. 5. p. 263. (v. v.)
18. *P. tenuis* (L. sp. 98.) culmo erecto tereti, foliis planis latissimis glaberrimis acuminatis, paniculâ elongatâ amplâ diffusâ, spiculis 6-8-floris linearis



Dulex
bulbosus

lanceolatis, glumæ valvulis inæqualibus ovatis obtusis, glumellæ valvulis æqualibus obtusis, externâ 5-7-nerviâ. 2f ad oras lacuum et fossarum passim. — Fl. fr. 3. p. 58. eng. bot. t. 1315. Leers. herb. t. 5. f. 5. — Schenckz. gram. t. 4. f. 1. (v. v.)

Sect. iv. ERAGROSTIS. — *Eragrostis et Megastachya P. de Beauv. t. 14. f. 11. et t. 15. f. 5.*

Spiculæ elongatæ, flosculis distiche imbricatis, glumæ 4-20-floræ flosculis breviores; semen haud sulcatum. — Panicula composita plus minus effusa.

19. *P. RIGIDA* (L. sp. 101.) *foliis angustis acutis, paniculâ secundâ lanceolatâ coarctatâ rigidâ, rachi marginatâ, spiculis 8-14 floris linearibus glabris rigidis, flosculis distichis laxissimis, glumæ glumellæque valvulis subæqualibus angustis acutis. (I) in arenosis aridis. — Fl. fr. 3. p. 65. eng. bot. t. 1371. *Megastachya rigida* P. de Beauv. — Schenckz. gram. t. 6. f. 2. 3. (v. v.)*

20. *P. MEGASTACHYA* (Kœl. gram. 181.) *foliis planis oris pilosis vaginis glabriusculis, paniculâ elongatâ patulâ, pedunculis basi glanduloso-pubescentibus, spiculis lanceolatis compressis sub-20-floris, flosculis laxis, glumæ valvulis subæqualibus ovatis acutis, glumellæ valvulis obtusis. (I) in arenosis, muris et marginibus viarum passim. — Fl. fr. 3. p. 56. P. Eragrostis Cav. ic. t. 92 non L. *Briza Eragrostis* L. *Megastachya Eragrostis* P. de Beauv. — Schenckz. gram. t. 4. f. 4. (v. v.)*

21. *P. ERAGROSTIS* (L. sp. 100.) *foliorum oris et vaginis pilosis, paniculâ patente, pedunculis basi nudis, spiculis oblongo-linearibus sub-10-floris compressis, flosculis laxè imbricatis, glumæ valvulis subæqualibus ovatis acutis, glumellæ valvulis æqualibus subobtusis, externâ 3-nerviâ. (I) in incultis Parisiorum ex Merat, Andegavia ex Bast., Arverniae, Ligeris (Prost), Galliae australis. — DC. syn. p. 130. Schreb. gram. 2. t. 38. *Eragrostis poæoides* P. de Beauv. (v. s.)*

22. *P. PILOSA* (L. sp. 100.) *foliorum oris pilosis vaginis glabris, paniculâ elongatâ patente tenuissimâ, pedicellis flexuosis, primariis basi pilosis, spiculis linearibus compressis 7-8-floris oblongis, glumæ valvulis valde inæqualibus subacutis, glumellæ valvulis inæqualibus obtusis. (I) in arenosis Galliae mediæ, australis occidentalisque. — Fl. fr. 5. p. 272. *Eragrostis pilosa* P. de Beauv. — Schenckz. gram. t. 4. f. 3. (v. v.)*

Sect. v. CATABROSIA P. de Beauv. t. 19. f. 8.

Glumæ 2-5-floræ obtusæ flosculis breviores; perigonii valvula externa erosodentata, interna subtrifida. — Panicula composita.

23. *P. ATROIDES* (Kœl. gram. 194.) *paniculâ laxâ, spiculis 2-floris lanceolatis, glumæ valvulis membranaceis inæqualibus obtusis. 2f in fossis aquaticis. — Fl. fr. 3. p. 64. *Aira aquatica* L. eng. bot. t. 1557. *Catabrosia aquatica* P. de Beauv. — Vaill. par. t. 17. f. 7. (v. v.)*

Sect. vi. GLYCERIA R. Brown. prod. p. 179. P. de Beauv. t. 19. f. 7.

Glumæ truncatæ 7-11-floræ flosculis breviores, perigonii valvula externa erosa navicularis, interna bifido-dentata. — Panicula subsimplex elongata.

24. *P. FLUITANS* (Kœl. gram. 204.) *paniculâ erectâ, spiculis 7-12-floris elongato-linearibus tereti-compressis. 2f in fossis aquaticis. — Fl. fr. 3. p. 57. eng. bot. t. 1520. *Festuca fluitans* L. *Glyceria fluitans* R. Brown. — Moris. s. 8. t. 3. f. 4. n. 16. (v. v.)*

XXXIII. BRIZA Kœl. gram. p. 148. DC. fl. fr. 3. p. 66. — Brizæ sp. L.

Gluma bivalvis multiflora; perigonium bivalve, valvulis ventricosis cordatis obtusis, interiore minutâ.

1. *B. MAXIMA* (L. sp. 103.) spiculis 15-17-floris cordatis. (I) in provinciis mediterraneis. — Fl. fr. 3. p. 66. *B. Monspessulana* Gou. — Moris. s. 8. t. 6. f. 13. n. 48. (v. v.)
2. *B. MINIMA* (L. sp. 103.) ligulâ brevissimâ obtusâ, paniculâ basi nudâ, pedunculis lâviusculis, spiculis 5-7-floris ovatis. ♀ in pratis et sylvis frequens. — Fl. fr. 3. p. 67. eng. bot. t. 340. — Moris. s. 8. t. 6. f. 10. n. 45. Spiculæ coloratae. (v. v.)
3. *B. VIRENS* (L. sp. 101.) ligulâ longissimâ lanceolatâ, paniculâ basi folio superiore involutâ, pedunculis scabris. (I) in sylvis rarior. — eng. bot. t. 1316. *B. virens* Fl. fr. 3. p. 67. an L? — Moris. s. 8. t. 6. f. 12. n. 47. Spiculæ virides. (v. v.)

† † † FLORES HERMAPHRODITI; SPICULÆ SESSILES, SECUS RACHIN SPICATE.

XXXIV. CYNOSURUS Mænch. meth. DC. fl. fr. 3. p. 75. — *Cynosuri* sp. L.

Bractea foliacea lacera ad basin spiculæ; gluma bivalvis, 2-5-flora; perigonum bivalve, valvulis integris.

1. *C. CORYLE* (L. sp. 105.) spiculis in racemum spicatum simplicem linearem digestis, bracteis pinnatifidis maticis. ♀ in sterilibus secùs vias. — Fl. fr. 3. p. 75. Lam. ill. t. 47. f. 1. — Moris. s. 8. t. 4. f. 22. n. 6. (v. v.)
2. *C. ECHINATUS* (L. sp. 105.) spiculis in paniculam ovatam glomeratam aggregatis, bracteis pinnatis scariosis aristatis (I) in incultis Galliæ australis, ad littora Oceani propè St.-Malo et Cherbourg (el. de Bréb.). — Fl. fr. 3. p. 75. Lam. ill. t. 47. f. 2. *Chrysurus echinatus* P. de Beauv. — Moris. s. 8. t. 4. f. 5. n. 13. (v. v.)
3. *C. ELEGANS* (Desf. atl. 1. t. 17.) spiculis in paniculam ovatam secundam laxam fasciculatis, bracteis pinnatis setiformibus, glumæ valvulâ alterâ aristatâ. (I) in montibus Corsicæ. — *C. gracilis* Viv. cors. 1. *Chrysurus elegans* P. de Beauv. (v. s.)

XXXV. ECHINARIA Desf. atl. 2. p. 385.


Gluma bivalvis membranacea 2-3-flora, flosculis aliis hermaphroditis, aliis masculis; perigonum bivalve, valvulâ exteriore 4-5-fidâ, laciniis rigidis longis subulatis, interiore minore 2-3-fidâ.


1. *E. CAPITATA* (Desf. 1. c.) capitulo terminali subrotundo. (I) in aridis Galliæ australis occidentalisque. — Fl. fr. 3. p. 74. *Cenchrus capitatus* L. *Sesleria echinata* Host. gram. 3. t. 8. — Moris. s. 8. t. 5. f. 4. n. 1. (v. v.)

XXXVI. SESLERIA Scop. carn. 1. p. 63. DC. fl. fr. 3. p. 75. — *Cynosuri* sp. L.

Bractea nulla; gluma 2-3-flora bivalvis; perigonum bivalve, valvulâ exteriore apice trifidâ, interiore bifidâ. — Flores capitati vel densè spicati.

1. *S. CARNARVONIA* (Ard. sp. 2. t. 6. f. 3. 4. 5.) foliis subobtusis, ligulâ oblongâ obtusâ, spicâ subdensâ oblongâ. ♀ in rupibus et pratis montium. — Fl. fr. 3. p. 76. et 5. p. 280. Lam. ill. t. 47. f. 1. *Cynosurus cæruleus* L. (v. v.)
2. *S. CYLINDRICA* (DC. syn. p. 134.) foliis acutissimis, ligulâ nullâ, spicâ densâ cylindricâ elongatâ. ♀ in calidis montosis Niceæ. — Fl. fr. 3. p. 279. *Festuca argentea* Savi in Ust. ann. 1800. ic. (v. s.)





XXXVII. TRACHYNOTIA Michaux bor. am. 1. p. 64. DC. fl. fr. 3. p. 74.

Gluma uniflora bivalvis, valvulis angustis carinatis alterâ apice breviter aristatâ; perigonium bivalve, valvulis glumæ conformibus.

1. T. STRICTA (DC. fl. fr. 3. p. 74.) culmo foliisque strictis, spicis geminis erectis, spiculis secundis pubescentibus. ♀ ad maris littora circa Rupellan, Carnac, Noirmoutiers, Vire. — Dactylis stricta Ait. Spartina stricta Roth. Limnetis pungens Pers. Host. gram. 4. t. 66. (v. v.)
2. T. ALTERNIFLORA (DC. fl. fr. 5. p. 279.) culmo stricto, foliis planis apice involutis, spicis paniculatis coarctatis gracilibus, rachi flexuosa, spiculis alternis distinctis. ♀ in limosis maritimis Bayonæ. — Spartina alterniflora Lois. (v. v. D.)

XXXVIII. CHAMAGROSTIS Wib. wett. 126. DC. fl. fr. 3. p. 77.

Gluma uniflora bivalvis, valvulis æqualibus oblongis obtusis truncatis; perigonium membranaceum pubescens minimum urceolatum margine lacerum. — Flores spicati subsecundi.

1. C. MINIMA (Wib. 1. c.). (1) in arenosis primo vere passim. — Fl. fr. 1. c. Agrostis minima L. Sturmia minima Sturm germ. fasc. 7. t. 1. Knappia agrostidea eng. bot. t. 1127. Mibora verna Adans. et P. de Beauv. — J. Bauh. hist. 2. p. 469. f. 3. (v. v.)

XXXIX. NARDUS L. gen. 69.

Gluma uniflora 2-valvis acutissima; perigonium nullum; stigma unicum.

1. N. STRICTA (L. sp. 77.) spicâ setacea rectâ secundâ, floribus approximatis, glumis breviter aristatis. ♀ in aridis et montanis. — Fl. fr. 3. p. 77. eng. bot. t. 290. — Moris. s. 8. t. 7. f. 22. n. 8. (v. v.)
2. N. ARISTATA (L. syst. 145.) spicâ setacea secundâ flexposâ aut nutante, floribus distantibus, glumis longè aristatis. (2) in aridis Delph., Monspelii, agri Ligericini (Prost). — Fl. fr. 3. p. 78. Vill. dauph. 2. t. 2. Rottbolla monandra Cav. ic. 1. t. 39. f. 1. Monerma monandra P. de Beauv. — Barr. ic. t. 117. f. 1. (v. v.)

XL. ROTTBOLLA L. gen. supp. 114.

Gluma mutica nunc univalvis et unicum florem hermaphroditum gerens, nunc bivalvis et flores 2 unum hermaphroditum alterum masculum includens; perigonium bivalve glumâ minus, valvulis inæqualibus.

1. R. INCURVATA (L. supp. 114.) foliis planiusculis, vaginâ sulcatâ, spicâ tereti subulatâ curvulâ, glumâ bivalvi uniflorâ subadpressâ subulatâ perigonium acuminatum subæquante. (1) in campis Galliae australis et maritimis prov. occid. — Fl. fr. 3. p. 78. Cav. ic. t. 213. eng. bot. t. 760. Ophiurus incurvatus P. de Beauv. (v. v.)
2. R. FILIFORMIS (Roth. catal. 1. p. 21.) foliis involutis, vaginâ læviusculâ, spicâ filiformi subulatâ subcompressâ erectâ, glumâ bivalvi acuminatâ uniflorâ patente perigonium acuminatum subæquante. (1) in maritimis secus Mediterraneum, agri Syrtici circa la Teste (Des Moul.), propè Caen ex Lenormand. — R. erecta Savi giorn. pis. 4. f. 5. 6. Fl. fr. 5. p. 280. Ophiurus filiformis Rœm. et Sch. — Barr. ic. t. 6. (v. v.)
3. R. SUBULATA (Savi. giorn. pis. 4. f. 4. 8.) spicâ tereti strictâ subulatâ, glumâ 1-valvi ensiformi acuminatâ per anthesiu patente. (1) in maritimis mediterraneis propè Cette. — Fl. fr. 5. p. 281. Monerma subulata P. de Beauv. — Barr. ic. t. 5. (v. s.)

XLII. ~~COLOPS~~ L. gen. 1150.

Gluma triflora coriacea bivalvis, valvula exteriore apice 3-5 aristas rigidas gerente, flosculo intermedio masculo; perigonum bivalve, valvula externa apice 3-4 aristas gerente. — Flores in rachi excavata semi-immersi.

1. **A. ovata** (L. sp. 1489.) spicâ ovatâ aristatâ aristis breviore, glumarum omnium valvula exteriore nervosâ adpressâ ciliato-scabrâ 3-4-aristatâ. (2) secus vias in provinciis meridionalibus et propè Bourg (Gironde) (Des Moul.). — Fl. fr. 3. p. 79. Lam. ill. t. 839. f. 1. — Schenckz. gram. t. 1. f. 2. (v. v.)
2. **A. TRIUNCLALIS** (L. sp. 1489.) spicâ oblongâ aristatâ aristarum ferè longitudo, glumarum inferiorum valvula exteriore nervosâ adpressâ pubescenti biaristatâ. 2' in sterilibus propè Parisios ex Merat. et provinc. australiorum usque ad Aginum. — Fl. fr. 3. p. 79. Lam. ill. t. 839. f. 3. — Vaill. bot. t. 17. f. 1. (v. v.)
3. **A. SQUARRA** (L. sp. 1489.) spicâ oblongâ aristis longiore, aristis inferioribus brevissimis, superioribus longioribus, glumarum valvula exteriore 1-2-aristatâ sulcatâ nervosâ glabriusculâ. 2' circâ Monspelium propè Pont-Juvénal reperiit Requien. — Fl. fr. 3. p. 721. Schreb. gram. t. 72. f. 2. (v. s.)

XLIII. TRITICUM DC. fl. fr. 3. p. 80. — Triticum et Bromi sp. L.

Rachis dentata; spiculæ in quoque racheos dente solitariæ, rachi oppositæ, gluma bivalvis multiflora; perigonum 2-valve.

Sect. I. SILIGO. — *Triticum P. de Beauv. t. 20. f. 4.*

Spiculæ 3-4-floræ flosculis 2 inferioribus fertilibus, supremis sæpè abortivis; glumæ valvulae latæ naviculares dentatae; ovarium apice barbatum. — Spica simplex densa imbricata.

1. **T. SATIVUM** (Lam. dict. 2. p. 554.) spicâ simplici, glumis 4-floris ventricosis, flosculis omnibus hermaphroditis. (1) ubique in planitiebus colitur. — Fl. fr. 3. p. 80. **T. aestivum** et **T. hybernum** L. (v. v.)
2. **T. COMPOSITUM** (L. f. supp. 115.) spicâ compositâ, glumis 3-floris ventricosis, flosculis omnibus hermaphroditis. (1) colitur rariùs. — Fl. fr. 3. p. 82. — Lob. ic. t. 26. f. 2. (v. v.)
3. **T. SPLETTA** (L. sp. 127.) spicâ simplici, glumis 4-floris cartilagineis truncatis, floribus 2-3 hermaphroditis, 2-1 neutris. (1) colitur in provinciis Helvetiæ conterminis. — Fl. fr. 3. p. 82. — Moris. s. 8. t. 6. f. 16. n. 1. (v. v.)
4. **T. MONOCOTYLO** (L. sp. 127.) spicâ simplici compressâ distichâ, glumis apice tridentatis trifloris, flore unico fertili. (1) colitur in montanis aridis. — Fl. fr. 3. p. 83. — Moris. s. 8. t. 6. f. 17. n. 2. — Lob. ic. t. 31. f. 1. (v. v.)

Sect. II. AGROPYRON Gœrttn. — *Agropyron et Brachypodium P. de Beauv. t. 20. f. 1. et 2. et t. 19. f. 3.*

Spiculæ 3-15-floræ flosculis omnibus fertilibus; glumæ valvulae lineares aut lanceolatae acutæ integræ; ovarium glabrum. — Spica plerumque composita, spiculis remotis nec imbricatis.

5. **T. CANINUM** (L. sp. ed. 1. p. 86.) radice fibrosâ, foliis planis scabris, spicâ simplici nutante densâ, spiculis 4-5-floris sessilibus adpressis glabris, glumæ valvulis subæqualibus aristato-acuminatis, glumellæ valvulis æqualibus, internâ obtusa brevissimè ciliatâ, externâ aristatâ aristâ breviore. 2' in sepiibus et dumosis. — eng. bot. t. 13; 2. **T. sepium** Lam. DC. fl. fr. 3. p. 83. **Elymus caninus** L. sp. ed. 2. **Agropyrum caninum** P. de Beauv. — Moris. s. 8. t. 1. f. 17. n. 2. (v. v.)
6. **T. REFLAX** (L. sp. 128.) radice repente, foliis planis aut apice convolutis

Sativum *neglectum*

aristatum

Milium *spp.*

canescens

erectum

setaceum *canescens*


setaceum *spicatum*

spicatum

spicatum

spicatum

spicatum



margine scabris, spicâ elongatâ simplici strictâ densâ, rachi scabré, spiculis glabris 4-5-floris sessilibus compressis, glumæ valvulis æqualibus, glumellæ valvulis æqualibus, internâ obtusâ ciliatâ. ♀ in cultis niminm frequens. — Fl. fr. 3. p. 83. Schreb. gram. t. 26. eng. bot. t. 909. Agropyrum repens P. de Beauv.

a. aristatum (DC.) spicâ subcylindricâ, glumâ glumellæque valvulâ externâ aristatis. — Vaill. par. t. 17. f. 2. (v. v.)

b. muticum (DC.) spicâ subcylindricâ, glumæ valvulis obtusis acutisve, glumellæ valvulâ externâ obtusâ submucronulatâ. (v. v.)

γ. pungens, spicâ subdistichâ, glumæ valvulis subacuminatis, glumellæ valvulâ externâ acutâ. — T. pungens Pers. ench. 1. p. 109. Fl. fr. 5. p. 283. (v. v.)

7. *T. rigidum* (Schrad. germ. 1. p. 392.) radice subrepente, foliis subconvolutis, spicâ distichâ elongatâ laxiusculâ basi interruptâ, spiculis compressis 5-7-floris sessilibus adpressis, rachi scabré, glumæ valvulis subæqualibus retusis 5-7-nerviis, glumellæ valvulis æqualibus obtusis exaristatis, internâ tenuissimè ciliatâ, externâ obtusâ mucronulatâ. ♀ in arenosis propè Narbonam. — Fl. fr. 5. p. 282. Agropyrum rigidum P. de Beauv. (v. s.)

8. *T. acutum* (DC. cat. 153.) radice repente, foliis convolutis erectis, culmo erecto stricto, spicâ distichâ continuâ, spiculis compressis 5-7-floris sessilibus subadpressis, rachi lœvi, glumæ valvulis subæqualibus subacutis 5-nerviis, glumellæ valvulis æqualibus subacutis, internâ tenuissimè ciliatâ. ♀ in arenosis limosissime maritimis secùs Oceanum et Mediterraneum. — Fl. fr. 5. p. 282. (v. v.)

9. *T. JUNCEUM* (L. sp. 128.) radice repente, culmo erecto stricto, foliis convolutis longissimis erectis, spicâ elongatâ distichâ subcontinuâ, spiculis compressis 7-9-floris sessilibus adpressis, rachi lœvi, glumæ valvulis subæqualibus obtusissimis 9-nerviis, glumellæ valvulis inæqualibus internâ obtusâ tenuissimè ciliatâ, externâ obtusâ brevissimè mucronatâ. ♀ in arenosis secis mare Mediterraneum. — Fl. fr. 5. p. 281. T. facetum Viv. fragm. 1. t. 26. f. 1. Agropyrum juncenum P. de Beauv. (v. v.)

10. *T. PENNATUM* (Moench. hass. n. 102.) radice repente, foliis planis pubescens-tibus, spicâ simplici rectâ distichâ, spiculis 9-18-floris glabris pubescentibusve brevissimè pedicellatis teretinsculis demùm distichis erecto-patulis, glumæ valvulis inæqualibus acutis, glumellæ valvulis æqualibus, internâ ciliatâ obtusâ, externâ acutâ aristatâ aristâ longiore. ♀ in sylvis, glareosis et ruderibus. — Fl. fr. 5. p. 283. 3. p. 84. T. gracile Fl. fr. 3. p. 84. Bromus pinnatus L. Gaud. Brachypodium pinnatum P. de Beauv. — Scheuchz. gram. t. 1. f. 7.. (v. v.)

11. *T. SYLVATICUM* (Moench. hass. n. 103.) radice fibrosâ, foliis planis villosis, spicâ simplici rectâ distichâ, spiculis 8-9-floris villosis glabrisve brevissimè pedicellatis erectis, glumæ valvulis inæqualibus aristato-acuminatis, glumellæ valvulis æqualibus internâ ciliatâ obtusâ, externâ acuminatâ aristatâ aristis supremis glumellâ longioribus. ♀ in sylvis. — Fl. fr. 3. p. 85. et 5. p. 283. Bromus sylvaticus Poll. Gaud. eng. bot. t. 729. Brachypodium sylvaticum P. de Beauv. (v. v.)

12. *T. CILIATUM* (DC. fl. fr. 3. p. 85) culmo lœvi stricto, foliis planis subpilosis ciliatis, spicâ erectâ distichâ, spiculis paucis 8-20-floris compressis rigidis sessilibus, glumæ valvulis inæqualibus acuminatis, perigonii valvulis subæqualibus, internâ obtusâ apice longè ciliatâ, externâ dorso ciliato-scabré acuminatâ aristatâ aristâ breviore. (I) secùs vias et agros prov. Mediterr. — Fl. fr. 5. p. 284. Bromus distachyos L. Festuca monostachya Desf. atl. 1. t. 24. f. 2. Brachypodium distachyon P. de Beauv. — Ger. gallop. t. 3. f. 1. (v. v.)

13. *T. PHENICOIDES* (DC. fl. fr. 3. p. 85. excl. syn., 5. p. 284.) culmo erecto lœvi, foliis convolutis pungentibus erectis, spicâ simplici rectâ distichâ, spiculis 10-20-floris erectis brevissimè pedicellatis, glumæ valvulis inæqualibus acu-

- minatis, glumellæ valvulis subæqualibus, internâ obtusâ tenuissimè ciliatâ, externâ acuminato-aristatâ aristâ multò longiore. \mathcal{U} in glareosis secùs mare Mediterraneum, in Delphin. propè S.-Spiritûs pontem. — Ger. gallop. t. 2. f. 2. (v. v.)
14. T. CESPITOSUM (DC. cat. 153. fl. fr. 5. p. 284.) radice repente, enlmo basi ramosissimo, foliis convolutis glaucis tenuissimis rigidis patulis, spicâ erectâ simplici, spiculis paucis alternis 6-12-floris brevissimè pedicellatis, glumæ valvulis inæqualibus acutis, glumellæ valvulis æqualibus internâ obtusâ tenuissimè ciliatâ, externâ aristatâ, aristâ brevi. \mathcal{U} in saxosis apriacis provinc. austral. — Festuca cespitosa Desf. atl. 1. t. 24. T. Plucknetii All. — Pluck. t. 33. f. 1. (v. v.)
15. T. POA (DC. fl. fr. 3. p. 86.) culmo tenello stricto, foliis angustis involutis strictis, spicâ simplici rectâ elongatâ strictâ, spiculis 5-9 floris glabris ovatis sessilibus adpressis, glumæ valvulis lanceolato-linearibus subæqualibus acutis, glumellæ valvulis æqualibus obtusiusculis muticis. (I) in Vogesen, circâ Langdunum, in Galliâ mediterr. et occid. passim. — T. Halleri Viv. frag. t. 26. f. 1. Brachypodium Poa P. de Beauv. — Pluck. t. 32. f. 7. (v. v. DC.)
Æ. Festuca, spicâ basi ramosâ. — Circâ Cenomanum. — T. Festuca DC. fl. fr. 3. p. 87. (v. s.)
16. T. UNILATERALE (L. mant. 35.) culmo tenello subsolitario, foliis angustis involutis vaginisque puberalis, spicâ simplici rectâ unilaterali, spiculis 4-6-floris sessilibus adpressis linear-i-lanceolatis, glumæ valvulis linearibus inæqualibus acuminatis, glumellæ valvulis æqualibus acuminatis exaristatis. (I) in arvis propè Monspelium, Avenionem. — Fl. fr. 5. p. 285. (v. v. DC.)
17. T. ROTTBOLLA (DC. fl. fr. 3. p. 86.) culmis plurimis humillimis, foliis plicatis convolutis vaginisque glaberrimis, spicâ densâ simplici erectâ, rachi flexuosa, spiculis 5-6-floris glabris oblongis secundis sessilibus adpressis, flosculis imbricatis, glumæ valvulis lanceolato-ovatis subæqualibus obtusis, glumellæ valvulis æqualibus obtusiusculis muticis. (I) in arenosis secùs mare Mediterr. et provinc. boreali-occidentalium. — Fl. fr. 2. p. 86. et 5. p. 285. T. unilaterale Viv. frag. 1. t. 23. f. 1. T. loliaceum Smith. (v. v.)
18. T. NARDUS (DC. fl. fr. 3. p. 87.) foliis setaceis involuto-canaliculatis, spicâ simplici rectâ, spiculis 5-7-floris subglabris secundis sessilibus adpressis, glumæ valvulis linearibus inæqualibus acuminatis, glumellæ valvulis æqualibus acuminatis, externâ sàpius aristatâ. \mathcal{U} in sterilibus Parisiorum, prov. occident. variüs et australium. — Brachypodium tenuellum et tenuiflorum Rœm. et Schult. (v. v.)
19. T. TENUICULUM (Lois. not. 27.) culmo simplici recto apice nudo, foliis angustis involutis vaginisque glabris, spicâ simplici rectâ strictâ, spiculis sessilibus adpressis 7-9-floris ovato-oblongis glaberrimis, glumæ valvulis subæqualibus linear-i-lanceolatis acutis, glumellæ valvulis æqualibus, internâ obtusiusculâ, externâ acutâ aristatâ aristâ subduplo longiore. (I) in agris circâ Nannetes, Andegavum. — Fl. fr. 5. p. 285. T. Hispanicum Viv. fragm. t. 23. f. 2. T. festucoides Bert. (v. s.)

XLIII. SECALE L. gen. 97.

Rachis dentata; spiculæ in quoque racheos dente solitariæ, gluma 2-et-rarius-3-flora, bivalvis; perigonum bivalve, valvula exteriore apice aristatâ.

1. S. CERATE (L. sp. 124.) glumis setaceis, perigonis scabris. (I) colitur ubique. — Fl. fr. 3. p. 88. Lam. ill. t. 49. (v. v.)
2. S. VILLOSUM (L. sp. 124.) glumis truncatis aristatis, perigonis villosis. (I) in agri, Lugduni ex Latour, Monspelii, Biterris, in Corsicâ. — Fl. fr. 3. p. 88. (v. s.)



1st floor

front door
— front door

air con

XLIV. EOLIUM L. gen. 95.

Rachis subdentata; spiculae solitariae rachi parallelæ; gluma multi-flora 2-valvis, valvula externâ magnâ, internâ minimâ sèpè abortivâ; perigonum 2-valve, valvula internâ ciliato-scabré.

1. *L. ERRENNE* (L. sp. 122.) culmo lœvi, spiculis 6-12-floris subcompressis muticis glumâ longioribus. $\frac{1}{2}$ secùs vias et in pascuis sterilibus. — Fl. fr. 3. p. 89. Lam. ill. t. 48. (v. v.)
2. *L. TENUE* (L. sp. 122.) culmo gracili lœvi, foliis angustis, spiculis 3-4-floris subcylindricis muticis glumam subæquantibus. $\frac{1}{2}$ secùs vias et prata sicca. — Fl. fr. 3. p. 89. — An ut volunt cl. Schrader et Gaudin prioris var.? (v. v.)
3. *L. TEMULENTUM* (L. sp. 122.) culmo scabro, spiculis 5-9-floris compressis aristatis glumam subæquantibus. (I) inter segetes. — Fl. fr. 3. p. 89. Lam. ill. t. 48. f. 2. (v. v.)
4. *L. MULTIFLORUM* (Lam. fl. fr. 3. p. 621.) culmo sublœvi, spiculis 20-25-floris compressis, superioribus aristatis, glumâ duplò longioribus. — In agris et pratis passim. — Fl. fr. 3. p. 90. Variat muticum. (v. v.)

XLV. ELYMUS L. gen. 96.

Rachis dentata; spiculae 2-3 in quoque racheos dente; gluma 2-4-flora bivalvis, valvulis sèpè patulis et involucrum mentientibus; flosculi superiores interdum masculi; perigonum bivalve.

1. *E. ALEXATRIS* (L. sp. 122.) spiculis geminis, spicâ erectâ arctâ, glumis pubescentibus flosculo mutico longioribus. $\frac{1}{2}$ in arenosis maritimis. — Fl. fr. 3. p. 90. — Gm. sib. 1. t. 25. (v. s.)
2. *E. EUROPÆUS* (L. mant. 35.) spiculis ternis, spicâ erectâ, glumis scabris setaceis, perigonio aristato. $\frac{1}{2}$ in pratis et secùs vias. — Fl. fr. 3. p. 91. Cuviera Europaea Kœl. (v. v.)

XLVI. HORDEUM L. gen. 98.

Rachis dentata; spiculae in quoque racheos dente ternæ, laterales sèpius masculæ pedicellatae, media sessilis hermaphrodita; gluma uniflora bivalvis, valvulis sèpè patulis et involucrum mentientibus.

1. *H. VULGARE* (L. sp. 125.) flosculis omnibus hermaphroditis aristatis, ordinibus indistinctis. (I) Colitur autumno satum. — Fl. fr. 3. p. 90. — J. Bauh. hist. 2. p. 418. f. 3. (v. v.)
2. *H. DISTICHON* (L. sp. 125.) floscalis omnibus hermaphroditis aristatis, spicâ crassâ sexfariam sulcatâ. (I) Colitur cum priori. — Fl. fr. 3. p. 92. Host. gram. 3. t. 35. (v. v.)
3. *H. DISTICHEUM* (L. sp. 125.) flosculis lateralibus masculis muticis, seminibus imbricatis, spicâ elongatâ compressâ. (I) Colitur verè satum. — Fl. fr. 3. p. 92. — C. Bauh. theat. 440. ic. (v. v.)
4. *H. ZEODONTUM* (L. sp. 125.) flosculis lateralibus masculis muticis, seminibus patentibus, spicis basi crassioribus subpyramidalatis. (I) Colitur rarius. — Fl. fr. 3. p. 93. Schreb. gram. t. 17. — J. Bauh. hist. 2. p. 430. f. 1. (v. v.)
5. *H. MURINUM* (L. sp. 126.) flosculis lateralibus masculis aristatis, intermedii glumis setaceis ciliatis. (I) in ruderibus. — Fl. fr. 3. p. 93. eng. bot. t. 1971. — Moris. s. 8. t. 6. f. 25. n. 4. (v. v.)
6. *H. SECUNDINUM* (Schreb. spic. 148.) flosculis lateralibus masculis aristatis, glumis omnibus setaceis scabris. (I) in pratis siccis et sterilibus. — Fl. fr. 3. p. 94. — Vail. par. t. 17. f. 6. (v. v.)
7. *H. MARITIMUM* (Vahl. symb. 2. p. 25.) flosculis lateralibus masculis aristatis

dorso pubescentibus, glamis scabris lateralibus lanceolatis. $\frac{y}{2}$ in arenosis maritimis à Niceâ usque ad Abbatis-villam sed rariūs. — Fl. fr. 3. p. 94. H. geniculatum All. ped. t. 91. f. 3. (v. v.)

8. H. CRINITUM (Desf. atl. 1. p. 113.) flosculis geminis fertilibus æqualibus longè aristatis, floscularum superiorum aristis involucro 4-phyllo aristato longioribus. (I) in arenosis secùs vias Fori-Julii. — H. jubatum Lois. DC. fl. fr. 5. p. 286. non L. Elymus crinitus Schreb. gram. 2. t. 24. (v. s.)


Ordo CXI ? LEMNACEÆ Duby mss. — Lemna Ach. Rich.
dict. class. 9. p. 276.


Flores monoici in spathâ sessili monophyllâ compressâ tenui membranaceâ primò inclusi. Fl. masc. pauci (1-2). Perigonium o. Stamen 1; filamentum cylindricum pistillo longius; antheræ 2 juxtâpositæ globulosæ 1-loculares longitudinaliter dehiscentes. Flos femineus unicus. Pistillum 1. Ovarium ovoideum compressum 1-loculare, ovulis 2-5-erectis. Stylus crassus teres. Stigma concavum truncatum. Capsula indehiscens 1-∞-sperma. Semina raphe notata; integumentum crassum. Embryo 1-cotyledoneus. Albumen o. — Herbæ minimæ annuæ natantes, folio aut fronde compressâ lenticulari constantes. Flores et radiculæ lateraliter nascentes. — Hujus ordinis in Monocotyledoneis phanerogamis locus incertus et idcirco ad hujus classis finem rejectus. Lemnam Pistiæ affinem vult cl. Hooker scot. 2. p. 191. et inter Aroideas inserit et revera Aroideæ videntur ordo quocum majores affinitates habent Lemnaceæ.

I. LEMNA L. gen. n. 1038.

Character isdem ac ordinis.

1. L. TRISULCA (L. sp. 1376.) foliis lanceolatis in petiolum attenuatis cruciatim cohærentibus, radicibus solitariis. (I) in aquis pigris puris. — Fl. fr. 2. p. 588. eng. bot. t. 926. — Mich. gen. t. 11. f. 5. (v. v.)
2. L. MINOR (L. sp. 1376.) foliis ellipticis utrinque planis basi cohærentibus, radicibus solitariis. (I) ad superficiem aquarum quietarum. — Fl. fr. 2. p. 389. eng. bot. t. 1093. — Vaill. bot. t. 20. f. 3. — Mich. gen. t. 11. f. 3. (v. v.)
3. L. GIBBA (L. sp. 1377.) foliis ellipticis subtûs bullato-convexis basi cohærentibus, radicibus solitariis. (I) ad superficiem aquæ quietæ. — Fl. fr. 2. p. 589. eng. bot. t. 1233. — Mich. gen. t. 11. f. 2. (v. v.)
4. L. POLYRHIZA (L. sp. 1377.) foliis ellipticis planis basi cohærentibus, radicibus fasciculatis. (I) ad superficiem aquarum quietarum. — Fl. fr. 2. p. 590. — Vaill. bot. t. 20. f. 2. — Mich. gen. t. 11. f. 1. (v. v.)
5. L. ARHIZA (L. mant. 294.) foliis elliptico-subrotundis geminis subtûs convexis eradicatis. (I) ad superficiem aquarum quietarum. — Fl. fr. 2. p. 590. bull. phil. n. 78. f. z-&c. — Mich. gen. t. 11. f. 4. (v. s.)





**Classis Tertia. MONOCOTYLEDONEÆ seu
ENDOGENÆ CRYPTOGAMÆ DC. organ. 1. p. 128.**

Truncus medullâ centrali, radiis medullaribus corticeque verâ plane destitutus, fibris sparsis nec concentrica dispositis constans, apice tantum crescens, in margine magis quam in centro induratus, interdùm abortivus subterraneus radiciformis. Folia sæpè vaginata integra nervis simplicibus, aut lobata nervis ramosis, nunquàm verè composita. Flores indistincti. Embryo cotyledone unico cellulis tantùm nec tracheis constante. (*DC. mss.*)

**Ordo CXII? CHARACEÆ L. C. Rich. Ad. Brongn. in dict.
class. 3. p. 474.**

Flores axillares perigonio destituti, monoici. *Masc?* Disci solitarii orbiculares rubri, annulo albo cincti, extùs membranâ reticulatâ translucidâ formati, intùs mucilaginosi filaments articulata aut tubos cylindricos foventes. *Fem.* Capsula 1-locularis 1-sperma, integumento duplice, externo membranaceo tenuissimo translucido superne 5 dentibus rosaceis terminato, interno duro sicco opaco valvis 5 angustis spiraliter contortis. — Plantæ aquaticæ submersæ, caulis ramosis debilibus, duris fragilibus, ramis verticillatis in verticillis superioribus 3-4-5 capsulas remotas basi 2-3 bracteis (ramis abortivis?) stipatas gerentibus. — Ordo ex cl. Leman Onagriis et Salicariis, ex cl. Agardh Bory-St.-Vincent etc. Algis affinis, hîc propter ramorum dispositionem in vicinio Equisetacearum collocatus.

I. CHARA Vaill. acad. 1719. p. 23. L. gen. n. 1203;

Character isdem ac ordinis.

1. *C. VULGARIS* (L. sp. 1624.) caulis striatis inermibus, ramulis basi nudis, fructibus subquaternis spiraliter striatis bracteam superantibus. $\frac{1}{2}$ in aquis pigris. — Fl. fr. 2. p. 584. et 5. p. 246. Lam. ill. t. 742. f. 1. — Vaill. acad. 1719. t. 3. f. 1. (v. v.)
2. *C. TOMENTOSA* (L. sp. 1624.) caulis sulcatis apice subhispidis, ramulis basi foliosis, fructibus solitariis spiraliter striatis bracteâ brevioribus. (I) in fossis. — Fl. fr. 2. p. 585. — Moris. s. 15. t. 4. f. 13. n. 9. (v. v.)

3. *C. HISPIDA* (L. sp. 1624.) caulis sulcatis hispidis, ramulis basi subfoliosis, fructibus solitariis spiraliter striatis bracteâ brevioribus (I) in fossis. — Fl. fr. 2. p. 585. Lam. ill. t. 376, f. 3. — Vaill. acad. 1719. t. 3. f. 3. (v. v.)
4. *C. GALIOIDES* (DC. cat. 93 et fl. fr. 5. p. 246.) caulis tenuibus non sulcatis apice setis raris hispidis, fructibus solitariis lævibus bracteis ternis circumdatis et iisdem subbrevioribus. (I) in fossis aquæ subdulcis Occitaniae maritimæ, in Neustriæ flumine Orne ex Lenormand. (v. v. DC.)
5. *C. CAPILLACEA* (Thuil. par. II. 1. p. 474.) caulis lævibus semipellucidis, ramis verticillatis elongatis, fructibus solitariis ovoideis sublævibus bracteâ subbrevioribus. (I) in aquis pigris. — Fl. fr. 2. p. 585. (v. s.)
6. *C. FLEXILIS* (L. sp. 1524.) caulis lævibus semi-pellucidis, ramis subverticillatis elongatis, fructibus aggregatis ovoideis sublævibus bracteâ longioribus. (I) in aquis pigris. — Fl. fr. 2. p. 586. *C. translucens* Pers. eng. bot. t. 1855. *Nitella flexilis* et *translucens* Agardh syst. alg. 124. — Vaill. acad. 1719. t. 3. f. 8. g. (v. v.)
7. *C. CANESCENTS* (Lois. not. 139.) caulis tenuissimis dichotomis albidis copiose hispidis, spinulis subulatis subverticillatis, internodiis supremis approximatis, ramulis fructiferis brevissimis verticillatis, bracteis fructu duplo longioribus. (I) in aquis dulcibus stagnosis secus littora maris Mediterranei propè Telonem, Monspelium. — Fl. fr. 5. p. 246. *C. crinita* Wallr. t. 3. Ag. l. c. (v. v. DC.)
8. *C. BATRACHOSPERMA* (Thuil. par. II. 1. p. 473.) caulis lævibus semi-pellucidis, ramis approximatis verticillatis, fructibus subquaternis ovoideis spiraliter striatis bracteâ brevioribus. (I) in aquis pigris. — Fl. fr. 2. p. 586. *Nitella batrachosperma* Agardh alg. 126. (v. s.)
9. *C. HYALINA* (DC. fl. fr. 5. p. 247.) caulis lævibus lucidis hyalinis, ramis verticillatis confertis in 7-8 ramulos divisis, ramulis trifidis in axillâ fructum ovatum breviter pedicellatum reflexum gerentibus. (I) in aquis quietis circâ Cœnonumanum, Nannetes. — *C. tenuissima* Desv? *Nitella hyalina* Ag. l. c. (v. s.)
10. *C. SYNCARPA* (Thuil. par. II. 1. p. 473.) caulis lævibus semipellucidis, ramis verticillatis, fructibus subtornis bracteâ destitutis. (I) in aquis pigris. — Fl. fr. 2. p. 586. (v. s.)

**Ordo CXIII. EQUISETACEÆ Richard. DC. fl. fr. 2. p. 580.
Vauch. monog. in mem. soc. gen. 31.**


Fructificationes terminales dispositæ in amentum conicum squamis peltatis intùs floriferis constans. Involucella bivalvia. Semina sphærica (acotyledonea ex Vauch.) numerosa nuda, filamentis quatuor polliniferis hygrometricis apice dilatatis circumPLICATA. — Plantæ aphyllæ ramis verticillatis sulcatis articulatis, articulis vagina monophyllâ cinctis.

I. EQUISETUM L. gen. 1169. Vauch. l. c.

Character isdem ac ordinis.

1. *E. ARVENSE* (L. sp. 1516.) caule sterili subscabro, striis circiter duodenis, vaginæ dentibus totidem, ramis scabriusculis tetragonis, caule fructifero evanido, involucris laxis, vaginæ dentibus 12. $\frac{1}{2}$ in glareosis humidis frequens. — Fl. fr. 2. p. 581. Vauch. mon. t. 1. (v. v.)





2. *E. FLUVIATILE* (L. sp. 1517.) caule sterili cylindrico glabro, dentibus et ramis circiter triginta, caule fructifero nudo evanido, vaginis amplis elongatis laxis, dentibus 30. \mathcal{U} in palustribus et ripis fluviorum. — Fl. fr. 2. p. 582. Vauch. mon. t. 2. *E. Telmateya* Ehr. crypt. 31. Fl. fr. 2. p. 581. *E. eburneum* Schreb. (v. v.)
3. *E. SYLVATICUM* (L. sp. 1516.) caule sterili fistuloso striato, dentibus et ramis circiter 12, ramis decompositis arcuato-deflexis, caule fructifero subnudo vaginis laxis, ramis paucioribus depauperatis. \mathcal{U} in montosis argillosis humidis. — Fl. fr. 2. p. 583. Vauch. mon. t. 3. (v. v.)
4. *E. UMBROSUM* (Willd. sp. 5. p. 3.) caule sterili fistuloso, dentibus et ramis circiter duodecim, ramis simplicibus arcuato-deflexis triquetris, caule fructifero nudiusculo, vaginis laxis, ramis depauperatis. \mathcal{U} in umbrosis Pyrenæorum ex Lapeyr. — Vauch. t. 4. (v. s. ex Germ.)
5. *E. PALUSTRE* (L. sp. 1516.) caule sulcato subscabro, sulcis dentibusque ferè octonis, ramis totidem quadrangularibus sæpè abortivis. \mathcal{U} in pratis et humidis. — Fl. fr. 2. p. 583. *E. tuberosum* Fl. fr. 5. p. 245. Vauch. mon. t. 5. (v. v.)
- $\beta.$ *polystachyon* (Ray ang. ed. 3. t. 5. f. 3.) ramis elongatis fructiferis. — Vauch. mon. t. 5. f. 2. (v. v.)
- $\gamma.$ *nudum*, vaginis dilatatis. (v. v.)
6. *E. LIMOSUM* (L. sp. 1517. non herb.) caule glabro fistuloso, striis dentibusque ferè 14, ramis simplicibus sæpius abortivis. \mathcal{U} in stagnis et fossis. — Fl. fr. 2. p. 582. Ray. t. 5. f. 2. Vauch. mon. t. 7. (v. v.)
7. *E. HYemale* (L. sp. 1517.) caule subnudo scabro fistuloso, striis et vaginæ dentibus ferè octodecim, dentibus pilosis aut evanidis. \mathcal{U} in sylvis humidis. — Fl. fr. 2. p. 580. Vauch. monog. t. 9. Vaginæ basi apiceque nigrescentes. (v. v.)
8. *E. MULTIFORME* (Vauch. mon. t. 12.) caulis numerosis striatis glabriusculis sulcatis apice spiciferis, ramis paucioribus irregulariter dispositis, vaginis plus minusve sphacelatis, dentibus octonis. \mathcal{U} in siccis et arenosis.
- $\alpha.$ *variegatum* (Vauch.) vaginis variegatis. — *E. variegatum* Schl. in DC. fl. fr. 5. p. 244. — Tabern. ic. 251. f. 1. (v. v.)
- $\beta.$ *ramosum* (Vauch.) vaginis amplis laxis, ramis numerosioribus. — *E. ramosum* Schl. in DC. fl. fr. 5. p. 245. (v. v.)
- $\gamma.$ *campanulatum* (Vauch.) vaginis campanulatis, caulis cinereis profundè sulcatis. — *E. campanulatum* Poir. (v. v.)

Ordo CXIV. FILICES Brown. prod. 145. DC. fl. fr. 3. p. 546.
— *Filicum* gen. Juss.

Fructificationes gregariæ, juniores sæpius indusio tectæ, in facie inferiore frondis sitæ, in paucis spuriis terminales spicatæ. *Masc?* Antheræ? minimæ sparsæ in foliis vix evolutis præsentes, membranæ tenui tectæ. *Fem.* Capsulæ uniloculares, sæpius annulo articulato elasticè dissiliente cinctæ, rariùs bivalves, seminulis numerosis minutissimis repletæ. — Frondes (folia) alternæ, pseudo-radicales, sæpè lobato-decompositæ, juniores ab apice ad basin circinnato-convolutæ.

Trib. I. *OPHIOGLOSSÆ* Hook. fl. scot. 2. p. 158.

Capsulæ 1-loculares, basi adnatæ, subglobosæ, coriaceæ, opacæ, annulo elastico destitutæ, semibivalves.

I. *OPHIOGLOSSUM* Sw. journ. Schrad. 2. p. 112. DC. fl. fr. 2. p. 570. — *Ophioglossi* sp. L.

Capsulæ subglobosæ sessiles uniloculares transversè dehiscentes, in spicam subarticulatam disticham connatæ.

1. *O. VULGATUM* (L. sp. 1518.) fronde ovatâ. \mathcal{U} in pascuis humidis. — Fl. fr. 2. p. 570. eng. bot. t. 108. Lam. ill. t. 864. f. 1. Barr. ic. t. 252. f. 1. (v. v.)
2. *O. LUSITANICUM* (L. sp. 1518.) fronde linearis-lanceolatâ. \mathcal{U} in arenosis maritimis Armoraciæ circâ Brivatem et Legionem, Burdigalæ (cl. Bory), Corsicæ. — Fl. fr. 5. p. 243. Lam. ill. t. 364. f. 3. — Barr. ic. t. 252. f. 2. Præcedenti triplò quadruplovè minus. (v. s.)

II. *BOTRYCHIUM* Sw. journ. Schrad. 2. p. 110. DC. fl. fr. 2. p. 569.

Capsulæ subglobosæ distinctæ sessiles uniloculares, ab apice ad basin dehiscentes, in spicam racemosam congestæ.

1. *B. LUNARIA* (Sw. l. c.) fronde solitariâ pinnatâ, pinnis lunatis. \mathcal{U} in pascuis montanis. — Fl. fr. 2. p. 569. *Osmunda Lunaria* L. eng. bot. t. 318. — Barr. ic. t. 252. f. 3. (v. v.)
2. *B. MATRICARIOIDES* (W. sp. 4. p. 62.) frondibus geminis subradicalibus petiolatis tripartitis, partitionibus subpinnatis, segmentis obtusis subdentatis subrotundis. \mathcal{U} in sylvis Vogesorum ex Schauenb. et Pyrenæorum ex Lapeyr. — Fl. fr. 5. p. 243. — Moris. s. 14. t. 5. f. 9. n. 26. (v. s. ex Siberiâ.)

Trib. II. *OSMUNDACEÆ* Hook. l. c.


Capsulæ annulo destitutæ, vasculoso-reticulatæ pellucidæ apice radiatæ aut substriatæ, longitudinaliter dehiscentes.


III. *OSMUNDA* Lam. fl. fr. 1. p. 10. DC. fl. fr. 2. p. 569.

Capsulæ confertæ subglobosæ pedicellatae uniloculares semibivalves in racemum seu in dorsum frondis dispositæ.

1. *O. REGALIS* (L. sp. 1521.) frondibus bipinnatis, omnibus fractiferis, racemo









terminali supra-decomposito, ♀ in sylvis humidis. — Fl. fr. 2. p. 569. Lam. ill. t. 865. f. 2. eng. bot. t. 209. (v. v.)

Trib. III. POLYPODIACEÆ Hook. scot. p. 152.

Capsulæ monocolulares annulo elasticò longitudinali cinctæ, transversè et irregulariter dehiscentes.

IV. CETERACH C. Bauh. pin. 354. DC. fl. fr. 2. p. 566.

Capsulæ sparsæ aut variè aggregatæ, squamis scarioso-fuscis membranaceis aut filiformibus obtectæ.

1. C. OFFICINARUM (C. Bauh. l. c.) fronde pinnatifidâ, laciniis alternis confluentibus obtusis, subtûs densè squamosis. ♀ ad rupes et muros. — Fl. fr. l. c. Asplenium Ceterach L. Grammitis Ceterach Willd. — Moris. s. 14. t. 2. f. 13. (v. v.)
2. C. MARANTÆ (DC. fl. fr. 2. p. 567.) fronde subbipinnatâ, pinnulis opposito-coadunatis basi subdentatis subtûs densè squamosis. ♀ ad rupes volcanicas circa Thueis (Ardèche) detexit cl. Prost, propè Tournon cl. Req. — Fl. fr. 5. p. 243. Acrostichum Marantæ L. — Lob. ic. t. 816. (v. s.)

V. GRAMMITIS Sw. syn. fil. p. 3.

Capsulæ in acervos oblongos sublineares rectos sparsæ; indusio nullo.

1. G. LEPTOPHYLLA (Sw. l. c. p. 3. et 218. t. 1. f. 6.) frondibus pinnatis bipinnatisque glaberrimis, pinnulis cuneiformibus rotundo-lobatis. ♀ in maritimis Corsicæ, Galloprovinciæ, Armoracie circa Brivatem et Legionem. — Acrostichum leptophyllum DC. fl. fr. 2. p. 565. — Barr. ic. t. 431. (v. s.)

VI. POLYPODIUM Adans. fam. 2. p. 26. DC. fl. fr. 2. p. 564. — Polypodii sp. L.

Capsulæ in puncta rotunda sparsa aggregatæ; indusio nullo.

1. P. VULGARE (L. sp. 154.) fronde profundè pinnatifidâ, lobis oblongis crenulatis obtusis approximatis, candice squammato. ♀ in muris, tectis et arborum truncis. — Fl. fr. 2. p. 564. eng. bot. t. 1149. P. cambricum L. — Moris. s. 14. t. 2. f. 6. n. 8. (v. v.)
β. serratum (Willd.) lobis linear-lanceolatis serratis acutis. — Fl. fr. 5. p. 242. — Barr. ic. t. 38. In agro Syrtico propè S.-Sever. (cl. Dufour), circa Vire ex cl. Lenormand. (v. s.)
2. P. PHÆGOPTERIS (L. sp. 1550.) fronde pinnatâ pinnis pinnatifidis basi coadunatis, infimis reflexis, segmentis linear-lanceolatis obtusis integris ciliatis. ♀ in montosis humidis Vogesorum, Arverniæ, Cebennarum (cl. Prost), ad rupes madidas sylvarum Neustriæ ex cl. Lenormand. — Fl. fr. 2. p. 564. eng. bot. t. 2224. — Moris. s. 14. t. 4. f. 3. n. 17. (v. s.)
3. P. RHÆTICUM (L. sp. 1552.) fronde bipinnatâ, pinnulis oblongis obtusis pinnatifidis, lobis dentatis, soris orbiculatis. ♀ in pascuis sylvaticis Alpium Delphinatûs ex Vill., in summis præruptis herbidis Vogesorum (cl. Moug. et Nestl.) — Fl. fr. 5. p. 242. — J. Bauh. hist. 3. p. 740. f. 1. (v. v.)
4. P. DRYOPTERIS (L. sp. 1555.) fronde ternatâ bipinnatâ patulo-deflexâ, laciniis obtusis subcrenatis, radice filiformi. ♀ in umbrosis sylvarum imprimis ist montanis. — Fl. fr. 2. p. 565. eng. bot. t. 616. (v. v.)
5. P. CALCAREUM (Sm. brit. 3. p. 1117.) fronde ternatâ bipinnatâ erectâ rigidulâ, laciniis obtusis subcrenatis, maculis fructiferis confluentibus. ♀ in ericetis montosis calcareis Jurassi et Pyrenæorum. — Fl. fr. 5. p. 243. — Clas. hist. 2. p. 212. f. 1. (v. v.)

VII. WOODSIA R. Br. in trans. linn. t. xi. p. 170.

Capsulæ pedicellatae in soros subrotundos aggregatae; indusium calyciforme apertum margine crinitum, receptaculo communi elevato nullo.

1. W. HYPERBOREA (Br. l. c. t. 11.) fronde pinnatâ, pinnis tripartitis vel pinnatifido-incisis cuneiformibus obtusis subtus hirtis, soris solitariis demum confluentibus. ♀ in Alpibus et Pyrenæis rariūs. — Polypodium hyperboreum Willd. eng. bot. t. 2023. Fl. fr. 5. p. 242. Ceterach alpinum Fl. fr. 2. p. 566. — Moris. s. 14. t. 3. f. ult. n. 23? (v. s.)

VIII. POLYSTICHUM Roth. germ. 3. p. 76. DC. fl. fr. 2. p. 559. — Hypopeltis Rich. — Polypodii sp. L.

Capsulæ in puncta subrotunda sparsa dispositæ, indusio umbilicato nempe centro adfixo et margine toto deliscente tectæ.

1. P. OREOPTERIS (DC. fl. fr. 2. p. 563.) fronde pinnatâ pinnis lanceolatis glabris resinoso-glandulosis inferioribus pinnatifidis, segmentis lanceolatis obtusis integris, punctis fructiferis marginalibus subconfluentibus, stipite nudo. ♀ in sylvis montanis et ericetis. — Polyp. oreopteris eng. bot. t. 1019. (v. v.)
2. P. THELYPTERIS (Roth. germ. 3. p. 77.) fronde pinnatâ, pinnis pinnatifidis glabris basi distinctis decussantibus, segmentis ovatis acutis integris, punctis fructiferis marginalibus confluentibus, stipite nudo. ♀ in sylvis subpaludosis. — Fl. fr. 2. p. 563. Polyp. Thelypteris Hedw. th. retr. t. 6. eng. bot. t. 509. (v. v.)
3. P. CALLIPTERIS (DC. fl. fr. 2. p. 562.) fronde subbipinnatâ, pinnis cordato-oblongis, inferioribus pinnatis, superioribus pinnatifidis, pinnulis ovatis obtusis denticulato-serrulatis, stipite paleaceo. ♀ in paludosis Abbevilleæ (cl. Boucher), Parisiorum ex Lois., Jurassi. — Polypod. cristatum L. sp. 1551. Afz. act. holm. 1787. t. 9. Aspidium cristatum eng. bot. t. 2125. (v. s.)
4. P. TANACETIFOLIUM (DC. fl. fr. 2. p. 562.) fronde bipinnatâ, pinnulis oblongis pinnatifidis, lacinias linearibus apice serratis, stipite subpaleaceo. ♀ in Vogesis, montibus Arverniæ, Corsicæ. — Polypod. tanacetifolium Hoff. (v. s.)
5. P. DILATATUM (DC. fl. fr. 5. p. 241.) fronde bipinnatâ, pinnulis oblongis distinctis inciso-pinnatifidis, segmentis mucronato-serratis, stipite paleaceo. ♀ in sylvis montanis. — P. spinulosum Fl. fr. 2. p. 561. excl. syn. Sw. Aspidium dilatum eng. bot. t. 1461. — Mapp. als. 106. f. 8. (v. v.)
6. P. FILIX-MAS (DC. fl. fr. 2. p. 559.) fronde bipinnatâ, pinnulis oblongis crenatis obtusis apice serratis basi duobus punctis fructificationis utrinque donatis, rachi stipiteque paleaceis. ♀ in sylvaticis et sterilibus. — Polyp. filix-mas L. sp. 1551. Aspidium filix-mas eng. bot. t. 1458. (v. v.)
♂. abbreviatum, pinnulis ovalibus obtusissimis crenatis, basi unico fructificationis punto utrinque donatis. — In sylvaticis agri Syrtici. — P. abbreviatum DC. fl. fr. 2. p. 560. (v. s.)
7. P. RIGIDUM (DC. fl. fr. 2. p. 560.) fronde pinnatâ ovato-lanceolatâ, pinnis bipinnatifidis cordato-lanceolatis, lacinias oblongis obtusis apice dentatis, stipite paleaceo. ♀ in sylvaticis petrosis Alpium et rariūs Pyrenæorum ex Lapeyr. — Polypodium fragrans Vill. excl. syn. (v. s.)
8. P. ACULEATUM (Roth. germ. 8. p. 77.) fronde bipinnatâ, pinnulis rigidis ovatis sublunatis acuminatis basi decurrentibus margine subserratis spinulosis, rachi stipiteque paleaceis. ♀ in sepibus sylvisque montanis. — Fl. fr. 2. p. 561. Aspidium aculeatum eng. bot. t. 1562. — Pluck. t. 180. f. 2. (v. v.)
9. P. PLUCKNETII (DC. fl. fr. 5. p. 241.) fronde pinnatâ, pinnis pinnatifidis basi subpinnatis, lobis ovato-lunulatis ciliato-serratis, inferiore anticè maximo,



Alonzo

stipite paleaceo. ♀ in sepibus et umbrosis. — *Polypodium Plucknetii* Lois. not. 146. — Pluckn. t. 180. f. 3. (v. s.)

10. *P. LONCHITIS* (Roth. germ. 3. p. 77.) fronde pinnatâ, pinnis lanceolato-falcatis acutis ciliato-serratis basi antice acutè auriculatis, stipite paleaceo. ♀ in sylvis montanis. — Fl. fr. 2. p. 560. *Aspidium Lonchitis* eng. bot. t. 796. — Moris. s. 14. t. 2. f. 12. n. 1. An 2. præcedentes hujus tantum varietates? (v. v.)

IX. ASPIDIUM DC. fl. fr. 2. p. 557. — *Aspidii sp. Sw.*

Capsulæ in puncta subrotunda sparsa dispositæ, indusio ab apice ad basin utrinque dehiscente acutissimo tectæ.

1. *A. FRAGILE* (Sw. journ. Schrad. 2. p. 40.) pinnis bipinnatifidis oppositis, pinnulis ovatis obtusis incisis, lacinulis acutis serrato-dentatis. ♀ in sylvaticis montanis et fissuris rupium. — Fl. fr. 2. p. 558. excl. var. ♂ et ♂ et 5. p. 240. *Cyathea fragilis* eng. bot. t. 1587. — Pluckn. t. 79. f. 3 et 180. f. 5. Admodum variabile. (v. v.)

2. *A. REGIUM* (Sw. syn. 58.) fronde bipinnatâ, pinnulis obovato - oblongis lobato-pinnatifidis, laciñiis linearē - oblongis obtusis subintegerrimis. ♀ in rupibus Alpium et Pyrenæorum. — Fl. fr. 5. p. 240. *Cyathea regia* Sm. eng. bot. t. 163. — Vill. dauph. 3. t. 53. f. C. An præcedentes var.? (v. s.)

3. *A. ALPINUM* (Sw. syn. 60.) frondibus triplicato-pinnatis, pinnulis pinnatifidis confluentibus, laciñiis linearibus obtusis apice bidentatis. ♀ in rupibus editiorum Alpium et Pyrenæorum. — Fl. fr. 5. p. 241. *Polypodium Alpinum* Jacq. ic. rar. 3. t. 642. — Seg. veron. suppl. t. 1. f. 3. (v. v.)

4. *A. MONTANUM* (Sw. journ. Schrad. 2. p. 42.) suprà-decompositum, foliolis ternis tripinnatifidis, lacinulis subfalcatis obtusis apice dentatis. ♀ in sylvaticis montanis. — Fl. fr. 2. p. 558. *Polypodium myrrhidifolium* Vill. dauph. 4. t. 53. — Pluckn. t. 89. f. 4. (v. v.)

X. ATHYRIUM DC. fl. fr. 2. p. 556. — *Athyrii sp. Roth.*

1. *A. FILIX-FEMINA* (Roth. germ. 3. p. 68.) fronde bipinnatâ, pinnulis oblongo-lanceolatis inciso - serratis, serraturis 2-3 - dentatis acutis, soris oblongis angustis. ♀ in sylvaticis et montanis. — Fl. fr. 2. p. 556. *Aspidium Filix-semina* eng. bot. t. 1459. — Pluckn. t. 181. f. 2. (v. v.)

XI. ASPLENIUM Smith. brit. 3. p. 1126. DC. fl. fr. 2. p. 553. — *Asplenii sp. L.*

Capsulæ in lineolas rectas transversas sparsas dispositæ, indusio laterali interius dehiscente tectæ.

1. *A. HALLERI* (DC. fl. fr. 5. p. 240.) frondibus bipinnatis rigidis, pinnulis alternis cuneiformi - triangularibus apice mucronato-dentatis obtusis. ♀ in rupibus calcareis Jurassi, Alpium, Pyrenæorum. — *Aspidium Halleri* Willd. 4. p. 274. *Athyrium fontanum* Fl. fr. 2. p. 557. — Barr. ic. t. 432. f. 1. (v. v.)

2. *A. LANCEOLATUM* (Sm. eng. bot. 240.) frondibus bipinnatis, pinnis ovato-lanceolatis, pinnulis obovatis argutè dentatis. ♀ Ad fissuras humidas rupium Fontisbleaudi, Neustriæ propè Vire et Falaise ex cl. Lenormand et de Bréb., Nigri-Monasterii, Burdigalæ (Des Moul.), Cebennarum. — Fl. fr. 5. p. 239. — Dod. pempt. 265. ic. — Vaill. bot. t. 9. f. 1. (v. s.)

3. *A. ADIANTHUM-NIGRUM* (L. sp. 1542.) frondibus subtripinnatis, pinnulis ovato-lanceolatis inciso-serratis, soris demum confluentibus. ♀ in locis umbrosis et nemoribus humidis. — Fl. fr. 2. p. 556. eng. bot. t. 1950. (v. v.)

4. *A. RUTA-MURARIA* (L. sp. 1541.) frondibus alternatim decompositis, pinnulis cuneato - rhomboideis subtrilobato - crenulatis. ♀ in muris et rupibus umbrosis frequens. — Fl. fr. 2. p. 555. eng. bot. t. 150. (v. v.)

5. *A. MARINUM* (L. sp. 1540.) fronde pinnatâ, pinnis oblongis obtusis incisc-

- serratis*, superioribus basi rotundis et subauriculatis. \mathcal{U} in maritimis Galliae occidentalis passim, insulis Stæchadum ex Ger. — Fl. fr. 2. p. 555. eng. bot. t. 392. — Moris. s. 14. t. 3. f. 4. n. 25. (v. s.)
6. A. VIRIDE (Huds. ang. 453.) frondibus pinnatis, stipitibus basi fuscis, pinnis rhomboe - subrotundis obtusè serratis. \mathcal{U} ad fissuras rupium Vogesorum, Jurassi, Alpium, Pyrenæorum. — Fl. fr. 2. p. 554. eng. bot. t. 2257. (v. v.)
 7. A. FONTANUM (DC. fl. fr. 5. p. 239.) frondibus pinnatis, stipitibus viridibus glabris basi fuscis, pinnis inferioribus trilobis crenatis, superioribus subrotundis. \mathcal{U} ad rupes Pyrenæorum orientalium. — Polypodium fontanum Sm. brit. 3. p. 1114. — Pluck. t. 89. f. 2. — Moris. s. 14. t. 3. f. 2. n. 11. An prioris var. (v. s.)
 8. A. TRICHOMANES (L. sp. 1540.) frondibus pinnatis, stipitibus nigrescentibus, pinnis rotundo-oblongis obtusè crenatis basi truncato-cuneatis. \mathcal{U} in muris et rupibus umbrosis humidis frequens. — Fl. fr. 2. p. 554. eng. bot. t. 576. — Moris. s. 14. t. 3. f. 1. n. 10. (v. v.)
- β . *Petrarchæ*, stipitibus pubescientibus. — A. Petrarchæ Fl. fr. 5. p. 238.
A. glandulosum Lois. not. 145. (v. s.)
9. A. GERMANICUM (Weiss. goett. p. 299.) frondibus alternalim subdecompositis, pinnulis subcuneiformibus apice incisis. \mathcal{U} in muris et rupibus submontanis Alsatiæ, Vogesorum, Jurassi ex Hall. agri Ligericini (cl. Prost). — Fl. fr. 2. p. 553. A. alternifolium Jacq. misc. 2. t. 5. f. 2. eng. bot. t. 2258. — Breyn. cent. t. 97. (v. s.)
 10. A. SEPTENTRIONALE (Hoffm. germ. 2. p. 12.) stipitibus nudis glabris superne trifidis, segmentis linearibus apice laciniatis tridentatis. \mathcal{U} in fissuris rupium. — Fl. fr. 2. p. 553. Acrostichum septentrimonale L. eng. bot. t. 1017. (v. v.)

XII. SCOLOPENDRIUM Smith. act. taur. 5. p. 410. DC. fl. fr. 2. p. 551. — Asplenii sp. L.

Capsulæ in lineolas sparsas lineares geminas intervenias dispositæ, indusiis 2 superficialibus suturâ longitudinali dehiscentibus tectæ.

1. S. OFFICINALE (Sm. act. taur. 5. p. 410.) frondibus cordato-lingulatis. \mathcal{U} in humidis umbrosis. — Fl. fr. 2. p. 552. eng. bot. t. 1150. A. Scolopendrium L. — Moris. s. 14. t. 1. f. 1. (v. v.)
2. S. SAGITTATUM (DC. fl. fr. 5. p. 238.) frondibus hastatis basi cordatis, auriculis mediocribus obtusis. \mathcal{U} in rupibus maritimis Massiliae, Corsiae (cl. Soleiro). — S. Hemionitis Fl. fr. 2. p. 552. non L. — Clus. hist. 2. p. 214. f. 1. — Matth. comm. 646. f. 2. (v. v.)

XIII. BLECHNUM Smith. act. taurin. 5. p. 411. DC. fl. fr. 2. p. 551. — Osmunda sp. L.


Capsulæ in lineas longitudinales solitarias continuas costæ frondis parallelas dispositæ, indusio superficiali continuo interius dehiscente tectæ.


1. B. SPICANT (Sm. I. c.) frondibus sterilibus pinnatifidis, laciniis lanceolatis obtusiusculis parallelis, fructiferis pinnatis, pinnis linearibus acuminatis. \mathcal{U} in nemoribus montanis. — Fl. fr. 2. p. 551. B. boreale Sw. eng. bot. t. 1159. Osmunda spicant L. (v. v.)

XIV. PTERIS Sm. act. taur. 5. p. 412. DC. fl. fr. 2. p. 549. — Pteridis et Acrostichi sp. L.

Capsulæ in lineam continuam marginalem dispositæ, indusio è margine frondis inflexo interius dehiscente tectæ.

1. P. CRISPA (All. ped. n. 2352.) frondibus sterilibus bipinnatis, pinnulis pin-





natifidis, segmentis obovato-crenatis apice inciso-dentatis, frondibus fertilibus infernè bipinnatis tripinnatisve, pinnulis linearibus oblongis subobtusis integris basi angustatis. ♀ in pratis saxosis montium. — Fl. fr. 2. p. 550. eng. bot. t. 116. *Osmunda crispa* L. — Moris. s. 14. t. 4. f. 11. n. 4. (v. v.)

2. P. AQUILINA (L. sp. 1533.) fronde suprà-decomposità, pinnulis lineari-lanceolatis, superioribus indivisis, inferioribus pinnatifidis, segmentis oblongis obtusis. ♀ in campestribus et sylvaticis sterilibus. — Fl. fr. 2. p. 550. Hook. scot. 2. p. 156. eng. bot. t. 1679. (v. v.)

3. P. CRETICA (L. mant. 130.) fronde pinnatà, pinnis oppositis lanceolatis elongatis basi angustatis, infimis tripartitis. ♀ in Corsicâ et circâ Niceam. — Fl. fr. 2. p. 549. — Tourn. inst. t. 321. (v. v. DC.)

XV. ADIANTHUM L. gen. n. 1180.

Capsulæ in puncta discreta seu lineolas ad marginem frondis distributæ, indusiis è margine ortis replicatis interius dehiscentibus tectæ.

1. A. ODORUM (DC. fl. fr. 5. p. 237.) frondibus bipinnatis, pinnulis ovatis obtusis sublobatis subtùs undis, stipite palaceo. ♀ ad muros et rupes humidas Corsicæ, Galloprovinciæ orientalis, Pyrenaorum orientalium. — A. fragrans Fl. fr. 2. p. 549. Viv. frag. 9. t. 11. f. 2. *Pteris acrosticha* Balb. *Polypodium fragrans* Desf. atl. 2. t. 257. non L. *Cheilanthes odora* Sw. (v. s.)

2. A. CAPILLUS-VENERIS (L. sp. 1558.) frondibus decompositis, pinnulis cuneatis apice rotundatis lobatis, stipite laevi. ♀ ad fontes umbrosos Jurassi et provinc. australium. — Fl. fr. 2. p. 548. — Tourn. inst. t. 317. (v. v.)

XVI. HYMENOPHYLLUM Sm. act. taur. 5. p. 118. DC. fl. fr. 2. p. 547. — Trichomanis sp. L.

Capsulæ marginales sessiles receptaculo communi cylindrico insertæ, intrà indusia bivalvia.

1. H. TUMBRIDGENSE (Sm. l. c.) frondibus subbipinnatis ovatis decurrentibus pinnulisque serratis, fructificationibus suprà-axillaribus solitariis. ♀ inter muscos, ad truncos in maritimis Armoraciæ, propè Cherbourg, Mortain (Manche) et Béfort (cl. Lejeune). — Fl. fr. 1. c. eng. bot. t. 162. — Pluck. t. 3. f. 5. 6. (v. s.)

Ordo CXV. MARSILEACEÆ *Brown. prod. 166.* — Rhizospermæ *Roth. DC. fl. fr. 3. p. 577.*

Fructificationes radicales; involucrum subsphæricum non dehiscens, coriaceum aut membranaceum, uni-aut multiloculare, organa utriusque sexus, deinde semina plura foventes. — Herbae aquaticeæ.

Trib. I. *SALVINIEÆ Ad. Brongn. in dict. class. t. 10. p. 196.*

Fructificationes membranaceæ biformes; aliæ (semina) ovoidæ integumento tenui reticulato in aquâ non intumescenti; aliæ (involucra? flores masculi?) multos granulos sphæricos columnæ centrali longis pedicellis adnexos, seminibus multò minores, reticulatos, in aquâ non disrumpentes, foventes. — Folia opposita (in nostris), non convoluta.

I. *SALVINIA Mich. gen. t. 58. Juss. gen. p. 16.*

Involucra 4-9 aggregata ovoidea membranacea 1-locularia; semina embryone unico.

1. *S. NATANS* (Hoffm. germ. 2. p. 1.) foliis ovato-subcordatis obtusis subtus pilis fasciculatis sebris. — Natans in aquis quietis provinciarum australium, Burdigalæ ex Laterr., ad ripas Rheni (cl. Mong. et Nestl.). — Fl. fr. 2. p. 579. Lam. ill. t. 863. *Marsilea natans* L. — Guett. acad. 1762. t. 29. f. 1. (v. v.)

Trib. II. *MARSILEÆ*. — Marsileaceæ veræ *Ad. Brongn. l. c.*

Involucra coriacea crassa indehiscentia aut multivalvia intùs dissepsimentis membranaceis multilocularia. In quoque loculo adsunt organa biformia parietibus inserta, alia pauciora (ovaria aut potius semina) integumento duplice, externo pellucido humiditate tumescenti, interno duro coriaceo, semine in substantiâ gelatinosâ nidulante et omnino libero; alia numerosiora utriculi membranacei humiditate tumescentes apice dehiscentes et in muco gelatinoso globulos sphæricos numerosos seminibus multò minores foventes. — Folia juniora filicum more apice convoluta.

II. *MARSILEA Juss. gen. p. 16. — Marsileæ sp. L.*

Involucra 2-3 pedicello communi insidentia, ovoidea, coriacea, intùs dissepsimentis tenuissimis multilocularia.

1. *M. QUADRIFOLIA* (L. sp. 1563.) foliis longè petiolatis quadrifoliolatis, foliolis margine integris. — In aquis natans passim. — Fl. fr. 2. p. 578. Lam. ill. t. 863. — Mapp. als. 166. ic. (v. v.)

III. *PILULARIA L. gen. n. 1183.*

Involucra solitaria subsessilia globosa coriacea quadrilocularia.

1. *P. GLOBULIFERA* (L. sp. 1563.) foliis filiformibus. ♀ in inundatis ad littora paludum passim. — Fl. fr. 2. p. 577. Lam. ill. t. 862. Vaill. bot. t. 15. f. 6. — Juss. acad. 1739. t. 11. (v. v.)



5-10
681 Mr. Neil
Cause ^{tried} ~~tried~~
2 vols. of C. Jones

Ordo CXVI. LYCOPODIACEÆ Richard. DC. fl. fr. 2. p. 571.

Fructificationes crustaceæ sessiles, ad axillas nunc foliorum et tunc axillares, nunc bractearum et tunc spicatae dictæ. Capsulæ nunc uniformes seminula multa foventes; nunc biformes; aliæ vulgationes (forsan masculæ) globulis sphæricis pulveraceis repletæ; aliæ rariores (verosimiliter femineæ) in-cludentes semina sphærica subscabra subtus costis tribus prominulis notata.

Trib. I. ISOETIDEÆ.

Capsulæ indehiscentes.

I. ISOETES L. gen. n. 1184.

Frutificationes subradicales, basi frondis immersæ; coccula oblonga non dehiscentia polysperma. — Folia radicalia.

1. I. LACUSTRIS (L. sp. 1563.) foliis subulatis semiteretibus. ♀ in fundo lacuum Armoraciæ, Aquitaniæ, Monspelii. — Fl. fr. 2. p. 576. Lam. ill. t. 862. eng. bot. t. 1084. — Ray ang. 1. p. 210. ic. (v. v.)

Trib. II. LYCOPODIEÆ.

Capsulæ dehiscentes.

II. LYCOPODIUM L. gen. 1185.

Dioicum aut monoicum. *Masc.* Coccula bivalvia pulvere plena. *Fem.* Coccula quadrivalvia 1-4-sperma. — Herbae habitu sicco vario, foliis caulinis numerosis imbricatis aut bifariam dispositis.

- Sect. 1. EULYCOPODIUM — *Lycopodium Ad. Brongn. in dict. class. t. 9. p. 559.*

Coccula omnia bivalvia semina? rotunda sphærica aut ovalia libera foventia.

1. L. ALPINUM (L. sp. 1567.) foliis quadrifariam imbricatis acutis carinatis, floralibus ovato-lanceolatis planis, ramulis fastigiatis erectis. ♀ in sylvis montanis. — Fl. fr. 2. p. 572. Fl. lapp. t. 11. f. 6. — Dill. musc. t. 58. f. 2. (v. v.)

2. L. COMPLANATUM (L. sp. 1567.) foliis quadrifariis basi connatis, duobus majoribus bifariam dispositis, duobus minimis adpressis, spicis geminis penduculatis. ♀ in sylvis Vogesorum et circâ Parisios. — Fl. fr. 2. p. 572. — Dill. musc. t. 59. f. 3. (v. s.)

3. L. ANNOTINUM (L. sp. 1566.) foliis sparsis subserratis muticis quinquefariis, floralibus dilatatis abbreviatis, ramis floriferis annotino-articulatis. ♀ in Alpibus Delphinatûs ex Villi. — L. juniperifolium Lam. DC. fl. fr. 2. p. 572. — Dill. musc. t. 63. f. 9. Moris. s. 15. t. 5. f. 2. n. 3. (v. v. in Alp. helv.)

4. L. CLAVATUM (L. sp. 1564.) foliis sparsis apice filamentosis, floralibus dilatato-membranaceis, ramis floriferis infernè strigosis apice bitrifidise. ♀ in ericetis et sylvulis montanis. — Fl. fr. 2. p. 573. — Dill. musc. t. 58. f. 1. Moris. s. 15. t. 5. f. 1. n. 2. (v. v.)

5. L. SELAGO (L. sp. 1565.) foliis sparsis integerrimis lanceolatis muticis uniformibus octofariis, caule dichotomo erecto fastigiato. ♀ in ericetis montosis

544 MONOCOTYL. SEU ENDOGENÆ. LYCOPODIUM.

- humidiusculis. — Fl. fr. 2. p. 573. — Dill. musc. t. 56. f. 1. — Moris. s. 15. t. 5. f. 7. n. 9. (v. v.)
6. L. INUNDATUM (L. sp. 1565.) foliis sparsis integerrimis linear-lanceolatis muticis, floralibus basi dilatatis patentiusculis. ♀ in ericetis inundatis passim. — Fl. fr. 2. p. 574. — Dill. musc. t. 61. f. 7. — Vaill. bot. t. 16. f. 1. (v. s.)

Sect. II. STACHYGYNANDRUM P. de Beauv. Æth. prod. p. 105. Ad. Brongn. l. c.

Coccula biformia 2-valvia (masc?) granulos tenuissimos liberos foventia; alia ovalia 4-valvia 3-4 semina 3-quetra placentæ centrali adnexa? foventia.


7. L. SLAGINOIDES (L. sp. 1565.) foliis sparsis ciliatis lanceolatis, floralibus majoribus patentibus. ♀ in ericetis et pascuis humidis Pyrenæorum, Alpium, Jurassi. — Fl. fr. 2. p. 574. — Dill. musc. t. 68. f. 1. — Hall. helv. t. 46. f. 1. (v. v.)
8. L. HELVETICUM (L. sp. 1568.) foliis ovalibus subacutis quadrifariis, duobus majoribus patulis, duobus minimis adpressis, caule radicante. ♀? in alpibus ad radices arborum et in ripibus umbrosis. — Fl. fr. 2. p. 575. — Dill. musc. t. 64. f. 2. Moris. s. 15. t. 6. f. 3. n. 34. (v. v.)
9. L. DENTICULATUM (L. sp. 1568.) foliis ovalibus acutè mucronatis irregulariter quadrifariis, duobus majoribus patulis, duobus minimis adpressis, caule radicante. (?) ad pedes arborum Galloprovinciæ, Monspelii. — Fl. fr. 2. p. 575. — Dill. musc. t. 66. f. 1. A. (v. s.)

FINIS PRIMÆ PARTIS.





work
de



New York Botanical Garden Library
QK313.C3 1828 pt.1
Candolle, Augustin/Botanicon Gallicum; s

gen



3 5185 00106 0720

